VIII. Die Mineralquellen Bosniens.

Von Prof. E. Ludwig.

(Fortsetzung.)

Die Soolwässer von Dolnj-Tuzla.

Die Stadt Dolnj-Tuzla, Station der Bahnstrecke Doboj-Simintan, liegt $36^{\circ} 20' 5''$ östlich von Ferro, unter $44^{\circ} 32' 3''$ nördlicher Breite, 232 Meter über der Meeresfläche, am Jalaflusse, dessen von Osten nach Südwesten sich erstreckendes Thal in der Nähe dieser Stadt gegen drei Viertelstunden Weges breit ist, nördlich von den Ausläufern der Majevisa Planina und Medvenjk Planina und südlich von dem Tuzlansko Brdo begrenzt wird. Die Thalsohle, sowie die Höhen, welche das Thal einrahmen, bestehen aus Gebilden der Tertiärformation, Sandstein, Schieferthon, Tegel. Eine halbe Stunde westwärts von der Stadt trifft man am linken Ufer der Jala eine von dem Gebirgsbach Kreka tief eingeschnittene Schlucht, in welcher ein Braunkohlenflötz dem Verflachen nach zu Tage tritt, dessen Vorkommen im Bachbette und höher hinauf an den Schluchtwänden genau untersucht werden kann. Das Flötz verflacht mit $6-10^{\circ}$ von SO. nach NW. unter die Thalsohle und H. Rittler¹⁾ fand die totale Maximalmächtigkeit mit $4\frac{1}{2}$ Fuss vor. Dieses Kohlenlager wird nun regelrecht bergmännisch ausgebeutet und hat besonders für die sich lebhaft entwickelnde Industrie grosse Bedeutung erlangt.

Dolnj-Tuzla hat ungefähr 8000 Einwohner, meist Mohammedaner, ist Sitz der Kreisbehörde und eines orthodoxen Bischofs; es gehört zu den wenigen Städten, welche schon seit den Urfängen Bosniens eine hervorragende Rolle spielen. Zuerst wird es von Constantin Porphyrogenitus als „Salenes“ erwähnt. Sein römischer Name war „Ad Salinas“. Die Slaven nennen es noch heute „Soli“ und auch „Tuz“ (bedeutet türkisch Salz). In den ungarischen Urkunden des Mittelalters kommt Tuzla als „Sou“, „Sow“ vor, Hauptstadt des „Salzgebietes“ oder „Salzbanates“. Von

¹⁾ Verhandl. der k. k. geol. Reichsanstalt. Wien 1878, pag. 375.

der Adria zum Pontus ist dies der einzige Ort, wo Salz gefunden wird und daher stammt seine alte Berühmtheit.¹⁾

In den Neogenschichten von Dolnj-Tuzla und Gornj-Tuzla, welche hauptsächlich aus Mergeln mit eingelagerten Tegeln und Sanden bestehen, entspringen mehrere Salzquellen, von denen die zwei wichtigsten in den beiden genannten Städten früher von den Einwohnern in primitivster Weise versotten wurden; die Quelle von Gornj-Tuzla enthielt 17 Procent Salz, jene von Dolnj-Tuzla nur 6 Procent.

In richtiger Würdigung der Wichtigkeit dieses Vorkommens betraute Se. Excellenz der Herr Reichs-Finanzminister v. Kállay im Jahre 1882 Herrn Bergrath Paul mit der näheren geologischen Untersuchung des Terrains um Tuzla. Die Ergebnisse dieser Untersuchung waren so günstig, dass Se. Excellenz die Herstellung einer Reihe von Bohrlöchern anordnete, und zwar zunächst in Gornj-Tuzla, wo die concentrirtere Soole zu Tage trat. Es gelang indessen nur mit der Bohrung am alten Quellenschachte (Bohrloch Nr. 1) eine vierundzwanzigprocentige Soole zu erschliessen, während die übrigen Bohrungen nicht so günstige Resultate ergaben. Da die Soole aus dem Bohrloche Nr. 1 beim Betriebe allmählich verdünnter wurde, verfügte Se. Excellenz der Herr Minister den Aufschluss in Dolnj-Tuzla. So entstanden denn die Bohrungen Nr. 5 und Nr. 6, deren Soolen ich untersucht habe. Das Bohrloch Nr. 5 liegt mitten im Weichbilde der Stadt Dolnj-Tuzla, und zwar an derselben Stelle, an welcher die Einwohner früher die Soole zum Versieden einer Quelle entnahmen; dieses Bohrloch ist 379 Meter tief und liefert grosse Mengen einer Soole, die dermalen wegen ihrer geringen Concentration und ihres grossen Glaubersalzgehaltes nicht verwendet wird. Das Bohrloch Nr. 6 liegt nördlich von der Stadt, ist 367 Meter tief und hat vom 195. Meter an bis zur Sohle Haselgebirge durchfahren. Aus diesem Bohrloche gelangt die Soole in einer Röhrenleitung zunächst zum Bohrloche Nr. 5, von wo aus sie mittelst einer Druckpumpe in die 7 Kilometer entfernte Saline zu Siminhan bei Ueberwindung einer Höhendifferenz von 42 Metern gedrückt wird. Die Saline ist sehr zweckmässig eingerichtet und erzeugt nach dem gewöhnlichen Sud-

¹⁾ Vergl. Bosnien und die Herzegovina von Johann v. Asbóth. Wien 1888. Alfred Hölder.

hüttenprocesse Blanksalz, Grobsalz und Briquettes. Das fertige Salz ist schneeweiss und enthält 97·87 Procent Chlornatrium.¹⁾

Die für die Analyse erforderlichen Mengen der beiden Soolwässer (5 und 6) aus den Bohrlöchern Nr. 5 und 6 sind unter Aufsicht des Herrn Kreisarztes Dr. Duller geschöpft und in Flaschen gefüllt worden, welche gut verkorkt und versiegelt an mich gelangten. Die beiden Wässer sind im frisch geschöpften Zustande etwas getrübt, nach längerem ruhigen Stehen klären sie sich jedoch unter Abscheidung eines geringen, sehr feinen, hellbräunlichen Bodensatzes; sie riechen nach Schwefelwasserstoff und schmecken intensiv salzig. Der Geruch verschwindet bald, wenn das Wasser an der Luft steht. Beim Abkühlen krystallisirt aus beiden Wässern reichlich Glaubersalz aus, das sich beim gelinden Erwärmen nur sehr langsam wieder auflöst. Durch die qualitative Analyse wurden in beiden Soolwässern folgende Bestandtheile nachgewiesen: Kalium, Natrium, Lithium, Ammoniak, Calcium, Magnesium, Eisen, Aluminium, Mangan, Schwefelsäure, Borsäure, Phosphorsäure, Kieselsäure, Kohlensäure, Chlor, Brom, Jod.

II. Soole aus dem Bohrloche Nr. 5.

Die quantitative Analyse ergab nachstehende Resultate:

Das specifische Gewicht der Soole bei 18° C. bestimmt und auf destillirtes Wasser derselben Temperatur als Einheit bezogen, beträgt 1·10411.

Chlor. I. 5·5054 Gramm Wasser lieferten 1·4949 Gramm Chlorsilber und Bromsilber, nach Abzug des Bromsilbers für 10·000 Gramm Wasser 2715·099 Gramm Chlorsilber, respective 671·390 Gramm Chlor.

II. 5·5145 Gramm Wasser gaben 1·4961 Gramm Chlorsilber und Bromsilber, nach Abzug des Bromsilbers für 10·000 Gramm Wasser 2712·794 Gramm Chlorsilber, respective 670·820 Gramm Chlor.

Brom. 882·87 Gramm Wasser verbrauchten 5 Cubikcentimeter Chlorwasser (1 Cubikcentimeter Chlorwasser = 0·00176 Gramm Brom), es resultirt 0·100 Gramm Brom für 10·000 Gramm Wasser.

Schwefelsäure. I. 10·981 Gramm Wasser gaben 0·414 Gramm Baryumsulfat, entsprechend 129·405 Schwefelsäureanhydrid für 10·000 Wasser.

II. 11·0108 Gramm Wasser gaben 0·4124 Gramm Baryumsulfat, entsprechend 128·601 Schwefelsäureanhydrid für 10·000 Wasser.

Borsäure. 1103·59 Gramm Wasser gaben 0·028 Gramm Borsäure und Magnesiumoxyd und 0·0395 Gramm Magnesiumpyrophosphat, entsprechend 0·125 Gramm Borsäureanhydrid für 10·000 Wasser.

¹⁾ Diese Angaben verdanke ich Herrn Oberbergrath Rücker.

Calcium, Magnesium. I. 275.485 Gramm Wasser gaben 0.024 Gramm Calciumoxyd und 0.0307 Gramm Magnesiumpyrophosphat, entsprechend 0.871 Gramm Calciumoxyd und 0.403 Gramm Magnesiumoxyd für 10.000 Wasser.

II. 276.125 Wasser gaben 0.0215 Gramm Calciumoxyd, entsprechend 0.779 Gramm Calciumoxyd für 10.000 Wasser.

III. 275.1693 Gramm Wasser gaben 0.0301 Gramm Magnesiumpyrophosphat, entsprechend 0.393 Gramm Magnesiumoxyd für 10.000 Gramm Wasser.

Eisen, Aluminium. 4393.24 Gramm Wasser gaben 0.0125 Gramm Eisenoxyd und 0.002 Gramm Aluminiumoxyd, entsprechend 0.028 Gramm Eisenoxyd und 0.005 Aluminiumoxyd für 10.000 Wasser.

Lithium. 2207.18 Gramm Wasser gaben 0.0033 Gramm Chlorlithium und Chlornatrium und 0.008 Gramm Chlorsilber, entsprechend 0.0042 Chlorlithium für 10.000 Gramm Wasser.

Alkalien. 11.0729 Gramm Wasser gaben 1.4360 Gramm Chlorkalium, Chlornatrium und Chlorlithium; 5.5065 Gramm Wasser 0.0100 Gramm Kaliumplatinchlorid, entsprechend 3.632 Gramm Kaliumoxyd und 686.454 Gramm Natriumoxyd für 10.000 Gramm Wasser.

Ammoniak. 276.03 Gramm Wasser brauchten 0.785 Schwefelsäure (1 Cubikcentimeter Schwefelsäure entspricht 0.01673 Gramm Ammoniak), entsprechend 0.485 Gramm Ammoniak für 10.000 Gramm Wasser.

Controlbestimmung. 10.9386 Gramm Wasser gaben 1.7340 Gramm Sulfatrückstand, entsprechend 1585.212 Gramm für 10.000 Gramm Wasser.

12. Soole aus dem Bohrloche Nr. 6.

Bei den quantitativen Bestimmungen wurden folgende Resultate erhalten:

Das spezifische Gewicht der Soole, bei 22° C. bestimmt und auf destillirtes Wasser derselben Temperatur als Einheit bezogen, beträgt 1.21121.

Chlor. 6.0038 Gramm Wasser gaben 3.6893 Gramm Chlorsilber; für 10.000 Gramm Wasser nach Abzug des Bromsilbers 6144.539 Gramm Chlorsilber entsprechend 1519.422 Gramm Chlor.

Brom 964.99 Gramm Wasser verbrauchten 9.4 Cubikcentimeter Chlorwasser (1 Cubikcentimeter = 0.00176 Gramm Brom), entsprechend 0.171 Gramm Brom für 10.000 Wasser.

Schwefelsäure. I. 12.0672 Gramm Wasser gaben 0.3575 Gramm Baryumsulfat, entsprechend 101.705 Schwefelsäureanhydrid für 10.000 Wasser.

II. 12.082 Gramm Wasser gaben 0.359 Gramm Baryumsulfat, entsprechend 102.011 Schwefelsäureanhydrid für 10.000 Wasser.

Borsäure. 1201.6 Gramm Wasser gaben 0.195 Gramm Borsäure und Magnesia und 0.2925 Gramm Magnesiumpyrophosphat, entsprechend 0.746 Gramm Borsäureanhydrid für 10.000 Gramm Wasser.

Kieselsäure, Calcium, Magnesium. 834.79 Gramm Wasser gaben 0.0105 Gramm Kieselsäureanhydrid, 0.3822 Gramm Calciumoxyd und 0.475 Gramm Magnesiumpyrophosphat, entsprechend 0.126 Kieselsäureanhydrid, 4.578 Calciumoxyd und 2.050 Magnesiumoxyd für 10.000 Wasser.

Eisen, Aluminium, Phosphorsäure. 4828·83 Gramm Wasser gaben 0·014 Gramm Eisenoxyd, 0·0045 Gramm Aluminiumoxyd und 0·0165 Gramm Magnesiumpyrophosphat, entsprechend 0·029 Eisenoxyd, 0·009 Aluminiumoxyd und 0·022 Phosphorsäureanhydrid für 10.000 Wasser.

Ammoniak. 302·8 Gramm Wasser verbrauchten 0·86 Cubikcentimeter Schwefelsäure (1 Cubikcentimeter = 0·01673 Gramm Ammoniak), entsprechend 0·475 Gramm Ammoniak für 10 000 Wasser.

*Natrium.*¹⁾ I. 12·0906 Gramm Wasser gaben 3·1855 Gramm Chlornatrium, entsprechend 1397·99 Gramm Natriumoxyd für 10.000 Wasser.

II. 12·0940 Gramm Wasser gaben 3·1889 Gramm Chlornatrium, entsprechend 1399·08 Gramm Natriumoxyd für 10.000 Wasser.

Controlbestimmung. I. 12·066 Gramm Wasser gaben 3·8850 Gramm Sulfatrückstand und 6·3880 Gramm Baryumsulfat, entspr. 1402·204 Oxyde für 10.000 Wasser.

II. 12·0558 Gramm Wasser gaben 3·8850 Gramm Sulfatrückstand und 6·3910 Gr. Baryumsulfat, entsprechend 1402·561 Gramm Oxyde für 10.000 Gramm Wasser.

Mittelwerte für 10.000 Gewichtstheile der beiden Soolwässer von Dolnj-Tuzla Nr. 5 und Nr. 6.

	Soole Nr. 5.	Soole Nr. 6.
Chlor	671·390	1519·422
Brom	0·100	0·171
Schwefelsäureanhydrid	129·405	101·858
Kieselsäureanhydrid	—	0·126
Borsäureanhydrid	0·125	0·746
Phosphorsäureanhydrid	Spuren	0·022
Kaliumoxyd	3·632	— ²⁾
Natriumoxyd	685·132	1398·540
Ammoniak	0·485	0·475
Calciumoxyd	0·779	4·578
Magnesiumoxyd	0·393	2·050
Eisenoxyd	0·028	0·028
Aluminiumoxyd	0·005	0·009
Lithium, Mangan, Jod	Spuren	Spuren
Sulfatrückstand gefunden:	1585·212	
„ berechnet:	1581·756	
Summe der Oxyde gefunden:		1402·383
„ „ „ berechnet:		1405·354
Specifisches Gewicht	1·10411	1·21121

¹⁾ Bei der mit Platinchlorid versuchten Abscheidung des Kaliums wurde kein Kaliumplatinchlorid erhalten.

²⁾ In dieser Soole konnte Kalium nicht nachgewiesen werden.

Saure und basische Bestandtheile zu Salzen gruppiert; Werte für 10.000 Gewichtstheile der Soolwässer:

	Soole Nr. 5.	Soole Nr. 6.
Chlornatrium	1106·450	2486·135
Chlorammonium	—	1·491
Chlorcalcium	1·111	9·015
Chlormagnesium	—	4·864
Bromnatrium	0·129	0·220
Schwefelsaures Natrium	224·264	180·834
Borsaures Natrium . . .	0·180	1·077
Schwefelsaures Kalium .	6·716	—
Phosphorsaures Calcium	Spuren	0·048
Calciumbicarbonat . . .	0·560	—
Magnesiumbicarbonat . .	1·257	—
Ammoniumbicarbonat . .	1·370	—
Eisenbicarbonat	0·056	0·056
Aluminiumoxyd	0·005	0·009
Kieselsäureanhydrid . .	—	0·126
Mangan, Lithium, Jod .	Spuren	Spuren
Summe der festen Bestandtheile	1341·479	2683·875

Die Soole 6 ist ihrer chemischen Zusammensetzung nach der Edelsonne von Reichenhall sehr ähnlich, sie unterscheidet sich von der letzteren nur durch den grösseren Gehalt an Glaubersalz und den geringeren Gehalt an Kalksalzen.

13. Die Therme von Gradačac.

Die Bezirksstadt Gradačac liegt im Kreise Dolnj-Tuzla, u. zw. 36° 5' 3" östlich von Ferro, unter 44° 52' 7" nördlicher Breite, 165 Meter über der Meeresfläche. In der Nähe von Gradačac kommt ausgesprochener Leithakalk vor; es sind daselbst wahrscheinlich sarmatische Schichten entwickelt und es findet sich auch Granit.

Die Therme entspringt in der Nähe der Stadt auf ebenem Terrain, sie hat mehrere Ausbruchstellen, von denen die drei ergiebigsten 79 Liter, 35 Liter und 31 Liter Wasser pro Minute liefern.

Das Wasser der ersten Ader wird von einem mit Holz ausgekleideten Bassin aufgenommen, über welches eine Badehütte erbaut ist. Mit dem Thermalwasser steigen an verschiedenen Stellen des Bassins reichlich Gasblasen auf.

Das Wasser der Therme ist klar, farblos, geruchlos und ohne auffallenden Geschmack.

Die qualitative Analyse ergab folgende Bestandtheile: Kalium, Natrium, Lithium, Calcium, Strontium, Baryum, Magnesium, Eisen, Aluminium, Chlor, Schwefelsäure, Phosphorsäure, Borsäure, Kohlensäure, Kieselsäure, Ameisensäure und nicht flüchtige organische Substanz.

Die Temperatur der Therme, am 29. Juli 1886 bestimmt, betrug 29·3° C. bei der gleichzeitigen Lufttemperatur von 22° C.

Das spezifische Gewicht, bei 25·6° C. bestimmt und auf reines Wasser von derselben Temperatur als Einheit bezogen, beträgt 1·0011.

Kalium, Natrium. I. 944·43 Gramm Wasser gaben 0·621 Gramm Chlorkalium und Chlornatrium, ferner 0·0362 Gramm Kaliumplatinchlorid, entsprechend 0·075 Gramm Kaliumoxyd und 3·427 Gramm Natriumoxyd für 10·000 Gramm Wasser.

II. 500·33 Gramm Wasser gaben 0·3278 Gramm Chlorkalium und Chlornatrium, ferner 0·0197 Gramm Kaliumplatinchlorid, entsprechend 0·076 Gramm Kaliumoxyd und 3·413 Gramm Natriumoxyd für 10·000 Gramm Wasser.

Kieselsäure, Calcium, Magnesium. 985·87 Gramm Wasser gaben 0·0334 Gramm Kieselsäure, 0·0862 Gramm Calciumoxyd und Strontiumoxyd, 0·0434 Gramm pyrophosphorsaures Magnesium, entsprechend 0·339 Gramm Kieselsäure, 0·859 Gramm Calciumoxyd, 0·158 Gramm Magnesiumoxyd für 10·000 Gramm Wasser.

Eisen, Aluminium, Phosphorsäure, Strontium. 9738·88 Gramm Wasser gaben 0·0068 Gramm Aluminiumoxyd, 0·0031 Gramm Eisenoxyd, 0·006 Gramm pyrophosphorsaures Magnesium, 0·0308 salpetersaures Strontium, entsprechend 0·007 Grm. Aluminiumoxyd, 0·003 Gramm Eisenoxyd, 0·015 Gramm Strontiumoxyd und 0·004 Gramm Phosphorsäureanhydrid für 10·000 Gramm Wasser.

Borsäure. 4869·44 Gramm Wasser gaben 0·1755 Gramm Borsäure + Magnesiumoxyd; diese auf 50 Cubikcentimeter gelöst, davon 20 Cubikcentimeter zur Magnesiumbestimmung verwendet, wobei erhalten wurden 0·150 Gramm pyrophosphorsaures Magnesium. Von Chlor war nur eine leise Spur vorhanden. Entspricht für 10·000 Gramm Wasser 0·083 Gramm Borsäureanhydrid.

Kohlensäure. I. 186·44 Gramm Wasser gaben 0·1062 Gramm Kohlensäure, entsprechend 5·696 Gramm für 10·000 Gramm Wasser.

II. 186·44 Gramm Wasser gaben 0·1082 Gramm Kohlensäure, entsprechend 5·803 Gramm für 10·000 Gramm Wasser.

Schwefelsäure. I. 903·695 Gramm Wasser gaben 0·338 Gramm Baryumsulfat, entsprechend 1·283 Gramm Schwefelsäureanhydrid für 10.000 Gramm Wasser.

II. 924·122 Gramm Wasser gaben 0·340 Gramm Baryumsulfat, entsprechend 1·266 Gramm Schwefelsäureanhydrid für 10.000 Gramm Wasser.

Chlor. 899·81 Gramm Wasser gaben 0·0895 Chlorsilber und 0·014 Silber, entsprechend 0·480 Gramm Chlor für 10.000 Gramm Wasser.

Organische Substanz. 250·18 Gramm Wasser verbrauchten 1·51 Cubikcentimeter Chamäleon, 1 Cubikcentimeter desselben entspricht 0·93 krystallisirter Oxalsäure, demnach für 10.000 Gramm Wasser 0·056 Gramm organische Substanz.

Control-Sulfate. 501·3235 Gramm Wasser gaben, mit Schwefelsäure behandelt, 0·5506 Gramm Sulfatrückstand, entsprechend für 10.000 Gramm Wasser 10·9829 Gramm.

Mittelwerte für 10.000 Gewichtstheile des Wassers der Therme in Gradačac.

Schwefelsäureanhydrid	1·275
Chlor	0·480
Borsäureanhydrid	0·083
Phosphorsäureanhydrid	0·004
Kieselsäureanhydrid	0·339
Kohlensäureanhydrid	5·749
Kaliumoxyd	0·076
Natriumoxyd	3·420
Calciumoxyd	0·859
Strontiumoxyd	0·015
Magnesiumoxyd	0·158
Eisenoxyd	0·003
Aluminiumoxyd	0·007
Lithium, Baryum, Ameisensäure . .	Spuren
Organische Substanz	0·056
Sulfatrückstand gefunden	10·983
Sulfatrückstand berechnet	10·913
Specifisches Gewicht	1·0011

Die sauren und basischen Bestandtheile zu Salzen groupirt
für 10.000 Gewichtstheile Wasser:

A. Die kohlensauren Salze als normale Carbonate gerechnet.

Schwefelsaures Kalium	0·141
Schwefelsaures Natrium	2·148
Borsaures Natrium	0·120
Chlornatrium	0·792
Kohlensaures Natrium	3·460
Phosphorsaures Calcium	0·009
Kohlensaures Calcium	1·525
Kohlensaures Strontium	0·021
Kohlensaures Magnesium	0·332
Kohlensaures Eisen	0·004
Aluminiumoxyd	0·007
Kieselsäureanhydrid	0·339
Organische Substanz	0·056
Halbgebundene Kohlensäure	2·287
Freie Kohlensäure	1·175
Lithium, Baryum, Ameisensäure . .	Spuren
Summe der festen Bestandtheile . . .	8·954

B. Die kohlensauren Salze als wasserfreie Bicarbonate gerechnet.

Schwefelsaures Kalium	0·141
Schwefelsaures Natrium	2·148
Borsaures Natrium	0·120
Chlornatrium	0·792
Natriumbicarbonat	4·895
Calciumphosphat	0·009
Calciumbicarbonat	2·196
Strontiumbicarbonat	0·027
Magnesiumbicarbonat	0·506
Eisenbicarbonat	0·006
Aluminiumoxyd	0·007
Kieselsäureanhydrid	0·339
Organische Substanz	0·056
Lithium, Baryum, Ameisensäure . .	Spuren
Freie Kohlensäure	1·175

Das der Quelle frei entströmende Gas enthält:

Kohlensäure	3.53 Procent
Sauerstoff	0.30 „
Stickstoff	96.17 „

Die Thermen von Olovo.

Olovo liegt $36^{\circ} 14' 3''$ östlich von Ferro, unter $44^{\circ} 7' 5''$ nördlicher Breite, 580 Meter über der Meeresfläche. Ueber die geologischen Verhältnisse der Umgebung von Olovo schreibt Dr. E. Tiêtze¹⁾: „Bei Olovo erheben sich zu beiden Seiten des Thales Kalkberge. Versteinerungen konnte ich trotz ziemlich sorgfältigen Suchens in dem Kalk, der sich dicht bei Olovo befindet, nicht entdecken. Die Kalke sind stellenweise sandig-dolomitisch. Am Flussbette selbst kommen wieder grünlich-bräunlich verwitternde Sandsteine zum Vorscheine, wie sie im Flysch häufig sind. Ihrer Position nach dürften die Sandsteine in's Liegende der beiderseits sich über denselben erhebenden Kalkmassen gehören, weshalb für die letzteren ein relativ junges Alter angenommen wurde. In der Nähe der Brücke wird hier im Flussbett von Olovo manchmal nach Blei gesucht; was ich indessen von den angeblichen Bleierzen sah, waren nur Schlacken. Die letzteren zeigen oft eine grünliche Farbe und glasige Beschaffenheit. Merkwürdigerweise waren aber in dieser Masse oft sehr zahlreich ziemlich grosse Klümpehen oder erhärtete Tropfen von metallischem Blei vertheilt, welche von einer weisslichen Oxydationsrinde überzogen schienen. Doch konnte man durch Kratzen mit dem Messer das Metall zum Vorschein bringen. Das Blei dürfte in der Nähe nur verhüttet worden sein und Olovo war nur der Verschleissmittelpunkt dieser Metallwaaren. Ueber den Ort des Vorkommens der Erze wurde mir eine Auskunft seitens der türkischen Bewohner Olovo's nicht zu Theil. Ich vermuthe, dass in den triadischen Kalkgebirgen der Žiwnica und Čemerna, welche zu dem Varešer Zuge gehören, jene Erze gewonnen wurden. Wenigstens erfuhr ich von dem Vorkommen von Bleierzen daselbst.“

Die Thermen von Olovo entspringen nahe dem Ufer des bereits erwähnten Flusses; das Thermalwasser kommt an sechs benachbarten

¹⁾ l. c. pag. 162.

Stellen aus Felsspalten hervor, einige von diesen Quellen setzen in der heissen Jahreszeit aus. Eine Quelle wird von einem kleinen Bassin aufgenommen und von hier aus das Wasser in ein Badehäuschen geleitet (*Badhausquelle*); eine zweite Quelle von einem sehr primitiven Bassin aufgenommen, das sich im Freien befindet; diese wird von Frauen zum Baden verwendet und *Frauenbad* genannt.

14. Therme von Olovo (*Badhausquelle*).

Die Temperatur der Quelle betrug am 20. Aug. 1887 31.5° C. bei einer gleichzeitigen Lufttemperatur von 23° C.

Das frisch geschöpfte Wasser ist klar, farblos, geruchlos und von fadem Geschmacke; bei längerem Stehen bildet sich ein geringer, weisser, aus Carbonaten der alkalischen Erden bestehender Bodensatz.

Das specifische Gewicht des Wassers bei 22° C. bestimmt und auf reines Wasser derselben Temperatur als Einheit bezogen, beträgt 1.001.

Der qualitativen Analyse zufolge befinden sich in dem Wasser folgende Bestandtheile: Kalium, Natrium, Calcium, Strontium, Magnesium, Eisen, Aluminium, Chlor, Schwefelsäure, Phosphorsäure, Kohlensäure, Kieselsäure und organische Substanzen. Strontium, Eisen, Aluminium, Phosphorsäure sind nur spurenweise vorhanden und konnten deshalb nur qualitativ nachgewiesen werden.

Kalium, Natrium. 961.11 Gramm Wasser gaben 0.0165 Gramm Chloride und 0.0085 Gramm Kaliumplatinchlorid, entsprechend 0.017 Kaliumoxyd und 0.077 Natriumoxyd für 10.000 Wasser.

Kieselsäure, Calcium, Magnesium. 722.39 Gramm Wasser gaben 0.0105 Gramm Kieselsäureanhydrid, 0.078 Gramm Calciumoxyd und 0.0595 Gramm Magnesiumpyrophosphat, entsprechend 0.145 Kieselsäureanhydrid, 1.080 Calciumoxyd und 0.296 Magnesiumoxyd für 10.000 Wasser.

Chlor. 671.02 Gramm Wasser gaben 0.0055 Gramm Silber, entsprechend 0.027 Chlor für 10.000 Wasser.

Schwefelsäure. 655.72 Gramm Wasser gaben 0.0072 Gramm Baryumsulfat, entsprechend 0.038 Schwefelsäureanhydrid für 10.000 Wasser.

Kohlensäure. 186.329 Gramm Wasser gaben 0.0465 Gramm Kohlensäure, entsprechend 2.496 Kohlensäure für 10.000 Wasser.

Organische Substanz. 250.2 Gramm Wasser verbrauchten 0.33 Chamäleon (1 Cubikcentimeter entspricht 0.00938 Gramm krystallisirte Oxalsäure), entsprechend 0.013 Gramm organische Substanz für 10.000 Wasser.

Controlbestimmung. 932·83 Gramm Wasser gaben 0·3458 Gramm Sulfatrückstand, entsprechend 3·707 für 10.000 Wasser.

Mittelwerte für 10.000 Gewichtstheile des Wassers
der Therme von Olovo (Badhausquelle).

Schwefelsäureanhydrid	0·038
Chlor	0·027
Kieselsäureanhydrid	0·145
Gesamt-Kohlensäure	2·496
Kaliumoxyd	0·017
Natriumoxyd	0·077
Calciumoxyd	1·080
Magnesiumoxyd	0·296
Strontium, Eisen	} Spuren
Aluminium, Phosphorsäure	
Organische Substanz	0·013
Sulfatrückstand gefunden	3·707
Sulfatrückstand berechnet	3·719
Specifisches Gewicht	1·001

Die sauren und basischen Bestandtheile zu Salzen gruppirt für
10.000 Gramm Wasser:

A. Die kohlensauren Salze als normale Carbonate gerechnet.

Schwefelsaures Kalium	0·031
Schwefelsaures Natrium	0·043
Chlornatrium	0·045
Kohlensaures Natrium	0·058
„ Calcium	1·929
„ Magnesium	0·622
Kieselsäure	0·145
Strontium, Eisen	} Spuren
Aluminium, Phosphorsäure	
Organische Substanz	0·013
Kohlensäure, halb gebunden	1·199
Kohlensäure, frei	0·098
Summe der festen Bestandtheile	2·886

B. Die kohlensauren Salze als wasserfreie Bicarbonate gerechnet.

Schwefelsaures Kalium	0.031
Schwefelsaures Natrium	0.043
Chlornatrium	0.045
Natriumbicarbonat	0.082
Calciumbicarbonat	2.778
Magnesiumbicarbonat	0.948
Kieselsäure	0.145
Strontium, Eisen	} Spuren
Aluminium, Phosphorsäure	
Organische Substanz	0.013
Kohlensäure, frei	0.098

15. Therme von O'ovo (Frauenbad).

Die Temperatur der Quelle betrug am 20. August 1887 34° C. bei einer gleichzeitigen Lufttemperatur von 23° C.

Die physikalischen Eigenschaften und die qualitative chemische Zusammensetzung des Wassers dieser Quelle gleichen denen des Wassers der Badhausquelle.

Das spezifische Gewicht des Wassers, bei 20° C. bestimmt und auf destillirtes Wasser derselben Temperatur als Einheit bezogen, beträgt 1.00058.

Kalium, Natrium. 687.96 Gramm Wasser gaben 0.012 Gramm Chloride und 0.0077 Gramm Kaliumplatinchlorid, entsprechend 0.022 Kaliumoxyd und 0.074 Natriumoxyd für 10.000 Wasser.

Kieselsäure, Calcium, Magnesium. 673.81 Gramm Wasser gaben 0.0086 Gramm Kieselsäureanhydrid, 0.0714 Gramm Calciumoxyd und 0.0537 Gramm Magnesiumpyrophosphat, entsprechend 0.128 Kieselsäureanhydrid, 1.060 Calciumoxyd und 0.286 Magnesiumoxyd für 10.000 Wasser.

Chlor. 977.63 Gramm Wasser gaben 0.006 Gramm Silber, entsprechend 0.020 Gramm Chlor für 10.000 Gramm Wasser.

Schwefelsäure. 580.67 Gramm Wasser gaben 0.0051 Gramm Baryumsulfat, entsprechend 0.031 Schwefelsäureanhydrid für 10.000 Wasser.

Gesamt-Kohlensäure. I. 186.142 Gramm Wasser gaben 0.0532 Gramm Kohlensäureanhydrid, entsprechend 2.858 Gramm Kohlensäure für 10.000 Wasser.

II. 186.142 Gramm Wasser gaben 0.051 Gramm Kohlensäure, entsprechend 2.740 Gramm Kohlensäure für 10.000 Wasser.

Organische Substanz. 250·2 Gramm Wasser verbrauchten 0·85 Cubikcentimeter Chamäleon (1 Cubikcentimeter = 0·000938 Gramm krystallisirte Oxalsäure), entsprechend 0·032 Gramm organische Substanz (Oxalsäure) für 10.000 Wasser.

Controlbestimmung. 980·21 Gramm Wasser gaben 0·3721 Gramm Sulfatrückstand, entsprechend 3·796 Gramm für 10.000 Gramm Wasser.

Mittelwerte des Wassers der Therme Olovo im Freien (Frauenbad) für 10.000 Gewichtstheile Wasser.

Chlor	0·020
Schwefelsäureanhydrid	0·031
Kieselsäureanhydrid	0·128
Gesammt-Kohlensäure	2·799
Kaliumoxyd	0·022
Natriumoxyd	0·074
Calciumoxyd	1·060
Magnesiumoxyd	0·286
Strontium, Eisen	} Spuren
Aluminium, Phosphorsäure	
Organische Substanz	0·032
Sulfatrückstand gefunden	3·796
„ berechnete	3·771
Specifisches Gewicht	1·00058

Die sauren und basischen Bestandtheile zu Salzen gruppirt;
Werte für 10.000 Gewichtstheile Wasser:

A. Die kohlensauren Salze als normale Carbonate gerechnet.

Schwefelsaures Kalium	0·041
Schwefelsaures Natrium	0·021
Chlornatrium	0·033
Kohlensaures Natrium	0·081
Kohlensaures Calcium	1·893
Kohlensaures Magnesium	0·601
Kieselsäureanhydrid	0·128
Strontium, Aluminium	} Spuren
Eisen, Phosphorsäure	
Organische Substanz	0·032
Kohlensäure, halbgebunden	1·182
„ frei	0·435
Summe der festen Bestandtheile	2·830

B. Die kohlensauren Salze als wasserfreie Bicarbonate gerechnet.

Schwefelsaures Kalium	0·041
Schwefelsaures Natrium	0·021
Chlornatrium	0·033
Natriumbicarbonat	0·115
Calciumbicarbonat	2·726
Magnesiumbicarbonat	0·916
Kieselsäureanhydrid	0·128
Strontium, Aluminium }	Spuren
Eisen, Phosphorsäure }	
Organische Substanz	0·032
Freie Kohlensäure	0·435

In dem Frauenbad-Bassin steigen ziemlich häufig Gasblasen auf; die Analyse derselben ergab folgende Zusammensetzung:

Kohlensäure	10·94 Procent
Sauerstoff	4·24 „
Stickstoff	84·82 „

Die Thermen von Olovo gehören zu den indifferenten Thermen, sie sind arm an festen Bestandtheilen und an Kohlensäure.

Die arsenhaltigen Vitriolquellen von Srebrenica.¹⁾

Im äussersten Osten von Bosnien, in der Nähe der serbischen Grenze, liegt die Bezirksstadt Srebrenica, 36° 57·8' östlich von Ferro, unter 44° 6·2' nördlicher Breite, 366 Meter über der Meeresfläche. In der Umgebung dieser Stadt besteht ein ausgedehntes, merkwürdiges Quellengebiet, das zahlreiche arsenhaltige Vitriolquellen enthält.

Die Stadt Srebrenica, welche jüngst durch diese Mineralquellen und mehr noch durch die Wiederaufnahme des Bergbaues eine gewisse Bedeutung erlangt hat, spielte schon zur Zeit der

¹⁾ Ich verdanke Herrn Oberbergrath Rücker und Herrn Bergmeister Pogatschnig viele Mittheilungen über Srebrenica, welche in diesem Aufsätze verwertet sind.

Römer und dann im Mittelalter eine hervorragende Rolle.¹⁾ Wahrscheinlich ist das heutige Srebrenica das „Argentaria“ der Römer. Der Gewerkschaft „Bosnia“, welche im Sommer 1881 Srebrenica in den Bereich ihrer Thätigkeit einbezog, verdankt die Geschichte des Bergbaues bei Srebrenica wichtige Funde; es wurden bei den angestellten Nachforschungen nicht nur mittelalterliche, sondern auch vielfach römische Spuren aufgedeckt; so fand man Bergmannswerkzeuge, Lampen, römische Grabsteine. Einer dieser Grabsteine, dessen Inschrift gut erhalten ist, liefert den Beweis, dass hier der Sitz des „*Procurator metallorum*“ war, eines der höchsten römischen Finanzbergbeamten, dessen Amtswirksamkeit sich auf die gesammten Bergwerke von Dalmatien und Pannonien erstreckte und über das heutige Dalmatien, Bosnien, einen Theil von Steiermark und Krain, dann bis an die Theiss und den Wienerwald reichte. Mit dem Untergange des weströmischen Reiches und der Römercultur auf der illyrischen Halbinsel ging auch der bosnische Bergbau ein.

Nach Jireček wurde der Bergbau in den Silbergruben von Srebrenica im Mittelalter wieder aufgenommen; Srebrenica war im späteren Mittelalter die grösste Berg- und Handelsstadt des ganzen Gebietes zwischen der Save und der Adria; es wird zum ersten Male im Jahre 1376 wieder genannt, zu welcher Zeit es bereits ein belebter Handelsplatz war und eine bedeutende ragusanische Ansiedlung besass. Die Bergwerke daselbst lieferten das weisse Silber (Bjelo srebro), welches in der Münze des benachbarten Ortes Gradina, die seit 1417 bestand, geprägt wurde. Mit der Eroberung Bosniens durch die Türken brach für den bosnischen Bergbau eine schlimme Zeit herein, am Ende des 16. Jahrhunderts hörte er vollständig auf. Die von den Ragusanern in's Land gerufenen sächsischen Bergleute scheinen eben zu der Zeit an der Grenze der Möglichkeit des Bergbaubetriebes angelangt zu sein, welche durch die damaligen beschränkten Hilfsmittel gesteckt war; sie vermochten nicht die Grubenwässer zu bewältigen, kannten das Sprengpulver nicht und wurden von den Türken arg bedrückt.

¹⁾ Vergl. Bosnien und die Herzegowina von J. von Asbóth, Wien 1888. A. Hölder. Ferner Beitrag zur Kenntnis der Erzlagerstätten Bosniens von B. Walter, Serajevo 1887, endlich Jireček, Die Handelsstrassen und Bergwerke in Bosnien und Serbien. Prag 1879.

Die Abbaue der Alten bei Srebrenica haben bei einer Längenerstreckung der einzelnen Gänge bis zu 5000 Meter und einer Mächtigkeit bis zu 10 Meter, von der Tagdecke aus eine Teufe bis zu 250 Meter erreicht. Dadurch wurden sehr weitläufige Räume geschaffen, welche sich allmählich mit dem nachrollenden Gestein ausgefüllt haben und das sind günstige Bedingungen für den Verwitterungsprocess, dessen Producte das Materiale für die dortigen Quellen abgeben.

Das Gestein, welches die Erzgänge von Srebrenica führt, ist Quarzpropylit; dasselbe erstreckt sich von SO. nach NW. in einer Länge von 14 Kilometer und in einer Breite von 9 Kilometer. Nach NW. entsendet das Massiv mehrere Zungen von Tuffen, deren bedeutendste eine Länge von 10 Kilometer und eine anfängliche Breite von 3 Kilometer besitzt. Im SO. wird das Massiv rechtwinkelig gegen seine Hauptrichtung und gegen die Streichrichtung des umlagernden Schiefers ziemlich geradlinig abgeschnitten, während sich dasselbe nach NW. in Arme auflöst. Das Massiv wird im Norden und Osten umrändert und mantelförmig umlagert von krystallinischen Schiefen; die Südwestseite wird jedoch von Werfener Schiefen und an einem Punkte von Kalken (Trias) begrenzt.

In diesem Gebiete vollzieht sich ununterbrochen ein Verwitterungsprocess in grossartigem Maassstabe, dem die im Gestein eingesprengten Kiese, sowie das Material der Erzgänge, welche das Eruptivgestein durchfurchen, unterliegen. Aus dem Pyrit wird Eisensulfat und Schwefelsäure, welche letztere zersetzend auf das Gestein einwirkt, von dem im letzten Stadium der Zersetzung eine weisse, kaolinartige Masse zu finden ist. Damit ist der Gehalt der Srebrenicaer Quellen an Eisenvitriol, freier Schwefelsäure und den Sulfaten der Basen, welche im Gestein vorkommen, erklärt; der Arsengehalt rührt nicht von dem im Gestein eingesprengten Pyrit her, denn dieser enthält, wie ich mich durch eine besondere Untersuchung überzeugte, nur eine minimale Arsenmenge; man findet aber in den Erzgängen und auf den alten Halden in der Gegend von Srebrenica auch häufig arsenhaltige Minerale, wie Arsenkies, Fahlerz. Ausser diesen kommen dort neben sehr viel silberhaltigem Bleiglanz, Blende, Bournonit, Boulangerit und Berthierit vor.

Von der Grossartigkeit des geschilderten Verwitterungsprocesses und der Ergiebigkeit der Srebrenicaer Mineralquellen geben die

mächtigen Ockerlager Zeugnis, welche sich offenbar in einem grossen Zeitraume in der Richtung jedes Quellenlaufes gebildet haben. Man schätzt die Ockermassen dieser Lager, welche stellenweise eine Mächtigkeit von mehreren Metern besitzen und die ganze Breite eines engen Thales einnehmen, auf 20 Millionen Kilogramm; die Regierung hat zur Aufarbeitung derselben eine Fabrik errichtet, welche bereits im Betriebe ist.

Für die Untersuchung habe ich von den Srebrenicaer Quellen zunächst drei ausgewählt, welche von der dortigen Bevölkerung wie folgt benannt werden: Črni Guber, Mala Kiselica, Velika Kiselica. Die Wässer dieser drei Quellen sind, frisch geschöpft, krystallklar, farblos und geruchlos und besitzen intensiven Eisengeschmack; sie reagiren sauer und werden auf Zusatz von gelbem Blutlaugensalz rein weiss getrübt, bei Zutritt der Luft wird die Flüssigkeit bald bläulich und es scheidet sich endlich ein dunkelblauer Niederschlag ab. Die qualitative Analyse ergab für die drei Wässer dieselben Bestandtheile, und zwar: Kalium, Natrium, Lithium, Calcium, Magnesium, Eisen, Aluminium, Mangan, Zink, Kupfer, Arsen, Chlor, Schwefelsäure, Kieselsäure, Phosphorsäure und organische Substanzen. In dem Ocker, der sich, wie bereits erwähnt, in der Nähe der Quellen reichlich vorfindet, konnte bei Verarbeitung von einigen hundert Gramm noch eine sehr geringe Menge von Antimon und eine eben noch erkennbare Spur von Blei nachgewiesen werden; andere als die aufgezählten Bestandtheile waren darin nicht zu finden.

16. Die Quelle Črni Guber.

Diese ist die dritte Mineralquelle, welche man beim Aufsteigen in dem engen Thal der Červena Rjeka antrifft, sie entspringt auf einem mit Ocker überkleideten Kegel von 30 Meter Höhe, der die enge Thalschlucht so abschliesst, dass eben noch Platz bleibt für den Bach (Červena Rjeka) und auf dessen linkem Ufer für den schmalen Reitweg. In einer Menge von 300 Liter pro Minute überströmt das Wasser dieser Quelle den mächtigen Kegel und gewährt, zumal bei günstiger Beleuchtung, einen imposanten Anblick. Die Temperatur der Quelle betrug am 17. August 1887 13° C., die Lufttemperatur zur selben Zeit 25° C.

Das specifische Gewicht des Wassers, bei 22° C. bestimmt und auf reines Wasser von derselben Temperatur bezogen, ist 1.0012.

Die quantitativen Bestimmungen ergaben folgende Resultate:

Schwefelsäure. I. 934.12 Gramm Wasser gaben 1.1023 Gramm schwefelsaures Baryum, entsprechend 4.051 Gramm Schwefelsäureanhydrid für 10.000 Gramm Wasser.

II. 973.29 Gramm Wasser gaben 1.1535 Gramm schwefelsaures Baryum, entsprechend 4.069 Gramm Schwefelsäureanhydrid für 10.000 Gramm Wasser.

Chlor. 1004.22 Gramm Wasser gaben 0.0029 Gramm Silber, entsprechend 0.010 Gramm Chlor für 10.000 Gramm Wasser.

Arsen. I. 10042.32 Gramm Wasser ergaben 0.1114 Gramm arsensaure Ammon-Magnesia, entsprechend 0.0607 Gramm Arsenrioxyd für 10.000 Gramm Wasser.

II. 5455.2 Gramm Wasser gaben 0.0615 Gramm arsensaure Ammon-Magnesia, entsprechend 0.0616 Gramm Arsenrioxyd für 10.000 Gramm Wasser.

Kieselsäure, Phosphorsäure, Eisen, Aluminium, Calcium, Magnesium. I. 942.25 Gramm Wasser gaben 0.0609 Gramm Kieselsäure, 0.1832 Gramm Eisenoxyd, 0.0085 Gramm Calciumoxyd, 0.0203 Gramm Magnesiumpyrophosphat, entsprechend für 10.000 Gramm Wasser: 0.646 Gramm Kieselsäure, 1.944 Gramm Eisenoxyd, 0.090 Gramm Calciumoxyd, 0.077 Gramm Magnesiumoxyd.

II. 931.205 Gramm Wasser gaben 0.604 Gramm Kieselsäure, 0.1848 Gramm Eisenoxyd, 0.018 Gramm Magnesiumpyrophosphat, entsprechend für 10.000 Gramm Wasser 0.694 Gramm Kieselsäure, 1.985 Gramm Eisenoxyd, 0.069 Gramm Magnesiumoxyd.

III. 980.683 Gramm Wasser gaben 0.0669 Gramm Aluminiumoxyd, entsprechend 0.682 für 10.000 Wasser.

IV. 9187.84 Gramm Wasser gaben 0.0815 Gramm Calciumoxyd, entsprechend 0.089 für 10.000 Wasser und 0.0108 Gramm Magnesiumpyrophosphat, entsprechend 0.007 Phosphorpenoxyd für 10.000 Wasser.

Zink, Mangan. 10042.32 Gramm Wasser lieferten 0.004 Gramm Manganoxyduloxyd und 0.0388 Gramm Zinkoxyd, entsprechend für 10.000 Wasser 0.004 Manganoxydul und 0.039 Zinkoxyd.

Kalium, Natrium. 950.513 Gramm Wasser gaben 0.0181 Gramm Chloride und 0.0442 Kaliumplatinchlorid, entsprechend für 10.000 Wasser 0.090 Kaliumoxyd und 0.025 Natriumoxyd.

Organische Substanz. 250.3 Gramm Wasser verbrauchten 2 Cubikcentimeter Chamäleon (1 Cubikcentimeter = 0.00093 Gramm krystallisirte Oxalsäure), entsprechend 0.074 organische Substanz für 10.000 Wasser.

Controlbestimmung. 710.108 Gramm Wasser gaben 0.5590 Gramm Sulfatrückstand und 0.8763 Gramm Baryumsulfat, entsprechend 3.622 Oxyde für 10.000 Wasser.

Mittelwerte für 10.000 Gewichtstheile des arsenhaltigen Eisenwassers der Quelle Črni Guber.

Schwefelsäureanhydrid	4.060
Chlor	0.010
Kieselsäure	0.648
Arsenigsäureanhydrid	0.061
Phosphorsäureanhydrid	0.007
Kaliumoxyd	0.090
Natriumoxyd	0.025
Calciumoxyd	0.089
Magnesiumoxyd	0.073
Eisenoxyd	1.965
Manganoxydul	0.004
Zinkoxyd	0.039
Aluminiumoxyd	0.682
Lithium, Kupfer	Spuren
Organische Substanz	0.074
Summe der Oxyde gefunden	3.622
Summe der Oxyde berechnet	3.608
Specifisches Gewicht	1.0012

Die sauren und basischen Bestandtheile zu Salzen gruppirt für 10.000 Gramm Wasser.

Schwefelsaures Kalium	0.166
Schwefelsaures Natrium	0.037
Chlornatrium	0.017
Schwefelsaures Calcium	0.209
Schwefelsaures Magnesium	0.219
Schwefelsaures, Eisenoxydul	3.734
Schwefelsaures Mangan	0.009
Schwefelsaures Zink	0.078
Schwefelsaures Aluminium	2.277
Phosphorsaures Calcium	0.010
Arsenigsäureanhydrid	0.061
Kieselsäure	0.648
Lithium, Kupfer	Spuren
Organische Substanz	0.074
Freie Schwefelsäure	0.093
Summe der festen Bestandtheile	7.539

17. Die Quelle Mala Kiselica.

Etwa 500 Meter von Srebrenica entspringt in dem circa 18 Meter breiten Thale Mala Kiselica die Mineralquelle gleichen Namens. Das Wasser derselben wird von einem nahezu kreisrunden, von Ocker begrenzten Becken aufgenommen, dessen Durchmesser ungefähr 2 Meter beträgt. Vom Grunde desselben steigen ziemlich häufig Gasblasen auf. Die Ergiebigkeit dieser Quelle ist 180 Liter pro Minute. Die Quelltemperatur betrug am 16. August 1887 14.5° C., die gleichzeitige Lufttemperatur 18° C.

Das spezifische Gewicht bei 21.2° C. bestimmt, beträgt 1.001, bezogen auf reines Wasser von derselben Temperatur als Einheit.

Schwefelsäure. I. 1016.34 Gramm Wasser gaben 1.1199 Gramm Baryumsulfat entspr. 3.784 Schwefelsäureanhydrid für 10.000 Wasser.

II. 997.86 Gramm Wasser gaben 1.1085 Gramm Baryumsulfat, entspr. 3.815 Schwefelsäureanhydrid für 10.000 Wasser.

Chlor. 999.61 Gramm Wasser gaben 0.0035 Gramm Silber, entspr. 0.012 Chlor für 10.000 Wasser.

Arsen. 9733.96 Gramm Wasser gaben 0.054 Gramm arsensaures Magnesium-Ammonium, entspr. 0.030 Arsenrioxyd für 10.000 Wasser.

Kieselsäure, Eisen, Aluminium, Calcium, Magnesium. I. 996.89 Gramm Wasser gaben 0.0415 Gramm Kieselsäure, 0.1678 Eisenoxyd, 0.0437 Aluminiumoxyd, entspr. für 10.000 Wasser 0.416 Kieselsäure, 1.683 Eisenoxyd, 0.438 Aluminiumoxyd.

II. 959.353 Gramm Wasser gaben 0.0396 Gramm Kieselsäure, 0.1635 Gramm Eisenoxyd, 0.0355 Calciumoxyd, 0.0478 Magnesiumpyrophosphat, entspr. für 10.000 Wasser 0.413 Kieselsäure, 1.704 Eisenoxyd, 0.370 Calciumoxyd, 0.179 Magnesiumoxyd.

III. 1336.47 Gramm Wasser gaben 0.060 Gramm Aluminiumoxyd entspr. 0.449 für 10.000 Wasser.

Phosphorsäure, Mangan, Zink. 9733.96 Gramm Wasser gaben 0.0263 Gramm Magnesiumpyrophosphat, 0.0386 Gramm Manganoxyduloxyd, 0.019 Gramm Zinkoxyd, entspr. für 10.000 Wasser 0.017 Phosphorpenoxyd, 0.037 Manganoxydul, 0.020 Zinkoxyd.

Kalium, Natrium. 1444.78 Gramm Wasser gaben 0.022 Gramm Chloride und 0.0376 Gramm Kaliumplatinchlorid, entspr. für 10.000 Wasser 0.051 Kaliumoxyd und 0.039 Natriumoxyd.

Organische Substanz. 250.2 Gramm Wasser verbrauchten 1.4 Cubikcentimeter Chamäleon (1 Cubikcentimeter = 0.000938 Gramm kryst. Oxalsäure) entspr. 0.054 organische Substanz für 10.000 Wasser.

Controlbestimmung. 965.2 Gramm Wasser gaben 0.7006 Gramm Sulfatrückstand und 1.1243 Gramm Baryumsulfat entspr. 3.260 Gramm Oxyde für 10.000 Gramm Wasser.

Mittelwerte für 10.000 Gewichtstheile des Wassers
der Quelle Mala Kiselica.

Schwefelsäureanhydrid	3·800
Chlor	0·012
Kieselsäureanhydrid	0·415
Phosphorsäureanhydrid	0·017
Arsentrioxyd	0·030
Kaliumoxyd	0·051
Natriumoxyd	0·039
Calciumoxyd	0·370
Magnesiumoxyd	0·179
Eisenoxyd	1·694
Aluminiumoxyd	0·444
Manganoxydul	0·036
Zinkoxyd	0·019
Lithium, Kupfer	Spuren
Organische Substanz	0·054
Summe der Oxyde, gefunden . . .	3·260
Summe der Oxyde, berechnet . . .	3·264
Specifisches Gewicht	1·001

Säuren und Basen zu Salzen gruppiert für 10.000 Gewichts-
theile Wasser.

Chlornatrium	0·020
Schwefelsaures Kalium	0·094
„ Natrium	0·064
„ Calcium	0·899
„ Magnesium	0·537
„ Eisenoxydul	3·219
„ Mangan	0·077
„ Zink	0·038
„ Aluminium	1·482
Freie Schwefelsäure	0·042
Calciumphosphat	0·028
Arsenigsäureanhydrid	0·030
Kieselsäureanhydrid	0·415
Lithium, Kupfer	Spuren
Organische Substanz	0·054
Summe der festen Bestandtheile . .	6·957

Die der Quelle frei entströmenden Gase bestehen aus:

Kohlensäure	3·139 Vol. Procent
Stickstoff	96·861 „ „

18. Die Quelle Velika Kiselica.

In dem Thale Velika Kiselica entspringt die Mineralquelle gleichen Namens, ungefähr 1 Kilometer von der neuen griechischen Kirche in Srebrenica entfernt. Die Quelle fällt durch ihre Mächtigkeit vor den anderen in demselben Thale entspringenden Quellen auf. Ein grosser, abgestutzter Ockerkegel, dessen Basis 25 Meter, dessen obere Fläche 10 Meter breit ist und dessen Höhe 6 Meter beträgt, hat sich aus dem Sinter dieser Quelle allmählich aufgebaut und nimmt oben in einer muldenförmigen Vertiefung das Wasser auf, dessen Menge pro Minute 60 Liter beträgt. Auch in dieser Quelle steigen, wenn auch selten, Gasblasen auf. Am 17. August 1887 bestimmte ich die Quellentemperatur; sie betrug 13° C., die Temperatur der Luft zur selben Zeit 28° C.

Das specifische Gewicht bei 22° C. bestimmt, beträgt 1·0009 auf reines Wasser derselben Temperatur als Einheit bezogen.

Schwefelsäure. I. 922·295 Gramm Wasser gaben 0·6000 Gramm Baryumsulfat, entspr. 2·234 Schwefeltrioxyd für 10.000 Wasser.

II. 1036·29 Gramm Wasser gaben 0·6808 Gramm Baryumsulfat entspr. 2·256 Schwefelsäureanhydrid für 10.000 Wasser.

Chlor. 997·86 Gramm Wasser gaben 0·0034 Gramm Silber, entspr. 0·011 Chlor für 10.000 Wasser.

Arsen. 8221·49 Gramm Wasser gaben 0·017 Gramm arsensaures Magnesium-Ammonium, entspr. 0·011 Gramm Arsentriloxyd für 10.000 Wasser.

Kieselsäure, Eisen, Calcium, Magnesium, Aluminium. I. 983·44 Gramm Wasser gaben 0·0319 Gramm Kieselsäure, 0·0382 Gramm Calciumoxyd, 0·050 Gramm Magnesiumpyrophosphat, 0·0895 Gramm Eisenoxyd, entspr. für 10.000 Wasser 0·324 Kieselsäure, 0·388 Calciumoxyd, 0·183 Magnesiumoxyd, 0·910 Eisenoxyd.

II. 959·41 Gramm Wasser gaben 0·0305 Gramm Kieselsäure, 0·0385 Gramm Calciumoxyd, 0·0488 Gramm pyrophosphorsaure Magnesia, 0·0855 Gramm Eisenoxyd, 0·011 Gramm Aluminiumoxyd, entspr. für 10.000 Wasser, 0·318 Kieselsäure, 0·401 Calciumoxyd, 0·183 Magnesiumoxyd, 0·891 Eisenoxyd, 0·115 Aluminiumoxyd.

Kalium, Natrium. 1001·99 Gramm Wasser gaben 0·0147 Gramm Chloride und 0·0159 Kaliumplatinchlorid, entspr. für 10.000 Wasser 0·030 Kaliumoxyd und 0·053 Natriumoxyd.

Organische Substanz. 250·2 Gramm Wasser verbrauchten 1·5 Cubikcentimeter Chamäleon (1 Cubikcentimeter Chamäleon = 0·000938 Gramm kryst. Oxalsäure) entspr. 0·057 Gramm organische Substanz für 10.000 Wasser.

Controlbestimmung. 966·85 Gramm Wasser gaben 0·4225 Gramm Sulfatrückstand und 0·6448 Gramm Baryumsulfat, entspr. 2·080 Oxyde für 10.000 Wasser.

Mittelwerte für 10.000 Gewichtstheile des Wassers der
Quelle Velika Kiselica.

Schwefelsäureanhydrid	2·245
Chlor	0·011
Kieselsäureanhydrid	0·321
Arsenigsäureanhydrid	0·011
Kaliumoxyd	0·030
Natriumoxyd	0·053
Calciumoxyd	0·395
Magnesiumoxyd	0·183
Eisenoxyd	0·901
Aluminiumoxyd	0·115
Phosphorsäure, Mangan, } Zink, Lithium, Kupfer }	Spuren
Organische Substanz	0·057
Summe der Oxyde, gefunden . . .	2·080
„ „ „ berechnet . . .	2·009
Specifisches Gewicht	1·0009

Die sauren und basischen Bestandtheile zu Salzen gruppirt,
Werte für 10.000 Gewichtstheile Wasser.

Chlornatrium	0·018
Schwefelsaures Kalium	0·055
„ Natrium	0·101
„ Calcium	0·960
„ Magnesium	0·549
„ Eisenoxydul	1·712
„ Aluminium	0·384
Freie Schwefelsäure	0·063
Arsenigsäureanhydrid	0·011
Kieselsäureanhydrid	0·321
Lithium, Kupfer, Zink, } Mangan, Phosphorsäure }	Spuren
Organische Substanz	0·057
Summe der festen Bestandtheile . .	4·168

Die der Quelle frei entströmenden Gase bestehen aus:

Kohlensäure	3·312 Vol. Procent
Stickstoff	96·688 „ „

Nach dem Ergebnis der chemischen Analyse gehören demnach die Mineralquellen von Srebrenica zu den arsenhaltigen Vitriolquellen und reihen sich den Quellen von Levico in Südtirol an. Bemerkenswert ist, dass die drei analysirten Quellen von Srebrenica viel weniger Eisenvitriol enthalten als die Quellen von Levico, und dass die Srebrenicaer Quellen alle arsenhaltig sind, während in Levico nur eine Quelle Arsen enthält, während die andere frei davon ist.

19. Die Schwefelquelle „Raso“ bei Priboj.

In dem grossen, Braunkohle führenden Neogenbecken, welches sich am nördlichen Abhange der Majevica von Ost nach West gegen die slawonische Ebene hin erstreckt, liegt am Janjafusse, und zwar $36^{\circ} 35' 9''$ östlich von Ferro, unter $44^{\circ} 36' 1''$ nördlicher Breite, 277 Meter über der Meeresfläche das Dorf Priboj. Zwischen diesem (östlich) und dem Orte Džemat, ganz nahe an der Formationsgrenze des Karpathensandsteines mit Gebilden der jüngeren Mediterranstufe (Braunkohle, Kalk, Mergel und Thon), tritt an fünf Ausbruchstellen die Schwefelquelle „Raso“ zu Tage. Die eine Ausbruchstelle liegt mitten im Bache, die vier anderen nahe seinen beiden Ufern. Die Ergiebigkeit der Quelle ist ziemlich beträchtlich; gefasst sind dieselben nicht, das aufsteigende Wasser sammelt sich in natürlichen muldenförmigen Vertiefungen, aus denen es seitlich in den Bach abfließt. Mit dem Wasser kommen ziemlich reichlich Gasblasen empor. Schon in ziemlicher Entfernung von den Quellen beobachtet man den Geruch nach Schwefelwasserstoff. Für die Analyse habe ich das Wasser der ergiebigsten Ausbruchstelle entnommen.

Die Quelltemperatur fand ich am 22. August 1888 23° C. bei der gleichzeitigen Lufttemperatur von 19° C.

Das Wasser ist farblos und klar, riecht stark nach Schwefelwasserstoff und schmeckt unangenehm, laugenhaft und nach Sulfiden. Violette Lackmuspapier wird beim Eintauchen in das frisch geschöpfte Wasser in seiner Farbe nicht verändert, nach dem Eintrocknen erscheint es blau. Nitroprussidnatrium erzeugt in dem Wasser eine tief blaue Färbung; Cadmiumsulfat erzeugt einen ziemlich reichlichen Niederschlag von Cadmiumsulfid; die von diesem Niederschlage abfiltrirte Flüssigkeit wurde bei der entsprechenden Prüfung mit Jodstärke, sowie mit Silberlösung frei von unterschwefliger Säure befunden. Der Schwefelwasserstoff kann durch Einleiten

von reinem Wasserstoffgas nur sehr schwer aus dem Wasser entfernt werden, selbst nach mehrtägigem Durchleiten von Wasserstoff erwies sich das austretende Gas noch immer schwefelwasserstoffhaltig.

Die qualitative Analyse ergab folgende Bestandtheile: Kalium, Natrium, Lithium, Calcium, Strontium, Magnesium, Aluminium, Eisen, Mangan, Chlor, Brom, Jod, Schwefelwasserstoff, Schwefelsäure, Borsäure, Phosphorsäure, Kieselsäure, Kohlensäure und organische Substanzen.

Das specifische Gewicht (auf destillirtes Wasser von 15° C. als Einheit bezogen) beträgt 1·00306. Bei der quantitativen Analyse wurden folgende Resultate erhalten:

Alkalien. I. 503·135 Gramm Wasser gaben 1·4664 Gramm Chloride und 0·011 Gramm Kaliumplatinchlorid, entsprechend 0·0429 Kaliumoxyd und 15·4307 Natriumoxyd für 10.000 Wasser.

II. 502·68 Gramm Wasser gaben 1·457 Gramm Chloride und 0·015 Gramm Kaliumplatinchlorid, entsprechend 0·0571 Kaliumoxyd und 15·3335 Natriumoxyd für 10.000 Wasser.

Kieselsäure, Calcium, Magnesium. I. 996·405 Gramm Wasser gaben 0·0295 Gramm Kieselsäure, 0·0525 Gramm Calciumoxyd und 0·0662 Gramm pyrophosphorsaures Magnesium, entsprechend 0·296 Kieselsäure, 0·527 Kalk und 0·239 Magnesia für 10·000 Wasser.

II. 697·23 Gramm Wasser gaben 0·0244 Gramm Kieselsäure, 0·039 Gramm Calciumoxyd und 0·0469 Gramm Magnesiumpyrophosphat, entsprechend 0·35 Kieselsäure, 0·551 Calciumoxyd und 0·251 Magnesiumoxyd für 10.000 Wasser.

Aluminium, Strontium. 8354·43 Gramm Wasser gaben 0·0012 Gramm Aluminiumoxyd und 0·0351 Gramm Strontiumnitrat, entsprechend 0·001 Aluminiumoxyd und 0·021 Strontiumoxyd für 10.000 Wasser.

Schwefelwasserstoff. Je 374·223 Gramm Wasser brauchten bei der Titrirung an der Quelle in drei Versuchen 7·8, 7·7, 7·9 Cubikcentimeter Jodlösung, von der 1 Cubikcentimeter 0·005073 Gramm Jod enthält. Dies entspricht im Mittel 0·142 Schwefelwasserstoff für 10.000 Wasser.

Schwefelsäure. I. 562·85 Gramm Wasser gaben 1·1787 Gramm Baryumsulfat, entsprechend 7·19 Schwefelsäureanhydrid für 10.000 Wasser.

II. 664·06 Gramm Wasser gaben 1·3916 Gramm Baryumsulfat, entsprechend 7·195 Schwefelsäureanhydrid für 10.000 Wasser.

Chlor. I. 250·255 Gramm Wasser gaben 0·6996 Gramm Chlorsilber und 0·0055 Gramm metallisches Silber, entsprechend 6·985 Chlor für 10.000 Wasser.

II. 250·517 Gramm Wasser gaben 0·6932 Gramm Chlorsilber und 0·0127 Gramm Silber, entsprechend 7·009 Chlor für 10.000 Wasser.

Kohlensäure. Je 187·1115 Gramm Wasser gaben I. 0·1254, II. 0·127 Gramm Kohlensäure, entsprechend 6·702, respective 6·787 Kohlensäure für 10.000 Wasser.

Organische Substanz. 501·53 Gramm Wasser angesäuert und durch Kochen vollständig von Schwefelwasserstoff befreit, brauchten 4·92 Cubikcentimeter Cha-

mäleon (1 Cubikcentimeter entspricht 0.001031 Gramm Oxalsäure), daher 0.101 organische Substanz für 10.000 Wasser.

Controlbestimmung. 447.35 Gramm Wasser gaben 1.697 Gramm Sulfatrückstand und 2.7338 Gramm Baryumsulfat, entsprechend 37.935 Sulfatrückstand und 16.955 Oxyde für 10.000 Wasser.

Mittelwerte für 10.000 Gewichtstheile Wasser der
Schwefelquelle Raso.

Schwefelsäureanhydrid	7.193
Chlor	6.997
Schwefelwasserstoff	0.142
Kieselsäureanhydrid	0.323
Kohlensäureanhydrid	6.745
Kaliumoxyd	0.050
Natriumoxyd	15.380
Calciumoxyd	0.539
Strontiumoxyd	0.021
Magnesiumoxyd	0.245
Aluminiumoxyd	0.001
Brom, Jod, Phosphorsäure, Bor- säure, Eisen, Mangan, Lithium }	Spuren
Organische Substanz	0.101
Summe der Oxyde, gefunden . .	16.955
berechnet . .	16.562
Specifisches Gewicht	1.00306

Säuren und Basen zu Salzen gruppirt, Werte für 10.000
Gewichtstheile Wasser.

A. Die kohlensauren Salze als normale Carbonate gerechnet.

Schwefelsaures Kalium	0.092
Schwefelsaures Natrium	12.696
Chlornatrium	11.544
Natriumsulfhydrat	0.233
Kohlensaures Natrium	6.119
Kohlensaures Calcium	0.963
Kohlensaures Strontium	0.030
Kohlensaures Magnesium	0.515
Aluminiumoxyd	0.001
Kieselsäureanhydrid	0.323
Organische Substanz	0.101
Brom, Jod, Phosphorsäure, Bor- säure, Eisen, Mangan, Lithium }	Spuren
Kohlensäure, halb gebunden . . .	3.241
Kohlensäure, frei	0.263

B. Die kohlensauren Salze als wasserfreie Bicarbonate gerechnet.

Schwefelsaures Kalium	0·092
Schwefelsaures Natrium	12·696
Chlornatrium	11·544
Natriumsulfhydrat	0·233
Natriumbicarbonat	8·657
Calciumbicarbonat	1·387
Strontiumbicarbonat	0·039
Magnesiumbicarbonat	0·785
Aluminiumoxyd	0·001
Kieselsäureanhydrid	0·323
Organische Substanz	0·101
Brom, Jod, Phosphorsäure, Bor- säure, Eisen, Mangan, Lithium } . . .	Spuren
Freie Kohlensäure	0·263

Das der Quelle frei entströmende Gas besteht aus:

Kohlensäure	5·54 Procent
Stickstoff	94·46 „

Die Quelle Raso gehört zu den Schwefelquellen, welche Alkalisulfide enthalten; bekannte Quellen von ähnlicher Zusammensetzung sind: Die Quelle von Burtscheid in Rheinpreussen, eine Therme von 72·5° C., die kalten Schwefelquellen von Parad in Ungarn, die kalte Schwefelquelle von Riolo in Italien, acqua solforosa I, die Pauls- oder Präsidentenquelle von Slanika in der Moldau und die Natron-Lithionquelle von Weilbach in Hessen-Nassau.

20. Der Sauerling von Jasenica.

Ungefähr 18 Kilometer nördlich von Zvornik liegt Jasenica, in der Nähe der Drina, an der Grenze von jüngeren Flyschsandsteinen und dem Alluvium. In dem Gebiete dieses Ortes entspringt an einer Berglehne ein von der dortigen Bevölkerung längst geschätzter Sauerling. Die Fassung der Quelle ist primitiv und unzuweckmässig, und da Jedermann seinen Bedarf an dem Sauerling durch Einschöpfen mit irgend einem Gefäss der Quelle entnimmt, so ist deren Wasser häufig etwas getrübt.

Die Temperatur der Quelle habe ich am 23. August 1888 bestimmt, sie betrug 13.5°C ., die Lufttemperatur zur selben Zeit 15°C .

Das frisch geschöpfte Wasser ist klar, farblos, von angenehm erfrischendem Geschmacke; empfindliches Lackmuspapier wird durch dasselbe violett, nach dem Eintrocknen blau.

Die qualitative Analyse wies folgende Bestandtheile nach: Kalium, Natrium, Lithium, Calcium, Strontium, Baryum, Magnesium, Eisen, Aluminium, Mangan, Chlor, Schwefelsäure, Borsäure, Phosphorsäure, Kieselsäure, Kohlensäure und organische Substanzen (darunter eine Spur von Ameisensäure).

Das specifische Gewicht des Wassers (destillirtes Wasser von 14.8°C . als Einheit genommen) beträgt für dieselbe Temperatur 1.00315.

Die quantitative Analyse ergab folgende Resultate:

Alkalien. I. 501.492 Gramm Wasser gaben 1.1125 Gramm Chloride und 0.143 Gramm Kaliumplatinchlorid, entsprechend 0.550 Kaliumoxyd und 11.147 Natriumoxyd für 10.000 Wasser.

II. 501.795 Gramm Wasser gaben 1.112 Gramm Chloride und 0.1417 Gramm Kaliumplatinchlorid, entsprechend 0.545 Kaliumoxyd und 11.169 Natriumoxyd für 10.000 Wasser.

Kieselsäure, Calcium, Magnesium. 1318.277 Gramm Wasser gaben 0.016 Gramm Kieselsäure, 0.3225 Gramm Calciumoxyd und 0.409 Gramm Magnesiumpyrophosphat, entsprechend 0.121 Kieselsäure, 2.446 Calciumoxyd und 1.117 Magnesiumoxyd für 10.000 Wasser.

Eisen, Aluminium, Phosphorsäure, Borsäure. 9920.905 Gramm Wasser gaben 0.0317 Gramm Eisenoxyd, 0.0055 Gramm Aluminiumoxyd und 0.0025 Gramm Magnesiumpyrophosphat, entsprechend 0.032 Eisenoxyd, 0.006 Aluminiumoxyd und 0.0016 Phosphorsäureanhydrid für 10.000 Wasser.

Die Hälfte des wässerigen Auszuges vom Abdampfrückstand ergab 0.747 Gramm Borsäure und Magnesia (chlorfrei) und bei der weiteren Verarbeitung 1.2984 Gramm Magnesiumpyrophosphat, entsprechend 0.571 Borsäureanhydrid für 10.000 Wasser.

Lithium. 4000.392 Gramm Wasser gaben 0.1882 Gramm eines Gemenges von Chlolithium, Chlormagnesium und Chlornatrium, aus welchem 0.5932 Gramm Chlorsilber und 0.0804 Gramm pyrophosphorsaures Magnesium erhalten wurde. Dies entspricht 0.089 Lithiumoxyd für 10.000 Wasser.

Strontium. 3004.581 Gramm Wasser gaben 0.0185 Gramm Strontiumnitrat, entsprechend 0.027 Strontiumoxyd für 10.000 Wasser.

Schwefelsäure. 1337.395 Gramm Wasser gaben 0.0105 Gramm Baryumsulfat, entsprechend 0.027 Schwefelsäureanhydrid für 10.000 Wasser.

Chlor. I. 186.23 Gramm Wasser gaben 0.414 Gramm Chlorsilber und 0.004 Gramm Silber, entsprechend 5.574 Chlor für 10.000 Wasser.

II. 184.183 Gramm Wasser gaben 0.4065 Gramm Chlorsilber und 0.0065 Gramm Silber, entsprechend 5.571 Chlor für 10.000 Wasser.

Kohlensäure. Je 187.4578 Gramm Wasser gaben I. 0.5268 und II. 0.5399 Gramm Kohlensäure, entsprechend 28.102, respective 28.801 für 10.000 Wasser.

Organische Substanz. 501.58 Gramm Wasser verbrauchten 6.79 Cubikcentimeter Chamäleon (1 Cubikcentimeter entspricht 0.001031 Gramm Oxalsäure), demnach 0.139 organische Substanz für 10.000 Wasser.

Controlbestimmung. 678.37 Gramm Wasser gaben 2.4494 Gramm Sulfatrückstand und 4.013 Gramm Baryumsulfat, entsprechend 15.797 Oxyde für 10.000 Wasser.

Mittelwerte für 10.000 Gewichtstheile Wasser des
Säuerlings Jasenica,

Chlor	5.573
Schwefelsäureanhydrid	0.027
Kieselsäureanhydrid	0.121
Borsäureanhydrid	0.571
Phosphorsäureanhydrid	0.0016
Kohlensäureanhydrid	28.452
Kaliumoxyd	0.548
Natriumoxyd	11.158
Lithiumoxyd	0.089
Calciumoxyd	2.446
Strontiumoxyd	0.027
Magnesiumoxyd	1.117
Aluminiumoxyd	0.006
Eisenoxyd	0.032
Mangan, Baryum	Spuren
Organische Substanz	0.139
Summe der Oxyde gefunden . . .	15.797
„ „ „ berechnet. . .	15.544
Specifisches Gewicht	1.00315

Säuren und Basen zu Salzen gruppirt, Werte für 10.000 Gewichtstheile Wasser.

A. Die kohlensauren Salze als normale Carbonate gerechnet.

Schwefelsaures Kalium	0·059
Chlorkalium	0·817
Chlornatrium	8·635
Borsaures Natrium	0·825
Kohlensaures Natrium	10·803
„ Lithium	0·219
Phosphorsaures Calcium	0·0035
Kohlensaures Calcium	4·364
„ Strontium	0·039
„ Magnesium	2·345
„ Eisen	0·047
Aluminiumoxyd	0·006
Kieselsäureanhydrid	0·121
Mangan, Baryum	Spuren
Organische Substanz	0·139
Kohlensäure, halb gebunden . . .	7·788
„ frei	12·876
Summe der festen Bestandtheile . .	28·476

B. Die kohlensauren Salze als wasserfreie Bicarbonate gerechnet.

Schwefelsaures Kalium	0·059
Chlorkalium	0·817
Chlornatrium	8·635
Borsaures Natrium	0·825
Natriumbicarbonat	15·284
Lithiumbicarbonat	0·349
Phosphorsaures Calcium	0·0035
Calciumbicarbonat	6·284
Strontiumbicarbonat	0·051
Magnesiumbicarbonat	3·573
Eisenbicarbonat	0·064
Aluminiumoxyd	0·006
Kieselsäureanhydrid	0·121
Mangan, Baryum	Spuren
Organische Substanz	0·139
Freie Kohlensäure	12·876

Der Sauerling von Jasenica gehört zu den alkalisch-muriatischen Sauerlingen und ist durch seinen Gehalt an Borsäure und kohlensaurem Lithium bemerkenswert.

21. Der Sauerling von Dubnica.

Zwischen Dolnj-Tuzla und Zvornik, eine Reitstunde von der Gensdarmrie-Kaserne Kalesia, liegt im Süßwasserneogen, unweit der Grenze desselben, mit dem zwischen Zvornik und Jasenica mächtig entwickelten Flyschzuge das Dorf Dubnica (36° 35' östlich von Ferro, unter 44° 26' nördlicher Breite, 460 Meter über der Meeresfläche). In der Nähe des Dorfes, an der Stelle, wo der Bach Rašljanka den Namen Dubnica erhält, entspringt an mehreren Stellen im felsigen Terrain ein Sauerling; an einer Stelle sah ich auch ziemlich viel Gasblasen aufsteigen. Der Sauerling, früher „Slatina“, jetzt „Kiseljak“ genannt, wird von der dortigen Bevölkerung zum Brobacken und als geschätztes Heilmittel verwendet. Zwei benachbarte Quellen, die 5 Meter über dem Wasserspiegel des Baches liegen, sind mit einer primitiven Steinfassung versehen; eine hölzerne Umzäunung schützt die Quellen vor den Verunreinigungen durch das weidende Vieh, das den Sauerling gern aufsucht. Für die Analyse wurde das Wasser einer dieser beiden Quellen entnommen; durch vergleichende Versuche ergab sich, dass das Wasser der zweiten Quelle dieselbe Zusammensetzung hat.

Die Temperatur der Quelle wurde am 29. Mai 1889 bestimmt, sie betrug 13·6° C.

Das frisch geschöpfte Wasser ist farblos, klar und von angenehm erfrischendem Geschmacke; es riecht schwach nach Schwefelwasserstoff, doch verschwindet dieser Geruch bald, sei es, dass das Wasser in einem offenen Gefäße an der Luft stehen bleibt, oder in einer verstopften Flasche aufbewahrt wird.

Durch die qualitative Analyse wurden folgende Bestandtheile nachgewiesen: Kalium, Natrium, Lithium, Calcium, Strontium, Magnesium, Eisen, Aluminium, Mangan, Chlor, Brom, Jod, Schwefelsäure, Borsäure, Phosphorsäure, Kieselsäure, Kohlensäure und organische Substanzen.

Das spezifische Gewicht, bei 16·2° C. bestimmt, beträgt (auf destillirtes Wasser von derselben Temperatur als Einheit bezogen) 1·0028.

Die quantitative Analyse ergab folgende Resultate:

Alkalien. I. 500·935 Gramm Wasser gaben 1·0373 Gramm Chloride und 0·1195 Gramm Kaliumplatinchlorid, entsprechend 0·461 Kaliumoxyd und 10·601 Natriumoxyd für 10·000 Wasser.

II. 501·03 Gramm Wasser gaben 1·0328 Gramm Chloride und 0·1096 Gramm Kaliumplatinchlorid, entsprechend 0·423 Kaliumoxyd und 10·582 Natriumoxyd für 10·000 Wasser.

Kieselsäure, Calcium, Magnesium. I. 1000·578 Gramm Wasser gaben 0·0084 Gramm Kieselsäure, 0·2798 Gramm Calciumoxyd und 0·1568 Gramm pyrophosphorsaures Magnesium, entsprechend 0·034 Kieselsäure, 2·796 Calciumoxyd und 0·565 Magnesiumoxyd für 10·000 Wasser.

II. 1000·578 Gramm Wasser gaben 0·2783 Gramm Calciumoxyd, entsprechend 2·781 für 10·000 Wasser.

Eisen, Aluminium, Phosphorsäure, Borsäure. 1000·578 Gramm Wasser gaben 0·0096 Gramm Eisenoxyd, 0·0018 Gramm Aluminiumoxyd und 0·0026 Gramm Magnesiumpyrophosphat. Aus der Hälfte von dem wässerigen Auszug des Abdampfrückstandes wurden 0·3395 Gramm eines chlorfreien Gemenges von borsaurer Magnesia und Magnesia erhalten, welches 0·6235 Gramm Magnesiumpyrophosphat lieferte. Demnach kommen auf 10·000 Wasser 0·010 Eisenoxyd, 0·002 Aluminiumoxyd, 0·002 Phosphorsäureanhydrid und 0·330 Borsäureanhydrid.

Strontium. 2001·156 Gramm Wasser gaben 0·006 Gramm Strontiumnitrat, entsprechend 0·014 Strontiumoxyd für 10·000 Wasser.

Chlor. I. 249·705 Gramm Wasser gaben 0·5530 Gramm Chlorsilber und 0·0049 Gramm Silber, entsprechend 5·543 Chlor für 10·000 Wasser.

II. 250·27 Gramm Wasser gaben 0·555 Gramm Chlorsilber und 0·0042 Gramm Silber, entsprechend 5·538 Chlor für 10·000 Wasser.

Schwefelsäure. 1000·578 Gramm Wasser gaben 0·0385 Gramm Baryumsulfat, entsprechend 0·132 Schwefelsäureanhydrid für 10·000 Wasser.

Kohlensäure. 187·372 Gramm Wasser gaben I. 0·614, II. 0·618 Gramm Kohlensäure, entsprechend 32·769, respective 32·879 für 10·000 Wasser.

Organische Substanz. 501·4 Gramm Wasser verbrauchten 3·5 Cubikcentimeter Chamäleon (1 Cubikcentimeter entspricht 0·0009018 Gramm Oxalsäure), demnach 0·063 organische Substanz für 10·000 Wasser.

Controlbestimmung. 493·835 Gramm Wasser gaben 1·6325 Gramm Sulfatrückstand und 2·6981 Gramm Baryumsulfat, entsprechend 14·706 Oxyde für 10·000 Wasser.

Mittelwerte für 10.000 Gewichtstheile Wasser des
Säuerlings Dubnica.

Chlor	5.541
Schwefelsäureanhydrid	0.132
Borsäureanhydrid	0.330
Phosphorsäureanhydrid	0.002
Kohlensäureanhydrid	32.879
Kieselsäureanhydrid	0.084
Kaliumoxyd	0.442
Natriumoxyd	10.592
Calciumoxyd	2.789
Strontiumoxyd	0.014
Magnesiumoxyd	0.565
Eisenoxyd	0.010
Aluminiumoxyd	0.002
Brom, Jod, Mangan, Lithium . . .	Spuren
Organische Substanz	0.063
Summe der Oxyde, gefunden . . .	14.706
" " " berechnet . . .	14.500
Specifisches Gewicht	1.0028

Säuren und Basen zu Salzen gruppirt, Werte für 10.000
Gewichtstheile Wasser.

A. Die kohlensauren Salze als normale Carbonate gerechnet.

Schwefelsaures Kalium	0.287
Chlorkalium	0.454
Chlornatrium	8.782
Borsaures Natrium	0.477
Kohlensaures Natrium	9.884
Phosphorsaures Calcium	0.004
Kohlensaures Calcium	4.977
" Strontium	0.020
" Magnesium	1.187
" Eisen	0.015
Aluminiumoxyd	0.002
Kieselsäureanhydrid	0.084
Brom, Jod, Mangan, Lithium . . .	Spuren
Organische Substanz	0.063
Kohlensäure, halbgebunden	6.923
" frei	19.033
Summe der festen Bestandtheile . .	26.173

B. Die kohlensauren Salze als wasserfreie Bicarbonate gerechnet.

Schwefelsaures Kalium	0·287
Chlorkalium	0·454
Chlornatrium	8·782
Borsaures Natrium	0·477
Natriumbicarbonat	13·984
Phosphorsaures Calcium	0·004
Calciumbicarbonat	7·167
Strontiumbicarbonat	0·026
Magnesiumbicarbonat	1·809
Eisenbicarbonat	0·020
Aluminiumoxyd	0·002
Kieselsäureanhydrid	0·084
Brom, Jod, Mangan, Lithium . . .	Spuren
Organische Substanz	0·003
Kohlensäure, frei	19·033

Der Sauerling von Dubnica gehört zu den alkalisch-muriatischen Sauerlingen und ist bezüglich der chemischen Zusammensetzung dem Sauerling von Jasenica ähnlich.

22. Der Sauerling bei Tešanj.

Die Bezirksstadt Tešanj liegt 35° 39·2' östlich von Ferro, unter 44° 36·8' nördlicher Breite, 238 Meter über der Meeresfläche. Ueber die geologischen Verhältnisse der Umgebung dieser Stadt schreibt Dr. E. Tietze¹⁾: „Bei Tešanj selbst treten ziemlich mächtige Conglomerate auf, welche an dieser Stelle die Basis und unterste Stufe des Tertiärgebirges bilden. Die Gemengtheile des Conglomerates sind zumeist Kalke. Hier aber bei Tešanj ist der äusserste südöstliche Rand jener Tertiärbucht gelegen, deren Bildungen sich bei Prnjavor zwischen dem alten Gebirge von Kobaš und dem Gabbro des Ljubič ausbreiten und dann durch das Tertiär von Dervent ihre Verbindung mit dem Vučja brdo finden. Das Castell von Tešanj liegt bereits malerisch auf einem mächtigen Felsen von Kalk, der überhaupt in der Umgebung Tešanj's nach Osten und

¹⁾ l. c. pag. 109.

Südosten zu eine ziemliche Rolle spielt. Der Kalk, in welchem leider Fossilien sich noch nicht fanden, gehört seiner petrographischen Beschaffenheit nach mit grosser Wahrscheinlichkeit zur Kreideformation und schliesst sich augenscheinlich an die Kalke an, die wir zwischen Doboj und Maglaj finden werden. Südlich von Tešanj erstreckt sich dieser Kalk bis Dobropolje. In dem Gebirge jedoch, welches sich zwischen Tešanj und Novi Seher erhebt, walten Serpentine und diabasische Grünsteine vor, denen kleine Partien von Rotheisenstein und rothe kieselige Gesteine an mehreren Stellen untergeordnet sind. Auch kommen, wie ich an einzelnen Stücken erkannte, gegen Novi Seher zu dunkle quarzige Schiefer dem Flysch untergeordnet vor, deren Beschaffenheit ihr relativ junges Alter kaum errathen lässt. Doch herrschen hier Flyschgesteine nicht ausschliesslich, denn es scheinen Neogenbildungen zwischen Dobropolje und dem Nordabhang jenes Gebirges an einigen Stellen die älteren Schichten zu überlagern, vielleicht als die letzten Ausläufer der grossen von Nordwesten her in diese Gegend eingreifenden Tertiärbucht. Namentlich kommen hier auch helle Kalkmergel ähnlich denen von Blažewce vor.“

2 $\frac{1}{2}$ Kilometer südlich von Tešanj entspringt im Walde, nahe der Fahrstrasse, der von der Bevölkerung sehr geschätzte Sauerling, der noch keine zweckmässige, sondern eine recht primitive Fassung hat.

Am 17. August 1888, um 7 Uhr Abends, bestimmte ich die Temperatur der Quelle, sie betrug 13° C., die Lufttemperatur zur selben Zeit 21° C. Ich fand das Wasser nicht vollkommen klar, sondern schwach opalisirend, infolge von suspensirten Mineralpartikelchen, die sich nach längerem ruhigen Stehen absetzten; der so entstandene Bodensatz war sehr gering. Die leise Trübung des Wassers rührt davon her, dass die Quelle nicht gut gefasst ist und dass sich Jedermann seinen Bedarf an dem Sauerling durch Einschöpfen mit irgend einem Gefässe verschafft.

Folgende Bestandtheile wurden durch die qualitative Analyse nachgewiesen: Kalium, Natrium, Lithium, Calcium, Strontium, Magnesium, Eisen, Mangan, Aluminium, Kupfer, Chlor, Schwefelsäure, Kieselsäure, Phosphorsäure, Borsäure, Kohlensäure und organische Substanzen (darunter Spuren von Ameisensäure und Buttersäure).

Das specifische Gewicht wurde bei 14·6° C. bestimmt; es beträgt 1·0029 (destillirtes Wasser von derselben Temperatur als Einheit angenommen).

Die quantitative Analyse ergab folgende Resultate:

Alkalien. I. 494·17 Gramm Wasser gaben 0·5706 Gramm Chloride und 0·0722 Gramm Kaliumplatinchlorid, entsprechend 0·282 Kaliumoxyd und 5·859 Natriumoxyd für 10.000 Wasser.

II. 491·477 Gramm Wasser gaben 0·5701 Gramm Chloride und 0·0774 Gramm Kaliumplatinchlorid, entsprechend 0·294 Kaliumoxyd und 5·879 Natriumoxyd für 10.000 Wasser.

Kieselsäure, Calcium, Magnesium. I. 1337·084 Gramm Wasser gaben 0·0518 Gramm Kieselsäure, 0·1845 Gramm Calciumoxyd und 1·1504 Gramm pyrophosphorsaures Magnesium, entsprechend 0·387 Kieselsäure, 1·380 Calciumoxyd und 3·100 Magnesiumoxyd für 10.000 Wasser.

II. 925·94 Gramm Wasser gaben 0·0439 Gramm Kieselsäure, 0·1277 Gramm Calciumoxyd und 0·8005 Gramm pyrophosphorsaures Magnesium, entsprechend 0·474 Kieselsäure, 1·379 Calciumoxyd und 3·114 Magnesiumoxyd für 10.000 Wasser.

Eisen, Aluminium, Mangan, Phosphorsäure. 9092·54 Gramm Wasser gaben 0·0456 Gramm Eisenoxyd, 0·0173 Gramm Aluminiumoxyd, 0·0087 Gramm Manganoxyduloxyd und 0·0142 Gramm pyrophosphorsaures Magnesium, entsprechend 0·05 Eisenoxyd, 0·019 Aluminiumoxyd, 0·01 Manganoxyduloxyd und 0·01 Phosphorsäureanhydrid für 10.000 Wasser.

Strontium. 10948·71 Gramm Wasser gaben 0·0049 Strontiumnitrat, entsprechend 0·002 Strontiumoxyd für 10.000 Wasser.

Schwefelsäure. I. 363·67 Gramm Wasser gaben 0·294 Gramm Baryumsulfat, entsprechend 2·747 Schwefelsäureanhydrid für 10.000 Wasser.

II. 176·68 Gramm Wasser gaben 0·1417 Gramm Baryumsulfat, entsprechend 2·753 Schwefelsäureanhydrid für 10.000 Wasser.

Chlor. I. 500·18 Gramm Wasser gaben 0·1019 Gramm Chlorsilber und 0·0126 Gramm Silber, entsprechend 0·587 Chlor für 10.000 Wasser.

II. 459·76 Gramm Wasser gaben 0·1058 Gramm Chlorsilber und 0·0025 Gramm Silber, entsprechend 0·587 Chlor für 10.000 Wasser.

Kohlensäure. Je 187·43 Gramm Wasser gaben I. 0·5651 und II. 0·5589 Gramm Kohlensäure, entsprechend 30·15, respective 29·819 für 10.000 Wasser.

Organische Substanz. 501·5 Gramm Wasser verbrauchten 3·59 Cubikcentimeter Chamäleon (1 Cubikcentimeter entspricht 0·001031 Gramm Oxalsäure), demnach 0·074 organische Substanz für 10.000 Wasser.

Controlbestimmung. 1007·67 Gramm Wasser gaben 2·8152 Gramm Sulfatrückstand und 4·823 Gramm Baryumsulfat, entsprechend 11·506 Oxyde für 10.000 Wasser.

Mittelwerte für 10.000 Gewichtstheile Wasser des
Säuerlings bei Tešanj.

Schwefelsäureanhydrid	2·750
Chlor	0·587
Kieselsäureanhydrid	0·431
Phosphorsäureanhydrid	0·010
Kohlensäureanhydrid	29·985
Kaliumoxyd	0·294
Natriumoxyd	5·879
Calciumoxyd	1·378
Strontiumoxyd	0·002
Magnesiumoxyd	3·107
Eisenoxyd	0·050
Aluminiumoxyd	0·019
Manganoxyduloxyd	0·010
Organische Substanz	0·074
Lithium, Kupfer, Borsäure	Spuren
Oxyde, gefunden	11·506
Oxyde, berechnet	11·180
Specifisches Gewicht	1·0029

Säuren und Basen zu Salzen gruppirt, Werte für 10.000 Gewichtstheile Wasser.

A. Die kohlensauren Salze als normale Carbonate gerechnet.

Schwefelsaures Kalium	0·544
„ Strontium	0·004
„ Natrium	4·435
Chlornatrium	0·969
Kohlensaures Natrium	5·852
Phosphorsaures Calcium	0·022
Kohlensaures Calcium	2·439
„ Magnesium	6·525
„ Eisen	0·073
„ Mangan	0·015
Aluminiumoxyd	0·019
Kieselsäureanhydrid	0·431
Lithium, Kupfer, Borsäure	Spuren
Organische Substanz	0·074
Kohlensäure, halb gebunden . . .	6·949
„ frei	16·087
Summe der festen Bestandtheile . .	21·328

B. Die kohlensauren Salze als wasserfreie Bicarbonate gerechnet.

Schwefelsaures Kalium	0·544
„ Strontium	0·004
„ Natrium	4·435
Chlornatrium	0·969
Natriumbicarbonat	8·276
Phosphorsaures Calcium	0·022
Calciumbicarbonat	3·512
Magnesiumbicarbonat	9·943
Eisenbicarbonat	0·100
Manganbicarbonat	0·021
Aluminiumoxyd	0·019
Kieselsäureanhydrid	0·431
Organische Substanz	0·074
Lithium, Kupfer, Borsäure	Spuren
Freie Kohlensäure	16·087

Der Säuerling von Tešanj gehört zu den alkalisch-erdigen Säuerlingen. Bemerkenswert an demselben ist der grosse Gehalt an Magnesiumbicarbonat.

(Schluss folgt im III. Hefte.)