säure, während eine oben S. 415 angeführte Untersuchung darin 42,85 nachgewiesen hatte.

Arseniksaures Kupferoxyd. — Das trockene Pulver wurde längere Zeit hindurch mit einer Lösung von Kalihydrat gekocht, wodurch es schwarz wurde. Nach dem vollständigen Auswaschen wurde das Kupferoxyd geglüht. Hr. Oesten erhielt aus 0,901 Grm. des Salzes 0,492 Grm. Kupferoxyd oder 54,60 Proc., während die oben angeführte Untersuchung 55,26 Proc. ergeben hatte. Das erhaltene Kupferoxyd war ganz frei von Arsenik.

Arseniksaures Zinkoxyd. — Das Salz war nach dem Glühen mit einer Lösung von kohlensaurem Natron gekocht worden. Es wurde dadurch sehr unvollständig zersetzt, desshalb in Chlorwasserstoffsäure gelöst, die Lösung mit Kalihydrat gesättigt, und mit einem Ueberschuss von kohlensaurem Natron gekocht. Hr. Oesten erhielt auf diese Weise aus 1,885 Grm. des geglühten Salzes nach dem ersten Kochen 1,388 Grm. und nach dem zweiten 0,916 Grm. Zinkoxyd oder 48,6 Proc. des geglühten Salzes, während nach einer oben angeführten Untersuchung nur 41,06 Proc. darin enthalten sind. Das Zinkoxyd enthielt daher noch eine bedeutende Menge von Arseniksäure.

Arseniksaures Manganoxydul. — Durch's Kochen mit Kalihydrat oxydirte sich das Oxyd und wurde braun. Aus 2,322 Grm. des Salzes erhielt Hr. Oesten 1,034 Grm. oder 41,38 Proc. Manganoxydul. Diess stimmt zwar mit einer oben angeführten Untersuchung desselben Salzes, nach welcher 41,08 Proc. Manganoxydul darin enthalten sind. Das erhaltene Oxyd-Oxydul war indessen nicht frei von Arsenik; mit Cyankalium im Kölbchen geschmolzen, gab es einen Spiegel von Arsenik. Es wurde in Chlorwasserstoffsäure gelöst, und die Lösung mit einem Ueberschuss von Kalihydrat gekocht. Aber auch das so behandelte Oxyd gab mit Cyankalium geschmolzen wiederum einen Spiegel von Arsenik.

Ueber die quantitative Bestimmung der salpetrigen Säure und der Untersalpetersäure durch übermangansaures Kali.

Von

Sigismund Feldhaus.

In dem Aprilhefte des Archivs der Pharm. 1860 habe ich die volumetrische Bestimmung der salpetrigen Säure mittelst des überman-

gansauen Kali's mitgetheilt. Ich benutzte diese Methode zur quantitativen Ermittlung des Salpetrigsäureäthyläthers in Mischungen mit Alkohol. Nebenbei hatte ich erwähnt, dass die Untersalpetersäure und die salpetrige Säure in der rothen rauchenden Salpetersäure durch Chamäleon bestimmt werden könnten.

Mohr erwähnt dieser Mittheilung, Lehrbuch der Titrimethode, 2. Aufl. S. 192 und bemerkt, dass man die rothe rauchende Salpetersäure nicht verdünnen dürfe, weil dadurch Zersetzungen stattfinden; es hätten 10 CC. einer gelben Salpetersäure im unverdünnten Zustande 7,5 CC. Chamäleon und auf 50 CC. mit Wasser verdünnt nur 1,8 CC. erfordert, und da durch den Zusatz des Chamäleons Verdünnung eintrete, so läge schon darin eine Fehlerquelle.

Ich habe hieraus Veranlassung genommen, die erwähnte Methode nochmals zu prüfen und zugleich ihren Werth durch Vergleichung mit Gewichtsanalysen klar zu stellen.

Die reine salpetrige Säure ist bekanntlich eine blaue Flüssigkeit, die sich, stark abgekühlt, mit Wasser von 0° zu einer farblosen Flüssigkeit verbindet, welche als das Hydrat der salpetrigen Säure angesehen werden muss. Im concentrirten Zustande wird dieses durch die geringste Erwärmung zersetzt, indem Stickoxydgas entweicht. Es scheint, dass der Widerstand dieser Verbindung gegen die Wärme mit der Verdünnung zunimmt, denn man kann salpetrigsaure Salze mit Säuren zersetzen, ohne eine Spur Stickoxydgas zu entwickeln, wenn die Verdünnung mit Wasser gross genug ist. Da diese Lösungen farblos sind, im Uebrigen das Verhalten der salpetrigen Säure zeigen, so darf man annehmen, dass dieselbe als Hydrat darin enthalten ist. Dass wasserfreie salpetrige Säure, erkennbar an der blauen Farbe, in wässriger Salpetersäure auftreten kann, steht dieser Annahme nicht entgegen.

Bei den Bestimmungen der salpetrigen Säure bediente ich mich des krystallisirten, sorgfältig getrockneten Silbernitrits. 0,1656 dieses Präparats gaben beim Glühen 0,1161 metallisches Silber (70,11 Proc.), bei einer zweiten Probe gaben 0,6712 . . . 0,4698 (70,00 Proc.), es war mithin reines AgNO_2 , denn diess enthält 70,13 Proc. Silber.

I. Bestimmung mit Uebermangansäure.

Die Maassflüssigkeit war aus umkrystallisirtem übermangansaurem Kali dargestellt, welches von Chlormetall frei war. Um das Urtheil ganz unbefangen zu erhalten, wurde der Gehalt dieser Lösung erst nach den Versuchen mit Kleesäure ermittelt und dann die Rechnungen vorgenommen. Zur Auflösung des Silbernitrits wurde Wasser verwendet, welches nach dem Ansäuern mit Salpetersäure oder Schwefelsäure das überman-

gansaurer Kali im Verlauf einer halben Stunde nicht veränderte. Destillirtes Wasser, welches nicht mit besonderer Vorsicht bereitet wurde, entfärbt so viel Chamäleon, dass die Richtigkeit der Analyse dadurch nicht unerheblich beeinträchtigt wird. Die Prüfung des Wassers auf reducirende Substanzen ist bei genauen Chamäleonanalysen unerlässlich. Bei den nachstehend mitgetheilten Versuchen wurde die Lösung des Silbersalzes in sehr schwach angesäuertem Wasser bewirkt, die Oxydation der salpetrigen Säure mittelst der Maassflüssigkeit bis fast zu Ende geführt, und dann erst die Lösung stark sauer gemacht und bis zur lichterrothen Farbe das übermangansaurer Kali zugetropft. Bei vollständig beendeter Reaction bleibt die Färbung der Flüssigkeit in einem vor Staub geschützten Becherglase eine Stunde und länger unverändert.

0,4844 Silbernitrit, 250 CC. Wasser mit Salpetersäure, verbrauchten 17,5 CC. Chamäleonflüss., berechnet 17,61 CC.

0,4975 Silbernitrit, 500 CC. Wasser mit Schwefelsäure, entfärbten 18 CC., berechnet 18,15 CC.

0,5498 Silbernitrit, 100 CC. Wasser mit Salpetersäure, entfärbten 19,6 CC., berechnet 19,96 CC.

0,3437 Silbernitrit, 300 CC. Wasser mit Schwefelsäure, entfärbten 12,4 CC., berechnet 12,49 CC.

0,4690 Silbernitrit, 500 CC. Wasser mit Schwefelsäure, entfärbten 17,2 CC., berechnet 17,05 CC.

0,3778 Silbernitrit, 200 CC. Wasser und Schwefelsäure, entfärbten 13,6 CC., berechnet 13,73 CC.

0,2235 Silbernitrit, 200 CC. Wasser und Salpetersäure, verbrauchten 8 CC., berechnet 8,12 CC.

0,3644 Silbernitrit, 500 CC. Wasser und Schwefelsäure, verbrauchten 13,2 CC., berechnet 13,18 CC.

Diese Versuche setzen die Anwendbarkeit der Methode ausser allem Zweifel. Eine Verdünnung auf ungefähr das 2000fache des Aequivalentgewichts der salpetrigen Säure, also auf 0,154 Grm. Silbernitrit 200 CC. Wasser, ist zu empfehlen. Bei viel geringerer Verdünnung kann man etwas Stickoxyd durch den Geruch wahrnehmen.

II. Bestimmungen mit Harnstoff.

Diese Gewichtsbestimmungen wurden in dem Berzelius-Rose'schen Apparat zur Kohlensäurebestimmung gemacht. Das Chlorcalcium war scharf getrocknet, nicht geschmolzen, fein körnig. Um nicht das Wasser der den Apparat passirenden Luft mit zu wägen, wurde dieselbe durch ein vorgelegtes Chlorcalciumrohr getrocknet. Der Berechnung wurde die Zersetzungsformel $C^2H^4N^2O^2 + NO^3 = 2 CO^2 + 2 N + NH^4O$ zu

Grunde gelegt, wonach 72 Gewichtsverlust 38 salpetriger Säure entsprechen. Zur Zersetzung des Nitrits wurde eine verdünnte Salpetersäure behutsam tropfenweise zu der Auflösung, welche zugleich den Harnstoff enthielt, zugesaugt.

0,2103 Silbernitrit, $\frac{1}{2}$ Grm. Harnstoff. Der Apparat wog vor der Zersetzung 75,2792, nach derselben 75,2030, Verlust $0,0762 = 0,1629 \text{ AgNO}^3$. Die Flüssigkeit wurde gelinde erwärmt und der Apparat nach dem Erkalten wieder gewogen. Das Gewicht betrug jetzt 75,1783, Verlust mithin $0,1009 = 0,2158 \text{ AgNO}^3$.

0,1054 Silbernitrit und 0,3 Grm. Harnstoff. Der Apparat wog vor der Zersetzung 63,4212, nach derselben 63,3804; Verlust $0,0408 = 0,0858 \text{ AgNO}^3$. Nach dem Erwärmen und Wiedererkalten wog der Apparat 63,3752, Verlust $0,0460 = 0,0984 \text{ AgNO}^3$.

III.* Bestimmungen mit Bleisuperoxyd.

Das Bleisuperoxyd ist ein sehr hygroskopischer Körper. Zu den Analysen wurde Superoxyd genommen, welches auch beim Erwärmen anmässig starke Salpetersäure nichts abgab. Es wurde in warmer Luft bei $110-120^\circ \text{ C.}$ getrocknet, bis, neben Schwefelsäure erkaltet, das Gewicht constant blieb. Die Filter von schwedischem Papier wurden bei derselben Temperatur getrocknet und wie das Superoxyd zwischen zwei gut schliessenden Uhrgläsern gewogen. Die Salpetersäure entfärbte die Uebermangansäure nicht im Mindesten, von Chlor war sie völlig frei. Das Auswaschen des salpetersauren Bleis geschah mit reinem Wasser unter Abhaltung von Staub. Dennoch wurde stets mehr Superoxyd gelöst, als der Formel $\text{NO}^3 + 2 \text{ PbO}^2$ und den Aequivalentgewichten $38 : 239$ entspricht. — Dass die Analysen mit Harnstoff der Schärfe entbehren, ist leicht erklärlich, aus der ungleichen Menge Kohlensäure, welche die Flüssigkeit bei ungleichen Temperaturen zurückhält. Aus welchem Grunde aber eine grössere Menge Bleisuperoxyd bei der Zersetzung durch salpetrigsaures Silber und Salpetersäure gelöst wird, ist mir völlig unerklärlich.

0,3695 AgNO^3 , 2,6312 PbO^2 , Verlust $0,5914 = 0,3806 \text{ AgNO}^3$.

0,4695 AgNO^3 , 1,3590 PbO^2 , Verlust $0,7631 = 0,4916 \text{ AgNO}^3$.

0,7143 AgNO^3 , 2,4680 PbO^2 , Verlust $1,1639 = 0,7500 \text{ AgNO}^3$.

Die rothe rauchende Salpetersäure ist ein wechselndes Gemenge von Salpetersäure, Untersalpetersäure und salpetriger Säure. In der dunkel gefärbten Säure ist die Gegenwart der salpetrigen Säure jedenfalls sehr gering, wenn nicht ganz zweifelhaft. Es ist hier nicht der

Ort, das Verhalten der Untersalpetersäure weiter zu erwähnen, es genügt, die Frage zu entscheiden, ob sie sich in der rothen rauchenden Säure vollständig vermittelt des übermangansäuren Kalis zu Salpetersäure oxydiren lasse. Setzt man zu der rothen rauchenden Salpetersäure tropfenweise Wasser, so entweicht unter Erwärmung Stickoxydgas, die Flüssigkeit wird bei grösserem Zusatz von Wasser farblos und zeigt das Verhalten der salpetrigen Säure neben Salpetersäure. Die Menge des entweichenden Stickoxydgases ist abhängig von dem rascheren oder langsameren Zusetzen des Wassers, von dem mehr oder minder vollständigen Vermischen jedes zugesetzten Wassertheiles, und desshalb kann die Menge der zurückbleibenden salpetrigen Säure nicht constant sein. Anders verhält es sich, wenn man die rothe rauchende Säure in so viel Wasser von mittlerer Temperatur einfließen lässt, dass keine Erwärmung bemerkbar wird. Lässt man z. B. aus einem Saugrohr einige CC. rothe rauchende Säure in mehrere hundert CC. Wasser unter Bewegen des Wassers einfließen, so tritt Vermischung ein, ohne dass man eine Entwicklung von Stickoxydgas wahrnehmen könnte. Man darf hieraus schliessen, dass sich die Untersalpetersäure hierbei nicht anders und nicht weiter als in das Hydrat der salpetrigen Säure und Salpetersäure zerlegt. Ist diese Annahme richtig, so ist die Bestimmung der Untersalpetersäure eine Bestimmung der salpetrigen Säure geworden und muss sich durch Chamäleon so genau wie jene ausführen lassen.

Mit einer rothen rauchenden Salpetersäure von 1,518 spec. Gewicht, eine Spur Chlor enthaltend, wurden folgende Versuche angestellt.

- 3,3672 Säure, 500 CC. Wasser, entfärbten 8,6 CC. Chamäleon
 $= 0,14127 \text{ NO}^4 = 4,195 \text{ Proc.}$
- 8,7436 Säure, 500 CC. Wasser, verbrauchten 21,8 CC. Chamäleon
 $= 0,3581 \text{ NO}^4 = 4,095 \text{ Proc.}$
- 6,0145 Säure, 300 CC. Wasser, verbrauchten 15,2 CC. Chamäleon
 $= 0,2497 \text{ NO}^4 = 4,117 \text{ Proc.}$
- 7,2525 Säure, 300 CC. Wasser, verbrauchten 18 CC. Chamäleon
 $= 0,2957 \text{ NO}^4 = 4,215 \text{ Proc.}$
- 9,6520 Säure, 500 CC. Wasser, verbrauchten 22,8 CC. Chamäleon
 $= 0,4073 \text{ NO}^4 = 4,221 \text{ Proc.}$
- 5,3200 Säure, 500 CC. Wasser, verbrauchten 13,4 CC. Chamäleon
 $= 0,2191 \text{ NO}^4 = 4,120 \text{ Proc.}$

Berücksichtigt man die Schwierigkeit, bei der grossen Flüchtigkeit der Untersalpetersäure die in einem Stöpselglase abgewogenen Mengen der rothen rauchenden Säure ohne Verlust mit Wasser zu vermischen,

so wird man zugeben, dass die Zahlen hinreichende Uebereinstimmung zeigen, um die vorhin ausgesprochene Ansicht zu unterstützen.

Um in der fehlerhaften Weise einen Versuch zu machen, wurden 15,255 Grm. derselben Säure tropfenweise mit Wasser versetzt; vollständige Entfärbung wurde mit 30 CC. erreicht, die Flüssigkeit entfärbte 16,2 CC. Chamäleon, es war mithin mehr als die Hälfte der Untersalpetersäure in entwichenes Stickoxydgas zerlegt worden. Ohne Zweifel muss ein solches Verfahren in jedem Versuche ein anderes Resultat geben.

Zur Controle der Chamäleonbestimmungen wurde die Untersalpetersäure mit Bleisuperoxyd bestimmt. In ein trockenes Stöpselgläschen wurde trockenes Bleisuperoxyd gegeben, gewogen, dann die rothe rauchende Säure zugefügt und deren Gewicht bestimmt. Nach beendigter Reaction wurde das unveränderte Superoxyd, unter denselben Cautelen wie bei der salpetrigen Säure, ausgewaschen, getrocknet und gewogen.

9,6550 Säure, 3,1802 Bleisuperoxyd, der Verlust betrug 1,1562
 $= 0,4456 \text{ NO}^4 = 4,61 \text{ Proc.}$

9,8670 Säure, 3,2764 PbO^2 , Verlust 1,2310 $= 0,4791 \text{ NO}^4$
 $= 4,85 \text{ Proc.}$

10,823 Säure, 4,3205 Superoxyd, Verlust 1,3450 $= 0,51397 \text{ NO}^4$
 $= 4,74 \text{ Proc.}$

6,3584 Säure, 2,9643 PbO^2 , Verlust 0,7432 $= 0,2861 \text{ NO}^4$
 $= 4,50 \text{ Proc.}$

4,1895 Säure, 2,1467 PbO^2 , Verlust 0,4625 $= 0,1935 \text{ NO}^4$
 $= 4,62 \text{ Proc.}$

Es war zu erwarten, dass die Zahlen auch hier grösser ausfallen würden, als bei den Chamäleonanalysen. Die Differenzen sind aber noch grösser als bei der Analyse des Silbernitrits. Ich bemerke, dass das Bleisuperoxyd auch an concentrirte Salpetersäure nichts abgab, was wegen des Gehalts an Silikaten, die in dem aus Mennige dargestellten Superoxyd gewöhnlich zugegen sind, vermuthet werden könnte.

Die Versuche mit salpetrigsaurem Silber bewiesen, dass bei einer sorgfältigen Behandlung die maassanalytischen Bestimmungen der salpetrigen Säure den Gewichtsanalysen voranzustellen sind.

Die Maassanalyse der Untersalpetersäure in der rothen rauchenden Salpetersäure hat allerdings darin eine Schwierigkeit, dass die Zerlegung mit Wasser einen Verlust durch Entwicklung von Stickoxydgas herbeiführen kann. Indess zeigen die Gewichtsanalysen mit Bleisuperoxyd unter einander weniger Uebereinstimmung als die Maassanalysen, so dass

in Berücksichtigung der Analysen des salpetrigsauren Silbers es mindestens zweifelhaft bleibt, ob dieselben mehr Vertrauen verdienen, als die Chamäleonbestimmungen.

Ueber directe Titrirung der Schwefelsäure mittelst Chlorbaryums.

Von

Robert Wildenstein.

Die bis jetzt zur Anwendung gebrachten Methoden Schwefelsäure maassanalytisch zu bestimmen, sind bekanntlich nur einer mehr oder weniger beschränkten Anwendung fähig (hierhin gehören auch die von mir in dieser Zeitschrift Heft 3 Seite 323 mitgetheilten Versuche) und können daher für die Technik nur von untergeordnetem Werthe sein. Eine maassanalytische Bestimmung der Schwefelsäure aber, soll eine solche der Technik von gutem Nutzen sein, muss eine ganz allgemeine Anwendung ermöglichen, d. h. dieselbe muss gestatten, direct mittelst Chlorbaryums aus salzsaurer Lösung zu titriren und den Punct der Beendigung in verhältnissmässig kurzer Zeit genügend scharf erkennen lassen.

Um diese Bedingungen zu erreichen, habe ich bei der sonst fast ganz unausführbaren directen Titrirung der Schwefelsäure durch Chlorbaryumlösung den nebenstehenden kleinen Apparat in Anwendung zu bringen versucht und zwar mit gutem Erfolg, da man mit Hilfe desselben bei geringem Zeitaufwande zu Resultaten gelangt, die für technische

Zwecke vollkommen ausreichend sind. Die einfache Zusammensetzung des kleinen Apparates ergibt sich fast ganz vollständig aus der Abbildung, alle anzuführenden Grössen sind die des von mir benutzten Apparates und mögen bei der Zusammensetzung eines solchen nur als Anhaltspunkte gegeben sein.

A ist eine Flasche von weissem Glase, deren Boden man abgesprengt hat (eine Glasglocke mit Tubus oder sonst ein entsprechendes Glasgefäss), von circa 900—950 CC. Inhalt, 10 $\frac{1}{2}$ Centim. hoch, 10 Centim. breit. In derselben befindet sich die

Fig. 38.