Buchanzeigen und Besprechungen.

Cassirer, R. Die vasomotorisch-trophischen Neurosen. Eine Monographie. Zweite umgearbeitete und vermehrte Auflage. Mit 24 Abbildungen im Text und 24 Tafeln. 988 S. Berlin 1912. S. Karger. Preis 30 Mk.

Was C. erste Auflage war (1901) wird jetzt seine zweite sein, erste und letzte Hilfe. Erste für jene, welche entmutigt vom Tierexperiment kommend in der Klinik das Spiel eines feingestimmten Apparates erblicken, letzte Hilfe für jene, welche sich in diesem Spiel nicht zurecht finden, Alle, die wir uns mit der schweren Frage beschäftigt haben, sind bei C. erstem Buch in die Schule gegangen. Hier fanden wir eine Summe von Tatsachen versammelt, mit Sachkenntnis gründlich klinisch beschrieben, mit scharfer Kritik gesichtet, Brauchbares davon auf den Nerv gestimmt und unter eine weitblickende Auffassung gebracht, die alle Ansichten mit kürzerer Distanz in sich schloß: Neben vasomotorischer Innervation gibt es auch noch eine trophische, die zwar nicht in anderen Bahnen läuft, die aber unabhängig von der Stärke der vasomotorischen Innervation, mit ihr manchmal auch ohne sie das Gewebe in seiner Ernährung beeinflußt. Der Weg ist der Reflexbogen. Der Impuls ist Reizung. Der intensivste Effekt wäre trophischer Tod, auch ohne Mitwirkung der Vasomotoren — neurotische Gangrän. Wir gingen von letzterer aus. Klinik, Anatomie und Experiment geboten uns halt zu machen bei einem vasomotorischen Effekt, der, über die gewöhnliche Dilatation und Konstriktion hinausgehend, die Gefäßwand selbst trophisch beeinflußt, schädigt, wir umgingen das Wort „vasomotorisch“ und suchten durch die Bezeichnung „angioneurotisch“ das Plus an Leistung auszudrücken.

Wir sind soweit gegangen, als uns der Einblick ins Gewebe dies erlaubte, also das Sehen uns diese Grenze zog, und wir verbleiben auch heute auf dieser Stelle. C. hat sich, hauptsächlich von der Klinik ausgehend, in das Gewebe hineingedacht und seine Gedanken haben ihn einen Schritt weiter

geführt. Der Dermatolog schließt bestenfalls zentripetal von Haut auf Nerv, für den Neurologen liegt das Zentralorgan wirklich im Mittelpunkt des Geschehens, er sieht die Dinge von oben, ohne Rücksicht auf jene, welche sie von unten aus nicht sehen können. Sein Standpunkt ist höher, aber auch exponierter und braucht stärkere Sicherung. Für sie zu sorgen ist der Zweck Seines Buches und diesem Bestreben verdanken wir eine Darstellung des Gegenstandes, die bis zum Zeitpunkt des Erscheinens wohl fast alles enthält, was in der Frage geschehen ist. Das Werk enthält sieben Kapitel; im folgenden meist in den Worten des Verfassers kurz ihr reicher Inhalt:

Erstes Kapitel: Anatomisch-physiologische Einleitung: „Es liegen keine Erfahrungen vor, die uns nötigen, isolierte trophische Nerven anzunehmen. Dagegen weisen zahlreiche klinische Beobachtungen darauf hin, daß das Nervensystem eine trophische Funktion ausübt. Diese ist nicht für alle Gewebsarten gleich geartet. Sie steht im engen Zusammenhang mit der besonderen Funktion der betreffenden Gewebe. Der trophische Einfluß wird auf den für diese Funktion zur Verfügung stehenden Bahnen geleitet. Die Haut erhält ihre trophischen Impulse auf dem Wege der sensiblen und vasomotorischen Leitungsbahn. Sie verlaufen hier zum Teil in einer der sonstigen Funktion entgegengesetzten Leitungsrichtung. Der Reflexmechanismus, der den Weg von der sensiblen zur vasomotorischen Leitungsbahn benutzt, ist für die Ernährung der Haut von größter Bedeutung. Ähnlich liegen die Verhältnisse für die Knochen und Gelenke, während für die Muskeln und Drüsen der Zusammenhang mit der Funktion ein ganz enger ist, und der trophische Einfluß, wenn auch unter reflektorischer Erregung, ohne weiteres auf den für die spezielle Funktion zur Verfügung stehenden Bahnen ablaufen kann. Selbst hier stehen aber auch vasomotorische Bahnen zur Verfügung.“

Zweites Kapitel: Die Akroparästhesien und verwandte Zustände: „Nach meiner Auffassung stellen also die Akroparästhesien in ihrer einfachsten Form (Schultze-scher Typus) eine sensible Neurose dar, in ihrer aus vasomotorischen und sensiblen Symptomen zusammengesetzten Varietät (Nothnagelscher Typus) eine vasomotorisch-sensible Neurose. Es sind meist die peripheren sensiblen Haut- und Gefäßnervendigungen bei der ersten Form, bei der zweiten dazu noch die peripheren gefäßverengernden Nerven (oder auch deren Ganglien) Sitz der Krankheit. Die Affektion der letzteren ist direkt oder reflektorisch bedingt.“

Drittes Kapitel: Die Erythromelalgie: „In einer nicht geringen Anzahl von Fällen zwar sind die erythromelal-

gischen Symptome nur beigeordnete Symptome irgendeines anderen Nerven- oder Gefäßleidens. Es erscheint uns aber nicht zweifelhaft, daß andererseits in einer weiteren Reihe von Fällen außer einer, anfangs wenigstens stets anfallsweise auftretenden schmerzhaften Röte und Schwellung an den gipfelnden Teilen, die von Hyperhidrosis und trophischen Veränderungen begleitet sein kann, sich keine wesentliche Störung findet. Diese Fälle teilen sich insofern in zwei Gruppen, als in der einen die lokalen Symptome der Bahn bestimmter Nerven folgen, in der anderen diffus auf alle oder die Mehrzahl der Endglieder verbreitet sind. In diesen Fällen muß man die Erythromelalgie als Krankheitsbild *sui generis* auffassen, mag sie hier auch auf einem durch eine allgemeine Neuropathie vorbereiteten Boden entstanden sein; selbst das letztere ist aber nicht immer nachweisbar.“

Viertes Kapitel: Die Raynaudsche Krankheit: „Bestimmte Teile des Nervensystems (vasomotorisch-trophische Zentren und Bahnen) und in erster Linie die vasokonstriktorischen, die das sympathische System im engeren Sinne zusammensetzen, sind in einen Zustand erhöhter Reizbarkeit versetzt, und zwar kann diese bedingt sein durch eine kongenitale, abnorme Anlage, die in sonstiger nervöser Heredität oft angekündigt erscheint. Sie kann erworben sein durch lang anhaltende und wiederholt schädigende Einflüsse, wie häufige Kälteeinwirkungen, rheumatische Erkrankungen, durch somatische oder psychische Traumen. Die erhöhte Reizbarkeit kann ferner ohne vorhandene Anlage und besonders bei solcher direkt hervorgerufen werden durch Intoxikationen und Infektionen und reflektorisch durch Erkrankung peripherer Organe, meist der Gefäße und seltener der Nerven. Es ergeben sich daraus eine Anzahl von Untergruppen der Krankheit. Damit ist aber die Einheitlichkeit des Krankheitsbildes nicht in Frage gestellt.“

Fünftes Kapitel: Die Sklerodermie. Sklerodermie ist nicht durch grobe Veränderungen im Nervensystem hervorgerufen, sie ist keine reine Angioneurose (vasomotorische Störung. Der Referent.), sondern eine Angiotrophoneurose. Der Reiz greift am Nervensystem an, kann exogen oder endogen toxisch oder reflektorisch sein, kann akut oder chronisch einwirken. Ähnlich wie hier präzisiert C. das Verhältnis toxischer Schädlichkeiten zur Angioneurose im sechsten Kapitel: Das akute umschriebene Ödem. „Es gibt Fälle, in denen die Erscheinung der flüchtigen Ödeme so weit hinter anderen wichtigeren Symptomen zurücktritt, daß es nicht angeht, ihnen klinische Selbständigkeit zuzusprechen. In vielen Fällen ist das umschriebene flüchtige Ödem aber sicher eine selbständige

Krankheit. Zwei Gruppen lösen sich da voneinander. Zur ersten Gruppe gehören die auf toxischem, autotoxischen oder infektiösem Wege entstehenden Fälle, die der Urtikaria und Purpura nahestehen. In der zweiten Gruppe herrschen nervöse Züge vor, sie entstehen unabhängig von äußeren Verhältnissen; Heredität und psychogene Momente kommen ätiologisch in Betracht. Die Labilität des vegetativen Systems ist die Grundlage, auf der sich die Symptome der Quinckeschen Krankheit aufbauen.

Siebentes Kapitel: Die multiple neurotische Gangrän. Es gibt eine multiple neur. Gangrän; „sie ist keine Krankheit *sui generis*, sondern ein unter verschiedenen Bedingungen sich findender Symptomenkomplex. Die mult. neur. Gangrän findet sich als seltenes Symptom einiger organischer Nervenkrankheiten (bei Gliosis spinalis, vielleicht bei der Tabes, bei der peripheren Neuritis, beim Herpes zoster).

In anderen Fällen treten neben ihren Symptomen solche einer schweren Urtikaria deutlich in den Vordergrund, so daß wir wohl von einer Urticaria gangraenosa sprechen dürfen. Es gibt Fälle, in denen sie, wie eine selbständige Infektion oder Intoxikation von der Art der gewöhnlichen Urtikaria oder der toxisch-infektiösen Form des angioneurotischen Ödems auftritt.“ „Es ist die Annahme statthaft, daß ein Trauma auf reflektorischem Wege eine erhöhte Reizbarkeit entfernterer vasomotorischer Nervengebiete produziert hat, die ihrerseits eben auch schon oft durch die neuropathische Disposition vorbereitet war.“

Alle beschriebenen Krankheitsbilder zeigen verwandtschaftliche Beziehungen zu einander, können symptomatisch, aber auch selbständig auftreten. Die vorzüglichen Tafeln geben teils die Hautveränderungen, teils im Röntgenbild die trophischen Störungen am Knochen, vorwiegend bei Morbus Raynaud und Sklerodaktylie wieder. Reiches Literaturverzeichnis.

Kreibich.

Herxheimer, K. und Altmann, K. Die Behandlung der Krankheiten der behaarten Kopfhaut. Aus: Sammlung zwangloser Abhandlungen aus dem Gebiete der Dermatologie, der Syphilidologie und des Urogenitalapparates, herausgeg. von Prof. Dr. J. Jadassohn. Bd. I. Heft 5. Halle a. S. Carl Marholds Verl. 1912. Preis Mk. 1.50.

Das vorliegende Heft bringt aus der Feder von K. Herxheimer und K. Altmann eine eingehende Darstellung der Therapie der Krankheiten der behaarten Kopfhaut, wobei

auch die Klinik der einzelnen Krankheitsbilder in genügender Weise gestreift wird. Handelt es sich auch um ein dem Dermatologen im allgemeinen geläufiges Kapitel, so bringt doch das Heft viele, nicht bisher veröffentlichte Einzelheiten und dürfte aus diesem Grunde dem Dermatologen manches Neue bringen. Auch dem Nichtspezialisten wird die Schrift, die in flüssiger Form das praktisch so wichtige Kapitel der Kopfhautkrankheiten in ihren wesentlichen Punkten behandelt, willkommen sein.

Fritz Juliusberg (Posen).

Zinsser, Prof. Dr. F. Syphilis und syphilisähnliche Erkrankungen des Mundes. Für Ärzte, Zahnärzte und Studierende. Mit 51 mehrfarbigen und 18 schwarzen Abbildungen auf 44 Tafeln. Urban & Schwarzenberg, Berlin u. Wien, 1912.

Der Zinssersche Atlas füllt zweifellos eine Lücke in unserer Disziplin aus. Am klinischen Unterricht tritt trotz der großen Wichtigkeit des Gegenstandes die Differentialdiagnose der syphilitischen und syphilisähnlichen Mund- und Rachenkrankungen zurück. Der Hauptgrund dafür liegt in der Zersplitterung des Krankenmaterials, das sich „außer in der dermatologischen, vielfach in der laryngologischen, der chirurgischen, der internen, der pädiatrischen und der zahnärztlichen Klinik einfindet“. Daher die Schwierigkeit einer Übersicht über das ganze Gebiet, zumal in den wenigen Stunden, die für die Ausbildung der Zahnärzte in der Syphilidologie in Frage kommen. Besonders diesem letzteren Mangel, den Zinsser bei der Abhaltung von Demonstrationen für Zahnärzte an der Kölner Akademie lebhaft empfand, verdankt der Atlas seine Entstehung.

Der einleitende Text schildert auf 55 Seiten in kurzer Übersicht den Verlauf der Syphilis an der Hand ihrer Erscheinungen im Munde und ihre Differentialdiagnose gegenüber den syphilisähnlichen Munderkrankungen. Auf die Klinik der letzteren, die meistens Teilerkrankungen von Allgemeinkrankheiten sind, ebenso wie auf die Gesamttherapie wurde als zu weitführend verzichtet. Der vorliegende „illustrierte Wegweiser für das Studium und die Diagnose dieser Krankheiten“ kann natürlich nicht den Gebrauch der Lehrbücher der oben genannten Zweige der Medizin ersetzen und entbehrlich machen — noch weniger die klinische Beobachtung selbst. Dieser aber soll der Atlas ein „ergänzendes und nützliches Hilfsmittel“ sein.

Ich glaube mit Sicherheit annehmen zu können, daß diese Hoffnung des Autors sich erfüllen wird. Der Text, der natür-

lich ganz auf den modernen Forschungsergebnissen ruht, zeichnet sich durch eine wohlthuende Klarheit, Knappheit und Prägnanz aus, die sich besonders auch in den scharfen Umrissen der Differentialdiagnose kundgibt. — Wenn ich einige Punkte hervorheben soll, so sagt Zinsser nach Betonung des hohen Wertes der Wassermannreaktion:

„Man darf aber nicht in den Fehler verfallen, von der Wassermannschen Reaktion alles zu verlangen, und darf sie nie für sich allein betrachten, gewissermaßen sie aus dem Rahmen des gesamten Krankheitsbildes herausnehmen. Nur in Verbindung mit der ganzen Krankengeschichte und dem Gesamtbefund hat sie für den Arzt die Bedeutung eines Symptoms. Im allgemeinen kann man den Wert des positiven Ausfalles der Wassermannschen Reaktion für die Diagnose etwa gleichstellen dem Werte einer positiven Syphilisanamnese. Den negativen Ausfall der Reaktion wird man niemals gegen die Diagnose verwerten dürfen.“ Mit dem Schlußsatz spricht Zinsser natürlich nicht, wie es von mancher anderen Seite geschah, dem negativen Wassermann jede diagnostische Bedeutung ab, z. B. dem immer wiederholten, stets negativen Wassermann, unabhängig von vorausgegangenen spezifischen Kuren zumal in der Spätperiode. In diesem Falle bin ich sicher, daß er auch die hohe Bedeutung des negativen Ausfalles anerkennen wird.

Sehr lehrreich ist die genaue Schilderung und Abbildung der den Besuchern der schönen Zinsserschen Klinik in Köln-Lindenthal und ihrer Moulagensammlung vertraut gewordenen, sonst aber trotz ihrer Häufigkeit wenig bekannten Atrophie der Kaufläche der ersten Molarzähne bei kongenitaler Lues.

Die Abbildungen selbst sind — ich möchte fast sagen — trotz ihrer künstlerischen, hohen Qualität fast durchweg von verblüffender Naturtreue, ein Umstand, der bei der Zartheit mancher Farbentöne und Nierendifferenzen (Plaques opalines et muqueuses, Epitheltrübungen über tieferen Infiltraten etc. etc.) doppelt hervorgehoben zu werden verdient.

Die Gesamtausstattung ist der rühmlichst bekannten Verlagsbuchhandlung würdig.

So kann die Anschaffung für Lehrer und Schüler in den berührten Disziplinen, sowie für alle Ärzte und Zahnärzte nicht warm genug empfohlen werden. Touton (Wiesbaden).