Ueber die eitrige metastatische Ophthalmie, besonders ihre Aetiologie und prognostische Bedeutung.

Von

Dr. med. Th. Axenfeld,
erstem Assistenten der Augenklinik in Marburg.

1. Hälfte.

Hierzu Tafel I, Fig. 1—7.

Einleitung.

Die vorliegende Arbeit¹⁾, deren Beendigung durch einige neu hinzukommende Fälle verzögert wurde, war mit ihrem Literaturverzeichniss in den Hauptzügen bereits beendet, als die umfassende Untersuchung Herrnheisers²⁾ über den gleichen Gegenstand erschien. Wenn ich trotzdem die eigene Bearbeitung ohne wesentliche Aenderungen veröffentliche, so geschieht dies weniger, weil manche der mitzutheilenden Beobachtungen besonderes Interesse bieten dürften und andere die Ansichten Herrnheiser's bestätigen, als aus dem Grunde, weil die Zusammenfassung der

¹⁾ Ueber einzelne Fälle cf. Berl. Klin. Wochenschr. 1893 Nr. 1, nach einem im Juli 1892 in Marburg gehaltenen Vortrag; ferner Verhandlungen der Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte in Nürnberg 1893.

²⁾ Prager Zeitschrift für Heilkunde 1893, XIV.

Literatur von andern Gesichtspunkten aus vorgenommen wurde. Ich habe dieselbe aber auf einen möglichst kleinen Raum in Gestalt von Tabellen zusammengedrängt und verweise für eine ausführliche chronologische Uebersicht der Fortschritte in der Lehre von der metastatischen Ophthalmie und der Theilnahme der verschiedenen Autoren an denselben auf die genauen Referate Herrnheiser's.

Den wärmsten Dank aber möchte ich zunächst abstaten meinem hochverehrten Chef, dem Herrn Prof. Dr. Uhthoff, der mir mehrere werthvolle Fälle in liberalster Weise überliess und durch in jeder Hinsicht wohlwollende Förderung und Theilnahme mir zu dieser Untersuchung die Gelegenheit bot; herzlichen Dank sodann Herrn Prof. F. Marchand, der mir verschiedene interessante anatomische Präparate gab, und dessen stets bereitem Rath ich ganz besonders verpflichtet bin; herzlichen Dank ferner den Herren Geheimräthen Prof. Dr. Mannkopff und Küster, Geheimrath Prof. Dr. Schmidt-Rimpler, meinem früheren hochverehrten Chef, den Herren Prof. Ahlfeld und Prof. C. Fraenkel für ihr freundliches Entgegenkommen und ihre vielfache Hilfe, desgleichen den Herren Collegen Saxer vom pathologischen und Hammerl vom hygienischen Institut.

Grössere infectiöse Pfröpfe, welche eine Verstopfung grösserer Gefässgebiete veranlassen, pflegen während einer Pyämie natürlich nur von Zeit zu Zeit in den grossen Kreislauf geworfen zu werden. Solche grösseren Embolien können sich nun nach ihrem Umfang an die verschiedensten Stellen hin verirren, sie sollen aber gern der directen Stromrichtung des Blutes folgen, weniger leicht in Seitenäste, besonders rechtwinkelig oder rückläufig inserirende Verzweigungen hineinfahren. In ähnlicher Weise würde dies für kleinere Pfröpfe und entsprechend kleinere Arterien

passen. So sucht Gussenbauer (Sephthämie, Pyohämie und Pyosephthämie, Deutsche Chirurgie 1882) die grosse Seltenheit der metastatischen Abscesse des Rückenmarks (Leyden¹⁾) dadurch zu erklären, dass dessen Arterien, abgesehen von ihrem engen Caliber, senkrecht entspringen.

Je feiner nun aber das embolische Material ist, besonders dasjenige, welches nur noch capilläre Embolien hervorruft, um so allgemeiner wird es sich im Blute vertheilen können, um so leichter jeden beliebigen Weg nehmen, unabhängig von der Insertionsweise der grösseren oder kleineren Arterien. So sehen wir denn auch, dass z. B. gerade am häufigsten die Nieren Sitz capillärer Embolien sind, obwohl ihre Arterien senkrecht der Aorta ansitzen. Für solche Massen kommen vielmehr nur die feineren anatomischen Verhältnisse als eine Embolie mehr oder weniger begünstigende Factoren in Betracht.

Es liegt zunächst auf der Hand, dass ein blutreiches Organ auch relativ mehr von solch fein vertheiltem Material erhalten wird, ebenso ist klar, dass, je enger die kleinen Gefässe, besonders die Capillaren, um so grösser die Gefahr auch des Haftenbleibens kleinerer Gerinnsel ist. Und schliesslich darf man nicht vergessen, dass auch aller kleinste Mengen, selbst vereinzelt circulirende Eitererreger, die an und für sich auch die engsten Capillaren ungehindert passiren, dadurch zur Ansiedelung veranlasst werden können, dass auf anderem Wege sich Circulationsstörungen einstellen, die zu einer Stagnation des coccenhaltigen Blutes und damit unter Umständen zur Eiterung führen²⁾. Neigt ein Organ zu solchen Circulationsstörungen, so würde auch hierin eine Disposition für metastatische Infectionen liegen können. Derartige Circulationsstörungen werden ja dafür

¹⁾ Klinik der Rückenmarkskrankheiten 1872.

²⁾ cf. z. B. die Ausführungen von Klebs, allgemeine Pathologie, 1887, p. 298.

verantwortlich gemacht, dass z. B. Brüche oder Contusionen von Knochen und Gelenken (Osteomyelitis!), sowie starker auf der Haut lastender Druck diese Stellen zur Vereiterung vorbereiten; es ist ferner bekannt, dass bei Hinzutreten einer Blutinfection bis dahin einfache Thromben zerfallen können; es wird ferner auf die Möglichkeit verwiesen, dass auch Altersveränderungen der Kreislauforgane Veranlassung geben können, dass infectiöse Keime sich festsetzen (Gussenbauer¹).

Enthält nun das Auge irgend welche Bedingungen, welche eine solche Disposition veranlassen, oder etwa das Gegentheil?

Die Frage ist verschieden beantwortet worden, mit ja und mit nein; so stehen, um nur einige Extreme anzuführen, die Angaben Hirschberg's², der anfangs die metastatische Ophthalmie, besonders die nicht puerperale als sehr selten, für das Leben fast infaust hinstellte, und diejenigen von Panas³), der das Auge für ganz besonders disponirt erklärt und mildere Fälle anführt, sich schroff gegenüber („La suppuration se localise à l'oeil plutôt que dans les autres organes“). Und zwischen diesen Ansichten finden sich viele weniger bestimmte.

Ob man die metastatische Ophthalmie selten oder häufig nennt, wird von dem Material der verschiedenen Beobachter, dann aber davon abhängen, womit man ihre Frequenz vergleicht. Jedenfalls gehört sie doch zu den selteneren Augenerkrankungen. Was aber die Disposition des Auges zur endogenen Infection anbelangt, so lassen sich in der That sowohl begünstigende wie schützende Vorrichtungen geltend machen:

Es wird zunächst von verschiedenen Seiten angegeben, dass im Gebiete der Carotiden, d. h. an Hals und Kopf

¹) l. c.

²) Arch. f. Augenheilk. 1880, Bd. IX, p. 299.

³) Festschr. zu v. Helmholtz' 70. Geb. 1891.

Metastasen überhaupt seltener seien als in den inneren Organen, dem Rumpf und den Extremitäten (vielleicht wegen des rechtwinkligen Ansatzes der Carotis[?]); an dieser Eigenschaft würde die A. ophthalmica in gleicher Weise, wie die übrigen Aeste theilnehmen. Es setzt ferner die A. ophthalmica, ebenso wie ihre Nachbararterien, selbst fast rechtwinklig an der Carotis int. an und verläuft sogar deutlich ein wenig nach hinten. Die zum Bulbus führenden Gefässe entspringen ihrerseits wieder mehr oder weniger winkelig aus ihren Mutterarterien, während dem Verlauf nach die Rami ethmoid. und lacrim. weit eher die eigentliche Fortsetzung der Art. ophth. darstellen. Dies ist zur Erklärung der Seltenheit von intraocularen Geschwulstmetastasen¹⁾ und auch für andere Embolien des Auges²⁾ herangezogen worden. Doch würde für die metastatische Ophthalmie dieser Arterienansatz nach der obigen Erörterung nur dann wohl von wesentlicher Bedeutung sein, wenn dieselbe nicht auf Capillarembole, sondern auf Einschleppung grösserer Bröckel beruht. Bei gleichmässigerer Verseuchung des Blutes mit fein vertheiltem Material kommt auch hier der Blureichthum und besonders das Verhalten der Capillaren in Betracht.

Zum Augapfel fliesst nun vom Blut der A. ophthalmica nur ein kleiner Theil, nach Schätzungen, die ich an injicirten Präparaten in der hiesigen Anatomie vornehmen konnte, etwa ein Achtel. Das Auge in toto stellt überhaupt, entgegen der Ansicht von Panas (l. c.) („organ éminentement vasculaire“), ein blutarmes Organ im Verhältniss zu seinem Volumen dar, in welchem die Sklera, Cornea und der Glaskörper etc. gegenüber der sehr gefäss-

¹⁾ Ueber den metast. Krebs der Chor., Festschrift zum 50jähr. Doktorjubil. von Virchow 1891.

²⁾ z. B. Knapp, über Verstopfung der Blutgefässe des Auges, v. Graefe's Arch. f. Ophthal. XIV. 1., p. 207. Cohn, Uterus und Auge 1890 u. a.

reichen Uvea weit überwiegen. Man kann wohl behaupten, dass jedes ebenso grosse Stückchen Muskel nicht weniger Blut enthält als der Augapfel.

Vergleichende Messungen, die Weite der Capillaren in verschiedenen Organen betreffend, existiren in der anatomischen und physiologischen Literatur leider nur äusserst spärlich. Der Grund liegt zum grossen Theil wohl in der Schwierigkeit der Untersuchung, die hauptsächlich auf das conservirte und injicirte Präparat angewiesen ist. Ist es schon fraglich, ob nach dem Tode die verschiedenen Organe bezüglich ihres capillaren Blutgehaltes gleich unverändert bleiben, so ist, selbst bei möglichster Uebereinstimmung in der Conservirung es immer unsicher, ob der Grad der Schrumpfung derselbe ist. Compactere Gewebe werden ihre Form mehr behalten, andre sich etwas stärker contrahiren. Wird Injection angewandt, so ist auch bei genau constantem Druck nicht ausgeschlossen, dass dieser je nach dem Gefüge, der Spannung des Organs Resultate giebt, die sich nicht ganz vergleichen lassen.

Einige Zahlen finde ich in Landois's Lehrbuch der Physiologie. Es giebt an, dass die Capillaren sehr verschiedene Durchmesser haben: Retina und Muskeln 5—6 μ , dagegen Knochenmark, Leber, Chorioidea 10—20 μ . Für die Aderhaut ist als Ergänzung der Befund Sattler's¹⁾ zuzufügen, dass in etwa 50 % der Fälle unmittelbar hinter dem Corp. cil. eine Zone gelegen ist mit äusserst feinen Capillaren, die grösstentheils nur 4—6 μ weit sind. Leber²⁾ fand an einem mit Berliner Blau injicirten Präparat die Netzhautcapillaren ebenfalls 5—6 μ weit, die der Aderhaut zwischen 10 und 30 μ .

Bei der beschriebenen Engigkeit der Capillaren, auf welche schon öfters Gewicht gelegt wurde, ist schliesslich

¹⁾ v. Graefe's Arch. f. Ophthal. XXII. 2., p. 34.

²⁾ Graefe-Saemisch Bd. II. 1. Cap. VIII., p. 310, 318.

noch zu berücksichtigen, dass der Blutstrom in denselben infolge des intraocularen Druckes wohl etwas langsamer fließen muss, als in gleich weiten Haargefässen an manchen andern Stellen des Körpers.

Sehen wir von etwaigen erworbenen Circulationsstörungen ab, so erscheint nach dem bisher Gesagten das Auge in seinem normalen Zustande bezüglich des Ursprungs seiner Arterien und seines Blutreichthums für relativ wenig geeignet zur Metastase, bezüglich seiner Capillaren aber mehr als eine ganze Reihe von andern Körpertheilen, oder: Das Auge erscheint für compactere Pfröpfe weniger empfänglich, zur Capillarembolie dagegen bis zu einem gewissen Grade disponirt. Finden wir z. B., dass in einer für das Auge unverhältnissmässigen Zahl sich endogene Infectionen ausbilden, so ist von vornherein deren capilläre Entstehung wahrscheinlicher.

In der Literatur finden sich von der berühmten Entdeckung der Capillarembolie (Virchow) an, vielfache Angaben und Befunde des Inhalts, dass die septischen Embolien in den kleineren Gefässen und Capillaren des Auges sich festsetzen (Leber, Litten, Hirschberg, Herrnheiser etc.). Billroth¹⁾ spricht sogar von einer „diffusen“ Entzündung des Auges in dem Sinne, dass nicht eine umschriebene Embolie stattfände, sondern dass sich in den Capillaren die im Blut circulirenden Mikroben diffus ansiedelten. Dem gegenüber ist aber doch auch vielfach von „plötzlicher Erblindung“, von starker Sehstörung allein schon durch die Embolie die Rede, also Begriffen, die den Verschluss grösserer Zweige oder ihrer Ausbreitungen voraussetzen, analog der blanden Embolie der Centralarterie. Und wiewohl der Unterschied in der Art der Embolie bei der blanden und der metast. Form vielfach hervorgehoben

¹⁾ Lehrbuch 1887, p. 475.

(z. B. Hirschberg) und ausserdem a priori anzunehmen ist, dass die Erscheinungen in mannigfaltiger Weise wechseln können, so ist es doch nicht in jeder Hinsicht klar, wie weit die geringe Beanlagung des Auges zur Aufnahme grösserer Pfröpfe gegenüber der Disposition zur Capillarembole das Krankheitsbild der metastat. Ophthalmie beeinflusst, und ob nicht manche besondere Eigenthümlichkeit derselben sich auf diesem Wege erklären lasse.

Seitdem durch ein reiches klinisches und anatomisches Material bewiesen ist, dass jede Art von pyämischer Allgemeininfection auch zur metastatischen Ophthalmie führen kann, ist die Frage mehr in den Hintergrund getreten, warum die letztere gewisse Formen der Sepsis in so ausgesprochener Weise bevorzugt. Gewiss ist es ein Fortschritt, dass man die verschiedenen Gruppen der ursächlichen Erkrankungen zu dem gemeinsamen Begriff der Pyämie zusammenfasste und ebenso die dazu gehörigen metastat. Ophthalmieen nicht mehr als Krankheiten sui generis von einander trennte. Allein diese einheitliche Auffassung der gesammten sephthopyämischen Infectionen darf auch bei Betrachtung der Ophthalmie nicht von vornherein ganz vernachlässigen, dass es eben doch je nach den Verhältnissen, unter denen die Pyämie den Körper trifft, je nach der Art der Infectionserreger u. s. w. gewisse Unterschiede geben kann, die es wünschenswerth erscheinen lassen, neben der Zusammenfassung auch einzelne Gruppen der Septhopyämie für sich darauf hin zu betrachten, ob sie völlig miteinander übereinstimmen. Und dass dies auch für die metast. Ophthalmie nicht unangebracht ist, scheint mir aus den später folgenden Betrachtungen hervorzugehen. Ich kann Herrnheiser hierin nicht beistimmen, wenn er z. B. dem alten Begriffe der puerperalen Ophthalmie jede Berechtigung absprechen will.

Als bekannte Thatsache möchte ich kurz vorausschicken, dass das Puerperium, dann die sogen. Endocar-

ditis ulcerosa weit häufiger Ursache der metast. Ophth. sein sollen, als z. B. chirurgische Infectionen¹⁾.

Die wegen ihrer Einfachheit zunächst bestechende Erklärung (Herrnheiser) es läge dies, abgesehen von bisher ungenügender Beachtung der nicht puerperalen Formen(?), auch daran, dass die puerperale Pyämie am meisten schwere Infectionen aufwiese, mit andern Worten: das Vorkommen der Augenmetastase stände im Verhältniss zur Schwere der Infectionen, entspricht in dieser Allgemeinheit nicht ganz den Thatsachen. Dann müsste wenigstens unter 100 tödtlichen chirurgischen Fällen annähernd das gleiche Verhältniss sich finden, wie bei 100 puerperalen, was nicht zutrifft.

Ein annäherndes Bild der Frequenz der metast. Ophthalmie gewinnt man, wie ich glaube, aus den statist. Angaben der Charité-Annalen der Jahre 1876—79 incl.²⁾. In dieser Zeit kamen dort im Ganzen 173 an Puerperalinfection (es sind nicht nur die metastasirenden Fälle gemeint) gestorbene Personen zur Section (unter 3694 Leichen); bei diesen fanden sich 7 metast. Panophthalmieen (6 doppelseitig, 1 einseitig), also 3,5 % der tödtlichen Puerperalinfectionen (0,19 % der gesammten Leichenmenge). Während derselben Zeit wurden 4 metast. Ophthalmieen aus interner, nur 1 beginnende aus traumatischer Ursache beobachtet; da aber die Gesamtzahl der nicht puerperalen tödtlichen septischen Zustände nicht angegeben ist, so lässt sich für diese ein procentuarisches Verhältniss nicht berechnen. Berücksichtigt man aber, dass Gussenbauer unter 234, Billroth unter 180 (zusammen 414 Fällen tödtlicher chirurgischer Sep-

¹⁾ Der Umstand, dass unter meinen eigenen Fällen nur ein puerperaler Fall sich befindet, spricht nicht gegen diese alte Erfahrung. Denn in den letzten Jahren, über welche mir Angaben vorlagen, sind in der hiesigen geburtshilflichen Klinik metastasirende Puerperalpyaemien nur sehr vereinzelt vorgekommen, dagegen umfassen die übrigen mitgetheilten Fälle das gesammte Krankenmaterial der Augenklinik und Medicinischen Klinik während der letzten 20 Jahre, ferner das der chirurg. Klinik aus den letzten 4 Jahren. Dazu kommen noch 2 Fälle, die ausserhalb klinisch beobachtet wurden.

²⁾ Nach den Sectionsberichten und den Arbeiten Litten's.

sis) auch nicht einen Fall selbst beobachteter metast. Ophthalmie anführen konnten, so ist der Unterschied wohl deutlich. Besonders auffallend aber ergibt sich die unverhältnissmässige Seltenheit der metastatischen Ophthalmie bei nach Wunden und Operationen entstandener Pyämie aus dem ungeheuren Material des deutsch-französischen Krieges von 1870/71¹⁾ und dem des amerikanischen Bürgerkrieges²⁾. Im Jahre 1870/71 sind 1810 Fälle von Septicämie und Pyämie mit 1762 (91,9 %) Todesfällen verzeichnet; von diesen sind 967 postoperativ, besonders nach Verletzungen der unteren Extremitäten. Unter den 774 genau protokollirten Fällen sind 2 metastat. Ophthalmieen (1 tödtlich, 1 geheilt), das macht 0,27 % der tödtlichen Septicopyämieen. Im amerikanischen Bürgerkrieg sind sogar 2818 „Pyämieen“ mit 97,4 % Sterblichkeit verzeichnet, allein etwa 1550 nach Beinwunden. Nirgends aber ist die Ophthalmie erwähnt, obwohl an der Hand von 48 ausgewählten, verschiedenen Sectionsprotocollen die vorgekommenen Veränderungen und besonders die Metastasen eingehend besprochen werden. Aus der vorantiseptischen Zeit liegt ja ein sehr grosses Material tödtlicher chirurgischer Pyämieen vor, und trotzdem haben die obengenannten Autoren (auch Heubner), deren Erfahrung in jene Zeit zurückreicht, selbst nur so spärliche oder gar keine Ophthalmieen gefunden.

Die Schwere der Infection, ein an sich etwas unbestimmter, aus vielen Factoren sich zusammensetzender Begriff, bietet daher nicht den gesuchten Aufschluss, obwohl eine andere der metastat. Ophthalmie vielfach zugesprochene Eigenthümlichkeit zu dieser Auffassung vorzüglich passen würde, nämlich ihre für das Leben angeblich besonders ungünstige prognostische Bedeutung. Ist auch der Standpunkt³⁾, dass fast ausnahmslos die Ophthalmie ein sicheres Todeszeichen sei, jetzt wohl allgemein

¹⁾ Kriegs-Sanitätsbericht über die deutschen Heere 1870/71, Bd. III.

²⁾ The medical and surgical history of the war of the rebellion part. III, Vol. II. (Otis, Huntington, Barnes) p. 857 ff.

³⁾ Früher von Hirschberg, Litten, Landsberg u. a. vertreten.

verlassen, so ist es doch auch heute noch die Auffassung vieler Lehrbücher und Arbeiten, dass die Augenmetastase eine noch ungünstigere Prognose meist stellen lasse, als der Pyaemie allein durchschnittlich schon zukommt, oder wenigstens, unbestimmter ausgedrückt, dass die Ophthalmie prognostisch von besonderer Bedeutung sei.

Ist dies zutreffend, bedeutet das Eintreten der Ophthalmie durchschnittlich, dass die Erkrankung einen besonders schweren Charakter angenommen hat, so würde die Augenmetastase eine ganz eigenthümliche, ungewöhnliche Stellung einnehmen. Denn im Allgemeinen unterscheiden sich die Metastasen der verschiedenen Körpertheile, soweit von einer eigenen prognostischen Bedeutung derselben überhaupt die Rede sein kann, nur bezüglich der Dignität des befallenen Organs. Es liegt auf der Hand, dass z. B. ein Leberabscess oder ein solcher im Herzfleisch andere Bedeutung hat, wie z. B. eine subcutane Metastase.

Zu diesen lebenswichtigen Organen im eigentlichen Sinne des Wortes gehört nun das Auge offenbar nicht, und andere Gründe müssten sich finden. Wir haben um so mehr Veranlassung, nach solchen zu suchen, als das häufige doppelseitige Auftreten der metast. Ophthalmie, wie alle doppelseitigen inneren Augenleiden, allerdings als Symptom einer allgemeinen constitutionellen Anomalie uns erscheinen muss.

Gussenbauer¹⁾ und Fehling²⁾ geben an, dass die metast. Ophthalmie nur mit anderweitigen Metastasen zusammen auftrete. Wäre diese, wie mir scheint, auf der „geringen Disposition“ des Auges beruhende Ansicht richtig, so würde eine speciell üble Bedeutung der Ophthalmie schon verständlich sein. Man könnte annehmen, dass es

¹⁾ l. c.

²⁾ Die Physiologie und Pathologie des Wochenbettes. Stuttgart 1890.

zur Augenmetastase im Allgemeinen erst dann kommen wird, wenn im Blute ungewöhnlich viel septisch-embolisches Material vertheilt ist, d. h. ein Material, welches zuerst in den andern mehr disponirten Organen die Eiterung hervorrief, also demnach so compact sein müsste, dass es überall aufgehalten wird. Es wird also in dieser Auffassung den speciellen capillaeren Verhältnissen des Auges keine Bedeutung zuerkannt.

Es ist nun ersichtlich, dass, wenn hauptsächlich die weite Verbreitung solcher gröberer embolisirender Massen hier in Betracht käme, wir vor Beginn der Ophthalmie zahlreiche Metastasen besonders auch im übrigen Ausbreitungsgebiet der Carotiden finden müssten, von welchem das Auge doch nur einen kleinen Theil ausmacht.

In welchem Verhältniss sind nun hier metastatische Eiterungen gleichzeitig beobachtet? Und ist die genannte Ansicht Gussenbauer's und Fehling's für die Mehrzahl der Fälle — Ausnahmen sind ja bekannt — richtig, welcher sich z. B. auch Stellwag von Carion (die Ophthalmie vom naturwiss. Standpunkt II. p. 152) anschliesst, indem er erklärt, dass sehr häufig gleichzeitige Gehirnmetastasen beobachtet würden? Welche prognostische Bedeutung kann überhaupt die metast. Ophthalmie beanspruchen?

Die Untersuchung dieser und anderer statistischer Fragen¹⁾ und der aus denselben auf die Entstehung der metast. Ophthalmie möglichen Schlüsse ist nur an der Hand eines grossen Materials ausführbar, wie es die Erfahrung eines einzelnen Beobachters über ein relativ so seltenes Leiden naturgemäss nicht enthalten kann. Ich habe deshalb ausser 14 eigenen klinischen und anatomisch-

¹⁾ So soll nach Fischer, Zehender (Lehrbuch), Knies u. a. die Ophth. meist einseitig, nach Soelberg-Wels, Litten, Klein (Art. Chor. in Eulenburg's Encycl.) etc. öfter doppelseitig sein etc.

bacteriologischen Untersuchungen die gesammte, annähernd 200 Fälle umfassende Literatur zusammengestellt und besonders auch darauf geachtet, ob in den übrigen Symptomen vielleicht irgend welche Anhaltspunkte sich fänden, aus welchen auf die Ophthalmie sich Rückschlüsse ziehen liessen.

Bei der hierbei gewählten Eintheilung in puerperale, chirurgische und solche Pyämieen, die der inneren Medicin angehören, welche Gruppen dort noch genauer bestimmt werden sollen, habe ich, um dies nochmals zu betonen, niemals eine andere Auffassung gehabt, als dass es sich nur um vielleicht etwas verschiedene Erscheinungen einer einheitlichen Krankheit handelt und dass eine scharfe Grenze nicht existirt, habe vielmehr vorurtheilsfrei untersuchen wollen, ob bezüglich der Ophthalmie volle Uebereinstimmung oder Unterschiede sich finden.

Eine eigentlich aetiologisch berechnete Eintheilung der Pyämie, die nach der Art der Infectionserreger (Strept., Staph., Pneumococcen etc.) ist bei der geringen Zahl der bacteriologisch genau untersuchten Fälle nicht durchzuführen, würde auch insofern ungeeignet sein, als sie allein manche andere nicht unwichtigen Verhältnisse unberücksichtigt lässt. In Ermangelung besserer Gesichtspunkte habe ich deshalb, auch zur klareren Uebersicht des Stoffes, die angegebene Eintheilung gewählt.

Die Infection im Wochenbett, obwohl auch traumatisch, hat ja die specielle Eigenthümlichkeit, dass sie die puerperale Veränderung des Organismus vorfindet. Zur chirurgischen sind ausser den traumatischen auch diejenigen Fälle zugerechnet, wo die Pyämie sich an irgend eine locale Eiterung anschliesst, zur internen nur die eigenthümliche Form der kryptogenetischen Pyämie und diejenige im Anschluss an andere Infectionskrankheiten. Es entspricht dies der Abgrenzung, wie sie in den Handbüchern der Gynaekologie, Chirurgie und inneren Medicin üblich ist.

Von den in der Literatur gegebenen Sectionsprotokollen und anatomischen Beschreibungen konnte vielfach nur mit einer gewissen Kritik Gebrauch gemacht werden; wo die Verhältnisse nicht zweifellos schienen, habe ich deshalb in die betreffende Colonne ein Fragezeichen gesetzt, für dessen nähere Begründung ich auf die Originalien verweisen muss. Ganz besondere Vorsicht war bei manchen das Auge selbst betreffenden anatomischen Daten aus älterer Zeit geboten, weil die, oft in frischem Zustand vorgenommene mikroskopische Untersuchung viele Fragen, besonders auch bacteriologischer Natur, nicht immer beantworten konnte; ich schliesse mich in dieser Auffassung derjenigen Herrnheiser's zum grossen Theile an.

Einige der älteren Fälle aber scheinen mir doch bezüglich der bakteriellen Natur der Embolie zweifellos. Es muss doch daran festgehalten werden, dass in Netzhautgefässen solche nur aus gleichartigen, glänzenden, gegen Säure und Alkali beständigen Körnchen zusammengesetzte Verstopfungsmassen bisher meines Wissens kaum anders, als in Fällen septischer Embolie beschrieben sind. In der Aderhaut sollen sie freilich nach Sattler's Angabe nicht selten vorkommen. Wenn H. in gleicher Weise an allen älteren Arbeiten Kritik üben wollte, so müsste er auch diejenigen Virchow's, Heiberg's u. a. nicht anerkennen. In den von H. angefochtenen Befunden Kahler's aber sind, wie ich glaube, mit Sicherheit Microbenhaufen anzunehmen, weil K. beschreibt und abbildet, dass die von ihm als Coccenembolien angesprochenen Massen vielfach aneurysmatische, spindelförmige Auftreibungen der Capillaren veranlasst hatten; dies weist bestimmt auf eine Vergrösserung der Massen an Ort und Stelle, also auf Mikroorganismen hin (cf. Fall XII etc.). Von diesem Standpunkt aus halte ich auch die Kritik Mitvalsky's¹⁾ für zu weit gehend, der

¹⁾ Nach dem Citat Herrnheiser's p. 51.

die für die damalige Zeit recht sorgfältigen anatomischen Untersuchungen von Roth, Litten und Kahler für sehr oberflächlich und vom Standpunkt der Bacteriologie für absolut unverwerthbar erklärt. Nur für die Art der Mikroorganismen kann man das Letztere in solchem Maasse behaupten.

Noch einige Worte über die histologische Technik: Es wurden ausschliesslich Celloidinschnitte angefertigt, die sich bekanntlich zur Serienuntersuchung, wenigstens zuerst, vorzüglich so gruppiren lassen, dass man sie auf mit 80 % Alkohol befeuchtete, der Grösse der Schale entsprechende Scheiben Fließpapier in Schneckenform der Reihe nach hinlegt; bei der späteren Färbung ist dies Verfahren freilich nicht mehr möglich. In Anwendung kamen ausser den gewöhnlichen Hämatoxylin- und Carminfärbungen solche mit Löffler'schem und Sahli'schem Methylenblau, ferner einfache Anilinfarben (Fuchsin, Carbofuchsin), besonders aber Gram'sche und Weigert'sche Färbungen. Die Letztere, nach meiner Erfahrung besonders empfehlenswerth, lässt sich bekanntlich, mit Ausnahme der Typhusbacillen, auf die hier in Frage kommenden eitererregenden Mikroorganismen mit positivem Erfolg anwenden. Sie giebt, bei richtiger Handhabung, nicht nur die schönsten, sondern auch die zuverlässigsten und zum Theil die einzigen Bilder. Es giebt Fälle, besonders bei Pneumococceneiterung wenigstens des Auges, wo die Löffler'sche etc. Färbung (auch längere Zeit im Brütöfen), völlig im Stiche lässt, die Weigert'sche dagegen brauchbare, wenn auch nicht immer vollkommene Resultate liefert. In manchen Fällen aber, besonders beim Pneumococcus, ist eine vollständige Färbung trotz aller vorgeschriebenen Vorsichtsregeln oft überhaupt nicht zu erzielen, daher Schlüsse über die Verbreitung der Mikroben nur mit grösster Vorsicht möglich.

Anfangs habe ich die Weigert'sche Methode, da man Celloidinschnitte bekanntlich nicht frei im Anilinwasser schwimmen lassen kann, so eingerichtet, wie es im hiesigen pathol. Institut für compactere Gewebe mit vorzüglichem Erfolg gemacht wird, dass ich auf dem Deckglas mit Aetheralkohol das Celloidin grösstentheils löste, und nur noch eine Spur daran liess, die dann als Klebemittel diente. Man lässt den Schnitt etwas an-

trocknen und bringt, sobald er weiss zu werden beginnt, das Deckglas, an dem er jetzt festhaftet, schnell in 80 % Alkohol, das Präparat nach unten, kann dann beliebig weiter färben; es empfiehlt sich, entweder $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ Stunde dünne Anilinfärbung im Brütöfen zu nehmen, da die Farbe nicht gut eindringt, oder besser concentrirte kürzere Zeit. Entfärbung mit Jodjodkali und Anilinölxytol, dann zum Aufhellen Xylol; mit dem von Herrnheiser benutzten Origannenöl habe ich keine guten Erfahrungen gemacht, da es selbst oft stark entfärbend wirkt und die Bakterienfärbung auslöscht, besonders auch nach Methylblaufärbung (vor dem Xylol hier absol. Alkohol auf die Objectträger). Erheblich bequemer, als die geschilderte Methode, die freilich celloidinfreie Präparate giebt, ist das von Herrnheiser angewandte Verfahren; bei gleicher Färbung drückt man vor jedem einzelnen Akt den Schnitt fest mit Fliesspapier an den Objectträger. Auch hierbei ist kurzes Färben mit concentr. Lösung (5 Minuten bei öfterem Wechsel, bis das Präparat von unten gesehen tiefblau ist) mir angenehmer. Vorfärbung mit Lithioncarmin. Für Pneumococcen ist eine bestimmte Zeitfolge beim Färben kaum anzugeben, nur die Controlle mit dem Mikroskop giebt Auskunft.

Eine anfangs häufige und sehr unangenehme Fehlerquelle bei Gram-Weigert'scher Färbung ist das Vorkommen von Mikroorganismen (meist grosse runde Diplococcen) in der zur Vorfärbung benutzten Lithion-Carminlösung (Orth). Die Mikroben setzen sich im Präparat fest, besonders dort wo sich Lücken bilden, sehr gern z. B. in den Opticusscheiden, wenn diese, wie so oft, sich etwas abheben. Die Coccen färben sich dann intensiv und können zu den grössten Irrthümern führen. Die Carminlösung muss deshalb ganz besonders sorgfältig filtrirt werden, jedesmal frisch vor dem Gebrauch. Benutzt man Picrocarmin, so sind solche Verunreinigungen wohl ausgeschlossen.

Ein 3—4 Wochen, auch erheblich längerer Aufenthalt in Müller'scher Flüssigkeit beeinträchtigt nach meinen Erfahrungen die Färbefähigkeit der hier in Frage kommenden Mikroben keineswegs, wenn man nur gründlich (2 und mehr Tage in fliessendem Wasser) auswässert. Besonders aber hat dies den grossen Vorzug, dass das Blut erhalten bleibt, die Gefässe nicht collabiren. Bei der sonst vorgeschriebenen reinen Alkoholconservirung hat man zwar den Vortheil der Fibrinfärbung (die nach Jahren übrigens auch negativ ausfallen kann), aber z. B. die Aderhaut

zieht sich dabei infolge der Blutextraction oft so zusammen, dass man sie kaum histologisch studiren kann. Auch ist mir mehrfach sehr unangenehm aufgefallen, dass die Sklera und Cornea, auch das Epithel, bei reiner Alcoholconservirung, besonders wenn man schon nach einigen Wochen untersucht, sich nach Weigert diffus dunkelviolet färbt und auch so bleibt, will man nicht alles, auch die Mikroben wieder entfärben. In diesem diffus gefärbten Gewebe sind dann Einzelheiten kaum zu erkennen (oft auch bei Löffler'scher Färbung).

Ich möchte deshalb grade die Müller'sche Flüssigkeit (etwa 3 Wochen) für das Studium der eitererregenden Mikroben im Auge empfehlen. Wenn genügend entwässert wurde und das Object nicht allzulange in der Chromsäure war, gelingt auch die Carminfärbung gut.

Die im Text den Autorennamen beigefügten Zahlen beziehen sich auf die Nummern der Tabellen; von diesen aus ist mit Hilfe der Jahreszahl die genaue Literaturangabe in dem am Schlusse folgenden Verzeichniss leicht zu finden.

Es lag natürlich nahe, aus der vorliegenden Literatur auch ein zusammenfassendes Bild der gesammten klinischen Erscheinungen und beschriebenen mikroskopischen Veränderungen zu geben. Aber diese sind zum grössten Theil so wohlbekannt, ausserdem so ausserordentlich mannigfaltig und wechselnd, dass eine erschöpfende Beschreibung über-grosse Ausdehnung beanspruchen würde. Ich habe deshalb auf eine vollständige monographische Darstellung dieser Verhältnisse um so eher verzichten zu dürfen geglaubt, als die eigenen Untersuchungen ja die verschiedensten Formen und Grade der metast. Ophthalmie betreffen. Ich möchte deshalb auf die dort gegebenen Schilderungen verweisen, die aus diesem Grunde zum Theil ausführlich sein mussten (cf. p. 47, 51, 70, 83, 94).

I.

A. Puerperalfieber.

Es sind dem Puerperalfieber manche Eigenthümlichkeiten zugesprochen worden, die freilich einen einheitlichen Charakter nicht erkennen lassen. So soll die metastat. Thyreoiditis (und Mastitis?) überhaupt fast nur im Puerperium vorkommen (Gussenbauer l. c. p. 107) und zwar stellen gerade diese Localisationen nicht selten die einzig nachweisbare Metastase dar (Felsenreich-Miculicz¹⁾, Rokitansky). Ganz besonders häufig ist auch gerade die puerperale Form mit sept. ulc. Endocarditis complicirt; andererseits wieder wird angegeben, dass daneben im Puerperium eine relativ grosse Zahl von Fällen vorkommt, die in Heilung übergehen, viel mehr als bei der „chirurg. Pyämie“ (Gussenbauer). Felsenreich und Miculicz haben gezeigt, dass dies besonders diejenigen Fälle sind, die ausschliesslich zu metastat. Eiterung in der Haut und den Gelenken führen (von 35 Fällen starben nur 2), eine Metastasenvertheilung, die überhaupt im Puerperium relativ häufig sein soll (Fehling l. c. p. 150). F. und M. sagen „Jede anderweite Verletzung trifft die Gewebe in unvorbereiteten Zustand, sie bedürfen erst einiger Zeit, um die nöthige Reaction einzuleiten. Der puerperale Stoffwechsel dagegen ist schon vorher sehr energisch, vielleicht spielen auch die Uteruscontractionen, die Venenthromben eine Rolle.“

Dass diese Fälle günstiger verlaufen, als die mit Eiterung innerer Organe complicirten, ist wohl einzusehen. Unerklärt aber ist es, weshalb die Eiterung sich in diesen Fällen so vollständig auf die beschriebenen Gebiete beschränkt. Vielleicht ruft die Gravidität mitunter nur in gewissen Organen Veränderungen hervor, welche diese zur metastat. Eiterung disponiren.

F. u. M. besprechen auch die übrige Prognose der puerperalen Pyämie eingehend, ohne jedoch die Ophthalmie zu erwähnen. Von übler Bedeutung ist nach ihrer An-

¹⁾ Prager Zeitschr. f. Heilkunde, 1881, p. 112 ff.

gabe, wenn schon in der ersten Woche der Infection sich Metastasen bilden; fällt nach Eröffnung der vorhandenen Abscesse das Fieber nicht, geht nicht ein etwa vorhandener Icterus zurück, so ist die Prognose nicht günstig. Der Icterus soll im Allgemeinen nicht von so übler Bedeutung sein, als bei der chirurgischen P. etc.

Es muss also nach Angabe dieser Autoren, denen auch Hüter, Fehling u. A. sich anschliessen, die Prognose auf die verschiedensten Umstände Rücksicht nehmen. Sie richtet sich nach der ganzen Schwere des Krankheitsbildes, die zur Zahl und Localisation der Metastasen nicht immer in gleichem Verhältniss steht. Die angegebenen Daten, deren Kritik nicht meine Sache ist, mögen im Anschluss an die oben vorgeschlagene Eintheilung, für die gesonderte Betrachtung der puerperalen Pyämie sprechen.

In die folgende Tabelle sind nur Fälle aufgenommen, über welche wenigstens einigermaassen genauere Angaben vorlagen und da auch diese nicht die sämtlichen rubricirten Fragen beantworten, ist die Berechnung leider nicht besonders übersichtlich (s. Tabelle, S. 20).

1) Das Lebensalter der Wöchnerinnen beträgt im Durchschnitt 32—33 Jahre, es ist auffallend, dass nur 4 Wöchnerinnen unter 25 Jahre stehen.

2) Es handelt sich dementsprechend in der Mehrzahl der Fälle um Mehrgebärende. Durchschnittszahl: 3. oder 4. Geburt.

3) Die Wochenbettinfection erfolgte zum Theil schon während der Geburt, zum Theil später nach anfänglichem Wohlbefinden und setzte sowohl stürmisch als allmählich ein.

Mehr interessirt uns die Frage, an welchem Tage nach Beginn der allgemeinen infectiösen Erscheinungen die Ophthalmie eintrat (47 mal angegeben). Sie stellte sich am Häufigsten in der ersten und zweiten Krankheitswoche ein, doch auch noch in der 7. Bezüglich der vitalen Prognose aber tritt kein wesentlicher Unterschied hervor, ob sie schon in der 1. oder der 2. Woche erschien (21,4 % : 26,6 % Genesungen). Im Allgemeinen kann man sagen, dass weder die ganz acut verlaufenden Fälle noch solche, wo der pyämische Zustand lange dauert, von Ophthalmie begleitet zu werden pflegen.

Tabelle I.

Autor	Alter der Patientin	Wierelte Geburt?	An welchem Tage der Infection kam die Ophthalmie?	rechts?	links?	beiderseits?	gestorben?
Fischer. 1845.	1)	38	?	14.	—	—	ja
	2)	23	?	2.	—	ja	ja
Arlt. 1853.	3)	?	?	?	ja	—	ja
	4)	?	?	?	ja	—	ja
Mackenzie. 1854.	5)	30	8.	28.	—	ja	ja
	6)	?	?	10.	ja	—	ja
	7)	?	?	8.	—	ja	nein
	8)	?	?	10.	—	ja	ja
Dr. Hall und Higginbottom.) 9—14)	?	?	5.—11.	1 mal	5 mal	—	ja
Meckel. 1854.	15)	35	4.	4.	ja	—	ja
	16)	30	?	17.	—	ja	ja
Virchow. 1856.	17)	27	?	?	—	—	ja
	18)	34	?	6.	—	—	ja
Knapp. 1867.	19)	25	?	13. r. l. nach 5 Wochen	—	—	ja
	20)	43	multip.	12. l. 13. r.	—	—	ja
Gayet. 1872.	21)	39	1.	8.	ja	—	ja
Roth. 1872.	22)	32	1.	3.	ja	—	ja
Heiberg. 1874.	23)	31	1.	12.	—	ja	ja
Samelsohn. 1874.	24)	?	multip.	11.	—	ja	nein
Förster. 1876.	25)	?	?	?	?	?	ja
Moore. 1876.	26)	22	?	8.	—	ja	ja

Tabelle I.

Wie viel Tage nach d. Auftreten d. Ophth. trat der Tod ein?	Metastasen in andern Organen? und welchen?	Endocarditis?	Thrombophlebitis?	Welche Infectionserreger?	Von wo ging im Auge die Eiterung aus?
14 8	? nein.	? nein	? ja	? ?	Chorioidea? (alle Theile vereitert)
8 längere Zeit	? ?	? ?	? ?	? ?	Chor.? Chor. u. Ret. ?
21 5 — 12	nein (keine Section). nein. nein. r. Knie.	? ? — nein	? ? — ja	? ? ? ?	? ? ? ?
? 1 2	? Gelenke, Lungen. Gelenke.	? nein ?	? ja nein (Lymphangit.)	? ? ?	? Chor.? Chor. u. Ret.
? 5	Herz, Milz, Nieren. Herz, Nieren, Milz, Leber.	ja ja	ja ja	? ?	Ret. u. Chor. Ret.
1 Tag nach l.	Gelenke, Nieren.	ja	ja	?	Chor.?
4 resp. 5	Nieren.	nein	ja	?	Ret.?
? 3 4 — ? 2	Herz, Leber, Nieren, Gelenke. Nieren, Gelenke. Herz, Milz, Niere, l. Schulter. nein. ? Pleura, Lungen.	ja ja ja ja nein ? nein	ja ja ja ja — ? ?	? ? ? ? ? ? ?	Chor.? Ret. Chor. u. Ret. Chor. ? Chor. u. Ret.?

Autor	Alter der Patientin	Wievielte Geburt?	An welchem Tage der Infection kam die Ophthalmie?	rechts?	links?	beiderseits?	gestorben?
Litten. 1878 u. 1880.							
27)	34	4.	3. l. 27. r.	—	—	ja	ja
28)	32	3.	15.	—	—	ja	ja
29)	?	6.	?	—	—	ja	ja
30)	?	3.	?	ja	—	—	ja
31)	?	3.	?	—	—	ja	ja
32)	?	3.	?	—	—	ja	ja
33)	?	3.	?	—	—	ja	ja
Roosa. 1878.							
34)	42	?	14.	ja	—	—	ja
35)	33	?	4.	?	?	?	nein
Martin. 1878.	36)	?	?	ja	—	—	nein
Hosch. 1880.	37)	?	3.—9. l. 9.—15. r.	—	—	ja	ja
Hirschberg. 1880.	38)	3.	3.	—	—	ja	ja
Mandelstamm. 1881.							
39)	52	?	1.	—	ja	—	nein
40)	29	?	1.	—	ja	—	nein
Kipp. 1881.	41)	39	multip.	2.	ja	—	nein
Mooren. 1882.	42-44)	?	?	?	?	—	nein 3 Fälle
Metaxas. 1882.							
45)	?	?	30.	—	ja	—	ja
46)	?	?	1.	—	—	ja	ja
Hirschberg. 1883.	47)	30	1.	13.	—	—	ja

Wie viel Tage nach d. Auftreten d. Ophth. trat der Tod ein?	Metastasen in andern Organen? und welchen?	Endocarditis?	Thrombophlebitis?	Welche Infections-erreger?	Von wo ging im Auge die Eiterung aus?
2 nach r.	Lunge, Milz, Nieren.	ja	ja	?	?
1	Gelenke, Nieren, Darm, Herz.	nein	ja	?	?
?	Nieren, Milz, Gelenk, Lungen.	ja	ja	?	?
?	Mening., Nieren, Gelenke, Darm.	nein	ja	?	?
?	Herz, Milz, Nieren, Gelenke.	ja	Diphtherie der Placentarstelle	?	?
?	Nieren, Gelenke.	ja	ja	?	?
?	Nieren, Milz, Gelenke.	ja	nein Genit. intact	?	?
42	r. Knie.	?	?	?	?
—	Knie, 8 Tage nach der Ophthalmie.	?	?	?	?
—	—	—	ja	?	?
7, resp. 1	Herz, Nieren.	ja	ja	?	r. } Ret.
11	Nieren, Gelenke, Pleura.	ja	ja	?	Ret.?
—	Coxitis.	—	—	?	?
—	l. Ellenbogengelenk.	—	—	?	?
—	nein.	—	—	?	?
—	ja; wo, nicht angeg.	—	?	?	?
?	nein (keine Section).	?	?	?	?
10	r. Knie.	?	?	?	?
6	Gelenke (keine Section).	?	—	?	l. ? r. anfangs Subl. retinae

Autor	Alter der Patientin	Wierelte Geburt?	An welchem Tage der Infection kam die Ophthalmie?	rechts?	links?	beiderseits?	gestorben?
Hirschberg und Henius. 1885. 48)	36	10.	r. 7. l. 19.	—	—	ja	nein
Wedl u. Bock. 1886. 49 u. 50)	?	?	?	?	?	—	ja
Vossius. 1887. 51)	39	4.	3.	ja	—	—	ja
Wagenmann. 1887. 52)	37	2.	7.	—	—	ja	ja
Pousson. 1887. 53)	28	2.	1.	—	ja	—	nein
van den Bergh. 1889. 54)	?	?	21.	ja	—	—	nein
Hofmohl. 1889. 55)	33	?	2.	ja	—	—	nein
Mitvalsky. 1892. 56)	24	?	?	?	?	ja	ja
Rancurel. 1892. 57)	32	2.	ca. 40.	ja	—	—	nein
58)	35	10.	9.	—	ja	—	nein
Herrnheiser. 1892. 59)	?	5.	7.	—	—	ja	ja
60)	30	1.	8.	—	ja	—	ja
61)	33	6.	10.	ja	—	—	ja
62)	36	5.	19.	ja	—	—	ja
63)	40	9.	5.	—	ja	—	ja
Eigener Fall. 1893. 64)	anfangs 20	1.	ca. 49.	—	—	ja	ja

Wie viel Tage nach d. Auftreten d. Ophth. trat der Tod ein?	Metastasen in andern Organen? und welchen?	Endocarditis?	Thrombophlebitis?	Welche Infektions-erreger?	Von wo ging im Auge die Eiterung aus?
—	Handphlegmone.	—	—	?	?
?	?	?	?	?	Chor. (2 mal)
6	nein.	nein	ja	Strept.	Ret., Iris
9	Herz, Nieren.	ja	ja	Strept.	Ret.
—	Haut, Gelenke (nach der Ophthalmie).	—	?	Strept.	?
—	nein.	—	ja	Strept.	?
—	l. Knie, Lungen.	—	—	?	?
4	?	ja	?	Strept	Ret.
—	nein.	—	ja	Strept.	?
—	nein.	—	ja	?	?
9, resp. 8 2	Nieren, Gelenk. Gehirn, Milz, Niere.	nein ja	ja ja	Strept. Staph. pyog. aur.	Ret. Iris, r. Retini- tis septica
12	nein	nein	ja	Strept.	Retin. (z. Th. auch Chor.)
5	Meningitis, Lunge, Niere.	nein	ja	Diploc.	Iris
39	Lunge (ganz frisch).	nein	ja	Strept.	? r. Netzhaut- blutungen
einige Tage	Pleura, Pericard, Ge- lenke (keine Sect.).	?	ja	?	?

Die mittlere Krankheitsdauer in den tödtlichen Fällen beträgt etwa 14 Tage (zwischen 10 und 50 Tage), im Durchschnitt tritt der Tod in diesen Fällen ein etwa 6 Tage nach der Ophthalmie. Bei den meisten der genesenen Fälle war die nachweisbare Metastasenbildung mit der Ophthalmie zu Ende; es folgte dann freilich noch eine längere Reconvalescenz.

Im ganzen sind es 4 Fälle, bei denen die doppelseitige Ophthalmie nicht beidrs. zu annähernd gleicher Zeit, sondern mit einem längeren Zwischenraum als 2 oder 3 Tage auftrat; derselbe betrug bei Hosch(37) 6 Tage, der Tod erfolgte 1 Tag nach der 2. Ophthalmie, desgleichen bei Knapp(19) (22 Tage Zwischenraum), Litten(27) (34 Tage). Nur der Fall von Hirschberg-Henius führte zur Genesung (Zwischenraum 12 Tage). 2 mal erkrankte zuerst das r., 2 mal das l. Auge.

Wegen der grossen Seltenheit einer metastatischen Ophthalmie bei protahirtem Verlauf (über 4 Wochen) der tödtlichen puerperalen Pyämie, sei hier eine Beobachtung mitgetheilt, die eine Patientin betrifft, bei welcher gemeinsam Herr Prof. Ahlfeld und Herr Prof. Kaltenbach zur Consultation zugezogen wurden:

Fall I.

Ipera, anfangs der 20ger Jahre (Frau eines Arztes). Forceps, hoher Dammriss, Naht. Schmutziges, ungenügend desinficirtes Instrument. Parametritis diffusa (im Winkelschen Sinn) mit peritonealen Reizerscheinungen. Pleuritis, Pericarditis, Gelenkaffectionen, Complication mit Metrophlebitis, Thrombenzerfall. Unzählige Schüttelfröste, steile Abfälle, schwerer Decubitus, Phlegmasia alba dolens. In der 6. bis 8. Krankheitswoche doppelseitige Panophthalmitis, Verlust beider Bulbi. Exitus lethalis in der 7. bis 8. Woche, wenige Tage nach der Erblindung.

In dem beschriebenen Fall hatte also die Patientin etwa 7 Wochen lang der Sepsis und den eitrigen Metastasen in zahlreichen Organen widerstanden. Kaum aber war, gleichsam den Höhepunkt der Erkrankung bezeichnend, die doppelseitige Ophthalmie eingetreten, so trat der Exitus ein.

4) Die erste der Patientin wahrnehmbare Augenstörung pflegt eine Herabsetzung der Sehschärfe zu sein, welche schnell, meist in 24 Stunden, bis zur Erblindung sich steigert, niemals aber „plötzlich“ wie

bei der blanden Embolie beobachtet wurde. Meist erst nach einigen Stunden oder selbst Tagen treten Schmerzen hinzu, seltener sind sie die erste subjective Erscheinung; in einzelnen Fällen (z. B. Wagenmann (52), Hirschberg [46]) verlief die Ophthalmie schmerzlos. (Hierbei spielt aber die allgemeine Kachexie eine Rolle.)

Der Ausdruck: „plötzliche“ Erblindung ist missverständlich und durch keine, von Anfang an genaue Beobachtung berechtigt. Samelsohn (24) z. B., der von „plötzlicher Erblindung“ spricht, hatte anatomisch eine eitrige Chor. mit nur secundärer Betheiligung der Netzhaut vor sich. Dass aber eitrige Chor. nicht zur plötzlichen Erblindung im eigentlichen Sinn des Wortes führen kann, dürfte sicher sein. Wohl aber kann eine frühzeitige Netzhautablösung einen ähnlichen Eindruck hervorrufen. Die Schmerzen dagegen beginnen öfters in Gestalt plötzlicher Stiche etc., was aber für die Art der Embolie nicht zu verwerthen ist, da sie ja doch sicher erst einige Zeit später sich einstellen.

5) Das erkrankte Auge verfällt, wenn die Zeit dazu bleibt, regelmässig der Panophthalmie mit Perforation, auch in den genesenen Fällen ist eine Phthisis bulbi ohne vorhergehende Panophthalmie bis jetzt nicht beobachtet. Das Sehvermögen war demnach stets völlig verloren. Einen eigenthümlichen, etwas ungewöhnlichen Verlauf beobachtete Herrnheiser (63): hier erfolgte die Perforation erst im phthisischen Stadium, nachdem die einer retrobulbären Phlegmone ähnlichen Erscheinungen der Panophthalmie zurückgegangen waren.

6) Ursache der unausbleiblichen Panophthalmie dürfte sein, dass bisher fast nur der *Streptococcus pyog.* gefunden wurde. Nur je 1 mal der *Staphyl. aur.* (Herrnheiser 60) und „*Diplococci*“ (ders. 62).

7) Sympathische Erkrankung ist im Anschluss an puerperale Ophthalmie bisher nicht beobachtet. Wohl aber haben recidivirende Schmerzen die Enucleation des phthisischen Auges angezeigt (z. B. Samelsohn (24).

8) Unter 63 Fällen (bei Roosa (35) fehlt eine Angabe) sind 41 einseitige, 22 doppelseitige met. Ophthalmieen. Unter den einseitigen ist 19 mal nur das l., 17 mal das r. Auge befallen; 5 Fälle sind unbestimmt (Mooren (42—44), Wedl-Bock (49,50).

9) Sämmtliche (17) auf beiden Augen annähernd gleichzeitig erkrankte Wöchnerinnen starben und zwar

1—14 Tage nachher, im Durchschnitt 6 Tage später. Die durchschnittliche Gesamtdauer dieser Pyämieen betrug 14 Tage, also ebensoviel, wie die der tödtlichen überhaupt.

Der Fall von Hirschberg-Henius (48), der einzig genesene bei doppelseitiger Ophthalmie, stellt eine gesonderte, 1 $\frac{1}{2}$ Wochen auseinanderliegende Erkrankung der einzelnen Augen dar und bedeutet daher keine Ausnahme von obigem Satze. Man kann ihn wie die analogen von Hosch (37), Knapp (19), Litten (27) als 2 malige einseitige Ophthalmie auffassen. Es ist freilich nicht unmöglich, dass die von Magnus unter 2528 Blinden angeführten 4 Fälle von Erblindung durch Iridochorioiditis puerperalis hierher gehören. Da aber jegliche genaueren Angaben fehlen, so lässt sich nicht entscheiden, ob beide Augen daran erblindet sind, ob zu gleicher Zeit u. s. w. Auch Landesberg führt unter Erblindungen 2 doppelseitige, 1 einseitige metastat. puerperale Ophthalmie an, doch ist der Ausgang des allgemeinen Leidens nicht ersichtlich. Zu erwähnen ist ferner der Fall von Cohn (cf. p. 106), bei dem die puerperale Natur des Processes zweifelhaft erscheinen muss.

Dagegen genasen von 41 einseitigen Ophthalmieen 14, während 27 Patienten starben (1:2).

Ein nennenswerther Unterschied in der Häufigkeit der linksseitigen Ophthalmie gegenüber der rechtsseitigen ist hier nicht festzustellen. Die Gesamtdauer der Erkrankung, die Zeit des Beginns der Ophthalmie, sowie der Eintritt des Todes lassen keine besonderen Eigenthümlichkeiten gegenüber der doppelseitigen und den vorn gegebenen allgemeinen Durchschnittswerthen erkennen.

Alles in Allem enthält die Tabelle 16 Fälle von metastat. Ophthalmie, die mit Genesung der Patientinnen endeten. Rechnet man noch hinzu die Fälle von Wheir, M'Whinnie (nach Mackenzie) ferner von Tarnier, Dor (nach Rancurel), Koenigstein (2), von Reuss (2), Felsenreich (1), (alle Discussion nach Hofmotel's (55) Vortrag), A. Martin, Magnus (4), bei denen über die näheren Umstände nichts angegeben ist, so sind immerhin mindestens 30 solcher genesener Fälle bekannt, denen 75 tödtliche gegenüberstehen (unter Hinzurechnung von 5 Fällen von Lee, Graves, Moser, Löhlein, 2 Martin, 9 Koenigstein, 2 Galezowsky, 9 Hirschberg). Es würde natürlich ein ganz falsches Bild geben, wollte man aus diesen 105 Fällen berechnen, ein wie grosser Theil der an metastat. Ophthalmie erkrankten Wöchnerinnen mit dem Leben

davon kommt, wie Rancurel dies mit 60 Fällen thut. Denn sicher ist die Veröffentlichung der gestorbenen Fälle relativ viel unvollständiger, als die der genesenen F.

Bezüglich ihrer prognostischen Bedeutung muss die doppelseitige, annähernd gleichzeitige Ophthalmie von der einseitigen getrennt werden. Die doppelseitige metastat. Ophthalmie verlangt in der That eine fast infauste, viel schlechtere vitale Prognose, als sie die puerperale Pyämie durchschnittlich besitzt. Wie weit aber die geringere Mortalität der an einseitiger Ophthalmie erkrankten Wöchnerinnen über dieses Maass hinausgeht, ist beim Fehlen ausreichender Vergleichstabellen z. Z. nicht mit Sicherheit zu sagen (sie ist aber höher als die der metastat. Ophthalmie aus anderen Ursachen).

10) Befunde am Endocard:

a) Die genesenen Fälle haben (mit Ausnahme des Poussonschen (53) Falles?) weder während der Krankheit noch später Herzerscheinungen geboten; sie sind deshalb höchwahrscheinlich frei von Endocarditis gewesen, da nach den bisherigen Erfahrungen die septische (puerperale) Endocarditis nicht heilbar ist.

Ist es auch sicher, dass trotz fehlender physikalischer Erscheinungen doch eine frische ulc. E. da sein kann, so lässt doch der weitere Verlauf ein Urtheil zu.

b) Unter 29 tödtlichen Fällen, die eine Angabe enthalten (16 doppelseitige, 13 einseitige), war 13 mal das E. intact, 16 mal verändert (55%).

Die septische puerperale Endocarditis ist relativ erheblich häufiger bei der doppelseitigen metastat. Ophthalmie als bei der einseitigen.

Auch darin spricht sich ohne weiteres der Unterschied der doppelseitigen Ophthalmie in prognostischer Hinsicht aus.

Von den ohne E. verl. Fällen waren 4 beiderseitig (25% d. doppelseitig.), 9 einseitig (66% d. einseitig.); mit E. waren 12 beiderseitig (75%), dagegen nur 4 einseitig (34%). Bei 16 einseitigen und 5 doppelseitigen fehlt eine Angabe. Es ist ja zuerst von Litten darauf aufmerksam gemacht, dass die E. kein notwendiges Zwischenglied sei. Aber auch in seiner Zusammenstellung von 7 Fällen (6 beiderseitigen!) war sie doch 5 mal vorhanden, während sie beim blossen Auftreten septischer Blutungen häufiger fehlte (unter 17 Fällen 8 mal keine E.).

11) Die Puerperalpyämieen, welche zur metastat. Ophthalmie führen, gehören (wie bekanntlich die allermeisten überhaupt) der secundären Pyämie an, d. h. sie schlossen sich erst an stärkere locale infectiöse Entzündungen der Genitalien und Umgebung an, meist mit ausgedehnter eitriger Thrombophlebitis. Nur ein Fall von Litten (33) macht eine Ausnahme; hier fand sich bei der Section ausser 2 kl. Cervixrissen der Uterus etc. intact; in dem Falle von Hirschberg-Henius haben zwar die Lochien und Genitalien bei der Untersuchung keine Veränderung gezeigt, doch waren die Parametrien druckempfindlich, beim Fehlen der Section ist deshalb der Fall nicht ganz sicher in dieser Hinsicht.

33 Fälle enthalten Notizen über Venenveränderungen. Die Thrombophlebitis nahm meist grossen Umfang an (Genital-Becken-Venen, Phlegmasie etc.). Die puerperale Phlebitis ist ja nun rückbildungsfähig und es muss deshalb unentschieden bleiben, ob bei den 7 genesenen Fällen, bei denen sie nicht direkt beobachtet wurden, sie nicht doch in geringerem Grade in der Tiefe bestanden hat.

Diese Thrombose ist nach Fehling für die puerperale P. ein noch constanteres Symptom als für die chirurgische. Sie fand sich auch bei 11 Sectionen, die ein intactes Endocard zeigten (Fischer (2) l., Mackenzie (8) bds., Meckel (15) r., Knapp (20) bds., Vossius (51) r., Herrnheiser (59) bds. (61, 62, 63).

12) Unter den 51 Fällen, bei denen über anderweitige Metastasen sich Angaben finden, sind 13 mal und zwar stets bei einseitigen Ophthalmieen sonstige Heerde nicht angetroffen worden. 7 von diesen Pat. genasen. Eine Endocarditis wurde auch bei den 6 lethalen nicht beobachtet (doch gelangten von ihnen nur 3 zur Section).

Eine Thrombophlebitis dagegen ist in der Mehrzahl auch dieser Fälle nachgewiesen, bei Hofmökkel unbestimmt, ebenso bei den 3 secirten mit Endocarditis nicht compl. Fällen. Die Verwerthung des Befundes sonstiger Metastasen muss freilich mit besonderer Vorsicht geschehen, da bei den genesenen Fällen kleine Heerde im Innern wohl bestanden haben können, auch andererseits eine Section nur bei grösster Genauigkeit massgebend ist. Auf jeden Fall aber ist bei diesen als einzige nachweisbare Metastase beschriebenen Ophthalmieen von „einer ausgedehnten Metastasenbildung in anderen Organen“ (Fehling) nicht die Rede.

13) Trotz der grösseren Häufigkeit anderweitiger Metastasen bei der doppelseitigen Ophthalmie ist dieselbe doch stets die einzige nachgewiesene Metastase an Kopf und Hals gewesen; nur in 3 einseitigen Fällen (Litten(30), Herrnheiser[60, 62]) fand sich eine metastat. Meningitis. Es ist daher für die doppelseitige (annähernd gleichzeitige) Ophthalmie ein zufälliges Hineinrren grösserer Pfröpfe ausschliesslich in die bulbären Gefässe selbst für die mit Endocarditis, sowie die spärlichen mit Lungenmetastasen (Litten(29), Hirschberg(38), Herrnheiser(59), Fall 64) behafteten Fälle im höchsten Grade unwahrscheinlich¹⁾.

Von den 38 Fällen, bei denen anderweitige Metastasen beobachtet wurden, ist bei den 3 Mooren'schen(42—44) nicht angegeben, wo dieselben sasssen, bei Roosa(35) (genesen) fehlt die Angabe, ob ein- oder doppelseitige Ophthalmie. 19 von den übrigen sind doppelseitig, 15 einseitig.

Bei den 19 doppelseitigen tödtlichen Fällen sind die während des Lebens aufgetretenen Metastasen sämmtlich vor oder gleichzeitig mit der Ophthalmie erschienen, d. h. bei den 4 Fällen, wo beide Augen erst einige Zeit nacheinander erkrankten, jedenfalls vor der 2. Ophthalmie. Wann im Vergleich zur Ophthalmie die meist erst durch die Section festgestellten inneren Metastasen entstanden sind, lässt sich nicht angeben. Bei der Mehrzahl der doppelseitigen Ophthalmieen fanden sich massenhafte meist capillare Embolien besonders in den Nieren, Gelenken, Herz, Milz etc.

Von den 15 einseitigen, mit anderen Metastasen verlaufenen Ophthalmieen sind 11 lethal, 4 genesen. Diese letzteren sind: Mandelstamm(39, 40) (1 Gelenk), Pousson(53) (Haut und Gelenke, doch erst nach der Ophthalmie), Hofmök(55) (Lunge, Knie). Von den 9 tödtlichen zeigten die Fälle von Roosa(34) (Knie), Moore(26) (Lunge), Herrnheiser(63) (Lunge) nur wenige, die anderen zahlreichere Metastasen (Meckel(15, 16), Roth(22), Litten(30), Gayet(21), Heiberg(23), Herrnheiser(60), Fall 61).

Unter der Gesamtzahl der 30 tödtlichen mit anderen Metastasen complicirten Fällen sind nicht weniger als 14 Gelenkeiterungen, einfach oder multipel, beobachtet; es sind dies Fälle, die während des Lebens zuerst oft wie ein akuter Gelenkrheumatismus erscheinen, sich aber (Litten u. a.) gegenüber dem

¹⁾ cf. p. 55 Anm.

eigentlichen Rheuma meist durch den eitrigen Charakter der Entzündung bald unterscheiden, freilich nicht immer. Es ist andererseits auffallend, dass in den 5 zur Heilung führenden Fällen, die sonst noch Metastasen boten, diese ganz ausschliesslich in den Gelenken, sowie im Unterhautzellgewebe lagen (Roosa (35), Mandelstamm (39, 40), Hirschberg-Henius (48), Pousson [53]). Es passt dies zu den oben gegebenen Erfahrungen von Felsenreich-Miculicz.

14) Zu der Auffassung von der capillaren Entstehung, besonders der doppelseitigen Ophthalmie passen ausser der sub 4) beschriebenen Form der Sehstörung auch die bisherigen ophthalmoskopischen und anatomischen Befunde. Danach ist für die doppelseitige Ophthalmie vorwiegend die Netzhaut Ort der Embolie, demnach auch hier besonders nach Gründen für die Capillarembolie zu suchen, während die einseitige Ophthalmie einen regelloseren Ausgang von den verschiedenen Augenhäuten zu nehmen scheint.

Die Mittheilungen über ophthalmoskop. Befund vor Ausbruch der Eiterung sind nicht sehr zahlreich (Hirschberg (38, 47), Litten (28—33), Herrnheiser (58), weil die baldige Trübung der Medien das Bild schnell verschleiert. In den sämtlichen Fällen von Litten, ferner dem von Herrnheiser waren vor dem Eintreten entzündl. Veränderungen multiple kleine Netzhautblutungen, z. Th. mit weissem Centrum vorhanden, ohne Erscheinungen der Embolie grösserer Aeste. Hirschberg (38) und Herrnheiser (59) konnten beobachten, wie ein solcher ganz kleiner Heerd sich schnell unter Infiltration etc. vergrösserte, bis er infolge starker Trübung der Medien bald unsichtbar wurde.

Hirschberg (47) sah ausserdem ein anderes Mal auf dem einen Auge ophth. eine frühzeitige Ablösung der Ret., die einzelne Hämorrhag., aber klare Gefässumrisse zeigte. Unter relativ geringer Trübung der Medien vergrösserte sich die auffallend weisse Abhebung. H. diagnosticirte eine metast. Chor., und es ist schade, dass dieser Fall, den ich bei doppelseitiger metast. Ophthalmie für eine Ausnahme halte, nicht anatomisch untersucht wurde.

Denn bei den doppelseitigen Fällen, wo frühzeitig genug untersucht werden konnte, ist besonders die Retina embolisch inficirt gefunden (Virchow (18), Hesch (37), Wagenmann (52), Mitvalsky (56), Herrnheiser (57). Der 2. Fall von Virchow (18) zeigte daneben Capillarembolie auch der Chor., ebenso fand Wagenmann in den verschiedensten Theilen des Auges und seiner Umgebung einzelne Coccenmassen, doch fast nur in

den Gefässen, also jedenfalls nicht gleichzeitig mit der Netzhautembolie abgesetzt. Bei Fischer⁽¹⁾ und Knapp (19, 20) ist ausschliesslich die Aderhaut angegeben, doch ist der Befund nicht sicher zu verwerthen wegen der für diesen Punkt nicht geeigneten Untersuchung, die sich hauptsächlich auf Zupfpräparate und kleine Schnittchen stützt.

Bei der einseitigen Ophthalmie ist häufiger die Chorioidea und Iris angeführt; in folgenden Fällen ist der primär infectirte Theil nachgewiesen: Wedl-Bock (49, 50) (Chor.), Herrnheiser (60, 62) (Iris), Meekel (15, 16) (Ret.), Heiberg (23) (Ret. und Chor.). Wahrscheinlich ist auch die ausschliessliche Infection der Chor. bei Samelsohn (24).

Die Fälle von Arlt (3, 4) und Moore (26) sind nicht ganz sicher, ob Chor. und Ret. oder eine von beiden (wahrscheinlich die Chor.) erkrankt war.

Es sei hier noch bemerkt, dass Herrnheiser 2 mal während des Lebens die Diagnose: „Embolie im vord. Augenabschnitt“ aus der relativ geringen Betheiligung des Glask. stellen konnte; auch beobachtete er eine rapide Cataractentwicklung. (Fall V.)

B. Pyämie im Anschluss an andere Verletzungen und locale Eiterungen verschiedenster Art (chirurgische Pyämie).

Der puerperalen metastat. Ophthalmie sind vielfach, z. B. von Förster, diejenigen unmittelbar angeschlossen worden, die bei anderweitigen Erkrankungen des weiblichen Genitaltractus beobachtet wurden; doch ist es nicht zutreffend, diese pyämischen Zustände mit den puerperalen ohne weiteres ganz zu identificiren, da ja doch die Beschaffenheit des Uterus etc., wie der ganzen Constitution eine andere ist.

Die metastat. Ophthalmie bei nicht puerperalen Infectionen der weiblichen Genitalien gehört jedenfalls zu den grössten Seltenheiten.

(Es sei zunächst noch ein Fall von Feuer¹⁾ erwähnt: bei

¹⁾ Centralbl. f. Augenh. 1881.

einer 20jährigen Primipara, die ein normales Wochenbett durchmachte, entstand 4 Tage nach der Geburt zu beiden Seiten der Internussehne des Auges ein Abscess in der Sklera, der durch Perforation nach innen zur Panophthalmie führte. Sonst war Pat. stets gesund. Ist schon die endogene Natur des Falles nicht über allen Zweifel erhaben, so scheint es sicher ganz ungewiss, ob die Augenaffection mit dem Puerperium resp. den Genitalien irgendwie zusammenhängt.)

Es liegen hier folgende Mittheilungen vor:

Förster beobachtete 2 einseitige Panophthalmieen nach Operationen (Amputatio cervicis, Abtragung des Hymens) mit Erhaltung des Lebens. Die beiden Fälle sind bei der eigentlich chirurgischen Pyämie berücksichtigt. Ebenfalls chirurgischer Art ist ein Fall von Bayer, wo die Digitaluntersuchung eines Cervixcarcinoms und doppelseitiger Salpingitis die tödtliche sept. Erkrankung hervorrief. Bei einem Falle von Jessop, der mir im Original nicht zugänglich war, ist es aus dem Referat im Virchow-Hirsch (1887, p. 555) nicht klar, ob der angeführte „eitrige Vaginalausfluss“ oder eine gleichzeitige leichte Pneumonie — wie ich glaube, das Letztere — die Ursache der mit Heilung des Allg.-Leidens verlaufenen einseitigen Panophthalmie war. Es bleiben dann noch die Fälle von Knapp und Gayet, wo mit Wahrscheinlichkeit, ohne Verletzung, die weiblichen Genitalien die Eingangspforte waren; beide Kranke genasen.

Schon aus diesem unverhältnissmässig günstigen Verlauf (unter 6 nur 1 gestorben) geht hervor, dass man diese Infection nicht in jeder Hinsicht mit der puerperalen zusammenwerfen kann; ebensowenig aber ist es auch berechtigt, sie von den jetzt noch zu besprechenden Formen zu trennen.

Ein Theil der in Behandlung des Chirurgen kommenden Fälle von Pyämie ist nun ursprünglich wohl interner Herkunft, d. h. von den Schleimhäuten des Tract. respir. intest. oder urogenit. eingeleitet. Allein in allen den Fällen pyämischer Infection von den Schleimhäuten aus, wo sich zuerst ein localer Eiterheerd bildete, ist ein Unterschied gegenüber anderen Abscessen und Infectionen, bei denen es

sich ursprünglich um Verletzungen, Operationen etc. handelt, rein äusserlich und nicht durchzuführen. Es sollen deshalb, wie dies ja auch die chirurg. Literatur thut, im weitesten Sinne des Wortes als chirurgische Pyämie alle diejenigen Fälle zusammengefasst werden, wo entweder ein Trauma vorlag oder die Pyämie sich an anderweitige locale Entzündungsheerde anschloss. Und diese Zusammenfassung der „traumatischen“ mit den anderen Fällen hat hier besonderen Grund.

Gerade die schwersten, fast stets tödtlichen metastat. Erkrankungen sind diejenigen, welche sich wie manche reine Septikaemien an grössere Operationen, Verletzungen etc. unmittelbar als sog. „primäre Septiko-Pyämien“ anschliessen, d. h. ohne dass es am Orte der Infection erst zu stärkerer eitriger Entzündung kommt; hier wird, wie man annehmen muss, in dem direkt inficirten circulirenden Blut das embolisirende Material gebildet. Solche Fälle fehlen zwar auch im Puerperium nicht ganz (cf. p. 30), gehören aber hier doch zu den grössten Seltenheiten.

Diese schweren, „primären“ chirurgischen Pyämien scheinen nun nur ausserordentlich selten zu metastat. Ophthalmie zu führen, so zahlreich auch die durch sie verursachten anderweitigen Metastasen sein können.

Die ophthalmologische Literatur über postoperative und post-traumatische metastat. Ophthalmie ist nicht gross (etwa von 1830 an gerechnet, also z. Th. vorantiseptischer Zeit). Es finden sich im Ganzen 19 Fälle mitgetheilt. Bei 7 von ihnen fehlt eine genauere Krankengeschichte (Förster(16, 17), Bayer(39), Nagel(8), Becker(23), von Beck(11), Graf(12). Unter den übrigen 12 sind 6, bei denen sich zunächst eine eitrige Phlebitis bildete (Weiss(15), Mackenzie(2), Fischer(1), Michel(21), Bryant(22), Beck(18).

Bei 4 weiteren (Litten(32), Meckel(8), Dimmer(37), Deutschmann(42) war auch eine ausgedehnte locale Eiterung vorhanden; wieweit Phlebitis vorhanden war, ist nicht angeführt. Es bleiben dann noch 2 Fälle übrig, bei denen aber auch eine

sog. primäre Pyämie nicht vorgelegen zu haben scheint, die von Mackenzie(3) (p. 589 ff.) und Edmunds(34). Beide Fälle, die fast genau übereinstimmen, betreffen Pyämieen nach Unterbindung der l. Carotis. In dem E.'schen Fall handelt es sich offenbar um direkte septische Thromben der unterbundenen Arterie. Dafür spricht ausser der wiederholten Nachblutung, an der Pat. zu Grunde ging, auch der Umstand, dass sich eitrige Metastasen nur im Ausbreitungsgebiet der unterbundenen Carotis fanden. Der M.'sche dagegen führte ausserdem noch zu Metastasen in den Gelenken, also zu allg. Pyämie. Aber auch hier ist auffallend, dass die septische Ophthalmie mit einer Meningitis zusammen auf derselben Seite lag, wo unterbunden wurde und es ist auch hier nicht unwahrscheinlich, dass die Augenembolie Folge der infectiösen Gerinnung in dem verletzten Gefäss war. Ein sicherer Fall von sog. primärer traumatischer Pyämie mit Augenmetastase ist demnach nicht bekannt.

Es ist auch deshalb angezeigt, die uns vorliegenden traumat. Fälle mit denjenigen zusammen zu behandeln, bei denen irgend eine andersartige locale Eiterung zur „secundären“ Pyämie führte durch Infection der venösen Bahnen, meist unter Vermittelung einer Thrombophlebitis. Relativ häufig sind in unserer Tabelle chronische Eiterungen als Ursache angegeben, welche sonst (Gussenbauer) seltener zur Pyämie führen.

Tabelle II umfasst im Ganzen 46 Fälle von nicht puerperaler localer Eiterung mit folgender Pyämie und Augenmetastase. Dass auch hier viele derartige Fälle nicht publicirt sind, geht u. a. auch daraus hervor, dass für die z. B. von Arlt, Horner, Fuchs als Aetiologie angegebene Nabelvereiterung der Neugeborenen sich nur ein genaueres Beispiel von Arlt findet, ferner für metast. Ophthalmie im Anschluss an Impfpyämie (Fuchs) überhaupt keine ausführliche Beschreibung. Tabelle II kann jedoch schon mehr Anspruch darauf machen, auch zutreffende procentuarische Daten zu geben, weil die hierher gehörigen Fälle wegen ihrer Seltenheit vollzähliger mitgetheilt sein dürften, als die puerperalen.

1) Das Lebensalter schwankt zwischen den ersten Lebens-
tagen und 69 Jahren, beträgt im Mittel etwa 35 Jahre. 9 Per-
sonen (32 %) waren 50 Jahre und darüber alt, bei der geringeren
Zahl der alten Personen überhaupt ein relativ bedeutender Bruch-
theil. Er entspricht annähernd dem von Gussenbauer (l. c.
p. 233) angegebenen Worte für die sog. chirurgische Pyämie
(nach Billroth 20,5 %, nach G. 32 %); wir haben deshalb
zwar keine Berechtigung, das Befallenwerden des Auges in
höherem Maass mit Altersveränderungen (bes. der Gefässe)
in Zusammenhang zu bringen, als dies bei dieser Pyämie an
sich zutreffend ist, aber die relativ hohe Zahl der älteren Per-
sonen scheint doch bemerkenswerth.

2) Geschlecht: Von 38 Personen, über deren Geschlecht
sich Angaben finden, sind 31 männlichen, nur 7 weiblichen Ge-
schlechts. Das starke Ueberwiegen der Männer entspricht
der bekannten Erfahrung, dass diese den hier in Frage kommen-
den Schädlichkeiten mehr ausgesetzt sind.

3) Der Termin des Auftretens der Ophthalmie
(18 mal angeg.) schwankt zwischen dem 1. und 45. Tag der
pyämischen Erscheinungen, ohne dass die früh aufgetretenen
Ophthalmieen (z. B. bei 4 genesenen kam sie gleich im Beginn:
Mackenzie (4), Leber (24), Dimmer (37), Fall [45]) bezüglich
der Ein- und Doppelseitigkeit, der Prognose oder sonst sich von
den späteren deutlich unterschieden.

Die Gesamtdauer der Krankheit — es betrifft dies
nur 12 tödtliche Fälle — schwankt zwischen 12 und 153 Tagen
(Mackenzie (3)).

17 mal ist angegeben, wie lange nach der Ophthalmie der
Tod eintrat; die Extreme sind 1 Tag und 5 Monate, doch ist
eine Dauer von 5—6 Wochen schon sehr selten. In dem
eigenen Fall (43) waren es 40 Tage, die Mehrzahl endete etwa
nach 8—14 Tagen. Irgend welche Regelmässigkeit lässt sich
hier nicht erkennen.

4) Eine „plötzliche Erblindung“ ist auch hier nicht
beobachtet, die Sehstörung vielmehr eine allmählich, aber meist
sehr schnell zunehmende; selten waren stechende Schmerzen das
erste Symptom, meist folgten dieselben bald unter Stärkerwerden
der entzündlichen Erscheinungen. Doch können Schmerzen auch
ganz fehlen (Landsberg (19)).

Tabelle II.

Autor	Ursächliche Krankheit	Alter und Ge- schlecht	Sitz der Ophthalmie			An wel- chem Tage der Infec- tion kam die Oph- thalmie?	Wie viel Tage nach d. Ophth. kam der exitus?
			rechts?	links ?	beider- seits ?		
Fischer. 1845.	1) Amputatio cruris.	16 m.	—	ja	—	?	4
Mackenzie. 1854.	2) Excision einer Bein- varice.	?	ja	—	—	?	1
	3) Unterbindung der l. Carotis.	Junger Mann	—	ja	—	5.	5 Monate
	4) Panaritium chron. nach Stich, mit re- cidiv. phlegmon. Erysipel.	60 w.	—	—	ja	1. des Recidivs	—
	5) Abscess am l. Ober- schenkel.	11 m.	—	ja	—	bald nachher	—
Arlt. 1854.	6) Caries des Keilbeins.	? m.	—	ja	—	?	—
	7) Nabelinfection (Neu- gebor.).	? ?	—	ja	—	?	?
Meckel. 1854.	8) Operation (welche?). Senkungsabscess.	60 m.	ja	—	—	15.	11
Cohn. 1860.	9) Empyem.	50 m.	—	ja	—	ca. 1 Monat	wenige Tage
Nagel. 1860.	10) Operation einer Struma.	?	?	?	?	?	?
Beck. 1870/71.	11) Knieschuss, dann Amput.	Soldat	—	ja	—	10.	2
Graf. 1870/71.	12) Schuss in's Gesicht.	Soldat	?	ja ?	—	?	—

Tabelle II.

Ist Patient gestorben?	Sonstige Metastasen	Endocarditis?	Thrombophlebitis?	Infections-erreger?	Panophthalmie?	Wo Ausgang im Auge?	Bemerkungen
ja	Lunge.	nein	Schenkel-venen	?	ja	Chor.?	Thrombophleb. unmittelbar durch die Operation.
ja	Lunge, Extremitäten.	?	do.	?	ja	?	
ja	Gelenke, Haut (gleichz. mit der Ophth.), nach 5 Mon. Mening.	nein	Infect. Thromb. der l. Carotis.	?	ja	?	† am Recidiv der Pyämie, vorher 5 Monate lange Reconvalescenz.
nein	Beim Recidiv Gelenkmetast. (nicht ver-eitert!)	—	?	?	ja	?	Sehr langsame Panophth.; r. nach 18 Tagen, l. nach 9—10 Wochen Protrusion etc.
nein	—	—	?	?	nein	?	Pseudoglioma retinae.
nein	?	?	?	?	?	?	
ja	?	?	ja	?	nein	?	
ja	Gelenke etc.	?	?	?	ja	?	Exitus nach vorübergehender Besserung.
ja	?	?	?	?	?	Chor.?	
ja	?	?	?	?	?	Ret.	Keine näheren Angaben.
ja	?	?	ja	?	?	?	
nein	?	—	?	?	?	?	

Autor	Ursächliche Krankheit	Alter und Geschlecht	Sitz der Ophthalmie			An welchem Tage der Infection kam die Ophthalmie?	Wie viel Tage nach d. Ophth. kam der exitus?
			rechts?	links?	beiderseits?		
H. Schmidt. 1872.	13) Phlegmone d. Halses.	52 m.	—	ja	—	?	einige Tage
	14) Phthisis pulmon.	? m.	? ja	? —	—	?	—
L. Weiss. 1875.	15) Complic. Femur-Fract.	57 m.	—	—	ja	l. 7. r. 11.	11 resp. 7
Förster. 1876.	16) Abtragung des Hy-mens.	w.	? ja	? —	—	?	—
	17) Amputatio cervic. ut.	w.	? ja	? —	—	?	—
Beck. 1877.	18) Messerstich in die Schulter, chron. Eite-rung (mit Retention u. Phlegm. d. pect. nach 5 Monaten, Pyämie).	Soldat ca. 20 Jahre	—	—	ja	10. der Pyämie	—
	19) Eitrige Peripleuritis, Lungengangrän.	Soldat ca. 20 Jahre	—	—	ja	l. 4. r. 14.	3 Wochen resp. 6 Tage
Landsberg. 1877.	20) Gonitis suppur. chron. nach Contusion. Nach 11 Jahren Pyämie.	20 w.	—	—	ja	1.	12
Michel. 1877.	21) Käsigc Epididymitis, eitrige Thrombose im l. Nebenhoden.	69 m.	—	—	ja	?	bald
Bryant. 1878.	22) Zerschmetterung des Unterschenkels.	47 m.	=	—	ja	12.	1.
Becker. 1878.	23) Amputatio femoris.	?	—	—	ja	?	?

Ist Patient gestorben?	Sonstige Metastasen	Endocarditis?	Thrombophlebitis?	Infections-erreger?	Panophthalmitis?	Wo Ausgang im Auge?	Bemerkungen
ja	Knie „etc.“	nein	?	?	ja	Chor. ?	Abgekapselter Perfor.-Abscess unter dem rect. int.
nein	?	—	?	?	ja	?	do. starb später an der Tuberc.
ja	nein.	nein	Ven. iliac.	?	ja	Chor. ?	Thromtus im ram. rec. chor.
nein	?	—	?	?	?	?	
nein	?	—	?	?	?	?	
nein	nein.	—	?	?	ja	?	Uebergreifen des Processes auf die Lungen. „Resorption von Eitertheilen aus der Lunge“. Bis zur Erblind. 8 Tage!
ja	nein.	A. pulm.!	?	?	ja	?	
ja	Pleuritis.	?	?	?	—	Chor. ?	Bis zum Tode keine Panophth. Schmerzlose Ophth. Keine Section.
ja	Nieren, Herz, Dickdarm, Kehlkopf, Luftröhre, Hirn.	ja	ja	?	—	bds. Sehnerv	Blutungen in Conj. u. Ret.
ja	Gelenke.	nein	Ven. fem.	?	ja	?	
ja	?	?	?	?	?	?	Keine Angaben.

Autor	Ursächliche Krankheit	Alter und Geschlecht	Sitz der Ophthalmie			An welchem Tage der Infection kam die Ophthalmie?	Wie viel Tage nach d. Ophth. kam der exitus?
			rechts?	links?	beiderseits?		
Leber.	1880.						
	24)	Panaritium.	Junger Arzt	? ja ?	—	1. der Pyämie	?
	25)	Eiterung eines Phalangealgelenks.	45 m.	—	ja	33.	?
Hirschberg.	1880.						
	26)	Cystitis suppurativa.	40 m.	ja	—	1.	?
Seggel.	1880.						
	27)	Otitis media.	Soldat	—	ja	?	?
	28)	Empyem.	Soldat	—	ja	?	—
Kahler.	1880.						
	29)	Gangrän des l. Zeigefingers.	40 w.	—	ja	?	?
	30)	Eitrige Lungencavernen.	28 m.	—	ja	?	?
Michel.	1881.						
	31)	Pirogoff'sche Amputation, dann Gangrän.	40 m.	—	ja	15.	7
Litten.	1881.						
	32)	Wunde am Finger mit Lymphangitis.	Mann	—	ja	?	?
Kipp.	1881.						
	33)	Otitis med. chron. dupl.	10 m.	ja	—	?	—
Edmunds.	1882.						
	34)	Halswunde, Unterbindung der l. Carot. comm.	32 m.	—	ja	5.	14
Cornwell.	1882.						
	35)	Phlegmon. Erysipel.	?	? ja ?	—	?	21
Martin.	1882.						
	36)	Eitrige Prostatitis nach chron. Gonorrhoe.	24 m.	—	ja	?	?

Ist Patient gestorben?	Sonstige Metastasen	Endocarditis?	Thrombophlebitis?	Infections-erregert?	Panophthalmie?	Wo Ausgang im Auge?	Bemerkungen
nein	nein.	nein	?	?	ja	?	„Gastricismus“.
nein	nein.	nein	?	?	ja	?	Chron. Fieber mit Schüttelfrösten.
?	?	?	?	?	—	?	Tabiker. Keine Section.
ja	?	?	?	?	ja	?	
nein	?	?	?	?	ja	?	
ja	Mening, Nieren, Milz, überall Hä-morrh.	ja	?	?	—	Ret.	Klinisch nicht beobachtet. Frische Ret. Infect.
ja	Nieren, Darm, Leber, Mening.	nein	?	?	?	l. Ret.	Nur Section.
ja	?	?	ja	?	ja	Iris und?	Uebrigster Augenbefund nicht mitgetheilt.
ja	Haut, Milz, Niere, Darm.	ja	nein	?	—	Chor.	Massenhafte allg. Blutungen.
nein	nein.	—	?	?	nein	?	Sehr leichte Pyämie, polikl. behandelt.
ja	Gehirn links.	nein	—	?	ja	?	Zerfallene Thromben in d. l. Carotis.
ja	?	nein	?	?	?	?	(Original nicht zugänglich).
ja	„Miliär in allen Organen“ (Lungen, Parotis, Gel., Herz etc.).	ja	?	ähnl. d. Neisser'schen ?	ja	?	Anfangs Fieber ohne nachweisbare Ursache.

Autor	Ursächliche Krankheit	Alter und Geschlecht	Sitz der Ophthalmie			An welchem Tage der Infection kam die Ophthalmie?	Wie viel Tage nach d. Ophth. kam der exitus?
			rechts?	links?	beiderseits?		
Dimmer. 1883. 37)	Extraction eines Molarzahnes, 14 Tage später Pyämie.	13 m.	ja	—	—	ersten Tagen	—
Shears. 1884. 38)	Phlegmone des Vorderarmes.	20 m.	—	ja	—	?	—
Bayer. 1885. 39)	Doppelseitige Salpingitis. Carcin. cervic. ut. duplicis (nach Exploration).	w.	?	?	?	?	?
Yevetzky. 1888. 40)	Panaritium.	?	?	ja	?	?	—
Panas. 1891. 41)	Lymphangitis und Abscess am l. Arm.	Junger Mann	ja	—	—	?	60 Tage
Deutschmann. 1893. 42)	Aufmeisselung des proc. mastoid. wegen Otitis media.	7 m.	—	ja	—	8.—14.	—
Eigene Fälle. 43)	Phlegmone am linken Ellenbogen, chron. Eiterung.	53 m.	—	ja	—	ca. 45.	ca. 40
44)	Abgesackter Pyopneumothorax.	40 w.	—	—	ja	?	4 resp. 6
45)	Cystitis suppurat., vorübergehend Pyelonephr.	65 m.	ja	—	—	im Beginn	—
46)	Periorchitis suppur.	63 m.	ja	—	—	14.	—

Ist Patient gestorben?	Sonstige Metastasen:	Endocarditis?	Thrombophlebitis?	Infectionserreger?	Panophthalmie?	Wo Ausgang im Auge?	Bemerkungen
nein	nein.	—	?	?	ja	?	Erwähnt ähnlichen Fall von Arlt.
ja	Meningitis.	ja	?	?	ja	?	
ja	?	ja	?	?	ja	Chor.?	Keine näheren Angaben.
nein	?	—	?	?	ja	?	
ja	Lunge ?	?	?	Strept.	nein!	?	Vorher Influenza mit Lungencomplication.
nein	l. periarticularer Schultergelenksabscess.	—	?	Bac.?	ja, ohne Perfor.	Chor.?	Führte nach 3 Monaten zur sympath. Ophthalmie.
ja	Nates, Meningitis.	nein	—	Strept.	ja	?	Nach 6 Wochen noch Strept. im Bulbus, cf. Fall II, p. 47.
ja	Nieren, Fussgelenk.	nein	—	Strept.	—	?	Bis zum Tode keine Panoph. mehr, cf. Fall VII, p. 107.
nein	nein.	—	?	Staph. pyog. aur.	ja	Chor. od. Ret.?	cf. Fall X, p. 107.
nein	nein.	—	?	Staph. pyog. aur. et citr.	ja	?	Später präperitoneale Phlegmone durch Streptoc.-Infection von der Inc.-Wunde aus, cf. Fall III, p. 51.

5) Meist stellt sich Panophthalmie ein mit Perforation, doch bei einzelnen Fällen sehr langsam, auch sind 4 Fälle mit direktem Uebergang in Phthisis bulbi beobachtet.

Fälle ganz schleichender, aber schliesslich doch zur Panophthalmie führender Vereiterung sind der von Beck (14 Tage) und Fall (45) (34 Tage), ferner der von Mackenzie (4), bei welchem auf dem einen Auge in 18 Tagen, auf dem andern sogar erst innerhalb von 9—10 Wochen sich mässige Protrusion und Chemosis ausbildete. Von Arlt (5, 7), Panas (41) und Ripp (33) wird ausdrücklich direkte Phthise angegeben, und zwar ist der Panas'sche der einzige überhaupt bekannte derartige Fall bei Anwesenheit von Streptococcen.

6) Die spärlichen bacteriol. Untersuchungen (6 Fälle) haben neben Streptococcen auch Staph. aur. u. citr. ergeben.

Martin fand ausser Micrococcen noch Bact. und den Neisser'schen Gonococcen ähnliche Microben, doch ist nicht angegeben, ob bereits Perforation vorlag etc. Deutschmann (42) beschreibt in dem phthisischen (nicht perforirten) Bulbus, der zu sympath. Ophthalmie führte, „kurze Bacillen“, von deren Beziehungen zu der Eiterung aber nichts Sicheres zu ermitteln war. Bei mehreren Fällen gelang die Züchtung virulenter Coccen noch nach relativ langer Zeit; bei Fall 45 höchstvirulente Staph. aur. 5 Wochen nach Beginn der entzündlichen Erscheinungen, bei Panas sogar nach über 8 Wochen (Streptococcen). Ein noch längerer Zeitraum findet sich bei Mitvalsky, der nach 70 Tagen (4 Wochen nach der Perforation) virulente Staph. aur. gewann (Tab. IV).

Es sind solche Fälle von einer gewissen principiellen Bedeutung für die Beziehung der Eitercoccen zur sympath. Ophthalmie. Schirmer¹⁾ führt mit Bezug hierauf an, dass er nach 3 wöchentlichem, Schmidt-Rimpler nach 4 wöchentlichem Bestehen der intraocularen metastat. Eiterung virulente Staphylococcen züchtete, was nach den obigen Daten also noch nach viel längerer Zeit möglich ist. Dass auch 5 Wochen nach stattgehabter Perforation in der Tiefe des Auges die Eitererreger vorhanden sein können, liess sich in folgendem Falle mikroskopisch nachweisen, bei dem die metastatische Natur der Ophthalmie wenigstens sehr wahrscheinlich ist.

¹⁾ v. Graefe's Arch. f. Opth. XXXVIII. 4., p. 95.

Fall II.

Phlegmone des Ellenbogens, metastat. Ophthalmie
1. mit Perforation, exitus leth. an Meningitis purul.
6 Wochen nach der Perfor. Streptoc. im Bulbus.

Lorenz Oberliesen-Melchers. 53 Jahre alt aus Liessen, Kr. Brilon.

Anamnese: Im Dezember 1892 erkrankte Pat. an einer entzündlichen Schwellung des linken Ellenbogens, die zur Vereiterung führte. Am 19. I. 93 Incision, ohne dass die Eiterung zum Stehen kam. In den letzten Tagen des Januar „plötzliche Erblindung“ des linken Auges d. h. Pat. konnte morgens beim Erwachen nichts mehr mit demselben sehen, bald starke entzündliche Erscheinungen. Der am 2. Februar zugezogene Arzt, Herr Dr. Schlüter in Hallenberg constatirte bereits Perforation nach Panophthalmie. Der Exophthalmus ging langsam zurück. Unter Fortdauer der fieberhaften Allgemeinerscheinungen trat ca. am 6. II. ein neuer grosser Abscess in der Glutaealgegend hinzu. Mitte Februar Incision und Entleerung grosser Eitermengen. Am 27. II. Aufnahme in die chirurgische Klinik.

Stat. präs. Dekrepider alter Mann, der unklare Antworten giebt. Im Urin Eiweiss. Am Kreuzbein eine markstückgrosse Wunde, die in eine Tasche nach dem rechten Oberschenkel hinführt und übelriechendes Secret entleert. Die Sonde führt nicht auf Knochen. Linkes Ellenbogengelenk nicht vollkommen streckbar, Pronation und Supination stark behindert. L. Auge zeigt das Bild einer in Perforation übergegangenen Panophthalmie. Bulbus schon stark geschrumpft.

1. III. Erysipel, von der Sacralwunde ausgehend.
3. III. Gesichtserysipel. Starke Bronchitis.
6. III. Erysipel abgeblasst. Doch delirirt der Kranke, die Kräfte nehmen ab.
7. III. Coma. Dämpfung über dem l. unteren Lungenlappen.

8. III. früh 2 $\frac{1}{2}$ Uhr. Exitus lethalis.

Section 8. III. vorm. 11 Uhr: „Suppuratio articulationis cubiti sin. et abscessus periarticularis. Abscessus regionis glutaeealis. Meningitis fibrino-purulenta praecipue sinistra (Pachymeningitis et Leptomeningitis purulenta). Endocarditis fibrosa (alt), Pneumonia lobularis (nicht metastatisch). Panophthalmia metastatica cum perforatione bulbi sin.

Makroskopische Beschreibung: Bulbus stark geschrumpft, zeigt beginnende Packetform. In der Mitte der weiss-trüben stark verkleinerten Cornea eine feine Haarfistel mit eingezogenem Rande, glattwandig. Auf dem Querschnitt Sehnerv unverändert, Papille geschwollen, zu beiden Seiten noch ein kurzer Netzhautstumpf, alles andere ist wie überhaupt der ganze Augenhalt in eine graue, etwas streifige Masse verwandelt, in welcher in der Gegend des Ciliarkörpers noch einzelne Pigmentfetzen liegen, und die hinten an den Seiten noch gelbliche Färbung besitzt.

Mikroskopische Untersuchung:

Der Bulbus wird in Alkohol gehärtet; Celloidin, Färbung nach Weigert (Bakterien-Fibrin), Hämotoxylin, Picrocarmin. Es wird nur die Umgebung der Perforationsstelle geschnitten.

Cornea nur in ihren Randtheilen in einer Breite von etwa 2 mm in Gestalt dicker glatter Stümpfe noch erhalten. Lamellenzeichnung durch Rundzellen und Narbengewebe, besonders in den vorderen Schichten vielfach unterbrochen. Epithel unregelmässig verdickt, setzt sich über das die Cornealstümpfe überziehende Granulationsgewebe eine Strecke weit lippenförmig in die Fistel hinein fort. Aderhaut in der Gegend hinter dem Aequator z. Th. noch wahrnehmbar, wiewohl hochgradig destruiert und farblos, infolge der starken Scleralschrumpfung papillomatös gefaltet. Netzhaut an der Papille an den Körnerschichten noch erkennbar, stark bindegewebig verdickt; die Stützfasern setzen sich unmittelbar in das vorliegende junge Bindegewebe fort. Limitans int. halskrausenartig aufgerollt. In den hinteren Winkeln des einem Rechteck ähnlichen Augennern liegen noch eitrige Massen, die durch schmale Gänge mit dem hinter der Fistel gelegenen zellärmeren Eiter zusammenhängen; ihr Centrum hat schlechtere Kernfärbung angenommen und zwar weil hier jetzt noch reichlich Streptococcen zusammengedrängt liegen (cf. Fig. 1), auf der einen Seite sich schlechter färbend (Degeneration), auf der andern dagegen bezüglich ihrer Gestalt und Färbefähigkeit normal. Hier meist ziemlich kurze Ketten, dagegen bei den degenerirenden sehr lange, gewundene Ketten. Die Coccenheerde sind vollständig von sehr dichten Rundzellen umschlossen, setzen sich nicht nach vorn weiter fort; der sie umgebende Eiter ist seinerseits, abgesehen von den ziemlich schmalen Pforten, allenthalben von Gefäss- und zellreichen jungen Bindegewebe umschlossen, dass vielfach sehr grosse runde Zellen mit blassem Kern enthält (entfärbte, gequollene Pigmentepithelien), daneben

kernlose helle Kugeln (hydrop. degen. Chor. Zellen? cf. Weiershäuser). Ausserdem grosse mit Blutpigment beladene Zellen (Leukocyten).

Die gleichen Mikroorganismen fanden sich in den andern metastatischen Eiterungen (Meningitis, Hautphlegmone).

In den untersuchten Schnitten konnten Beziehungen der Coccen zu Gefässen natürlich nicht mehr nachgewiesen werden. Opticus und Sehnervenscheiden frei von Microg., desgleichen das umgebende Orbitalgewebe.

7) In einem Falle (Deutschmann(42) kam es nach 3 Monaten zur sympath. Ophthalmie des 2. Auges, obwohl eine Perforation des metastatisch bis zur Panophthalmie erkrankten nicht stattgefunden hatte.

8) Unter 44 Fällen (bei 2 tödtlichen fehlt eine Angabe) sind 14 doppelseitig, 30 einseitig, von letzteren 15 linksseitig, 8 rechtsseitig, 7 unbestimmt.

9) Ausgang: 29 Personen starben (63%), 17 genasen (37%), also mehr als der 3. Theil blieb am Leben. Die grössere Malignität der mit doppelseitiger Ophthalmie (78,6% Sterblichkeit) gegenüber den mit einseitigen Ophthalmieen (53,3% Sterblichkeit) einhergehenden Fällen ist auch hier unverkennbar, aber nicht so stark, wie bei der puerperalen Pyämie.

Unter den 17 Genesenen sind 3 doppelseitige, 14 einseitige; 11 doppelseitige, 16 einseitige starben. Die 3 doppelseitigen Genesenen, bei denen übrigens die Ophthalmie beiderseitig zu gleicher Zeit eintrat und stets zur Panophthalmie führte, sind die von Mackenzie(4), Leber(25), Beck(18).

Vergleichen wir mit den eben angegebenen Zahlen solche, die sich auf die sog. chirurgische Pyämie überhaupt beziehen, so ergibt sich, dass letztere an sich eine sehr hohe Sterblichkeit besitzt. Lassen wir zunächst die Fälle ausser Acht, wo zu chronischer Eiterung sich später pyämische Symptome gesellten — es verlaufen solche Fälle öfters milde — so ergibt sich für diejenigen, in denen der infectiöse Process ohne oder mit vorhergehender Localeiterung im Anschluss an ein Trauma das Gepräge der Pyämie trug:

Amerikanischer Rebellionskrieg 97% Mortalität (2800 Fälle).

Deutsch-französischer Krieg 1870/71 85% Mortalität.

Gussenbauer (p. 232) 94,28% Mortalität.

Es sind bei diesen Zahlen die sämtlichen „primären“

schweren Septicopyämieen mitgerechnet; würde man nur die „secundären“ berücksichtigen, so wären die Werthe wohl etwas niedriger ausgefallen.

In unserer Tabelle finden sich 19 analoge eigentlich post-traumatische Fälle mit 13 Todesfällen (cf. p. 35) = 73,1 %.

Bei Hinzurechnung der chronischen Eiterungen mit secundärer Pyämie beträgt nach Gussenbauer die Sterblichkeit 88 %. Berechnen wir in gleicher Weise diejenige der sämtlichen 46 Fälle, so ergab sich eine Sterblichkeit von 63 %.

Ist auch das vorliegende Material nicht geeignet, so brauchbare Verhältnisswerthe zu geben, wie das angeführte grosse chirurgische, so lässt sich doch soviel ohne weiteres behaupten:

Dass auf dem Gebiete der sog. chirurgischen Pyämie die doppelseitige metastat. Ophthalmie zwar auch meistens schwere Fälle complicirt, dass aber selbst ihr eine besondere ungünstige Bedeutung nicht zuzukommen scheint. Gewiss ist auch eine mit metastat. Ophthalmie (besonders doppelseitiger) verlaufender Pyämie wie die anderen als eine ernste Erkrankung anzusehen, aber es muss sogar hervorgehoben werden, dass die einseitige Ophthalmie viel häufiger milde Fälle begleitet, als solche durchschnittlich bei der chirurgischen Pyämie angetroffen werden; ganz besonders aber ist so lange die Prognose höchstens zweifelhaft, wenn nicht relativ günstig (ad bonum vergens), so lange die Ophthalmie die einzige nachweisbare Metastase darstellt, hier wie überhaupt natürlich unter eingehender Berücksichtigung aller anderen Krankheitssymptome.

10) Endocarditis:

Obwohl bei der chirurgischen Pyämie die Endocarditis im Allgemeinen viel seltener ist, als bei der puerperalen, findet sie sich bei den mit Ophthalmie complicirten Fällen in nur wenig niedrigerem Procentsatz wie bei jener. Es geht auch hieraus hervor, dass die Endocarditis wahrscheinlich das Zustandekommen der Ophthalmie begünstigt und dass auch aus diesem Grunde die puerperale Pyämie häufiger zur Infection des Auges führen wird. (Eine besondere Beziehung der Endocarditis zur doppelseitigen metastat. Ophthalmie lässt sich hier nicht erkennen.)

Eine genaue Tabelle über 124 tödtliche Fälle aus dem Kriege 1870/71 enthält nur 1 Endocarditis, 48 ausführlich mitgetheilte Sectionen aus dem amerikanischen Bürgerkrieg gar keine.

Die 17 genesenen Fälle der Tabelle II können wohl als endocarditisfrei gelten. Unter 16 Sectionen, bei denen sich Angaben finden, war 7 mal Endocarditis, das macht zur Zahl der brauchbaren Sectionen 43,7 % (gegenüber 55 % Endocarditis bei den analogen puerperalen Sectionen), trotz der geringen Zahl der Fälle eine beweisende Thatsache. Bereits Fehling giebt die Endocarditis als Grund an für die grössere Häufigkeit der metastat. Ophthalmie im Puerperium; es scheint nur fraglich, ob sie als der einzige Grund anzusprechen ist.

11) Bei sämtlichen in Tabelle II angeführten Fällen, die genauere Angaben enthalten, lag eine „secundäre Pyämie“ vor (cf. p. 35), welche an grössere und kleinere Operationen und Verletzungen der verschiedensten Körperstellen (bes. der unt. Extr.), ferner eitrige Entzündungen der Haut, der Knochen und Gelenke, des Mittelohrs, der Lunge, des Urogenitalapparates etc. sich anschloss.

Da die chirurgische Pyämie nicht so ausschliesslich secundäre, sondern relativ häufiger auch primäre Formen aufweist, so liegt hierin vielleicht ein weiterer Anhaltspunkt für die grössere Häufigkeit der Ophthalmie im Puerperium; denn es ist immerhin denkbar, dass besonders der starke Thrombenzerfall ähnlich wie endocarditische Exerescenzen ein gerade für Infection des Auges besonders günstiges Material abgeben. Bei dem Ueberwiegen der secundären Form auch bei der „chirurgischen“ Pyämie wird aber dieser Einfluss wohl nicht besonders gross sein.

12) 10 mal war die Ophthalmie die einzig nachweisbare Metastase, von diesen Fällen sind 8 genesen (6 einseitige, 2 doppelseitige), 2 gestorben.

Eine Endocarditis ist bei diesen Fällen wohl auszuschliessen. 2 besonders prägnante und auch wegen des übrigen Krankheitsverlaufs interessante Fälle sind No. 45 und 46. Der Letztere sei hier genauer mitgeteilt:

Fall III.

R. metastatische Panophthalmie als einzige nachweisbare Metastase bei eitriger Periorchitis.

Staphyl. pyog. aur. et citreus.

Winter, Wilhelm, 63 Jahre alter Schreiner aus Battenberg. Kr. Biedenkopf.

Ueber den aus der chirurgischen Klinik hergesandten Pat. ergibt die dort am 27. III. 92 aufgenommene Anamnese, dass derselbe früher stets gesund war, nicht hereditär belastet ist.

Keinerlei Anhaltspunkte für Tuberkulose oder Syphilis. Ca. am 13. März 92 sollen spontan, ohne jegliche ihm bekannte äussere Veranlassung Schmerzen im linken Hoden aufgetreten sein; gleichzeitig wurde das Urinieren beschwerlich, ist aber bis jetzt ohne Kunsthilfe möglich gewesen. Da das Scrotum stark anschwell, die Schmerzen sehr heftig wurden und Fluctuation sich einstellte, wurde am 29. III. eine breite Incision gemacht. Es fand sich bei schichtweisem Vorgehen in die Tiefe, dass unter der prall gespannten Tunica vaginalis communis eine reichliche Eitermenge lag, ohne dass Hoden und Nebenhoden nachweisbar verändert waren. Tamponade, Verband. Das bis dahin vorhandene unregelmässige Fieber hörte gleich auf. Am 4. IV. Schluss der Incisionswunde durch Secundärnaht, nur im unteren Winkel blieb ein Drainrohr. In dem Eiter wurden im hiesigen hygienischen Institut 2 verschiedene Staphylococcenarten (*aureus* und *citreus*) nachgewiesen, doch keine Tuberkelbacillen.

Am 6. IV. klagte Pat. zum ersten Mal über Schmerzen im r. Auge; auf Befragen gab er jedoch an, dass das Leiden schon auf der Reise nach Marburg, also am 27. III., begonnen und sich jetzt nur bedeutend verschlimmert habe. Es wurde starke Chemose der Lider und Conjunctiva bulbi, heftige Iritis und beginnende Protrusion constatirt.

9. IV. 92 Aufnahme in die Augenklinik.

Stat. praes.

Alter, decrepider, schwerhöriger Mann. Mässiges Emphysem und Bronchitis, sonst Respirationstractus normal. Herzaction wenig stark, doch regelmässig, ohne Geräusche. Temperatur nicht erhöht, Puls 76. Mässiger Grad von Arteriosclerose. Tractus intestinalis und Nervensystem ohne Veränderung, Urin desgleichen.

Am Scrotum links auf der Vorderseite längsverlaufende Narbe. An ihrem unteren Ende eine Fistel, die wenig secernirt. Abscesshöhle zusammengefallen, keine wesentliche Schwellung oder Schmerzhaftigkeit mehr.

Linkes Auge normal. E, S = $\frac{6}{6}$. Presbyopie + 2,5.

Rechtes Auge: Panophthalmie. Starker entzündlicher Exophthalmus, mächtige Chemose. Cornea diffus getrübt, mit granulirtem Epithel, sonst völlig intact. Kammerwasser gelblich getrübt, Iris missfarben, Pupille eng und durch eitriges Exsudat verlegt. Schmerzen zur Zeit nur mässig. Amaurose.

9. IV. 92. R. Exenteratio bulbi in Chloroformnarkose mit dem Bunge'schen Löffel. Glaskörper und Chorioidea total ver-

eitert. Da die einzelnen Bestandtheile der exenterirten Masse zerfielen, wurde dieselbe nicht conservirt. Dagegen wurde ein Tropfen Eiter auf Agar verrieben. Es wuchsen Reinkulturen von *Staphyl. pyog. aureus* und *citreus*, also dieselben, wie aus dem periorechitischen Eiter.

21. IV. R. glatte, schmerzlose, langsame Heilung.

Ohne Fieber oder sonstige Beschwerden hat sich unten am Scrotum eine 10-Pfennigstück grosse fluctuirende Stelle gebildet, die auf Druck schmerzhaft ist (Senkungsabscess). Incision; mässige Menge guten Eiters. Davon 3 Agarculturen.

28. IV. Die aus dem Senkungsabscess angelegten Culturen haben ausser *Staphylococcen* 2 Arten von *Streptococcen* ergeben:

1) Den *Streptoc. pyog.*,

2) eine grössere Colonieen bildende Art; die einzelne Col. stellt eine etwa hanfkorngrosse Scheibe dar, die in der Mitte etwas prominent und weisslich, peripher grau durchscheinend, fein radiär gestreift erscheint. Die Col. sehen auffallend trocken aus und sind etwas unregelmässig zackig. In ihrem übrigen Verhalten stimmen diese *Streptococcen* mit den anderen vollkommen überein.

Sowohl die aus dem Auge gezüchteten wie die von der Periorechitis herkommenden *Staphylococcen* erweisen sich als hochgradig virulent.

2. V. Seit einigen Tagen Diarrhoe, ferner Schmerzen im l. Oberschenkel, vom Knie bis zum Hüftgelenk und Nabel ausstrahlend. Abdomen links unten druckempfindlich.

27. V. In die chirurgische Klinik zurückverlegt wegen zunehmender Schmerzen. Dortiger Befund: „Psoasspannung des l. Beines. Mächtiger Abscess der l. Lumbalgegend bis nach vorn ins Becken hineinreichend. Keine ausgesprochene Dislocation der Wirbelsäule. Die Abscessgegend ist empfindlich, aber nicht geröthet. Probepunction giebt grüngelben Eiter.

1. VI. Incision in der Lumbalgegend, Gegenöffnung über dem Poupart'schen Bande mit Zurückschiebung des Peritoneums. Keine Abscessmembran. Der Abscess führt nicht nach der Wirbelsäule. Quere Drainage, Tamponade. Es hat sich um eine präperitoneale Phlegmone gehandelt, die wahrscheinlich vom Scrotum ausging.

16. VII. Entlassung. Abscess vollständig geheilt. Pat. ist zur Zeit, abgesehen von allgemeiner Schwäche, ohne jede nachweisbare Krankheit.

In dem am 1. VI. entleerten phlegmonösen Eiter fanden sich wieder Staphylococcen, keine Tuberkelbacillen.

Der beschriebene Fall ist bemerkenswerth:

1) wegen der ersten Erkrankung. Die selbständige eitrige Periorchitis ohne nachweisbare Erkrankung der Harn-Samenwege gehört zu den grössten Seltenheiten. Es ist nicht mit aller Sicherheit festzustellen, ob nicht auch sie schon nur eine isolirte Metastase einer allgemeinen Pyämie gewesen; da aber die Ophthalmie erst 14 Tage nachher eintrat, ist sie hier eingereiht, hätte sonst wohl auch der kryptogenetischen Pyämie zugezählt werden können. Nach der zeitlichen Aufeinanderfolge kann die Ophthalmie auch durch eine erst von der Periorchitis ausgehende Allgemeininfektion entstanden sein.

2) wegen des übereinstimmenden bacteriol. Befundes von Staphyl. pyog. aur. und citreus (beide von grosser Virulenz) im Scrotal- und im Augen-Eiter.

3) weil ausser der ersten periorchitischen Eiterung die Ophthalmie die einzige nachweisbare Metastase war.

13) Die Zahl der anderen Metastasen ist, abgesehen von den unter 12) behandelten Fällen, bei den einseitigen Ophthalmieen nicht erheblich kleiner als bei den doppelseitigen. Ein wesentlicher Unterschied in der Prognose ist aber zwischen den sonst metastasenfremen (21% Mortalität) und den mit anderen Metastasen einhergehenden (88,8%) vorhanden. Auch auf die doppelseitige Ophthalmie bezieht sich dies insofern, als bei 2en der 3 genesenen Fälle die Ophthalmieen die einzigen Metastasen waren.

Unter den 18 Fällen (16 tödtlich), bei denen noch andere Metastasen vorlagen, wurden solche mehrfach nur in einem Organ, 13 mal an verschiedenen Stellen gefunden (nur 1 genesen).

In 9 Fällen (von 28) waren ausser den Ophthalmieen Metastasen an Kopf und Hals vorhanden, davon nur 2 mal bei doppelseitiger Ophthalmie (unter 9 Fällen). Ausser den von Endocarditis und Lungenmetastasen freien Fällen, ferner den sämtlichen genesenen Fällen, bei denen andere Metastasen (und Endocarditis) fehlten (zusammen 17 Fällen), ist infolgedessen wahrscheinlich noch der grösste Theil der doppelseitigen Ophthalmieen capillärer Natur; auch für einen Theil der übrigen einseitigen Ophthalmieen ist dies anzunehmen.

9 mal fand sich Meningitis (Mackenzie (3), Landsberg (8),

Shears(38), Edmunds(34), Martin(36), Fall(43), sämmtlich einseitig und in den 2 doppelseitigen von Kahler(29, 30). 1 mal (Michel(21) finden sich ausserdem Metastasen in der Trachea und im Larynx angegeben. Die Meningitis ist erheblich häufiger als bei den puerperalen Fällen, aber auch sie ebenso wie die Ophthalmie wird nur in den Fällen von Kahler(29), Martin(36), Shears(38) vielleicht nicht capillär sein, da bei den anderen Endocarditis und Lungenheerde fehlen ¹⁾.

14) Ophthalmoskop. Beobachtungen fehlen leider ganz; (nur bei Fall 45 war noch etwas zu erkennen).

Von den bisherigen anatomischen Untersuchungen über doppelseitige Ophthalmie sind nur 3 für den Beginn der Infection in beiden Augen zu verwerthen: es fand sich 2 mal multiple Capillarembolie der Netzhaut, 1 mal des Sehnerven (Kahler(29, 30), Michel(21). Kahler konnte nur noch in je einem Auge in beiden Fällen die Netzhautembolie nachweisen, die andern waren schon zu stark vereitert. Das eine Mal fand er 15 Pilzpfropfe, meist in Capillaren.

In dem Nagel'schen Fall fanden sich ebenfalls Entzündungen nur der Ret., doch ist nicht angegeben, ob eins. oder doppels. Michel fand ein andermal auf dem einen Auge eine embol. Iritis, der übrige Befund ist aber nicht angegeben. Die Befunde von Chorioiditis (Weiss, Landsberg) sind nicht beweisend für die Primäraffection dieser Membran, ebensowenig der eigene Fall 44, da die makroskop. wie die nicht vollständige mikroskop. Untersuchung keinen sicheren Aufschluss geben.

Die geringere Zahl der Untersuchungen gestattet keine allgemeineren Schlüsse, doch ist die sichere Primäraffection der Netzhaut bei 2 doppelseitigen Fällen immerhin hervorzuheben.

Ueber den Sitz der Embolie bei der einseitigen Ophthalmie ist noch weniger bekannt. Litten(32) fand sicher die Chor. infect. Die Untersuchungen von Fischer(1), Schmidt(13), Landsberg(20) und Bayer(39) sind hierfür nicht ausreichend. In Fall 45 war trotz genauester Untersuchung nur mit Wahrscheinlichkeit die Chor. anzusprechen.

Es sei noch erwähnt, dass 4 mal unter den als „Chorioiditis“

¹⁾ Bei all diesen Fällen ist zu berücksichtigen, dass bei abnormer Communication zwischen rechtem und linkem Herzen (offenes Foramen ovale) auch ohne End. und Lungenheerde ein grösserer Bröckel unmitttelbar in den Körperkreislauf übergehen kann; es ist dies aber wohl eine seltene Ausnahme.

beschriebenen Fällen die Eiterung hauptsächlich am Aequator sass (H. Schmidt (13), Weiss (15), Landsberg (20), Fall 45), hinter dem corp. cil., also in der Gegend der Sattler'schen feinsten Capillaren.

C. Metastatische Ophthalmie,

1) im Anschluss an Infektionskrankheiten.

Dem Gebiete der inneren Medicin gehören zunächst an diejenigen Fälle von metastatischer Ophthalmie, die sich an die verschiedenen Infektionskrankheiten anschliessen.

Sehr mit Recht hebt schon Horner¹⁾ hervor, dass ein grosser Theil gerade dieser angeblich metastatischen Processe einer scharfen Kritik nicht standhalte, und dass es sich vielfach nur um die ähnlichen Endstadien äusserer Entzündungen (Hornhautulcerationen) gehandelt habe. Es ist schon auffallend, dass die Handbücher der inneren Medicin in den Artikeln über die betreffenden Infektionskrankheiten von einer Ophthalmie meist nichts wissen. Und obwohl in allen Lehrbüchern der Augenheilkunde, vielfach in der gleichen Reihenfolge, die verschiedensten Krankheiten sich angegeben finden, macht es doch zum Theil Schwierigkeiten, auch nur eine zweifellose und genaue Beobachtung in der Literatur zu finden, die uns über die übrigen Symptome, das Stadium der Allgemeinerkrankung, die Rolle, welche vielleicht eine Meningitis vermittelnd spielt etc., genügend unterrichtet. Auch Herrnhaiser kommt zu einem ähnlichen Ergebniss. Bei der ausserordentlichen Spärlichkeit des brauchbaren Materials lohnen sich statistische Zusammenstellungen nicht; nur soviel ist erkennbar, dass der grösste Theil der von Ophthalmie befallenen Patienten genesen ist; wir besitzen deshalb auch fast gar keine anatomischen Untersuchungen. Aber auch jede genauere hier-

¹⁾ Gerhard's Handbuch der Kinderkrankheiten, Abtheilung Augenerkrankungen. 1882.

hergehörigeklinische Publication muss willkommen geheissen werden.

Um nicht den Umfang dieser Arbeit zu sehr auszu dehnen, verzichte ich hier auf eine eingehende kritische Literaturbesprechung, zumal eigene Beobachtungen mir nicht zur Verfügung stehen. Der Vollständigkeit wegen, führe ich nur kurz an, was aus den bisherigen Mittheilungen zu entnehmen ist und verweise bezüglich der näheren Begründung auf eine später erfolgende Mittheilung.

Das Verständniss der Mehrzahl der hiergehörigen Ophthalmieen kann heutzutage keine Schwierigkeiten mehr bieten, da durch zahlreiche Untersuchungen anderweitig localisirter Metastasen es festgestellt ist, dass bei Influenza¹⁾, Scarlatina, Masern, Diphtherie, (Scorbut) infolge von Mischinfection mit den gewöhnlichen Eitererregern secundäre Pyämieen vorkommen (ebenso beim Milzbrand und bei der Cholera²⁾); doch existirt für die letzten beiden nicht eine zweifellose Beobachtung von metastat. Ophthalmie, trotz mannigfacher Angaben). Bei den ganz vereinzelt nach Variola, Varicellen, Parotitis epidemica, Peliosis rheumatica, Morbus Weylii, (Dysenterie?) beobachteten Fällen lässt sich nicht sicher sagen, ob specifische oder Mischinfection vorgelegen hat. Dagegen sind beim Erysipel und Typhus abdominalis, sehr selten auch beim Rotz (welche alle übrigens auch Mischinfectionen geben können), eitrige metastatische Ophthalmieen beobachtet, die wir als specifische ansprechen

¹⁾ cf. die Anmerk. anf S. 58.

²⁾ Durch Injection selbst grösserer Mengen virulenter Typhusbacillen in den Glaskörper des Kaninchens wird zwar starke eitrige Hyalitis mit nachfolgender Phthisis (amaurot. Katzenauge), nicht aber Panophthalmie mit Perforation hervorgerufen. Es sei hier erwähnt, dass auch Cholerabacillen, in den Glaskörper gespritzt, eitrige Entzündung mit Phthisis verursachen, ohne Allgemeininfection. Die Reaction ist aber geringer als bei Typhusbacillen.

dürfen, weil dies beim Erysipel a priori annehmbar, beim Rotz (v. Graefe-Virchow) anatomisch, beim Abdominaltyphus bacteriologisch nachgewiesen ist (Panas, Grandclément¹⁾). Beim Typhus kamen diese metastat. Ophthalmieen als Nachkrankheit vor, wie die anderen specifischen posttyphösen Abscesse und führten nicht zur Panophthalmie ebenso ein Theil der übrigen hierhergehörigen Augeninfektionen.

Es gehören weiter hierher die viel zahlreicheren und besser gekannten bei Pneumonie und der epidemischen Cerebrospinalmeningitis beobachteten Fälle, die später noch eingehendere Betrachtung finden sollen (p. 102 ff.).

Schliesslich sind auch die nach Febris recurrens und bei rheumatischen Zuständen sich ausbildenden Iridochorioiditen häufig hierher gerechnet. Sie sind zwar zweifellos infectiöse Erkrankungen und können mitunter eitrigen Charakter annehmen, unterscheiden sich aber bekanntlich dadurch, dass sie niemals zur Vereiterung des Auges führen. Die wenigen Fälle von Erblindung nach Recurrens sind durch iritische Verwachsungen, Pupillarschluss und secundäre Veränderungen infolge mangelnder Behandlung herbeigeführt. Dasselbe gilt von den sogenannten gonorrhoeischen Metastasen. Die Grenze zwischen den eitrigen und nicht eitrigen inneren Augenentzündungen ist freilich auch sonst oft eine fliessende, der Unterschied nur graduell.

2) bei der „kryptogenetischen“ Pyämie.

2) Von grosser praktischer Bedeutung, auch fürs Auge, ist die sogenannte kryptogenetische Septicopyämie,

¹⁾ Nach einer mündlichen Mittheilung des Herrn Collegen Siegrist (Bern) sind aus einem von ihm beobachteten retrobulbären Abscess, der sich an Influenza anschloss, ausschliesslich die Pfeiffer'schen Influenzabacillen cultivirt worden, die demnach wahrscheinlich auch intraoculare Eiterungen hervorrufen können, auch ohne Mischinfection mit anderen Eitererregern.

wie sie zuerst von Leube¹⁾, später von Jürgensen²⁾ u. A. eingehend beschrieben ist. Es sind dies bekanntlich Fälle, bei denen, ohne dass sich die Eintrittspforte nachweisen lässt, septisch-fieberhafte Zustände mit Metastasen sich einstellen, die anfangs nicht selten unter dem Bilde verschiedener Infectiouskrankheiten oder unbestimmter fieberhafter Allgemeinerkrankungen einsetzen und früher sicher auch oft mit diesen verwechselt sind. Die bei den tödtlichen Fällen vorgenommene genaue Section ergibt mitunter noch eine der Diagnose entgangene innere Ursache (und eine solche kann auch bei unseren genesenen Fällen vorgelegen haben), in vielen Fällen aber lässt sie sich nicht auffinden. Wir haben es hier alsdann mit „primären Pyämieen“ in dem Sinne zu thun, wie er bei der chirurgischen Pyämie eingehend erörtert wurde. Nur solche, soviel man feststellen konnte, „primäre“ Pyämieen sind hier berücksichtigt, dagegen der ch. P. alle die nur während des Lebens dunkeln Fälle zugezählt, bei denen die Section einen deutlichen localen eitrigen Heerd ergeben hat.

Für die zahlreichen Fälle, bei denen sich absolut keine Primärveränderung findet, muss man sich die Infection vorläufig so vorstellen, dass die Microben irgend eine Schleimhaut durchsetzen, ohne in ihr selbst deutliche Veränderungen hervorzurufen. Als Gelegenheitsursache scheint die vielbeschuldigte „Erkältung“ eine Rolle zu spielen, sie findet sich wiederholt auch in unserer Tabelle III angegeben, soweit sie von den Autoren angeführt wird. Es soll damit keineswegs der Zusammenhang zwischen ihr und der Pyämie für sicher erklärt werden; aber die „Erkältung“ findet sich doch so häufig angegeben, dass sie vorläufig nicht ganz ausser Acht gelassen werden darf, natürlich nur als Gelegenheitsursache. Ob vielleicht gewisse Microorga-

¹⁾ Deutsches Arch. f. klin. Med. XXII, 1878, 3 u. 4.

²⁾ Verhandl. des Congresses für innere Med., Wiesbaden 1888. Lehrbuch der spec. Path. u. Ther. 1889, etc.

nismen, die sich auf den Schleimhäuten aufhalten, grössere Virulenz bekommen, oder ob etwa catarrhalische Zustände die Schleimhaut durchgängig machen, ist natürlich nicht festzustellen.

Panas (l. c.), welcher der Erkältung nach seinen Beobachtungen ziemlich grosse Bedeutung zuschreibt, erinnert daran, dass Pasteur durch Abkühlung Hühner für Milzbrand empfänglich machen konnte, gegen den sie sich sonst völlig immun erweisen.

In manchen Fällen, bei denen der Augeneiterung Eiterungen in einem anderen Organ vorausgingen, ist es nicht immer sicher zu entscheiden, ob die zeitlich erste Eiterung auch nur eine Metastase einer kryptogen. Pyämie, oder etwa selbst die Ursache der Infection war, welche das Auge betheiligte; so z. B. in Fall 45 der Tabelle II, wo die der Ophthalmie um 14 Tage vorausgehende eitrige Periorchitis selbst ja auch auf endogenem Wege entstanden sein muss. Auch bei kurz vorhergehenden Lungenerscheinungen ist nicht immer klar, ob diese nicht ebenfalls metastatisch und nicht die Quelle der Pyämie gewesen sind. Hier sind also wieder Uebergänge zur vorigen Gruppe vorhanden.

Zur kryptogenetischen Pyämie sind also gerechnet:

1) alle Fälle, die als Endocarditis ulcerosa beschrieben sind. Seit Litten's Arbeiten ist allgemein anerkannt, dass die septische Endocarditis nur ein Symptom der Allgemeininfection ist, wiewohl sie klinisch öfters sehr in den Vordergrund tritt. Ob die Endocarditis selbst durch infectiöse Verstopfung der Klappencapillaren entsteht (Koester), oder ob die im Herzen circulirenden Mikroben sich hier nur ansetzen, ist noch nicht ganz entschieden. Die symptomatische Bedeutung der Endocarditis gilt selbst für diejenigen Fälle, wo vor der eigentlich pyämischen Erkrankung ein alter, z. B. post rheumatischer Klappenfehler

schon bestand. Der letztere mag wohl die Ursache gewesen sein, dass sich am Endocard die Eitererreger festsetzten, ähnlich vielleicht den Experimenten von Rosenbach und Ribbert, welche durch Verletzung der Herzklappen und nachfolgende Blutinfektion eine Endocarditis erzeugten. Auch mögen vielleicht mildere Endocarditiden einmal unmittelbar in die malignen übergehen. Klinisch aber haben wir es von dem Auftreten eitriger Embolien ab mit einem anderen Krankheitsbilde und jedenfalls mit allgemeiner Pyämie zu thun. Allerdings giebt es auch Uebergänge mit weniger reizenden Embolien.

Es sei hier nochmals darauf verwiesen, dass bei einer Pyämie selbst eine hochgradige ulceröse Endocarditis sich der Diagnose völlig entziehen kann, wie dies besonders deutlich der Fall 24 aus Tabelle III zeigt. Bei Schmidt-Rimpler findet sich zwar die Angabe, er habe eine metastat. Ophthalmie bei einem acuten Gelenkrheumatismus beobachtet zu einer Zeit, „als eine Endocarditis noch fehlte;“ dies ist aber nach den jetzigen Erfahrungen während des Lebens nicht mit Sicherheit festzustellen.

2) Fälle, die unter dem Bilde des acuten Gelenkrheumatismus verliefen. Diese Fälle werden von Billroth, Litten u. A. als Pyämieen mit vorwiegenden Gelenkmetastasen bezeichnet und von den eigentlich rheumatischen Erkrankungen scharf geschieden. Ist es nun auch richtig, dass bei einer Vereiterung der Gelenke nicht mehr der gewöhnliche Rheumatismus vorliegt, so ist doch andererseits zu bedenken, dass auch die pyämischen Gelenkmetastasen öfters subacut verlaufen und zur Rückbildung gelangen, und dass vielleicht ein ganzer Theil der beiden Formen durch dieselben Mikroben, nur verschiedener Virulenz (z. B. *Diplococcus lanceolatus*), erzeugt wird. Klinisch ist auch hier der Unterschied meist durchzuführen.

3) Fälle, die ähnlich einem Typhus, einer Meningitis oder einer Miliartuberculose verlaufen, wohlunter-

schieden von den „posttyphösen Eiterungen“, sowie den eigentlichen Typhuspyämieen.

4) Fälle mit unbestimmten fieberhaften Allgemeinerscheinungen; bei denen es zur endogenen Infektion des Auges kam.

Statistik der Tabelle III.

Dieselbe enthält 27 Fälle von kryptogenetischer Pyämie mit Augenmetastase.

1) Das Lebensalter (21 mal angegeben) schwankt zwischen $\frac{3}{4}$ und 60 Jahren (beträgt im Durchschnitt 30,8 Jahre). Eine stärkere Betheiligung des höheren Alters ist nicht vorhanden, im Gegentheil die Zahl der unter 20 Jahre alten Personen relativ gross (8).

2) 12 waren männlichen, 8 weiblichen Geschlechts; das letztere ist also hier wieder relativ stärker betheiligt, als bei der chirurg. Pyämie.

3) Die Ophthalmie trat auf zwischen dem 1. und 18. Tag der Erkrankung, meist zu Ende der 1. und Anfang der 2. Woche. Ein Unterschied bezüglich der übrigen Erscheinungen, lässt sich zwischen den früh und spät aufgetretenen nicht erkennen. Die mittlere Krankheitsdauer beträgt für die tödlichen Fälle meist $1\frac{1}{2}$ bis 3 Wochen.

4) Die Art der Sehstörung war, soweit sie von Anfang an beobachtet wurde, ebenfalls eine allmähliche, aber schnell zunehmende, die entzündlichen Erscheinungen meist hochgradig, aber auch weniger stark; 1 mal ist Schmerzlosigkeit angegeben (Landsberg (7)). In der Intensität der entzündlichen Erscheinungen am Auge war aber die Virulenz des ganzen pyämischen Processes nicht etwa deutlich zu erkennen.

5) Gegenüber 13 Panophthalmieen, meist mit Perforation, sind 6 Fälle von intraocularer Eiterung mit direktem Uebergang in Phthisis bulbi beobachtet, also relativ mehr als bei der chirurgischen und puerperalen Form. Viel stärker tritt dieser Unterschied hervor, wenn man die „Meningitisophthalmie“ und solche nach Infektionskrankheiten mit hierher rechnet. Der erste Fall von Nettleship (6) ist zwar als „Panophthalmitis“ beschrieben, doch bestand weder Chemose, noch Protrusion, es kam bald zur Phthisis. Der zweite, der später ein „Pseudogliom“ darstellte, ist nicht vom Anfang beobachtet.

6) In 1 Fall (Scheffels) wurde nach Panophthalmie ohne Perforation eine sympathische Ophthalmie des anderen Auges beobachtet.

7) Unter den 27 Fällen sind 12 doppelseitige, 15 einseitige Ophthalmieen. 10 mal ist das l., 3 mal das r. Auge erkrankt, 2 Fälle in dieser Hinsicht unbestimmt. (Eine gewisse Vorliebe des l. Auges fand sich schon bei Tabelle II.)

8) 10 der doppelseitigen Fälle starben (83,3 % Sterblichkeit), während von den einseitigen 10 genasen (also 33,3 % Sterblichkeit). Demnach ist die vitale Prognose nur für die doppelseitige Ophthalmie sehr bedenklich, etwa im gleichen Maass wie bei der „chirurgischen Pyämie“, aber wie diese geringer als bei der puerperalen, während die einseitige Ophthalmie sogar häufiger genesende Fälle complicirt und für die kryptogenetische Pyämie noch weniger ungünstig ist, als sie es schon bei der chirurgischen gewesen. Die gesammte Sterblichkeit beträgt 55,5 % (15:12).

Zieht man von den tödtlichen doppelseitigen den von Hirschberg (17) ab, wegen des 14 tägigen Zwischenraumes zwischen den beiden Ophthalmieen und berechnet denselben mit den einseitigen, so ändert sich die Mortalität der doppelseitigen, annähernd gleichzeitig auf 81,8 % gegenüber 37,5 % der anderen Fälle.

Eine Statistik zum Vergleich der allgemeinen Sterblichkeit bei der kryptogenetischen Pyämie habe ich nicht gefunden, wohl Angaben über eine grössere Reihe leichterer und solche hauptsächlich über schwere Fälle. Es müssen hier sehr erhebliche Unterschiede vorkommen; so verliefen 100 Fälle, die Jürgensen¹⁾ zusammenstellt und bei denen er keinerlei Augencomplicationen, (auch keine Blutungen beobachtete) zum grössten Theile günstig, während Litten und Leube, die auch hier auf die Augenerscheinungen grossen Werth legen, fast nur tödtlich verlaufende Krankheiten vor sich hatten. Ich kann deshalb nicht sagen, wieweit die gefundenen Zahlen von den Durchschnittswerten der kryptog. Pyämie abweichen. Doch scheint mir die durchschnittliche Sterblichkeit der doppelseitigen Ophthalmie höher, als die der kryptog. Pyämie überhaupt, wenn man wenigstens zur letzteren, wie es in unserer Tabelle geschehen, alle Fälle von endogener Eiterung aus unbestimmter Ursache rechnet.

¹⁾ Congress für innere Med. Wiesbaden 1888.

Tabelle III.

Autor	Ursächliche Krankheit	Alter und Geschlecht	Sitz der Ophthalmie:			An welchem Tage der Infection kam die Ophthalmie?	Wie viel Tage nach d. Ophth. kam der exitus?
			rechts?	links?	beiderseits?		
Bowman. 1849.							
1)	„Endocarditis ulcer. nach altem Klappenfehler.“	Student	—	ja	—	2.	11
Arlt. 1854.							
2)	„Pyämisches Fieber.“	60 m.	—	ja	—	5.	—
Virchow. 1856.							
3)	„Endocarditis ulcer.“	55 w.	—	—	ja	?	?
Schiess. 1874.							
4)	„Septisches Fieber.“ Zwischendurch Erysipel.	35 w.	ja	—	—	9.	—
Landsberg. 1877.							
5)	„Endocard. ulcer. nach altem Klappenfehler.“	23 w.	—	ja	—	ca. 8.	9
Nettleship. 1880.							
6)	Kryptogen. Pyämie.	4 ?	—	ja	—	?	—
	7) Kryptogen. Pyämie.	$\frac{3}{4}$?	—	ja	—	?	—
Landsberg. 1880.							
8)	Kryptogen. Pyämie. „Bronchialkatarrh.“	65 m.	—	ja	—	8.	ca. 60
Adams. 1881.							
9)	„Endocard. ulcer. nach altem Klappenfehler.“	13 w.	—	—	ja	?	27
	10) „Alter Klappenfehler, dann typhöses Fieber.“	15 m.	—	—	ja	?	?

Tabelle III.

Ist Patient gestorben?	Sonstige Metastasen:	Endocarditis?	Thrombophlebitis?	Infectionserreger?	Panophthalmie?	Wo Ausgang im Auge?	Bemerkungen
ja	Pericard, Mening.	ja	—	?	ja	Chor.	„Typhöse Erkrankung.“
nein	Pleura (?)	—	—	?	ja	?	Viell. von d. Pleura ausgeg. 3 Tage vorher Cataract-extraction.
ja	?	ja	—	?	—	Ret.	—
nein	Abscess im Nacken.	—	—	?	nein	Chor.	Amaurot. Katzenauge.
ja	Pericarditis.	ja	—	?	ja	Iris	Ophthalmie schmerzlos.
nein	Gelenke.	—	—	?	nein	?	Gelenke nicht vereitert, geheilt (rheumatoid.)
nein	—	—	—	?	?	?	Spät. Pseudogliom.
ja	R. Fuss, l. Vorderarm, später Gehirn, Lunge.	?	—	?	ja	?	Keine Section. † nach längerer Reconvalescenz an d. and. Metast.
ja	„In vielen Organen“ und a. beiden Füße.	ja	—	?	—	?	Bis zum ex. leth. keine Panophth.
ja	Intra vitam nicht.	ja	—	?	ja	?	Keine Section.

Autor	Ursächliche Krankheit	Alter und Ge- schlecht	Sitz der Ophthalmie:			An wel- chem Tage der Infec- tion kam die Oph- thalmie?	Wie viel Tage nach d. Ophth. kam der exitus?
			rechts?	links?	beider- seits?		
Litten. 1881.							
11)	Perfor. ulc. ventr.? Pyämie.	w.	—	ja	—	?	?
12)	Pyämie.	m.	—	—	ja	?	?
Moore. 1882.							
13)	„Endocard. ulcer.“	?	—	ja	—	4.	8
Mooren. 1882.							
14)	{ Kryptog. Pyämie. Bild des acuten Gelenkrheumat.“	?	—	—	ja	?	—
15)		?	—	—	ja	?	—
Knapp. 1882.							
16)	Kryptogen. Pyämie. „Erkältung.“	17 w.	ja	—	—	3.	—
Hirschberg. 1885.							
17)	„Endocard. ulc., alter Klappenfehler.“	13 w.	—	—	ja	4 resp. 18	—
18)	„Acuter Gelenkrheu- matismus.“	1½ m.	—	—	ja	„ersten Wo- chen.“	—
Jessop. 1887.							
19)	Krypt. Pyämie.	?	? ja ?	—	—	?	—
Gayet. 1887.							
20)	Krypt. Pyämie. „Erkältung?“	18 w.	? ja ?	—	—	?	—
Sutphen. 1889.							
21)	Krypt. Pyämie, ähn- lich dem acuten Ge- lenkrheumatismus.	39 m.	—	—	ja	4.	—
Scheffels. 1890							
22)	Krypt. Pyämie, ähn- lich dem acuten Ge- lenkrheumatismus.	24 m.	ja	—	—	3.	—

Ist Patient gestorben?	Sonstige Metastasen:	Endocarditis?	Thrombophlebitis?	Infectionserreger?	Panophthalmitis?	Wo Ausgang im Auge?	Bemerkungen
ja	Leber, Nieren.	nein	—	?	ja	?	Multiple Hämorrhagien.
ja	Haut, Gelenke, Lungen.	nein	—	?	ja	?	Multiple Hämorrhagien.
ja	Gelenke.	ja	—	?	ja	?	Alter rheum. Klapfenfehler.
ja	Gelenke.	?	—	?	?	?	{ Nichts über Section.
ja	Gelenke.	?	—	?	?	?	
nein	—	—	—	?	nein	?	„Erkältung während der Menses.“ (Metritis?).
ja	Pleuritis.	ja	—	?	—	?	Keine Section.
nein	Gelenke.	—	—	?	nein	?	Geheilt mit Lin- senluxation u. Restitution des Visus.
nein	Lunge.	—	—	?	ja	?	Angebl. nach eitr. Vaginalausfluss.
nein	—	—	—	Staph. pyog. aur.	ja	?	„Erkältung wäh- rend der Menses.“ Später ein Furun- kel.
nein	Gelenke.	—	—	?	nein	?	
nein	„Meningitis.“	—	—	?	ja, ohne Perf.	?	„Chor. post menin- git.“ Später l. sympath. Ophth.

Autor	Ursächliche Krankheit	Alter und Geschlecht	Sitz der Ophthalmie:			An welchem Tage der Infection kam die Ophthalmie?	Wie viel Tage nach d. Ophth. kam der exitus?
			rechts?	links?	beiderseits?		
Panas. 1891. 23)	Krypt. Pyämie. („Erkältung?“)	66 m.	—	ja	—	1.	—
Eigene Fälle: 24)	Krypt. Pyämie. („Erkältung?“) Bild des acuten Gelenk- rheumatismus.	58 m.	—	—	ja	ca. 14.	ca. 4
25)	Krypt. Pyämie.	25 m.	—	ja	—	2.	—
26)	Krypt. Pyämie. (Cholelithiasis?)	48 w.	—	—	ja	1. resp. 4.	10 resp. 14
27)	Krypt. Pyämie (Car- cin. ventr.?)	49 m.	—	—	ja	ante mortem.	sehr bald

Die beiden genesenen doppelseitigen Fälle sind der von Hirschberg(18) und der von Sutphen(21). Alle beide führten nicht zur Panophthalmie, stehen in sofern analogen bei der Meningitis beobachteten Fällen nahe (auch bacteriologisch?). Der von H. ist deshalb noch besonders erwähnenswerth, weil er der einzige Fall ist, bei dem sich das Sehvermögen zum Theil wieder herstellte. Es sei deshalb genauer referirt: 18 Monate altes Kind. Schwerer Gelenkrheumatismus. In den ersten Wochen doppelseitige Augenerkrankung. Nach 6 Wochen (A. von Graefe) r. amaurot. Katzenauge, Hypopyon („Spes nulla.“) l. ebenfalls gelber Reflex; „analog wie bei Meningitis“. 16 Jahre später: beiders. hintere Synechien, r. Luxation der zum Theil cataractösen Linse, Papille nicht atroph., Art. nasal. inf. verödet, nach oben und innen vor der Netzhaut Bindegewebszüge, Glask. klar; Sn XVII in 3"; l. ähnlicher Befund, doch ohne Linsenluxation; präpapilläre Glaskörperflocke. Sn 2 1/2 in 4". Herzaction stürmisch, doch keine organischen Klappenfehler (Leyden).

Es ist dies überhaupt der einzige Fall, wo bei so ausgesprochen eitrigem Character nicht völlige Erblindung eintrat.

Ist Patient gestorben?	Sonstige Metastasen:	Endocarditis?	Thrombophlebitis?	Infectionserreger?	Panophthalmitis?	Wo Ausgang im Auge?	Bemerkungen
nein	—	—	—	Staphyl. aur. non liquef.	nein	?	
ja	Lungen, Niere, Gelenke (Prostata?)	ja, r. Ventr.	—	Pneumococcen.	—	?	Bis zum Tode keine Panophth.
nein	—	—	—	?	ja	?	„Herpes labialis.“
ja	Gehirn, Mening.	ja	—	Pneumoc.	ja	Ret. und?	„Ophthalmieen längere Zeit die einzigen Metastasen.“
ja	Nieren, Herz, Milz, Haut, Meningen, Lunge, retroperit. Phlegmone.	ja	?	Streptoc. pyog.	—	r. Ret. l. Ret. † Iris.	„Pemphigus chron. malign.“

Bei der epidemischen Cerebrospinalmeningitis ist etwas Aehnliches z. B. von Knapp¹⁾ beschrieben, doch waren hier die entzündlichen Veränderungen auf Glaskörpertrübungen beschränkt und nie eigentlich eitrig. Aehnlich ist auch ein Fall von Fuchs²⁾ (nach Varicellen), und eine analoge posttyphöse gelbliche Glaskörpertrübung, die mit Einschränkung des Gesichtsfeldes aber leidlichen Visus endigte, ist in der hiesigen Klinik beobachtet und auch anderweitig beschrieben. Allein auch bei der Meningitis bleibt, wenn einmal sich das Bild des amaurotischen Katzenauges ausgebildet hat, wie in dem Hirschberg'schen Fall, höchstens etwas Lichtschein übrig.

9) Eine Thrombophlebitis mit eitrigem Thrombenzerfall fehlt natürlich; wo also keine Endocarditis ulcerosa vorhanden war, scheint das embolische Material sich im Blute selbst gebildet zu haben. Nach einmal eingetretener Metastasenbildung kann von dieser aus natürlich auch eine Infection in der gewöhnlichen Weise erfolgen.

¹⁾ Arch. f. Ohrenheilk. 1885. XIV, p. 241.

²⁾ Lehrbuch 1892. p. 312.

10) Endocard:

Bei sämmtlichen genesenen Fällen ist Endocarditis sehr unwahrscheinlich. Bei den 15 tödtlichen fehlt 3 mal eine Angabe; unter den 12 übrigen finden sich 10 mit Endocarditis complicirte (7 doppelseitige, 3 einseitige), bei je einem einseitigen und einem doppelseitigen ergab die Section ein glattes Endocard.

Die Endocarditis ist demnach bei der kryptogenetischen mit Ophthalmie complicirten Pyämie rel. am häufigsten (83,3 % der brauchbaren Sectionen gegenüber 55 % bei der puerperalen, 43,7 % bei der chirurg. P.)

Während bei der chirurg. P. die Ophthalmie bei „primären Formen“ nicht vorzukommen scheint, ist ihre Häufigkeit bei der kryptogenetischen primären Pyämie zum Theil wohl sicher auf die Häufigkeit der ulcerösen Endocarditis bei derselben zu schieben.

Besonders die doppelseitigen Ophthalmieen zeigen einen hohen Procentsatz von Endocarditis (70,0 %) gegenüber 23,1 % bei den einseitigen, wie dies schon bei der puerperalen Form deutlich war.

Unter den 10 genesenen Fällen von einseitiger Ophthalmie sind 5, bei denen die Augenentzündung die einzige nachweisbare Metastase gewesen ist. Es gehört hierher folgender Fall:

Fall IV.

Linksseitige metastat. Panophthalmie als einzige nachweisbare Metastase bei ganz leichter kryptogenetischer Pyämie.

1879. 24. VI.

Waldschmidt, Heinrich. 25 Jahre alt aus Langendorf, bisher stets gesund auch bezüglich seiner Augen, erkrankte ohne ihm bekannte Veranlassung am 19. d. M. plötzlich unter Schüttelfrost und Kopfweh. Nachdem diese fieberhaften Erscheinungen 2 Tage lang bestanden hatten, trat Herpes labialis auf und fast zur selben Zeit Röthung und Schmerzhaftigkeit des bis dahin, soweit er weiss, ganz normalen linken Auges. Schon am nächsten Tage war das Sehvermögen total erloschen, es stellte sich hochgradiger Schmerz ein; währenddessen verloren sich die allgemeinen fieberhaften Beschwerden. Pat. klagt zur Zeit nur über sein Auge.

Stat. praes. (Geh. R. Schmidt-Rimpler.)

Kräftig gebauter Mensch von blühendem Aussehen. Die genaue Untersuchung des Körpers giebt weder für eine Allgemeinerkrankung noch irgend ein anderes locales Leiden einen Anhaltspunkt.

R. Auge normal. M 0,5 S = $\frac{6}{6}$.

L. Mässige Schwellung der Lider, Chemosis der Conjunctiva. Cornea ganz fein diffus getrübt, sonst völlig normal. Vordere Kammer tief, schmales Hypopyon. Iris kaum verfärbt, Pupille eng, doch auf Atropin ohne Synechieen gut erweitert; der anfänglichen Pupillenausdehnung entsprechend bleibt auf dem Centrum der vorderen Linsenkapsel ein feiner grauer Belag. Ophthalmoskopisch kein Reflex (diffuse Glaskörpertrübung). Bulbus etwas weich, auf Druck in der Ciliargegend rings um die Cornea schmerzhaft. Gesichtsfeld für Lampe noch frei.

3. VII. L. Stärkere Injection und Chemose. Linksseitiger Kopf- und Gesichtsschmerz. Auch jetzt Temperatur nicht erhöht.

4. VII. Sehr lebhafte Schmerzen, Zunahme der Chemosis; in der Pupille eine kleine Blutung.

8. VII. Pupille durch graugelatinöses Exsudat verlegt, vordere Kammer eng. Tension erhöht. Pat. sieht central noch kleinste Lampe, Gesichtsfeld hochgradig eingeengt.

10. VII. Exophthalmus; Panophthalmie. Vorderer Bulbusabschnitt rel. wenig betheiligt.

15. VII. Fluctuation am Ansatz des rect. ext. Entleerung einer ziemlichen Eitermenge durch Incision.

21. VII. Nochmalige Incision.

17. VIII. Pat. wird mit schmerzfreiem, etwas verkleinertem Bulbus entlassen. Während seines ganzen Aufenthaltes sonst völliges Wohlbefinden.

24. IV. 1880. Phthisis bulbi totalis.

(Es ist dieser Fall ein Paradigma für die sogenannten „spontanen Panophthalmieen“, die anscheinend die einzige Erkrankung überhaupt darstellen können und er ist, wie die ihm analogen, ein Beweis, dass es auch eine „kryptogenetische Pyämie mit vorzugsweiser Betheiligung der Augen“ giebt, eine Gruppe, die in der Zusammenstellung Jürgensen's fehlt, aber von Litten

und in manchen Lehrbüchern als äusserst selten bereits angeführt wird.

Dass die Ophthalmie in solchen Fällen (zu denen übrigens auch manches „Pseudogliom“ gehören dürfte) Folge einer, wenn auch geringfügigen Allgemeininfektion ist, wird sich, wenn der Patient von Anfang an in Beobachtung ist, an dem ganzen Krankheitsverlauf meist erkennen lassen; in der Regel gingen ihr allgemein fieberhafte Erscheinungen voraus. Wie flüchtig diese aber sein können, lehrt obige Beobachtung, noch mehr der Fall von Panas, bei dem der Beginn der Augeneiterung mit demjenigen der Allgemein-Erscheinungen zusammenfiel. Ich würde deshalb auch in dem klinischen Verlauf keinen Gegengrund sehen, den Fall XI (acute tiefe Eiterung bei altem Leucoma adhaerens) hieher zu rechnen, wenn anders man in dem dort angeführten anatomischen Befund einen Beweis sehen darf, dass die Infektion hier nicht von aussen erfolgte.

Schon bei der chirurgischen Pyämie fanden sich Fälle, bei denen die ursächliche Krankheit sehr hinter der metastatischen Ophthalmie zurücktrat, z. B. bei Fall 45; ja der Fall von Kipp (einseitige Ophthalmie nach Otitis media) wurde sogar rein poliklinisch behandelt. Ueberhaupt sind die allermeisten Patienten, bei denen die Ophthalmie (besonders die nicht puerperale) die einzig nachweisbare Metastase war, genesen.

Diese Ophthalmie als einzige nachweisbare Metastase findet sich bei allen Formen der Pyämie; im Ganzen habe ich 33 derartige Fälle gefunden, mit Hinzurechnung der nicht in diese Zahl aufgenommenen Meningitisophthalmie natürlich viel mehr. 26 von diesen Patienten genasen, nur 7 starben (also nur 21,2% Mortalität). 5 mal war die Ophthalmie doppelseitig, 28 mal einseitig; 6 mal bildete sich direkt Phthisis bulbi aus, sonst kam es, abgesehen von den bald gestorbenen Fällen, zur Panophthalmie.

10 von diesen Fällen gehören dem Puerperium an, sämtlich einseitig mit 4 Todesfällen, 9 der chirurg. P., davon 5 einseitige genesene (2 direkte Phthisen), 2 doppelseitige genesene, 2 doppelseitige lethale; 14 Fälle haben „interne“ Ursachen, davon sind nicht weniger als 9 Folge von Lungenerkrankungen mit nur 1 Todesfall (doppelseitig, Mackenzie). Die übrigen 8 Fälle, sämtlich einseitig und genesen, führten 3 mal unmittelbar zur Phthise. Die andern 5 von den 14 „internen“ Fällen, mit 1 Phthise und auch sämtlich einseitig und genesen, gehören der kryptogen. Pyämie an.

Eine septische Endocarditis, von der sich niemals etwas fand, kann bei all den genesenen Fällen auch deshalb so gut wie sicher ausgeschlossen werden, weil dieselbe eben nicht zur Genesung geführt hätte nach allen bisherigen Erfahrungen, zumal in der Mehrzahl der Fälle die Eitererreger wenigstens im Auge starke Virulenz zeigten; auch sind niemals irgend welche Herzstörungen zurückgeblieben. Mit Ausnahme derjenigen Fälle, welche Lungenerscheinungen boten, haben wir es deshalb wieder mit Capillarembolien zu thun. Von einem Lungenheerde dagegen können natürlich auch gröbere Emboli eingeschleppt sein.

Die Fälle einseitiger isolirter metastatischer Ophthalmie bedürfen keiner besonderen Erklärung. Es kommen ja solche isolirte endogene Eiterungen auch an vielen anderen Körperstellen vor z. B. den Gelenken, Knochen (Osteomyelitis!), im subcutanen Gewebe, der glandula thyr., der Milz (Billroth), den Meningen etc., warum nicht auch einmal im Auge? Es handelt sich hier eben wohl um ganz vereinzelte, kleine embolische Massen, die auf ihrer Wanderung wegen der Enge der Capillaren im Auge vielleicht relativ häufig haften bleiben und eben wegen des leichten Haftenbleibens meistens milde Fälle begleiten.

Viel schwieriger zu erklären aber sind die hierhergehörigen doppelseitigen Ophthalmieen, besonders die genesenen. Während die lethalen sich den andern doppel-

seitigen tödtlichen anschliessen, die sich schon eher deuten lassen und später noch eingehender besprochen werden sollen, müssen wir bei den genesenen annehmen, dass ohne sehr weite Dissemination des septischen Stoffes, wenigstens ohne schwere Allgemeinerkrankung gerade nur die Gefässe beider Augen inficirt worden sind. Die offenbare Disposition der Augen (jedenfalls zur Capillarinfection) kann hier nicht als Folge einer schweren constitutionellen Anomalie aufgefasst werden; vielleicht lagen bei diesen, immerhin ganz ausserordentlich seltenen Fällen, ganz besondere anatomische Verhältnisse vor, oder wir müssen annehmen, dass mitunter Augen vorkommen, die schon bei leichten septischen Zuständen zu Veränderungen neigen, welche die vereinzelt im Blut anwesenden Mikroben zum Haften veranlassen (cf. die neuen Beobachtungen Herrnheiser's über Retinitis septica). Die pyämischen Allgemeinsymptome sind wenigstens meist relativ gering gewesen, daher wohl nur Fälle, wie der von Beck so aufzufassen, dass trotz der schweren Infection, die sich in der doppelseitigen Ophthalmie aussprach, der Pat. ausnahmsweise sich erholte. Mit Hinzurechnung der mit anderweitigen Metastasen complicirten Fälle sind bisher, abgesehen von der epidemischen Meningitis, 9 Fälle beschrieben, wo trotz doppelseitiger metastat. Ophthalmie das Leben erhalten blieb (davon 7 gleichzeitig), gegenüber 53 lethalen.

In 5 Fällen wurden die isolirt erkrankten Augen anatomisch untersucht (Vossius I, (51), Herrnheiser I, (61), Mitvalsky IV, Weiss III, (11), eigener Fall II, (45). Nur bei Vossius und Herrnheiser war eine genauere Bestimmung der primär inficirten Augenhäute noch möglich, nämlich das eine Mal Ret. und Iris, das andere Mal die Netzhaut allein.)

12) Soweit andere Metastasen vorhanden waren (14 brauchbare Angaben), betrafen dieselben besonders gern die Gelenke. Nur 4 mal ist eine andere Metastase am Kopf und Hals

beobachtet. (Bowman (1), Scheffels (22), Fall 26 und 27.) In Fall 26 und 27 ist aber die Meningitis jedenfalls lange nach der Ophthalmie aufgetreten, die mehrere Tage lang sicher die einzige Metastasen am Kopf und Hals waren. Damit bleibt von den Doppelseitigen nur Fall 27 mit einer gleichzeitigen Meningitis compliciert; die übrigen können demnach nur durch einen ganz feinen Stoff erzeugt sein, der das übrige Carotidengebiet passierte, sind also trotz der Häufigkeit der Endocarditis capillärer Entstehung¹⁾. Von den einseitigen Ophthalmieen aber sind natürlich die wahrscheinlich capillär, bei denen sowohl eine Endocarditis als Lungenmetastase fehlte (Schiess (4), Nettleship (7), (8), Knapp (17), Gayet (21), Panas (26), Fall 27 und 29).

Berechnet man noch, analog wie bei den früheren Tabellen, weiter die Verteilung der Metastasen, so ergibt sich, dass die meist schweren, mit doppelseitiger Ophthalmie complicierten Fälle durchschnittlich mehr Metastasen aufweisen, als die einseitigen, doch nicht an Kopf und Hals.

13) Bezüglich des Ausgangspunktes der Eiterung im Auge liegen ausser der hier nicht verwertbaren Untersuchung Bowman's zunächst Mittheilungen von Landsberg (4) und Schiess (3) vor; dieselben beziehen sich auf einseitige Ophthalmie und zeigen einmal die Iris, das anderemal die Chorioidea wahrscheinlich als ersterkrankte Membran. In den doppelseitigen Fällen 26, 27 war die Retina vorwiegend primär betheiligt, wenn auch nicht ausschliesslich. Soweit die geringe Zahl der Untersuchungen es zulässt, wiederholt sich also auch hier die Erfahrung, dass bei der einseitigen Ophthalmie regellos irgend ein Teil des Auges inficiert wird, während bei der doppelseitigen vorwiegend die Netzhaut der schuldige Theil zu sein scheint.

14) Während im Puerperalfieber fast ausschliesslich Streptococcen, bei der „chirurgischen“ Pyämie neben diesen besonders auch Staphylococcen angetroffen werden, spielt bei der kryptogenetischen Pyämie sowie bei der nach einigen Infektionskrankheiten der Fraenkel-Weichselbaum'sche Pneumococcus eine wahrscheinlich bedeutende Rolle.

Da die durch ihn hervorgerufene innere Augenent-

¹⁾ cf. p. 55 Anm.

zündung bisher eine zusammenhängende Besprechung nicht gefunden hat, sei es gestattet, sie in einem besonderen Kapitel zu behandeln.

Pneumococcen-Ophthalmie.

Dass der Fraenkel-Weichselbaum'sche Pneumococcus weitverbreitet im Körper vorkommt, besonders auf den Schleimhäuten des Tract. resp. und seiner Nebenhöhlen und dass er in den verschiedensten Organen Entzündungen, auch eitriger Natur, hervorrufen kann, ist durch zahlreiche bacteriologische Untersuchungen dargethan. Auch ist man mehr und mehr zu der Auffassung gekommen, dass die sämtlichen lanzettförmigen Kapseldiplococcen, obwohl sie ja nach ihrem Aufenthaltsort etc. mancherlei Variationen besonders ihrer Impfwirkung, der Cultur etc. zeigen, doch alle zu der „Gruppe der Pneumococcen“ gehören dürften, z. B. die der Mundhöhle, Nase etc. In der umfassenden letzten Arbeit von Kruse und Pansini¹⁾ sind die bisherigen Fundorte zusammengestellt.

Es ist nun wahrscheinlich, dass die metastatische Ophthalmie wie andere Augenentzündungen durchaus nicht selten durch den *Diplococcus lanceolatus* veranlasst wird. Schon manche ältere mikroskopische Befunde erinnern morphologisch an ihn, z. B. einige von Deutschmann (Ueber die Ophthalmia migrator. 1899. p. 49 ff.).²⁾ Der erste vollständige Bericht über sein Vorkommen stammt von Fuchs³⁾, der in dem Eiter einer Influenza-Tenonitis den *Diplococcus lanceolatus* mit Sicherheit nachwies und züchtete. Ungefähr zu derselben Zeit brachte Hirschberg (Centralblatt) die Mittheilung, dass in einem verletzten

¹⁾ Zeitschrift für Hygiene XI, 1892. p. 279 ff.

²⁾ Der Befund Sattler's (17. Vers. d. ophth. Ges. in Heidelberg. 1885), der aus Thränensackeiter einen „dem Pneumococcus ähnlichen“ Kapselcoccus züchtete, bezieht sich, wie Herr Prof. S. mir gütigst mittheilte, auf den Friedlaender'schen Bacillus.

³⁾ Wiener klin. Wochenschr. 1890. Nr. 11.

Auge, welches wegen sympath. Ophthalmie des andern von ihm enucleirt wurde, im Berliner Institut für Infektionskrankheiten von Dr. Frosch der *Pneumococcus* anatomisch aufgefunden sei. Vor kurzem hat auch Guasparini (*Annali di Ottalmal.* XXII. 1893, p. 131) ihn aus eitrigem Hornhautgeschwüren und aus Thränensackeiter cultivirt, ferner experimentelle Impfungen beim Kaninchen vorgenommen. Analoge Ergebnisse bei *ulc. corn. serp.* infolge eitriges Dakryocystoblennorrhoe sind in letzter Zeit in der Marburger Klinik mehrfach erhoben worden. Im Innern des Auges, bei metastat. Ophthalmie im Anschluss an eine Pneumonie fand ihn Herrnheiser. Sein Fall sei kurz referirt:

67 jähriger Mann; 15 Tage nach Beginn einer Pneumonie beiders. Hypopyon, l. mit Panophthalmie und Hornhautulceration, die nach 8 Tagen breit perforierte; r. auffallend geringe entzündliche Erscheinungen trotz dichter Glaskörperinfiltration. Ex. let. am 26. Krankheitstage. Während des Lebens sonst keine Metastasen, keine deutliche Endocarditis, doch fanden sich bei der Section ausser der Pneumonie und den Ophthalmieen eine Endocard. valv. Aort. und eine eitrige Meningitis. In all diesen Herden durch Färbung kapselumgebene längliche Doppelcoccen, die sich nicht mehr cultivieren liessen. Von dem mikroskopischen Befund der hinteren Bulbusabschnitte sei hervorgehoben, dass in dem nicht perforierten Auge Stäbchen und Zapfen gut erhalten, aber durch eine Fibrinschicht von der Netzhaut vielfach abgehoben waren (ob das Auge noch etwas gesehen hat, ist nicht angegeben. Section ca. 36 St. nach dem Tode). Im Glaskörper zahlreiche, in der Chor. spärliche, im Sehnerven und in der Netzhaut keine Coccen. (cf. hierüber die Ausführungen auf S. 15). Da nicht angegeben ist, ob das ganze Auge mikroskopisch untersucht wurde, so ist nicht sicher zu entnehmen, ob die Ret. überall nur secundär inficirt war etc. Von Gefässermbolien findet sich nichts angegeben, solche fehlten übrigens auch in dem Fall, wo sich „Diplococcen“ fanden (Tab. I, 62).

In dem perforierten Auge ausserdem „andersgeformte Coccen und Bakterien“ (vielleicht zum Theil Involutionsformen?)

Wie ersichtlich, hat H. die Diagnose: Fränkel'scher *Pneumococcus* allein auf den mikroskopischen Befund hin

gestellt, ohne durch Cultur und Impfung seine Ansicht stützen zu können. Ist bei diesem Verfahren, wie H. selbst hervorhebt, die Deutung auch nicht mit der von der heutigen Bacteriologie sonst verlangten Methode möglich, so möchte ich doch ihm durchaus beistimmen, dass in dem vorliegenden Fall dieselbe einen hohen Grad von Sicherheit beanspruchen kann. In manchen Fällen ist das mikroskopische Verhalten des *Pneumococcus* so charakteristisch, dass eine Verwechslung mit den anderen Eitererregern (*Staphylococcen*, *Streptococcen* und den seltenen *Mikroc. tenuis*, *Mikr. tetragenus*, *Typhusbac.*, *Bact. coli comm.*, *Bac. pyog. foet.*, *Bac. pyocyaneus*.) — denn nur um diese handelt es sich hier für uns — nicht wohl möglich ist, auch ohne Cultur und Impfung.

Bekanntlich kann der *Diplococcus lanceolatus*, besonders in der Bouilloncultur, in Ketten auswachsen, deren Glieder rundliche Gestalt annehmen und den eigentlichen *Streptococcen* völlig gleich werden können (Kruse). Andererseits bildet der *Streptococcus*, besonders der *brevis*, sehr oft ganz kurze Ketten und Doppelformen, die aber rundliche Glieder zeigen. Kruse und Pansini (l. c. p. 336) kommen bei ihren ausgedehnten Untersuchungen aber nur zu dem praktischen Ergebniss, dass nicht in jedem Fall, wenn wir einem Mikroorganismus begegnen, der die morphologischen und Culturmerkmale des *Streptococcus pyogenes* trägt, wir denselben ohne weiteres als eine Varietät des letzteren auffassen dürfen, wie eine Reihe sicher von *Pneumococcus* abstammenden Varietäten unzweifelhaft beweisen. Dass umgekehrt aber die Variabilität des *Streptococcus pyogenes* so weit ginge, dass dieser ganz die morphologischen Eigenschaften des „typischen“ *Dipl. lanc.* annehmen kann, haben R. und P. nicht beobachtet, ebensowenig die anderen Untersucher. Auch sind diese hauptsächlich durch die Cultur gewonnenen Resultate nicht uneingeschränkt auf das anatomische Präparat zu übertragen.

Wo sich Pneumococcen züchten liessen, hat meines Wissens die controllirende anatom. Untersuchung des betr. Organs stets die charakteristischen Doppelcoccen ergeben.

Im menschlichen Körper, in der Lunge, den Meningen, dem Endocard, den Nieren etc. ist die Ausbildung längerer, dem Streptococcus gleicher Ketten, beim Pneumococcus bisher nicht beobachtet. Wohl finden sich fast stets einzelne kurze Ketten von 3 oder 4, selten 5 und 6 Gliedern. Dieselben sind auffallend plump, geradlinig, die einzelnen Glieder (da die Kettenbildung eine Degenerationserscheinung ist) meist ungleich, zum Theil länglich, zum Theil platt gedrückt, häufig stark vergrössert und fast nie gleichmässig rund, sondern eckig, mit stumpfen Kanten. Diese Involutionsformen, die auch bei der Doppelanordnung sich häufig finden, sind, besonders in Abscessen, oft sehr zahlreich. Durch Quellung, ebenso wie man es auf künstlichen, besonders feuchten Nährböden beobachtet, können die einzelnen Glieder bis 10 mal so gross werden als die Durchschnittsgrösse, sind dann theils rundlich, theils klumpig; ist nur eines der beiden einen Doppelcoccus bildenden Glieder so vergrössert, so sitzt manchmal das kleinere normalgrosse wie der Spross an einem Hefepilz, welcher letzteren die grösseren Involutionsformen in der That ähnlich werden können (cf. Abbildung 6). Wieder andere werden zu plumpen, kurzen Stäbchen; diese Degenerationsformen, die sich in den 4 von mir untersuchten Fällen von metastat. Pneumococconophthalmie regelmässig fanden, stimmen mit den Beschreibungen Kruse's überein und werden in solcher Mannigfaltigkeit bei den anderen Eitererregern wohl nicht so häufig beobachtet.

Als eigentlich characteristisch aber dürfen wir die nicht degenerirten lanzettförmigen Diplococcen ansehen, deren Form ja auch die Ursache ist, dass sie von C. Fränkel den Bacillen zugerechnet werden. Das unterscheidet sie von den anderen Eitercoccen selbst da, wo ihre Kapsel

sich nicht mehr deutlich darstellen lässt, also z. B. im Alkohol conservirten Präparat. Wo ein frisches Eiterpräparat möglich war, ist durch den Nachweis der Kapsel eine Verwechslung, wenigstens nach den bisherigen Erfahrungen, ausgeschlossen. Aber ebenso wie meist in künstlichen Nährmedien mit Ausnahme des Blutserums, verschwindet die Kapsel bei der Conservirung oder wird wenigstens undeutlich. Mitunter hat man an Stellen, wo die Diplococcen ausnahmsweise einmal dichtere Zoogloenmassen bilden, Gelegenheit, wenigstens noch zu erkennen, dass zwischen den einzelnen Doppelpococen sich noch ein Zwischenraum befindet, dass sie sich nicht so dicht berühren, wie wir es bei den Zoogloenmassen der Staphylococcen und Streptococcen beobachten. Auch erscheint bei Färbungen mit Carmin solche eine Diplococcenmasse oft aus zart rosa gefärbten Körnchen zusammengesetzt, die einzeln grösser sind, als die später nach Weigert intensiv gefärbten Mikroorganismen, ohne dass jedoch nach Hinzufügung der letzteren Methode eine deutliche Contrastfärbung zwischen Coccen und einer Kapsel zu Tage getreten wäre. (Die durch das Weigert'sche Verfahren oft herbeigeführte geringe Schrumpfung des Gewebes lässt einen sicheren Grössenvergleich mit dem einfachen Carminpräparat nicht zu.)

Allein selbst wenn keine Spur einer Kapsel mehr sichtbar ist, bleibt doch das ausschliessliche Vorkommen der lanzettförmigen Diplococcen (neben den beschriebenen Involutionenformen) genügend zur Diagnose. Durch die Freundlichkeit des Herrn Collegen Saxer war ich in der Lage, ausser meinen eigenen noch mikroskopische Präparate der verschiedensten, bacteriologisch zweifellosen Eiterungen (Phlegmonen, Meningitis, Lungen-, Nieren-Abscesse) zum Vergleich heranzuziehen. Niemals fanden sich in Streptococcenheerden, auch wo die Doppelform vorherrschte und nur ganz kurze Ketten vorlagen (*Str. brevis*) Bilder, welche eine Verwechslung mit dem *Dipl. lanceol.* möglich

gemacht hätten. Besonders beweisend aber war mir der Vergleich der beiden nur mikroskopisch als Pneumococcenophthalmieen angesprochenen Augen (Fall VI und IX) mit den Präparaten von Fall V und VIII, bei welchen letzteren in dem einen Fall durch Kapselfärbung, in dem anderen durch vollständige Cultur die Diagnose: Pneumococcen sichergestellt war. Die anatomischen Bilder der 4 Fälle, und nur diese, stimmten vollständig überein; die Annahme „Pneumococcen“ in den beiden nicht cultivirten Fällen wurde von den Herren Professoren Marchand und Fränkel bestätigt.

Finden wir also im mikroskopischen Präparat eines Eiterherdes, z. B. eines metastatischen, nur die kleinen lanzettförmigen nach Gram färbbaren Diplococcen mit ihren Involutionsformen, so können wir sie mit grösster Wahrscheinlichkeit als zur Gruppe des *Diplococcus lanceolatus*¹⁾ gehörig ansprechen, da bei solchem anatomischen Befund sich bisher nur Pneumococcen haben cultiviren lassen. Damit soll nicht behauptet werden, dass man bei einer Pneumococceneiterung solch ein Bild finden müsste und dass nicht auch in Fällen, wo dies typische Bild sich nicht findet, doch der Pn. vorliegt; ja trotz der Cultur und gleich-

¹⁾ Zu derselben ist wohl auch der bisher nur 1mal gefundene „*Diplococcus pyogenes*“ (Pasquale, Giornale med. del R. esercito etc. 1890) zu rechnen, der von den gewöhnlichen Pneumoc. sich nur durch das Fehlen der Kapsel und das Wachsthum auf Kartoffel unterschied. Derselbe wuchs nicht in Ketten aus. Ganz kürzlich hat Canon (Zur Aetiologie der Sepsis, Pyämie und Osteomyelitis, Zeitschrift f. Chir. XXXVII, 1893, p. 570) in einem Unterkieferabscess einen wahrscheinlich aus der Mundhöhle stammenden, dem Pneumoc. ähnlichen, nur etwas kleineren Kapseldiplococcus im mikroskop. Präparat gefunden, der sich aber nicht auf Agar cultiviren liess. Ob er deshalb nicht doch zur „Gruppe des Dipl. lanc.“ gehörte, wage ich nicht zu entscheiden; ein negativer Culturversuch scheint einige Zeit nach dem Tode auch bei Pneumococcen nicht ausgeschlossen.

zeitiger, anatomischer Untersuchung kann die Differentialdiagnose Schwierigkeiten machen (cf. Fall XI). (Kruse und Pansini sind wegen der mannigfachen derartigen Uebergänge sogar geneigt, die gesammten Streptococcen und Pneumococcen als Gruppen einer grossen Hauptart anzusehen.)

Schon das Wachsthum des Pneumococcus auf künstlichen Nährböden, seine meist schnell vergehende Uebertragbarkeit sind nicht immer ganz die gleichen; in besonders mannigfaltiger Weise aber kann bekanntlich seine Virulenz schwanken und damit die Art und der Grad der von ihm verursachten so mannigfachen pathologischen Veränderungen, die in den einschlägigen bekannten Arbeiten von A. Fränkel, Weichselbaum, Foa, Bordone-Uffreduzzi etc. nachzulesen sind (cf. die Literatur-Zusammenstellung von Kruse-Pansini). Wir können danach fürs Auge erwarten, dass auch hier sich Intensitätsunterschiede ergaben. Es sind zwar auch die Staphylococcen und Streptococcen nicht immer Eitererreger; in seltenen Fällen sind auch seröse Entzündungen von ihnen verursacht worden (cf. u. a. Jordan, die acute Osteomyelitis etc. Beiträge zur klin. Chirurgie 1893, Bd. X, No. 3, p. 587). Aber ihre pyogene Natur ist doch die vorherrschende Regel und Ausnahmen ungewöhnlich, während der Dipl. lanceol. häufig auch serös-plastische Entzündungen z. B. in den Gelenken, auf den serösen Häuten zu verursachen scheint. Ich bin deshalb nicht der Ansicht Herrnheiser's (l. c. p. 120), dass der Pneumoc. für's Auge an Virulenz auf gleicher Stufe stehe mit dem Staph. aur. Es giebt Fälle, wo der Pneumoc. viel bösartigere und schnellere Panophthalmie nach Injection minimaler Mengen in den Glaskörper setzt (in 24 St. Perforation mit tödtlicher allg. Infection bei frisch virulenten Culturen von einer Meningitis), als man sie mit der gleichen Menge Staph. aur. erreichen kann, aber auch viel weniger infectiöse.

Als Erreger pyämischer Zustände wird nun der

Pneumococcus nicht nur bei denjenigen Fällen gefunden, welche sich an ein Lungenleiden anschliessen, sondern besonders auch bei den kryptogenetischen Formen. Immer grösser wird die Bedeutung, die ihnen als der Ursache der „ulcerösen Endocarditis“, endogener Gelenkeiterungen etc. zugesprochen wird. Die folgenden beiden Fälle sind solche occulten Pyämieen mit metastat. Ophthalmie.

Fall V.

26. VII. 93. Frau S., 48 Jahre alt aus Fritzlar.

Doppelseitige metastatische eitrige Ophthalmie bei kryptogenetischer Pyämie nach Cholelithiasis ohne Leberabscesse. Endocarditis ulcerosa, Meningitis suppurativa metastatica, multiple Abscesse in der Gehirnschubstanz. Fränkel-Weichselbaum'scher Pneumococcus.

Krankengeschichte:

Anamnese: Schon als Mädchen Schmerzanfälle in der Magengegend. Menses früher normal, zuletzt irregulär. 6 Partus, 1 mal schwer. Im Januar 1890 und Ostern 90 je 1 Anfall äusserst heftiger Schmerzen in der Magengrube, besonders nach dem Rücken zu. Im Anfall Erbrechen, 1 mal mit ziemlich viel Blut. Am 26. VII. 90 Consultation bei Herrn Geheimrath Mannkopf: „Bis jetzt keine Gelbsucht. Diagnose: Ulcus simplex ventriculi, wohl vernarbt. Mässig anämisch neurasthenischer Zustand.“ Am 4. VII. 90 erneuter Schmerzanfall wie früher, doch mit folgender Gelbsucht und tonfarbenem Stuhlfgang, dunkelgrünem Urin. Die Anfälle wiederholten sich dann von Zeit zu Zeit, dauerten 2 Tage bis 2 Wochen, die beschwerdefreien Zwischenräume einige Wochen bis $\frac{1}{2}$ Jahr. Seit etwa 1 Jahr ist die Haut auch in der Zeit zwischen den Anfällen zwar weniger gefärbt gewesen, aber doch immer gelb geblieben, P. hat meist schlechten Appetit, übelriechenden Athem, Obstipation abwechselnd mit Diarrhö, starkes Hautjucken, dunkeln Urin.

Vor ca. 1 Monat ein rel. leichter Anfall; derselbe liess etwas nach, war aber noch nicht verschwunden, als vor etwa 14 Tagen ein neuer, sehr starker hinzukam, der mit besonders starken Schmerzen in den Schläfen und stärkerem „Fieber“, häufigem Schüttelfrost einherging. Auch diesmal häufiges Erbrechen von galligem Schleim. Die ganzen Erscheinungen, die zwar ausser-

gewöhnlich stark waren, aber sonst den während der früheren Anfälle beobachteten glichen, waren bereits in Abnahme begriffen, als am 22. VII. das l. Auge stärkere Injection und Schwellung der Bindehaut unter rapider Abnahme der Sehschärfe zeigte. Seit 1 bis 2 Tagen ist es stärker vorgetrieben und kann spontan weder geöffnet noch bewegt werden. Seit gestern analoge Veränderungen r.; bis zum Mittag des 25. VII. will P. noch gut gesehen haben; dann plötzlicher Schmerz im r. Auge. Ihre Angehörigen sagten ihr, das Weiße am Auge sei ganz roth. Bald hat sich ein immer dichter Schleier vors Auge gelegt, am Abend konnte schon das Nachtlcht nicht mehr erkannt werden. P. giebt bestimmt an, dass das Sehen sich allseitig gleichmässig verschlechterte, ein umschriebener Gesichtsfelddefect ist ihr nicht aufgefallen. P. war bisher zwar sehr elend, aber nicht benommen, kommt zu Fuss die Treppe herauf, giebt klare und ausführliche Antworten.

Stat. präs. Kleine schlank gebaute, elende Frau. Farbe der Haut überall icterisch, zahlreiche oberflächliche Kratzeffekte. Leichter Oedem der Haut über der Tibia.

Sensorium frei, Nervensystem intact. Höhere Sinnesorgane excl. Augen normal.

Tract. respir u. urogenital normal.

Cor.: Puls 110 bis 120, elend, regelmässig. Percutt. nichts Abnormes; an allen Klappen nach dem 1. Ton ein lautes, blasendes, weiches Geräusch mit dem Punct. max. über der Pulmon. und am l. 2. Rippenknorpel. Rhythmus und Stärke der Töne nicht besonders verändert.

Tract. aliment. Magengrenzen nicht vergrössert. In der Mitte des Epigastriums starke Druckempfindlichkeit, die sich nach r. bis zum Ende der Rippenknorpel fortsetzt. Hier unbestimmte Resistenz in der Tiefe. Leberdämpfung über 3 Fingerbreit unter den Rippenrand reichend, in der Mittellinie zwischen mittlerem und unterem Drittel zwischen Basis des proc. xiphoidei und Nabel. Leberwand fühlbar, stumpf, ohne Höcker und Einkerbungen. Uebriges Abdomen weich, nicht empfindlich. Milz vergrössert, unter dem l. Rippenrand deutlich fühlbar.

Albumen: Opalescenz. Gmelin'sche Gallenfarbstoffprobe positiv. Urin bräunlichgrün.

Augen: l. starkes Oedem der Leber, Ptosis, grünlichgelbe Chemose und Protrusion des Bulbus, der sehr hart und unbe-

weglich ist. Hornhautepithel glatt. Brechende Medien diffus gelblich, Iris missfarben und etwas geschwollen, hint. Synechien. Ophthalmosk. nichts zu sehen. Amaurose. Vord. Augenabschnitt trotz der schon eingetretenen Panophth. weniger stark verändert als r.

r. analoger Zustand im Beginn. Glasige, durch Gallenfarbstoff chromgelbe Chemose, diffus rauchige, gelbe Trübung der Medien. Hochgradige Verfärbung der Iris, einzelne hintere Synechien, die sich auf Atropin grossenteils lösen. Kleines weissliches Hypopyon. Aus der Tiefe gelblicher Schein, sonst kein Reflex. Nur central und nach unten noch grösste Lampe, Projection dabei nur nach unten. 27. VII. morgens. Diagnose des Herrn Geheimrath Mannkopf: „Wahrscheinlich Leberabscess mit folgender Pyämie im Anschluss an Cholelithiasis. Endocarditis z. Z. nicht wahrscheinlich, da die Stärke des 1. Tons rel. wenig herabgesetzt ist, secundäre Veränderungen fehlen. Die augenblicklich vorliegenden Allgemeinsymptome können nicht als besonders schwere gelten.“

27. VII. 11 Uhr vormittags: Plötzlich sehr heftiger Schmerz im Kopf, Nacken und entlang der Wirbelsäule. Innerhalb $\frac{1}{4}$ Stunde stellen sich ein: starke Benommenheit, kurze krampfartige Zuckungen in Händen, Füssen, Gesicht, mitunter Zähne klappern, Trismus. Facies Hippocratica, Cheyne-Stoke'sches Phänomen. Temperatur (bis dahin 38,6) steigt auf 41°, Puls 126 bis 136.

Am r. Auge ebenfalls beginnende Protrusion. Auch jetzt noch gelbliche Trübung des Kammerwassers und der Iris r. stärker als l.

Im Blut (Deckglaspräparat) sehr vereinzelte Coccenhäufchen mit z. Th. länglichen Gliedern, aber ohne deutliche Kapsel. An einer Stelle ein länglicher Diplococcus.

In den nächsten beiden Tagen vorübergehende geringe Besserung der meningealen Erscheinungen, dann Verschlimmerung.

30. VII. r. Nochmalige Deckglasuntersuchung des Blutes giebt keinen sicheren Befund; die bacterische Impfung gab auf allen Röhrchen einzelne weisse Staphylococcen; doch wahrscheinlich nur Verunreinigung.

Keine auf Endocarditis sicher hinweisenden Erscheinungen. 1. VII. Starke Nackensteifigkeit, häufiges Schreien, Delirien. Hyperästhesie der Arme besonders der l., ohne locale Gelenkveränderungen. Blutuntersuchung: Färbung und Impfung von gleichem Ergebniss wie am 30. VII.

Im Laufe des Tages Zeichen einer schlaffen Hemiplegia sinistra mit gleichzeitiger Störung der Sensibilität; auch der r. Facialis scheint paretisch.

2. VIII. Temperatur seit Beginn der Meningitis schwankend zwischen 40,6 und 38,8, mit Morgenremissionen; Puls zwischen 152 und 96. Athmung jetzt nicht mehr stockend, sondern beschleunigt, durchschnittlich 50 bis 60 in der Minute.

Augen: r. Stat id. l. unten aussen oberflächlich Hornhautgeschwür. 3. VIII. Cor. ohne neue Veränderungen. Nachmitt. 5 Uhr exitus lethalis.

3¹/₂ St. später Enucleation beider Bulbi; dabei findet sich l. unter der Sehne des rect. ext. bereits eine Perforation, auch gegenüber bildet sich eine Oeffnung, aus beiden entleert sich dicker, etwas grünlicher Eiter. Das r. Auge wird unverletzt herausgeschält, beiderseits. Enucleation wegen der Tenonitis schwierig.

Aus dem Perforationseiter des l. und durch eine feine Punctionsöffnung auch aus dem Glaskörper des r. Auges werden je 4 Glycerinagarculturen angelegt. Brütöfen.

Auf den vom l. Auge angelegten Röhrechen wuchsen als Verunreinigungen neben kleinen, glashellen, tröpfchenförmigen Colonien eine Anzahl Staphylococcen, r. dagegen nur die kleinen glashellen Tröpfchen, die mikroskopisch als lanzettförmige kapsellose Diplococcen ohne Eigenbewegung erschienen, nur in Brüttemperatur aber nicht im gewöhnlichen Gelatinestich gediehen, in Bouillon zu sehr langen, ungelenken und z. Th. sehr unregelmässig gewundenen Ketten auswuchsen, deren Glieder vielfach ungleichmässig, meist etwas stumpfkantig und durchschnittlich grösser waren als die Diplococcen von der Agarcultur. Am 3. Tage vorgenommene Hornhautimpfungen ergaben keinerlei Reaction, ebensowenig gelang es mit der beschriebenen Bouillon locale oder allgemeine Erscheinungen (subeutane Inj.) zu erzielen. Am 4. bis 5. Tag waren die Colonien zu einem unsichtbaren, glashellen Belag zusammengeflossen, nicht mehr übertragbar, die einzelnen Individuen bereits sehr spärlich und degeneriert. Die Coccen färben sich nach Gram.

Im Eiterstrichpräparat beider Augen nur in grösserer Zahl dieselben Diplococcen, mehrfach in den Eiterzellen, überall mit deutlicher Kapsel. Nirgends längere Ketten. Diagnose: Pneumococcen.

Dieselben Ergebnisse hatten im pathologischen Institut aus dem meningalen Eiter angelegte Culturen, in denen nur Reinculturen der Diplococcen wuchsen.

Auszug aus dem Sectionsprotokoll.

Section 4. VIII. 93. Vorm. $\frac{3}{4}$ 11 Uhr. (Prof. Marchand.):

Endocarditis ulcerosa valvulae Aortae, Meningitis metastatica purulenta et Abscessus multipl. cerebri, Ophthalmia metastatica duplex, Dilatatio duct. choledoch, cyst., vesicae felleae etc. ex concrement., cicatrices hepatis inveterat., Icterus.

Herz, Leber und Gehirn seien genauer beschrieben; die Eintrittspforte der Pyämie liess sich nicht finden. Die nicht näher geschilderten Organe waren frei von Metastasen etc.

An der hinteren Aortenklappe unterhalb des nodul. Arantii beginnend und sich beiderseits unter die lunulae fortsetzend eine Hervorragung von über 1 cm Länge und 3—4 mm Höhe und ungefähr ebensoviel Dicke vorhanden ist, welche etwas höckrig, fleckig, theils dunkelrot theils blass-gelblich-grau gefärbt ist. Von der Oberfläche lassen sich noch zarte augenscheinlich fibrinöse Beschläge abziehen, wonach die etwas höckrige, hellere ziemlich mürbe Masse zum Vorschein kommt. Die Klappe ist an dieser Stelle etwas gegen den Ventrikel ausgebuchtet.

Zwischen Gallenblase und colon transversum spannt sich eine ziemlich schlaaffe ligamentöse Verwachsung aus, die zum Theil dem Netz angehört. Gallenblase klein, schlaff, wenig gefüllt. Am Hals derselben ist ein Stein fühlbar. Im Duodenum etwas hellgelber deutlich gallig gefärbter Inhalt; Duct. choled. vollständig durchgängig, oberhalb desselben sitzt ein eckiger Stein von etwa Kirschgrösse, vollständig lose. Ductus choledochus ebenso wie Duct. cyst. und Duct. hep. ziemlich stark und gleichmässig erweitert. Duct. choled. nach dem Aufschneiden $3\frac{1}{2}$ cm, Duct. cyst. sehr kurz und so weich, dass er ohne deutliche Grenzen in die Gallenblase übergeht. Duct. cyst. ist an der Innenfläche besonders an dem Uebergangstheil mit stark strahligen Narben besetzt; eine ähnliche Narbe findet sich auch an der Gallenblase selbst. An der Uebergangsstelle in den Duct. cyst. findet sich ebenfalls ein lose liegender Stein. Zwei ähnliche

Steine finden sich in den Endtheilen des Duct. hep., ebenfalls locker.

Leber 26 cm breit, rechter Lappen 18 cm hoch, verhältnissmässig dünn, flach, circa 6—7 cm dick. Consistenz auffallend schlaff, Farbe etwas fleckig, röthlich-gelbbraun. Auf dem Durchschnitt Gallengänge erweitert, z. Th. mit gelber Flüssigkeit gefüllt. Entsprechend einer Einziehung an der Oberfläche finden sich in der Umgebung und im Anschluss an die erweiterten Gallengänge einige fibröse weissliche Züge, deutlich bindegewebige Verdichtungen mit spärlichen Residuen von Leberparenchym. In den übrigen Theilen der Leber ist die acinöse Zeichnung meist sehr deutlich, die centralen Theile der Läppchen an einigen Stellen geröthet, meist sehr deutlich icterisch gefärbt; nirgends eitrige Infiltration.

An dem oberen Rand des linken Stirnlappens dicht an der Mittellinie kommen mehrere etwas prominente, intensiv gelbe Infiltrate zum Vorschein, welche auf dem Durchschnitt sich scharf von der Gehirnoberfläche abheben.

An der Basis findet sich bei der Herausnahme des Gehirns eine sehr ausgedehnte eitrige Infiltration von grünlich-gelber Farbe, hauptsächlich die Gegend zwischen den Schläfenlappen in der Gegend des Chiasma und der Hirnschädel ferner die Oberfläche des pons, der medulla oblongata und der Kleinhirnhemisphaeren einnehmend.

Der Eiter setzt sich besonders in die linke fossa Sylvii nach der Convexität hin fort, sehr viel weniger auch in die rechte fiss. Sylvii. Ebenso umgiebt dieselbe nach abwärts das Halsmark, soweit dasselbe von oben her zu übersehen ist. Aehnliche gelbe Exsudatmassen finden sich in der Umgebung der austretenden Hirnnerven, namentlich an beiden Trigemini, deren Substanz ebenfalls eitrig infiltriert ist, besonders im Bereich des Ganglion Gasseri.

Die Gehirnsubstanz unten z. Th. bereits stark erweicht, gelblich gefärbt. Im hinteren Theil des l. Scheitellapens sitzt nahe der Oberfläche, jedoch die Pia nirgends erreichend eine mit grünlich gelbem Eiter gefüllte Höhle von Kirschengrösse, ziemlich scharf von der Umgebung abgegrenzt. Letztere ist gelblich infiltriert. Ein ähnlicher kleinerer Heerd sitzt in der r. Hemisphäre etwas weiter nach vorn, ebenfalls unter der grauen Substanz. Sodann findet sich an einer andern Stelle rechts ein kleiner rother hämorrh. Heerd von Hanfkorngrösse, ein zweiter etwas grösserer ebenfalls mehr rechts nach hinten.

Mikroskopische Untersuchung der Augen:

Beide Augen wurden in 95% Alkohol conserviert und nach etwa 10 Tagen horizontal getheilt, vollständig in Celloidin gebettet und in Schnitte zerlegt. Die den Opticus enthaltenden Schnitte kamen fast vollzählig, von den übrigen jeder 3. bis 4. Schnitt zur mikroskopischen Untersuchung, mit der Ueberlegung, falls nothwendig, auch die Dazwischenliegenden noch nachzusehen, was aber nicht erforderlich schien. Im ganzen gelangten etwa 300—400 Totalschnitte aus allen Schichten zur Untersuchung. Färbung mit Hämatoxylin-Eosin, Picrocarmin, nach Gram, Weigert, Kühne, Löffler, mit Carbolfuchsin und Sahli's Boraxmethylenblau.

L. Cornea vielfach von Epithel entblösst. Beginnender peripherer Ringabscess der vorderen Schichten. Die tieferen Hornhautpartieen (ebenso die der Sclera) haben sich mit Eosin stärker gefärbt, als die oberflächlichen, bleiben auch bei Weigert'scher Fibrinfärbung intensiv violett, sind also wohl diffus von einem fibrinartigen Stoff durchtränkt. (Es macht den Eindruck, als sei derselbe oberflächlich vom Alkohol schon extrahiert.) Am Rande der Cornea in der stark infiltrierten und geschwellten Conj. bulbi grosse blasige jetzt ganz leere endothelausgekleidete Räume (Lymphräume?)

Vord. Kammer in der bekannten Weise von fein granulierter Masse gefüllt, in ihren tieferen Theilen ein dichtes, zellarmes, die Iris überziehendes Fibrinnetz. Iris selbst im Zustand mässiger Entzündung, ohne eigene eitrigen Veränderungen, doch ausgedehnt mit der Linsenkapsel verwachsen. Hintere Kammer von zellarmen, fibrinreichen Exsudat gefüllt. Linse intakt, Kern mit Anilinfarben und Hämatoxylin stärker gefärbt. Epithel der stark hyperämischen und infiltrirten Ciliarfortsätze vielfach desquamierend. In das benachbarte Glaskörperexsudat haben sich von hier aus bereits junge Gefässe und Bindegewebszüge (Granulationsgewebe) entwickelt. Glaskörper von einem dichten, nach Weigert'scher Methode intensiv färbbaren Fibrinnetz durchsetzt, welches peripher die bekannten unregelmässigen Maschen zeigt; central dagegen sind die einzelnen Fasern ungewöhnlich kurz und stumpf, vielfach stern- und garbenförmig, z. Th. in Rosetten oder auch in unregelmässigen Haufen angeordnet, zwischen denen zahlreiche grössere und kleinere Bröckel liegen; gerade die letzteren geben die intensivste Fibrinfärbung; doch bleibt das Centrum der Rosetten bei Vortärbung mit Carmin roth, und zwar

deshalb, weil dasselbe meist von einer andersartigen homogen kugligen Masse gebildet wird. Solche Klümpchen finden sich vielfach auch isoliert, besonders auch zwischen den Fibrinmaschen in der Peripherie. Sie sehen hier und da ganz wie Zellen aus, doch ist mit Hämatoxylin nachweisbar, dass sie eines Kernes entbehren und demnach nur eigenthümlich gleichmässig geronnene Massen darstellen. Ausserdem, besonders in der Peripherie des Glaskörpers massenhafte, meist mehrkernige, reihenweise Rundzellen, vielfach zerfallen; ferner reichlich Kernfragmente, die z. Th. wieder von andern Rundzellen aufgenommen sind und hier vielfach ein coccenähnliches Aussehen haben, zumal sie Anilinfarben besonders intensiv aufnehmen. Der Glaskörper ist von der Netzhaut durch entzündliche Massen flach abgedrängt. Am reichlichsten ist seine Infiltration vorn an der Ora serrata und hinter der Linse.

Netzhaut in der Gegend der beiden Perforationen am rect. ext. und int. in grosser Ausdehnung total zerfallen; sie ist überhaupt von sämmtlichen Augenhäuten am stärksten lädiert. Einzelne Bruchstücke der Ret. liegen hier in Eiter eingebettet, der grösstentheils von der Chor. herstammt. Ausserdem zeigt die Netzhaut zu beiden Seiten der Papille noch je einen umschriebenen Heerd, in welchem nur sie eitrig zerfallen ist. Der Eiter ergiesst sich von hier in den subretinalen Raum und zu beiden Seiten unter das präretinale Fibrinnetz, dieses arkadenförmig vordrängend, indem dasselbe mit den Gefässen der Retina in festem Zusammenhang bleibt. Handelt es sich hier sicher um primär eitriges Retinitis, so ist doch im Bereich der Perforationen nicht mehr festzustellen, ob hier nicht auch die Chorioidea für sich septisch inficirt wurde. Dieselbe ist in der Umgebung der Perforationen ebenfalls total vereitert und mächtig infiltrirt, auch ist die Glashaut hier zerstört. Sonst ist die Chor. im allgemeinen nur mässig zellig infiltrirt, zeigt nur vereinzelt noch dichtere umschriebene Zellheerde der inneren Schichten, welche die Glashaut vordrängen und sich gegen die wenig veränderte Schicht der grösseren Gefässe durch eine feine Membran ziemlich scharf abgrenzen.

In der noch vorhandenen Netzhaut, die z. Th. stark gelockert ist, vielfach zwischen den verdickten Stützfasern Knäule von Fibrin. Neuroepithel in der bei Weiershäuser, Löwe etc. geschilderten Weise zerfallen; hier und da noch feine radiäre Strichelung durch zierliche Fibrinfädchen. Trotz des Zerfalls der einzelnen Elemente stellt die Stäbchen-Zapfenschicht doch noch

eine Schicht für sich dar, welche von der Körnerschicht meist sich getrennt hat. Die myelinartigen Bildungen haben sich hier und da zu eigenthümlich baumartig verzweigten Figuren zusammengelegt, die in der Nähe der Perforationen auch isoliert zwischen den Eiterzellen liegen (cf. Fig. 2, Taf. I). Limitans ext. fast nirgends zu erkennen, äussere Körner infolgedessen vielfach unregelmässig vorgefallen. Einzelne Heerde ganglionärer Nervenfasern. Pigmentepithelien vielfach abgestossen, entfärbt, mächtig vergrössert. An einzelnen Stellen liegen solche farblose, sehr grosse runde Zellen heerdförmig unter der Netzhaut. Dazwischen freies Pigment. Papille prominent, Opticus und seine Scheiden weiter hinten normal.

Von dem eben geschilderten Befund der Gegend des horizontalen Meridians weichen die durch die obere und untere Hälfte exaceretisch gelegten Schnitte nur insofern ab, als auf einigen die Veränderungen in der Chor., auf andern die der Retina stärker sind. Jedenfalls bestehen mehrere selbständige metastat. Heerde in der Netzhaut, ob in der Chor. ist nicht zu entscheiden.

Das später erkrankte rechte Auge zeigt analoge Veränderungen wie das l., nur weniger hochgradig. Die Beschreibung kann sich deshalb auf Chor. und Ret. beschränken. Die Netzhaut ist zu beiden Seiten hinter der Ora serrata in einer Breite von je 3 mm total vereitert, die Eiterzellen ergiessen sich frei in den Glaskörper und subret. Raum, in welchem sie sich etwa 7 mm weit fortsetzen. Die Chor. ist auf der einen Seite in gleicher Ausdehnung und an gleicher Stelle wie die Netzhaut ebenfalls eitrig zerfallen, abgesehen von der besser erhaltenen Schicht der grossen Gefässe und der Suprachor., d. Chor.-Eiter geht in den Glaskörper ohne Grenze über. Weiter hinten aber ist die Chor. nur mässig diffus in ihren inneren Schichten infiltriert. Auf der gegenüberliegenden Seite ist die Glashaut zwar vorgedrängt, aber noch völlig erhalten. Zu beiden Seiten der Papille ist auch in diesem Auge die Netzhaut heerdförmig vereitert; Gefässe sind in diesen sicher auf endogenem Wege inficirt und eitrig geschmolzenen Stellen überhaupt nicht zu finden.

Jedenfalls besteht in mehreren von einander getrennten Heerden primäre metastatische Retinitis, doch ist für die eine vorgelegene Stelle fraglich, ob nicht auch die Chorioidea für sich inficirt wurde (cf. Fig. 3, Taf. I). Die Färbung der Mikroorganismen bot grosse Schwierigkeiten. Einfache

Anilinfarben (Methylenblau, Fuchsin) gaben gute Structurbilder aber gar keine Coccen. Carbofuchsin, welches Kahlden (Leitfaden der Histologie 1893) für Pneumococcen so sehr empfiehlt, gab selbst nach $\frac{1}{2}$ stündigem Färben im Brütöfen nur vereinzelte, ganz undeutliche Diplococcen, liess die allermeisten ungefärbt; dasselbe gilt für das von Klebs (Lehrbuch der pathol. Anatomie 1892) gerühmte Sahli'sche Boraxmethylenblau, ferner die Löffler'sche „Universalmethode“, die hier nach langdauernder Brütöfenfärbung fast ganz negativ blieb. Auch die Kühne'sche Methode, die Herr College London im hygienischen Institut vorzunehmen die Freundlichkeit hatte, blieb gänzlich resultatlos.

Die einzigen einigermaassen brauchbaren Bilder lieferte die Gram'sche und Weigert'sche Methode, aber nur in einer kleinen Anzahl von Schnitten. Obwohl ich über 3 Wochen ausschliesslich fast mich abmühte, gute Färbungen zu erhalten, bin ich doch nicht einmal dahin gekommen, eine bestimmte Zeit für die verschiedenen Flüssigkeiten herauszufinden, bei deren Innehaltung rel. gute Färbung zu erwarten war, und es war mehr ein unberechenbares Glück, wenn sich Coccen färbten. Durch Vergleich verschiedener Präparate liess sich schliesslich feststellen, dass ausschliesslich die kleinen lanzettförmigen Diplococcen in ausserordentlicher Massenhaftigkeit locker zwischen den Eiterzellen lagen, besonders auch in den Zellen; sie fanden sich vor und in der Netzhaut neben der Papilla, auch im Choroidea dort, wo er mit dem der Ret. und dem Glask. frei communicierte. Innerhalb von Gefässen wurden keine gesehen, doch gestattet die mangelhafte Färbung keinen sicheren Schluss bezüglich einzelner Coccen. Nur so viel lässt sich sagen, dass Gefässverstopfungen, Coccen-Embolien nicht vorhanden waren, da diese sich auch mit Hämatoxylin sicher erkennen lassen, wie mich Präparate von Lungen- und Nierenmetastasen des Pneumococcus lehrten. Nirgends waren dichtere Coccenhäufen, nirgends längere Ketten; Involutionsformen waren spärlich. Ich möchte noch hervorheben, dass auch hier es bei der Gram'schen Färbung nützlich erschien, die Carminverfärbung etwas kräftig zu nehmen. Der bacteriol. Befund stimmte vollkommen überein mit dem bei Fall VI, Fall VIII und IX erhobenen.

Besondere Besprechung verdient noch das Verhalten der Gefässe. Dieselben sind in beiden Netzhäuten, ganz analog wie bei Fall VI, grösstentheils verlegt und zwar besonders die der Netzhaut. Nur ein kleiner Theil der Ret. Gefässe kann noch

Blut enthalten haben; Venen und Arterien verhalten sich etwas verschieden. Während in vielen Venen, bes. der grossen Papillenvene, ferner der Centralvene bis hinter die Lamina crib. massenhafte Rundzellen zwischen gequollenen und abgelösten Endothelien liegen und die Wand durchsetzen, auch vielfach noch netzförmiges Fibrin vorliegt, tritt in der Mehrzahl der Arterien, soweit sie sich noch von den Venen unterscheiden lassen, die Endothelwucherung und eigentliche Organisation in den Vordergrund. Die Arterienveränderung überschreitet nicht den Entzündungsheerd resp. die Eiterung hört an der Lamina cribrosa auf, während die Vene bis etwa 5 mm hinter dieser entzündliche Infiltration zeigt. Venen und Arterien zeigen vielfach stark homogene gequollene Media, ohne Muskelstructur bei den Art., die sich nur durch stärkere Dicke alsdann noch unterscheiden. Vielfach nimmt diese gequollene Media intensive Fibrinfärbung an, welche noch eine feine concentrische Schichtung erkennen lässt; es scheint hyalines Fibrin vorzuliegen. Einige grössere Venen der Papille weichen von dem Geschilderten insofern ab, als sie von einem zellarmen, „weissen Thrombus“ verlegt sind, der an manchen Stellen feine Spalten, sowie junge Bindegewebszellen erkennen lässt. Diese „weissen“ Thromben finden sich vornehmlich in dem bereits perforirten Bulbus; sind jedenfalls etwas älteren Datums, lassen keine Blutplättchen mehr erkennen.

Demgegenüber verhalten sich die Chor.-Gefässe etwas anders: Wohl sind in ihrem Lumen vielfach massenhafte Rundzellen, ihre Wand ist dicht infiltrirt, manche Gefässe ganz verdeckt. Allein die Mehrzahl speciell der grösseren Gefässe ist noch bluthaltig, ohne reichlicheres Fibrin; es liegt das gewöhnliche Bild der eitrigen Entzündung vor mit erheblich stärkerer Zellauswanderung und Exsudatbildung, aber bei weitem geringerer Obliteration der Gefässe, als sie in der Netzhaut sich findet.

Obwohl Leberabscesse in dem beschriebenen Falle sich nicht fanden, ist die Cholelithiasis doch der wahrscheinlichste Ausgangspunkt. Leider sind aus dem Inhalt der Gallenblase etc. Culturen nicht angelegt worden. Ueber Cholelithiasis als Ursache von Pyämie finden sich bei Canon (l. c. p. 509) genauere Angaben; er selbst und Bozzollo haben ebenfalls Pneumococcen nachgewiesen, die demnach gerade hier nichts Ungewöhnliches darzustellen

scheinen, aber bisher, wie auch die anderen pyogenen Mikroorganismen nur von deutlichen Gallengangabscessen aus eine so schwere Allgemeininfektion hervorriefen (auch *Bac. Friedl.*, *Staph. aur.*, *Bact. coli comm.*).

Es sei ferner noch hervorgehoben, dass die beiden Augenmetastasen jedenfalls den GehirneMBOLIEEN um mehrere Tage vorausgingen, also eine Zeitlang die einzige Metastase darstellten. Es weist schliesslich der Vergleich des klinischen Befundes der beiden Augen darauf hin, dass doch in dem Grade der entzündlichen Erscheinungen am vorderen Bulbusabschnitt längere Zeit ziemlich bedeutende Unterschiede sich finden können, ohne dass daraus über den Sitz der Embolie weiter vorn oder mehr in der Tiefe ein sicherer Schluss sich ziehen lässt, wenn man nicht, wie Herrnhaiser, in der glücklichen Lage ist, durch ophthalmoskopische Untersuchung die relativ geringe Beteiligung der tieferen Theile nachzuweisen. Besonders bei nicht ganz gleichaltrigen doppelseitigen metastat. Ophthalmieen scheint Vorsicht geboten. Darin, dass die Endocarditis sich der Diagnose intra vitam entzog, stimmt der Fall mit dem nächstfolgenden überein.

Fall VI.

Doppelseitige eitrige metastatische Ophthalmie bei kryptogenetischer Pyämie (nach „Erkältung“). Endocarditis ulc. val. tric., multiple Metastasen in den Gelenken und inneren Organen, Gehirn frei. Fränkel-Weichselbaum'sche Pneumococcen.

Loewe, Konrad. 58 Jahre alter Schulmacher aus Weidenhausen, Kr. Marburg.

28. Sept. 1884. Aufnahme in die medic. Klinik.

Anamnese: Keine hereditäre Belastung. Pat. hat 1884 längere Zeit an Typhus abdom. gelegen, war seitdem stets gesund und kräftig. Pat. hat sich am 2. Sept. d. J. beim Anmachen des Sedanfeuers starken Durchnässungen ausgesetzt, fühlte sich denselben Abend schon unwohl, verrichtete aber in den nächsten Tagen noch seine Arbeit. Am 7. Sept. plötzlich

starkes Mattigkeitsgefühl, Schwere der Glieder, totale Heiserkeit. Letztere verschwand im Lauf des Tages wieder. Keine subjectiven Fiebererscheinungen zuerst. Bald stellten sich mässige Leibschmerzen und Tenesmus ein; als diese auf Calomel zurückgingen, kam Durchfall, der trotz Decoct. Colombo bis zur Aufnahme anhielt. Vor 5 Tagen hatte der dünnflüssige Stuhl einmal schwarze Färbung. Pat. verlor den Appetit, mochte nur Flüssigkeiten geniessen, magerte schnell ab. Ganz geringer Husten. In den letzten Tagen öfteres starkes Hitzegefühl.

Stat. praes. (Geheimrath Mannkopff).

Nervensystem:

Schlaf schlecht und durch Delirien gestört. Sensorium augenblicklich frei. Höhere Sinnesorgane intact. Mit Ausnahme grosser allg. Schwäche keine nervöse Anomalie.

Thorax: In den unteren Particeen etwas raubes Vesiculärathmen mit vereinzeltem trockenem Brummen, Expirium etwas verlängert. Husten mit schleimigetrigem Sputum.

Circulation: Spitzenstoss mit Deutlichkeit weder sichtbar noch fühlbar. Tiefe und oberflächliche Herzdämpfung nicht vergrössert. Töne über allen Klappenapparaten nur leise, aber von normalem Rhythmus. Nirgends Geräusche. Puls klein, 108. Arterienrohr etwas rigide und geschlängelt. Temper. 39,1.

Tract. Digest: In der Gegend der Flex. sign. etwas Gargonillement. Leber und Milz nicht vergrössert. Dünnflüssiger Stuhl.

Urin: normal.

Bis zum 6. X. Befinden wechselnd, unregelmässig intermittirendes Fieber, keinerlei Localerkrankung. Dann beginnender Decubitus, unfreiwillige Stuhlentleerung, Schmerzen in r. Schulter- und Hüftgelenk.

8. X. In pulmonibus l. hinten unterhalb der Scapula Schall etwas höher und kürzer. Raubes Vesiculärathmen, z. Th. unbestimmtes Athmen, zahlreiche trockene mittelgrossblasige Rasseleräusche. Auch r. hinten unten katarrhalische Erscheinungen.

Cor: 1. Ton an der Mitralis etwas klirrend. Nirgends ein Geräusch.

Rechtes Schultergelenk bei activer und passiver Bewegung sehr schmerzhaft, desgl. aber nicht so stark, der r. Ellenbogen; rechte Hüfte und Knie ebenfalls schmerzhaft.

Sonst normale Beweglichkeit. Zunehmende Somnolenz und Apathie.

9. X. Linkes Auge lebhaft injicirt. Hypopyon, Iritis mit Pupillarverschluss. R. Ophthalmoskopie wegen enger Pupille nicht ausführbar.

Am Herzen: 1. Ton an der Mitralis etwas in die Länge gezogen, keine Geräusche!

11. X. L. ziemlich beträchtliche Chemosis, Pupille trotz starker Atropininstitution nicht sichtbar, von grauem, eitrigem Belag verdeckt. R. ophthalmoskopisch bei gewöhnlicher Pupillenweite nichts zu sehen. Bei Mydriasis erkennt man die grau verwaschene Papille, doch nur nach den Seiten hin sieht man noch undeutlich einzelne Netzhautgefäße. Beim Blick nach unten sieht man auf der Netzhaut eine rundliche weisse Infiltration, die mit kleinen capillären Hämorrhagieen besetzt ist. Der Glaskörper zeigt verschiedene stärkere Flocken, die gesammten brechenden Medien haben sich fein rauchig getrübt. (Geheimrath Schmidt-Rimpler.)

Stärkere Benommenheit, Dyspnoe. Seit 2 Tagen kein Stuhlgang. Am Cor. Verhältnisse unverändert. Keinerlei Geräusche. Puls 148. Temperatur schwankt zwischen 38,7 und 39,5.

12. X. Collaps. Exitus lethalis.

Sectionsbericht (Auszug). (Prof. Marchand.) 13. X.

Endocarditis ulcerosa valvulae Tricuspidalis, Thrombosis sen embolia supp. art. pulmon. utriusque, Pneumonie lobularis et abscessus lobi inferioris utriusque, praecipue dextri, Carcinoma ventriculi, Nephritis metastatica Duplex, Arthritis purulenta articulationis sternoclavicularis Dextrae, humeri et coxae, Retinochorioiditis purulenta metastatica duplex, Leptomeningitis chronica (nicht metastatisch), Abscessus prostatae. Möglicherweise ist das Magencarcinom der Ausgangspunkt für die Pyämie (?).

Der Befund am Herzen sei etwas ausführlicher mitgetheilt, weil er ein Beispiel darstellt dafür, dass die endocardialen Veränderungen sehr hochgradig sein und sich trotzdem der Diagnose entziehen können:

Valv. mitr. und Aortae bis auf geringe Verdickungen der ersteren völlig frei von Veränderungen. Tricuspidalis dagegen hochgradig deformirt durch zahlreiche grosshöckerige Vorsprünge von weicher, bröcklicher Be-

schaffenheit und röthlich gelber Farbe, die besonders an der Vorderfläche des vorderen Zipfels, in geringerem Grade an allen Zipfeln vorhanden sind, dadurch das Lumen beträchtlich verengen. Die Ventrikelfläche im ganzen glatt. Dagegen setzen sich die weichen, gelblichen Massen auf die Chordae tendin. fort, die stellenweise durch dieselben ganz eingehüllt erscheinen.

Vom Vorhof aus gesehen, wölben sich die beschriebenen Massen in den ersteren hinein, indem sie hier noch z. Th. auf die Innenflächen des Vorhofes sich fortsetzen. Auch in der Mitte des r. Ventrikels befindet sich eine weiche gelbliche Thrombenmasse, von lappiger Gestalt, die an 2 gegenüberliegenden Stellen des Conus locker fixirt ist und augenscheinlich einen feinen, hier ausgespannten Sehnenfaden eingehüllt hat.

Pulmonalklappen intact.

Milz nicht vergrößert.

Augen:

Der l. Bulbus auffallend breit, ziemlich weich. Pupille durch ein gelbliches Exsudat eingenommen, beim Durchschneiden entleert sich stark getrübe Flüssigkeit. Glaskörper eitrig infiltrirt, corpus ciliare durch gelbliches Infiltrat ganz verdeckt, ähnlich auch der hintere Abschnitt der Retina, welche selbst verdickt und mit zahlreichen Blutpunkten durchsetzt erscheint. Am r. Auge, am hinteren Umfange, ein flaches gelbliches Infiltrat dicht hinter dem corpus ciliare, welches anscheinend unter der Retina seinen Sitz hat. Glaskörper in der Nachbarschaft getrübt, Retina in der Umgebung gequollen, mit kleinen Blutungen durchsetzt, Papilla optica verwaschen.

Mikroskopische Untersuchung

des in Alkohol conservirten linken Bulbus. Es kamen etwa 100 Schnitte zur Untersuchung, welche die Papille und Umgebung umfassten. Da das Auge in mehreren Stücken conservirt und dabei Theile der Netzhaut verloren gegangen sein konnten, wurde von einer vollständigen Serienuntersuchung abgesehen.

Vordere Kammer von einer zellarmen fein granulirten geronnenen Masse gefüllt; Iris von einem dichten Fibrinnetz überzogen, ohne eigene stärkere eitrige Entzündung oder Embolien.

Die mittleren Theile des Glaskörpers sind nicht mehr vorhanden, die erhaltenen peripheren dicht mit Eiterzellen durch-

setzt und zwar sowohl vor der Papille, wie besonders hinter der Linse.

Chorioidea in ihren inneren Schichten zellig dicht infiltrirt, im allgemeinen etwa ums doppelte verdickt, die Schicht der grossen Gefässe zeigt geringere entzündliche Veränderungen. Nur an einer Stelle hinter der Ora serrata, analog den Netzhautveränderungen, ist die Chor. ganz vereitert, die Glashaut gesprengt und eine direkte Verbindung des Chor.-Eiters mit dem im Glaskörper befindlichen nachzuweisen. (Doch ist gerade hier das Auge durchschnitten.) Die Retina zeigt ausser diffuser eitriger Entzündung mittleren Grades und entzündlicher Lockerung und Durchtränkung ihrer Schichten totale Degeneration des Neuroepithels, das zu einer Detritusmasse oder homogenen gequollenen Schicht geworden ist. In den Zwischenkörnerschichten zwischen den stark verdickten Müller'schen Stützfäsern reichlich netzförmige Fibrinknäule; mehrfach Heerde ganglionärer Nervenfasern. Sie ist hinten von einem zellarmen Fibrinnetz überzogen, erst über diesem erscheinen dichte Zellreihen. In der Gegend des Aequators bis zur Ora serrata ist sie ausgedehnt zerfallen, hier findet auch von ihr aus eine profuse Eitersecretion in den Glaskörper hinein statt. Die Netzhaut ist in grösserem Umfang als die Aderhaut zu Grunde gegangen, doch ist wegen der Conservirung ein sicherer Schluss nicht möglich. Im subretinalen Raum zur Zeit kein Eiter mehr (arteficiell).

Im allg. unterscheidet sich das Bild nicht von dem eitriger intraocularer Entzündung mittlerer Intensität. Es sei noch hervorgehoben, dass die auch bei Fall Selig geschilderten Veränderungen der Arterien sich in ausgedehntem Maasse fanden, doch nur, soweit unmittelbar die eitrig entzündlichen Erscheinungen reichten, nämlich bis zur Lamina; weiter rückwärts in dem bezüglich seiner Scheiden wie des Nerven normalen Opticus waren die Centralgefässe bis auf einzelne Leukocythen frei. Auffallend war in der Chor. an mehreren Arterien der stark eitrig Inhalt und die Infiltration, während die Venen in der Umgebung noch fast frei waren. Die beiden Zeichnungen der Fig. 4, Tafel I illustriren die gefundene Arteriitis, die sich in starker Endothelwucherung resp. Desquamation mit eingestreuten Leukocythen wechselnder Zahl, ferner vielfach homogener Quellung der Wandung äusserte. In manchen so thrombosirenden Gefässen beginnende Organisation. Arterien und Venen wegen der Entartung der Wand vielfach nicht mehr zu unterscheiden, im allg. wiegt in den Venen die Menge der Leuko-

cythen vor während speciell die Wandung auch ganz verschlossener Arterien sowie ihr Thrombus mitunter nur einzelne Wanderzellen enthält.

Bacteriol. Untersuchung:

Im Glaskörpereiter, bes. hinter der Linse und hier auch in einzelnen Zoogloemassen, sehr zahlreiche lanzettförmige Diplococcen, die in Grösse und Aussehen den Fränkel'schen Pneumococcen, und nur diesen, vollkommen gleichen (Fig. 5); in den ebenfalls untersuchten Nieren, Lunge, Endocard fanden sich ebenfalls nur die lanzettförmigen Diplococcen in der für diese Organe bekannten Anordnung, vielfach noch in den Gefässen, bes. in den Nieren.

Dort, wo sie hinter der Linse in schmalen Zoogloehaufen liegen, ist zwar auch eine Kapsel nicht zu sehen, doch liegen die einzelnen Individuen nur locker beieinander und sind durch einen helleren, schmalen Zwischenraum von einander getrennt — wohl Rest der Kapselzeichnung. Vielfach kurze, gradlinige Ketten, mit länglicher, oder platter stumpfkantiger Form der Glieder. Oefter auch Involutionsformen von z. Th. beträchtlicher Grösse, mitunter hefepilzähnliche Formen (cf. Fig. 6, Taf. I). Meist sind die Diplococcen locker zwischen den Zellen vertheilt. Ausserordentlich zahlreiche, dicht besetzte Phagocyten. An einigen Stellen im Glark. liegen die Diplococcen, ohne eigentlich Ketten zu bilden, in langen welligen Zügen. Sie folgen hierbei der Anordnung der Glaskörperfibrinfasern. Ausser im Glark. finden sich zahlreiche Diplococcen in der Netzhaut bis vor die Papille, in der Chor. nur da, wo dieselbe ganz vereitert ist, nicht im Corp. eil. und in der Iris. In der Vorderkammer nur an einer Stelle ein in Zerfall begriffener, mit wohlgebildeten Diplococcen besetzter Phagocyt.

Es muss jedoch hervorgehoben werden, dass ein sicheres Urtheil über die Verbreitung der Mikroben auch hier nicht möglich ist, weil sie ebenfalls trotz aller Mühe nicht vollständig und gleichmässig sich färben liessen. Intensive Hämatoxylinfärbung stellte die grösseren Haufen und welligen Züge deutlich dar, war aber wegen starker Färbung auch der geronnenen Eiweissmassen etc. für die einzelnen und intracellularen Coccen nicht brauchbar. Gram'sche Färbung misslang, dagegen ergab die Weigert'sche z. Th. sehr schöne Bilder, jedoch nie in allen Theilen des Präparates, meist nur an ganz bestimmten Stellen: fiel die Zoogloefärbung einigermaassen aus, so fehlten meist die Einzelmikroben und umgekehrt. (cf. Fall

Pein, Selig). Auch Herr College Saxer, dem ich einige besonders schöne Präparate verdanke, kam zum gleichen Ergebniss.

Es sei hier bemerkt, dass, ebenso wie bei dem einen von Beck (II, 19) beschriebenen Fall hier die Endocarditis im grossen Kreislauf nur capillare Embolien verursacht haben kann, da sie sich ausschliesslich auf das rechte Herz beschränkte (cf. p. 96). Bemerkenswerth ist auch, dass eine so hochgradige Endocarditis während des Lebens keine sicheren Symptome machte.

Die Biologie der bei Fall V aus beiden Augen und den Meningen gezüchteten Mikroben war für den Fränkel-Weichselbaum'schen *Pneumococcus* charakteristisch; dass positive Impfungen überhaupt nicht glückten, ist wohl Folge davon, dass diese erst am 3. Tage vorgenommen wurden, darf uns aber überhaupt nicht wundern, da selbst von frischen Entzündungsheerden gezüchtete *Pneumococci* ihre Virulenz sehr schnell einbüssen können, besonders wenn die Alkalescentz des Nährbodens nicht ganz die ihnen zusagende ist. Die Beobachtung Kruse's, dass die Kettenbildung in der Bouillon meist ein Zeichen der Degeneration sei, bestätigte sich auch hier insofern, als selbst grössere Mengen schadlos von Kaninchen vertragen wurden.

Fall V ist einer der nicht häufigen, auch von Herrnheiser besonders hervorgehobenen Fälle, wo die metastat. Ophthalmie die richtige Diagnose des bis dahin ganz unbestimmten, resp. der Gallensteinkolik zugeschriebenen fieberhaften Allgemeinleidens ermöglichte.

Sonst wich der klinische Verlauf der Augenerscheinungen von dem gewöhnlichen nicht wesentlich ab. Und doch ist Veranlassung vorhanden, gerade hierauf sein besonderes Augenmerk zu richten.

Durch die Vorliebe des *Diplococcus lanceolat.*, auf den Schleimhäuten, bes. des Tract. respir. und seiner Nebenhöhlen sich aufzuhalten, ist es bedingt, dass derselbe hauptsächlich Blutinfektionen erzeugt, welche der inneren Medicin angehören. Scheint es auch nach den Untersuchungen von Foá, Bordone-Uffreduzzi, Guarneri und Kruse

sicher gestellt, dass der Pneumoc. mitunter auch ausserhalb des Organismus und der Nährböden in getrocknetem Zustande sich einige Zeit halten kann, freilich nicht immer unter Bewahrung seiner Virulenz, so pflegt er doch zu eigentlich chirurgischen Wundinfectionen oder puerperalen Processen weniger häufig Veranlassung zu geben (cf. auch Fehling l. c.).

Leyden¹⁾ hat darauf aufmerksam gemacht, dass die durch den Kapseldiplococcus hervorgerufene Meningitis im allgemeinen weniger maligne sei, als die eigentlich septische Form, eine Ansicht, die von Netter²⁾ dahin erweitert wurde, dass aus dem bacteriol. Befunde sich die Prognose des Empyems mit ziemlicher Sicherheit bestimmen lasse, und dass die Pn.-Empyeme, welche nach seinen Beobachtungen 30 % der Fälle ausmachen (50 % Strept., 13 % Fäulnisbact., 10 % Tuberkelbac.) nicht die sofortige Operation anzeigen. Die letztere Folgerung ist von Levy³⁾ als viel zu weit gehend mit Recht angegriffen worden, da die Pneumoc. sehr verschieden bösartige Eiterungen hervorrufen können und die Therapie natürlich mit der schlimmsten Möglichkeit rechnen muss. Ich selbst kann über diese Frage natürlich nicht urtheilen, habe sie aber angeführt, weil trotz der geringen Zahl der genau bacteriolog. untersuchten Fälle von metastat. Ophthalmie manches dafür spricht, dass die Verhältnisse bei der Pneumococccenmetastase des Auges etwas ähnlich liegen, wie Netter für das Empyem sie angiebt.

Bei Erkrankungen der Luftwege, besonders der Lunge (Pleuritis, Pleuropneumonie, Bronchitis etc.), dieselben

¹⁾ Bemerkungen über Cerebrospinalmeningitis etc. Zeitschr. f. klin. Medicin XII, 1887. Heft 4, p. 386 ff.

²⁾ De l'utilité de la bactériol. pour le pronostic et le traitement des pleurésies purulentes (Semaine médicale 1890, Nr. 22), ref. in Baumgarten's Jahresbericht (C. Fränkel).

³⁾ Arch. f. exp. Path. u. Pharm. XXVII. 1890 p. 369 u. XXIX.

mögen selbst eitrigen Charakter haben oder auch nicht, sind öfters pyämische metastat. Ophth. beobachtet. Es muss freilich hervorgehoben werden, dass nicht immer festzustellen ist, ob nicht auch die Lungenerscheinungen metastat. Natur sind. (cf. Tab. III, 24). Die folgende Tabelle zeigt aber jedenfalls, dass die Zahl der Fälle nicht gering ist, bei denen die Lungen-

Tabelle IV.

Autor	Ursächliche Krankheit	Alter und Geschlecht	Sitz der Ophthalmie:			An welchem Tage der Infection kam die Ophthalmie?	Wie viel Tage nach der Ophthalmie exitus leth.?
			rechts?	links?	beiderseits?		
Mackenzie. 1854. 1)	Pleuropneumonie.	35 m.	—	—	ja	2.—3.	31
Cohn. 1860. 2)	Empyem.	50 m.	—	—	—	ca. 1 Monat.	wenige Tage
H. Schmidt. 1872. 3)	Phthisis pulmonum.	?	? ja	?	—	?	—
Piéchaud. 1873. 4)	„Pleuritis, Lungenentzündung“.	?	? ja	?	—	?	?
Roosa. 1878. 5)	Linkss. croup. Pneumon.	46 w.	? ja	?	—	ca. 20.	—
Kahler. 1880. 6)	Eitrige Cavernen.	28 m.	—	—	ja	?	?
Seggel. 1880. 7)	Eitrige Pleuritis.	Soldat	—	ja	—	?	—
Kipp. 1881. 8)	Pleuropneumonie nach Pharyngitis u. Ot. med.	24 m.	ja	—	—	3.	—

erkrankung den sept. Erscheinungen voranging und wahrscheinlich ihre Ursache war. Ich habe in dieselbe eine Reihe von Influenzafällen aufgenommen, weil gerade hier die Complicationen von den Lungen ausgelöst zu werden pflegen, was sich auch darin ausdrückt, dass in anderweitigen Eiterungen besonders häufig der *Diploc. lanceol.* angetroffen wurde. (Mischinfection.)

Tabelle IV.

Ist Patient gestörten?	Sonstige Metastasen	Endocarditis?	Infections-erreger?	Panophthalmie?	Bemerkungen
ja	nein.	nein	?	ja, sehr langsam	
ja	?	?	?	?	Tabelle II, 9).
nein	?	—	?	ja	Starb später an der Tuberculose, doch nicht an dem pyäm. Anfall. Tab. II, 14.
ja	?	?	?	ja	„Plötzlicher Beginn bei starkem Husten“.
nein	r. Schultergelenk.	„ja“ (?)	?	nein	Ophth. während der Reconvalescenz.
ja	Nieren, Darm, Leber, Meningen.	nein	?	—	Embol. der Ret. Nur Section. Tab. II, 30.
nein	?	—	?	ja	Tab. II, 28.
ja	—	—	?	ja, in 18 Tagen.	Alle pyäm. Erscheinungen erst nach der Pneumonie.

Autor	Ursächliche Krankheit	Alter und Ge- schlecht	Sitz der Ophthalmie?			An wel- chem Tage der Infec- tion kam die Oph- thalmie?	Wie viel Tage nach der Oph- thalmie exitus leth. ?
			rechts?	links?	beider- seits?		
Mooren. 1882.	} Pneumonie.	?	?	ja	?	—	?
9)							
10)							
11)	Pleuritis.	?	?	ja	?	—	?
(Adler. 1889.	Eitr. Bronchitis.	?	?	ja	?	—	?
(Cohn. 1890.	Bronchopneumonie.	36 w.	—	—	ja	17. resp. 21.	—
Natanson. 1890. 12)	Pneumonie.	m.	—	—	ja	ca. 6 Wochen	—
Braunstein. 1890. 13)	Pneum. nach Infl.	w.	?	ja	?	—	—
Hirschmann. 1890. 14)	Pneum. nach Infl.	?	?	ja	?	—	?
Hosch. 1890. 15)	Pneum. nach Infl.	1	ja	—	—	10.	—
Mitvalsky. 1892. 16)	Pneumonie.	44 w.	—	ja	—	6.	—
Herrnheiser. 1893. 17)	Pneumonie.	67 m.	—	—	ja	ca. 14.	ca. 8
Eigener Fall. 18)	Pyopneumothorax.	40 w.	—	—	ja	?	4. resp. 6.

Ist Patient gestorben?	Sonstige Metastasen	Endocarditis?	Infections-erreger?	Panophthalmie?	Bemerkungen
ja	?	?	?	?	
ja	?	?	?	?	
nein	Gelenke.	—	Staph. pyog. aur.	—	„Metast. Abscess der Conj. bulbi mit secundärer Iridochor.)
nein	Strumitis.	—	(Pneumoc.?)	nein	cf. p. 106.)
nein	—	—	?	nein	3 Mon. nach Infl. Pyämiegeheilt, doch bestand noch nach 2 Monaten pleur. Erguss.
nein	?	—	?	nein	
nein	—	—	?	ja	„Phthisis wie bei Mening.“
nein	—	—	?	nein	
nein	—	—	Staph. pyog. aur.	ja, in 3 Wochen	70 Tage nach Beginn Züchtung der Coccen.
ja	—	ja	Pneumoc.	—	R. geringe entzündl. Erscheinungen.
ja	Nieren, Fussgelenk.	nein	Strept.	—	Tab. II, 44.

Nicht aufgenommen in die Tabelle ist der von Laqueur beschriebene Fall von schneller doppelseitiger Erblindung bei Influenza unter dem Bilde der nicht eitrigen Iridochor., da die embolische Natur nicht erwiesen scheint und der Visus sich auf Atropin in kurzer Zeit zur Norm zurückbildete, also jedenfalls nicht das gewöhnliche Bild metastat. Ophth.; fortgelassen ist auch der Fall von Eversbusch, da 3 Tage vor der Panophthalmie ein eitriges, perforirendes Fussgeschwür eingetreten war und deshalb die Herkunft der Pyämie von der Lungenentzündung her unsicher ist. Fortgelassen sind hier die beiden Fälle von Beck (Tab. II, 18, 19) weil es sich das eine Mal nur um eine Verletzung, das andere Mal um eine Eiterung im Brustkorb mit nur secundärer Betheiligung der Lunge handelt. Auch den eigenen, von Herrnheiser angefochtenen Fall von tiefer Eiterung in einem staaroperirten Auge (Fall XII) habe ich als nicht einwandfrei fortgelassen, ebenso ist ein Fall von Adler nicht mit berechnet, da die metast. Natur der Conj. Eiterung zwar wahrscheinlich, aber nicht ganz zweifellos ist. Dagegen sind einige Fälle wieder angeführt, die wegen der ausgesprochenen primären Localeiterung schon unter den „chirurg.“ vorkamen.

Auch scheint mir hierhin der interessante Fall von Cohn zu gehören, den der Autor selbst als puerperalen auffasst:

Es kam hier einige Tage nach mit Zahnschmerzen beginnenden fieberhaften Erscheinungen zum Abort, ohne dass jemals die Genitalien und Umgebung irgend welche entzündliche Veränderungen zeigten; dagegen war von Anfang an quälender Husten vorhanden. 10 Tage später Beginn der Ophth. l., nach 2 Tagen r. Bei der Aufnahme ins Krankenhaus fand sich eine ausgedehnte Bronchitis resp. Lungeninfiltration („klingendes Rasseln“), ferner ein metast. Stromaabscess, in welchem sich „lange Ketten von Coccen fanden, welche in einer Kapsel zu liegen schienen, die durch Essigsäurezusatz zum Schwinden gebracht wurde.“ Die Augenaffectio verlief in der Weise, dass nach vorübergehender Protrusion sich ohne eigentliche Panophthalmie bds. Phthisis bulbi ausbildete. Cohn sagt: „Die anfänglich aufgetretene Bronchitis, welche lange Zeit fortbestand und wiederholt Fieberbewegungen verursachte, lässt den Termin der puerperalen Erkrankung nicht mit Sicherheit angeben.“ Ich möchte annehmen, dass eine puerperale Infection, d. h. eine solche von den puerperalen, abgesehen von dem Abort nicht erkrankten Genitalien aus in keiner Weise bewiesen ist. Wahrscheinlicher

war es die fieberhafte Lungenerkrankung, welche zur Allgemeininfektion und damit, wie so oft, zum Abort führte. Zu letzterer Annahme passt auch die Art der Ophthalmie besser.

Denn gerade das ist aus Tabelle IV wohl ersichtlich, dass die nach Lungenaffectionen aufgetretenen eitrigen metastatischen Ophthalmieen verhältnissmässig häufig direkt zur Phthisis oder doch sehr langsam zur Panophthalmie führen, deutlich auch die rel. geringe Sterblichkeit dieser Patienten: unter 18 Fällen 9 Todesfälle. Die Fälle 2, 6, 9, 10, 11, 17, 18 sind bezüglich der Panophthalmie unbestimmt, weil der Tod nach wenigen Tagen eintrat. Unter den übrigen 11 Fällen mit diesbezüglichen Angaben sind 7 Panophthalmieen, 4 Phthisen, also der 3. Theil. Ich bin natürlich weit entfernt von der unbeweisbaren Behauptung, dass die von der Lunge ausgehenden Pyämieen alle durch den Pneumococcus veranlasst seien und führe dafür folgendes Beispiel an¹⁾:

Fall VII.

Pyämie im Anschluss an Pyopneumothorax, Abscessus multipl. ren., Arthritis purul. articul. pedis sin., Ophthalmia metast. dupl., Streptoc. pyog.

Frau Unger, 40 Jahre alt. Moabiter Baracke.

24. II. 1880. Unter dem Bilde schwerer Infection (hohem Fieber, eitriger Fussgelenkentzündung etc.) ist sie seit 6 Tagen zuerst am rechten, bald darauf am linken Auge erkrankt.

r. kein Lichtschein. Leichte Chemosis d. Conj., pericorneale Injection, Pupillarverschluss mit eitrig gelblichem Exsudat.

(Diagnose: eitrige Iridochorioiditis Prof. Uhthoff.)

l. Unsicherer Lichtschein. Fast dasselbe Bild wie r., doch nicht ganz so weit vorgeschritten.

Exitus lethalis 4 Tage nach Erkrankung des l. Auges.

Section: Linksseitiger abgesackter Pyopneumothorax, von dem wohl die Infection ausgegangen ist. Die l. Lunge ist von einer eiterhaltigen Höhle mit besonderer bindegewebiger Wand

¹⁾ Dasselbe ist wegen der starken primären eitrigen Veränderungen in der Tabelle II mit berechnet.

durchsetzt. Cor intakt. Leichte Schwellung der Milz, leichte Trübung der Leber, pyämische kleine Abscesse in den Nieren, eitrige Entzündung des l. Fussgelenks. Gehirn nichts. Oedem der pia mater.

Linkes Auge: (frisch secirt). Chorioidea in toto freipräparirt. Eine grosse scharf begrenzte Parthie derselben zeigt sich schon von aussen schmutzig grau verfärbt und ist der hintere Abschnitt dieser Fläche fest mit der Sclera verwachsen. Von der Innenseite her ist die grauweisse Stelle deutlich über die nicht veränderte Chorioidea prominent und mit zahlreichen Hämorrhagieen bedeckt. Sie nimmt fast $\frac{1}{3}$ des ganzen Augenhintergrundes ein und zeichnet sich durch ihre Anordnung aus; sie beginnt nämlich an der Stelle, wo eine der langen Ciliararterien durch die Sclera hindurchtritt und erstreckt sich ziemlich symmetrisch von dieser Perforationsstelle aus nach vorn auf die Hinterfläche des Ciliarkörpers und der Iris. Die auf dieser Parthie liegende Retina ist ebenfalls stark verdickt. Der Glaskörper ist sehr consistent und durchsetzt mit weisslichen Flecken und Strängen. Diese Glaskörpertrübungen bestehen aus Rundzellen, Blut, Fibrin. Das Auge, ca. 24 St. nach dem Tode, ohne in Flüssigkeit gelegen zu haben, untersucht, birgt in seinem Glaskörper eine grosse Zahl von Mikrococcen.

r. Bulbus, in Alkohol gehärtet, zeigt dieselben Veränderungen der Chorioidea, aber weit ausgedehnter. Nur ein kleines Terrain an der Macula und um die Papille ist noch frei. Retina in grosser Ausdehnung eitrig abgehoben, z. Th. eitrig geschmolzen. Zwischen Retina und Chorioidea, und im Glaskörper consistente Massen (Rundzellen, Fibrin, Blut) mit weitgehender regressiver Metamorphose. (Eine beigelegte Skizze der verdickten Chorioidea des r. Auges zeigt, dass die grösseren Gefässe deutlich erkennbar, die Choriocapillaris dagegen völlig vereitert ist. Dabei scharfe Begrenzung durch die Glashaut).

Von dem r. Bulbus ist noch ein mikroskop. Präparat von Corp. ciliare und Iris mit nächster Umgebung vorhanden. Färbung mit Hämatoxylin:

Corp. ciliare mässig stark infiltrirt, Muskelbündel gelockert. In der Gegend des Schlemm'schen Canals stärkere Rundzellenanhäufung. Kammerwinkel durch diese verlegt, vordere Kammer von einer zellarmen, ein dichtes Fasernetz bildenden Masse ausgefüllt. Iris verdickt, gelockert, besonders in der Peripherie zellig infiltrirt. Endothel nicht deutlich. Die inneren

Schichten der pars ciliaris retinae zeigen hochgradigen eitrigen Zerfall, sind von der sie überdeckenden Exsudatschicht nicht scharf abzugrenzen. Zwischen den Zellen liegen hier in grosser Zahl kleine, runde Coccen, zu kürzeren und längeren Ketten angeordnet, hier und da rosenkranzförmig, z. Theil auch in grösseren Haufen dicht beisammenliegend. Es handelt sich nach Aussehen und Grösse um den gewöhnlichen *Streptococcus pyogenes*. Bakterien und andre Formen fanden sich nicht.

Die gegebene makrosk. Beschreibung der anatom. Präparate lässt eine sichere Deutung nicht zu, ob die Netzhaut oder die Aderhaut der primär infectirte Theil gewesen.

Ohne also über die bakteriolog. Natur der in Tabelle IV enthaltenen Fälle bestimmt urtheilen zu wollen, möchte ich nur darauf hinweisen, dass die Zahl der direkten Phthisen verhältnissmässig gross ist, gegenüber 0 im Puerperium, 13,3% bei der chirurg. Pyämie (20:4) und 21,3% bei der kryptog. Pyämie (18:5), Zahlen, welche durch analoge Ausrechnung wie bei Tab. IV gefunden sind und bei denen als in keiner Richtung entscheidend alle die Fälle unberücksichtigt blieben, bei denen bis zum Tode keine Zeit zur Panophthalmie blieb, die sich z. B. bei Fall Schneider (Tab. II, 45) noch nach 34 Tagen ausbildete.

Es sind daher auch die sicher durch Pn. verursachten Fälle Tab. III, 24, 26 und Tab. IV, 15 nicht mit berechnet. Dass sich bei Fall V (Tab. III, 26) bds. Panophthalmie ausbildete, spricht nicht gegen die Möglichkeit, dass die Pneum. doch rel. oft auch einfache Phthise setzen, und zwar in Fällen geringerer Virulenz auch des Allgemeinleidens, das hier zum Tode führte. In der Rapidität der Augeneiterung hat sich hier nur die Bösartigkeit der ganzen Infection wiedergespiegelt. Es wäre ja sehr interessant, wenn eine zur Panophthalmie führende Pneumococc. Metastase des Auges öfters einen Rückschluss auf die Malignität und Prognose der Pyämie stellen liesse; dass aber dies nicht immer den gleichen Schritt geht, zeigt der Fall Herrnheisers, bei dem die entzündl. Reaction rel. gering bis zum Tode war.

Einen eigentlichen Beweis aber für die aus den oben angeführten Daten, auf welche ich kein besonderes Ge-

wicht lege, entnommene Vermuthung, dass gerade die in Phthisis bulbi unmittelbar übergehende Augenmetastase vielleicht verhältnissmässig oft durch den Fränkel'schen Pneumococcus veranlasst sein dürfte, liefern die Erfahrungen über die epidemische Cerebrospinalmeningitis und die dieselbe complicirende Ophthalmie.

Das klinische Bild ist bekanntlich folgendes:

Meist einige Tage nach Beginn der meningealen Erscheinungen¹⁾, ab und zu aber auch unmittelbar danach oder auch gleichzeitig, stellt sich auf einer, seltener auf beiden Seiten eine mässige Chemose der Conj. bulbi und Injection ein, während die brechenden Medien sich rauchig trüben. Iritis mit geringem, meist schnell wieder verschwindenden Hypopyon, diffuse Glaskörpertrübung, die bald ausgesprochen eitrig-gelben Reflex liefert. Dabei ist das Auge von Anfang an weich, wenig schmerzhaft. Unter Rückbildung der Injection und Schwellung nimmt die Hypotonie zu, die Cornea klärt sich, das Auge wird leicht phthisisch (amaurotisches Katzenauge). Später häufig Cataracta accreta.

Es gilt nach den zahlreichen Untersuchungen Fränkel's, Weichselbaum's, Foá's u. A. für sicher, dass der *Diplococcus lanceolatus* der Erreger der epidemischen Cerebrospinalmeningitis ist; wir haben demnach auch die eitrige intraoculare Entzündung ihm zuzuschreiben, die nach allgemeiner Beobachtung sehr selten zur Panophthalmie führt²⁾. Und eigenthümlicherweise sind die von ihr befallenen Individuen fast immer genesen, wir besitzen bekannt-

¹⁾ Auffallender Weise nennt Heubner (Eulenburgs Realencyclop. 1889, Artikel Cerebrospinalmeningitis) die Ophthalmie eine „Nachkrankheit“.

²⁾ Doch sind einzelne Fälle bekannt, z. B. von Wecks, Markusy (doppels., Centralbl. 1879. p. 165).

lich kaum eine genaue anatomische Untersuchung eines solchen an der Meningitisophthalmie erblindeten Auges.

Fragen wir uns zunächst, wieweit die bisherigen anatomischen Untersuchungen Unterschiede ergeben haben, welche die häufig geringere entzündliche Wirkung der Pneumococcen im Auge uns erklären, so ist dies bis jetzt nur mangelhaft möglich. Denn unter den untersuchten Augen fehlen ja gerade solche direkt phthisischen. Zwei Punkte aber ergeben sich gemeinschaftlich aus den oben und auf S. 93 beschriebenen Fällen, die vielleicht von Bedeutung sind.

1) Die bekannte Seltenheit dichter Coccenmassen (Zoogloea), die sich nur bei Fall VI in schmalen Zügen fanden. Dieser Unterschied in der Bildung dichter Massen äussert sich deutlich in der Art der embolischen Retinitis: Während in den bisherigen genau bacteriol. untersuchten Fällen die Streptococcen (und wohl auch Staph.) sich in den Gefässen in Gestalt dichter Massen verbreiten, sich deshalb in denselben relativ häufig noch nachweisen lassen und damit vielfach weithin unmittelbare Necrose der Netzhaut hervorrufen, weniger eitrige Entzündung, scheinen sich die Pneumoc. nach der Embolie schnell ins umgebende Gewebe zu vertheilen, weniger aber in Nachbargefässe überzugreifen, vom welchen aus dann eine hauptsächlich locale, reichlichere Eiterung erfolgt. So finden wir bei Fall V (cf. Fig. 4) zu beiden Seiten der Papille solche umschriebene kleine Eiterherde in der Netzhaut und auch in den anderen Fällen ist eine Necrose gleich derjenigen bei Fall XIII nicht vorhanden, obwohl die Mikroben in grosser Zahl die Netzhaut durchsetzen. Es kann ja nun diese schnelle Vertheilung der Pneumoc. als Ausdruck einer schnellen Propagation und damit als bösartiges Symptom erscheinen; andererseits bietet aber ihre lockere Anordnung vielleicht dem Gewebe eher Gelegenheit, sie getrennt unschädlich zu machen.

2) Die ungewöhnlich starke Phagocytose, deren Reichlichkeit Weichselbaum veranlasste, den Namen „*Diplococcus intercellularis meningitidis*“ aufzustellen. Doch will ich mir kein Urtheil erlauben, ob sich in derselben ausspricht, dass die Zellen die ihre Virulenz schneller verlierenden Pn. leichter „vertilgen“, oder ob die Zellen erst durch das aus anderen Gründen beginnende Absterben der Mikr. und dadurch freiwerdende Substanzen ihres Protoplasmas (Chemotaxis) angezogen werden und dieselben dann in sich aufnehmen. Beide Auffassungen würden ein reichliches Zugrundegehen der Mikroben annehmen. Dass die Pneumoc. selbst in die Zellen eindringen und diese vernichten ist bei der völligen Integrität der Zellen für die grosse Mehrzahl wohl nicht anzunehmen (doch vergl. Befund auf p. 99). Kruse und Pansini (l. c. p. 360 ff.) sind der Ansicht, dass die Pneum. relativ bald an ihren eigenen Stoffwechselprodukten sterben. Vielleicht bereitet ihre Isolirung auf den geschlossenen Augenraum ihnen gerade hier bald diese Autointoxication. Jedenfalls werden sie hier länger als an vielen Körperstellen auf einen engen Raum beschränkt.

Wie geschieht nun die Infection des Auges bei der epidemischen Cerebrospinalmeningitis?

Die von Horner (Gerhard's Handbuch der Kinderkrankheiten) angezogene Untersuchung Grohé's besteht nur darin, dass dieser bei der Neuritis opt. eine Infiltration der Sehnervenscheiden fand. Eine intraoculare Eiterung lag überhaupt nicht vor. Unter den von Berthold, Rudnew, Oeller mitgetheilten Sectionen betrifft die erste ein typisches amaurot. Katzenauge bei Neuritis des andern Auges; leider gestattet die mikrosk. Untersuchung aber keinen Schluss über die Genese; die Opticus-scheiden wurden nicht untersucht, es wird nur eitrige Zerstörung der Netzhaut angegeben. Der Fall von Rudnew, der für die embol. Entstehung spricht, war mit Enocard. ulc. complicirt, und vielleicht keine reine Meningitis, sondern eine Scorbutpyämie¹⁾.

¹⁾ So wird er auch von Ziemssen (Handbuch II, 2) aufgefasst.

Oeller, der ein fast gleichzeitig mit Beginn der Meningitis eitrige erkranktes Auge untersuchte, das in den wenigen Tagen bis zum Tode für eine Mening. Ophth. ungewöhnlich starke entzündl. Erscheinungen zeigte, fand die Opticusscheiden normal, dagegen ausgedehnte eitrige Refinochor., was ihn für die embolische Entstehung eintreten lässt. Auch der Fall von Weeks ist für die Herkunft der Ophthalmie, bes. den Weg der Mikroben nicht zu verwerthen, da der obendrein unsichere Befund von Bakterien (?) im Auge und den Scheidenräumen eines infolge von Panophthalmie bereits perforierten phthisischen Auges, also zu spät, erhoben wurde. Für die Genese ist auch nicht beweisend der Befund von Wedl-Bock, die bei einer „Panophthalmie nach Meningitis“ Coccen auf der Vorderfläche der Iris fanden.

Will man über die Ophthalmie, deren Beziehungen zur Meningitis heute noch ebenso strittig sind, wie vor 20 Jahren, sich ein Urtheil bilden, so ist es zunächst nothwendig, nachzuforschen, wie weit, wenn von einer „eitrigten Ophthalmie bei Meningitis“ die Rede ist, die Meningitis die ursächliche primäre Erkrankung für die Ophthalmie darstellt und wie weit es sich nur um ein gleichzeitiges Vorkommen handelt.

Die tuberculöse M. ist natürlich ausgeschlossen, vielmehr nur die epidemischen und die sporadischen Fälle gemeint, welche von vielen als aetiol. gleichartig mit der epidem. angesehen werden (z. B. Strümpel, Lehrbuch). Es liegen aber auch einzelne Fälle von sporad. M. vor, bei denen Staph. pyog. aur. und Bacillen gefunden wurden (H. Neumann und R. Schaefer, Virch. Arch. CIX Heft 3, 1887; Mircoli, Estr. delle Gazz. degli Ospit. 1891, Nr. 88, ref. Centralbl. f. Bact. 1892 p. 918, u. A.).

Wenn wir nun mit Weichselbaum¹⁾ annehmen, dass die epidemische Cerebrospinalmeningitis durch direkte Infection des Schädelraums von den Nebenhöhlen der Nase

¹⁾ Wiener klin. Wochenschr. 1883, Nr. 28—32.

aus und nicht auf dem Wege der Blutbahn eingeleitet wird, welcher Ansicht sich z. B. auch Netter¹⁾ u. A. anschliessen, so könnte die Uebertragung aufs Auge gesehen:

1) Durch Infection des Blutes von den Meningen aus, also durch eigentliche Metastase.

2) Durch direkte Fortleitung in den Scheidenräumen.

Zur Beurtheilung dieser beiden vielfach behaupteten Möglichkeiten ist in allen künftigen Fällen, die nur klinisch beobachtet werden, zunächst eine bacteriologische Untersuchung des Blutes nothwendig.

Wie weit (von den Meningen aus) bei der epidemischen Cerebrospinalmeningitis das Blut inficirt wird, ist bis jetzt noch nicht genügend festgestellt, wenigstens fehlen umfassendere Angaben. Und doch würde das Fehlen der Pneumococcen im Blut auch der Auffassung von der direkten Infection der Meningen selbst eine weitere Stütze bieten. Dass sie in einem Theil der so benannten Fälle ins Blut übergehen, oder von Anfang an darin enthalten waren, geht z. B. aus den Mittheilungen Foá's und Bordone-Uffreduzzi's²⁾ hervor, die einmal eine seröse Entzündung des Pericards, der Pleura, des Peritoneum mit massenhaften Mikroben, sehr oft auch acute Nephritis mit zahlreichen kleinen metastasischen Heerden, mehrmals Polyarthrits, ferner Uebergang der Dipl. in den Foetus, die Placenta und die Milch einer Wöchnerin nachwiesen. Die allgemeine Blutinfection geht auch aus anderweitigen Angaben über Complication mit Endocarditis (z. B. Strümpel, Netter etc.), Gelenkschwellungen (z. B. Mannkopff³⁾) hervor; die Gelenkergüsse können nach Leyden

¹⁾ Arch. génér. de Méd. 1887, Mars ff.

²⁾ Zeitschr. f. Hyg. IV, 1888, p. 76.

³⁾ Ueber Men. cerebrosp. epid. Berlin 1866. p. 156.

(l. c. p. 242) von trüber Beschaffenheit sein und einzelne Flocken enthalten, auch werden nach letzterem subcutane Abscesse ab und zu beobachtet. Es gehören aber, soweit ich aus der sehr umfangreichen Literatur ersehe, eitrige Entzündungen anderer Organe bei der Mening. epid. zu den grössten Seltenheiten, abgesehen vom Auge.

Gegenüber den für das Vorkommen einer Blutinfection sprechenden Befunden hat z. B. Netter („de la méningite due au pneumocoque, avec ou sans pneumonie“) vergeblich zahlreiche bacteriol. Blutuntersuchungen vorgenommen.

Sehr bemerkenswerth scheint auch die öfters gemachte Erfahrung, dass zur Zeit von epidemieartigem Auftreten der Meningitis diese häufig mit Pneumonie abwechselt oder auch mit ihr zusammen auftritt. Demnach kann die Infection durch die Verbreitung ihrer Erreger auf den Schleimhäuten des Tract. resp. verschiedene Organe befallen, und gerade die Lungenentzündung ist ja auch sonst nicht selten die Ursache einseitiger metastatischer Ophthalmie¹⁾ (cf. p. 102).

Welche Fälle führen nun zur Blutinfection und wie weit ist diese constant? Will man die Ophthalmie durch Embolie erklären, so müsste diese Allgemein-infection auch in leichteren, genesenden Fällen vorkommen. Die Untersuchung des Blutes bei epidemischer Cerebrospinalmeningitis ist demnach in erster Linie für uns wünschenswerth, obwohl nach den Untersuchungen Canons auch bei sicherem Vorhandensein pyogner Coccen im Blut ihr Nachweis nur in einem Theil der Fälle intra vitam bis jetzt gelingt.

Immer aber wird bei einer embolischen Ophthalmie zu fragen sein, ob die Meningitis selbst nicht nur ein

¹⁾ Thomas (Gerhard's Handb. der Kinderkrankheiten 1878, Artikel Pneumonie) führt auch Fälle von doppels. Neuritis opt. bei Pneumonie an, die von Seidel und Sichel beschrieben sein sollen.

gleichwerthiges Symptom einer anderweitig eingeleiteten kryptogenetischen Pyämie ist, die nur zeitlich eher, nicht aber als Ursache der Ophthalmie sich ausbildet. Schliesslich wäre es sogar möglich, dass eine embolische Meningitis für sich wieder die Augencomplication durch direkte Fortleitung hervorriefe.

Alle diese verschiedenen Möglichkeiten muss man zur Zeit noch einfach bestehen lassen, es ist, wie dies auch Herrnheiser betont, ganz falsch, eine einheitliche Theorie zu fordern.

Die Fortsetzung meningealer Entzündungen in den Opticusscheiden ist vielfach beschrieben und allbekannt; auch konnte, z. B. von Leube¹⁾ bis zum Bulbus hin eitriges Exsudat mit Extravasaten der benachbarten Pialfortsätze verfolgt werden, ferner typische Tuberkel. Allein es ist bisher meines Wissens bisher nur wenig untersucht worden, wie weit — beim Menschen — die eitererregenden Mikroorganismen selbst vordringen. (Von den Deutschmann'schen Versuchen über sympath. Ophthalmie sehe ich hier ab; es soll ja hier gerade eigentliche Meningitis gefehlt haben, auch entstand im Auge keine Eiterung.) Wohl ist die Annahme vielfach verbreitet, dass sie sich ohne weiteres im Scheidenraum fortpflanzen und bis ins Auge gelangen können. Allein das bacteriologische Beweismaterial ist sehr spärlich. Und doch ist die Art der Mikroorganismen sicher von Belang. So konnte Deutschmann bei seinen Versuchen über Neuritis optica den Staph. pyog. aur. nicht anwenden, weil die Thiere an der Meningitis zu Grunde gingen, bevor eine stärkere Betheiligung der Scheidenräume eintrat.

Wir müssen, wenn die Meningitisophthalmie auf dem Wege der Scheiden entsteht, es mit Mikroorganismen zu

¹⁾ l. c. Ferner Michel, Deutsch. Arch. f. klin. Med. XXII, 1878. p. 439.

thun haben, die sich trotz nur mässiger Virulenz schnell bis ins Auge verbreiten können und hier noch eitererregend wirken, ohne doch in den Meningen eine tödtliche Erkrankung hervorzurufen. Die Möglichkeit, dass etwa nur Toxine, Stoffwechselprodukte ins Auge mit dem Lymphstrom diffundiren, ist unwahrscheinlich. Solche, sich in einer Flüssigkeit doch gleichmässiger vertheilende lösliche Substanzen müssten vermuthlich häufiger beide Augen erreichen. Es fragt sich in erster Linie: Wie weit pflanzen sich die Pneumococcen in den Sehnervenscheiden fort und in welchem Verhältniss steht diese Fortleitung zur Malignität der ursächlichen Meningitis?

Einen Beitrag zu dieser Frage mögen die folgenden Fälle geben:

Fall VIII.

Pneumococcenmeningitis mit Infection des Blutes, Pn. in den Sehnervenscheiden. Rechtsseitige Capillarembolie der Netzhaut. Infection der Orbita durch die fissura supraorbitalis.

Stroh, Anna. 2 Monate alt aus Marburg, wird im Zustand starker Pädatrie in die Klinik gebracht (23. III. 93). bes. auf der Hornhaut unten innen ein etwas über stecknadelkopfgrosser, oberflächlicher Epitheldefect mit wenig infiltriertem Grunde, offenbar durch den mangelhaften Lidschluss veranlasst. Auf den Ulcerationen etwas trockener, schmutzig grauer Belag. Sonst ausser der allg. Kachexie keine Symptome.

Innerhalb der nächsten 3 Wochen erholte sich das Kind unter geeigneter Diät zusehends, nahm an Gewicht zu. Die Hornhautulcere reinigten sich. Am 14. IV. 93 bds. Facette. Kind befindet sich wohl.

Noch im Lauf desselben Tages aber trat eine erhebliche Verschlechterung des Allgemeinbefindens wieder ein. P. wurde apathisch, nahm keine Nahrung. Temp. im Mastdarm 38°. Objectiv sonst nichts nachzuweisen, Lungen speciell frei von Veränderungen. Keinerlei Convulsionen etc. Abends 8¹/₄ Uhr exitus letalis ohne längere Agonie.

Ohne an Meningitis zu denken, nahm ich unmittelbar nachher eine ophthalmoskop. Untersuchung vor, nur um die Zeichen des eingetretenen Todes festzustellen: Beiderseits völlige Ischämie der kaum sichtbaren Arterien. Papille und Retina in weitem Umkreis intensiv grauweiss verfärbt, Venen stark geschlängelt und weit, vielfach unterbrochen. I. auf der Papille und oberhalb derselben bis in die Peripherie hinein sehr ausgedehnte frische Hämorrhagien. Brechende Medien klar. Die weisse Trübung und völlige Verwischung der Papillengrenzen war für eine reine Leichenerscheinung auffallend stark und musste zum Theil schon vor dem Tode existiert haben. Diagnose: bds. hochgradige Neuroretinitis, I. mit Hämorrhagien. Vielleicht Meningitis? (Es sei hier erwähnt, dass ein ähnlicher ophthalmoskopischer Befund von noch stärkerer intensiv weisser entzündlicher Trübung der Ret. bei Meningitis von Hirschberg im Heidelberger ophthalmol. Congress 1875 mitgetheilt ist).

Section 15. IV. 93. morgens 8 $\frac{1}{4}$ Uhr. (Dr. Pels-Leusden):

Sehr stark abgemagerte weibliche Kindesleiche.

Augenlider I. etwas ödematös. Bei Eröffnung der Dura quillt die Gehirnssubstanz stark vor und es entleert sich reichlich etwas gelblich gefärbte Flüssigkeit. Pia mater durchweg stark ödematös, Venen derselben stark gefüllt. Es finden sich entlang den Gefässen, den Lymphscheiden derselben entsprechend, gelblich weisse Flocken und Streifen in der Pia. Besonders stark ist dies vorn am I. Schläfenlappen; sowohl Convexität als Basis zeigen eitrige Trübung der stark vermehrten Pialflüssigkeit. Dura ohne Veränderungen, Gehirnssubstanz desgl. Chiasma und intracranielle Optici von gelblich trüber Flüssigkeit umspült, welche sich in den hinteren Abschnitt der Scheiden fortzusetzen scheint. Sehnerv auf dem Querschnitt ohne makroskop. Veränderungen.

Lungen durchweg lufthaltig, nur an den hinteren unteren Parteen der I. Lunge finden sich einige luftleere stärker bluthaltige, doch nicht eigentlich pneumonische Stellen; Pleura überall glatt und glänzend. Herz und Organe des Bauchs bis auf einige geschwollene Mesenterialdrüsen ohne Veränderungen.

Im Pialeiter finden sich ausserordentlich zahlreiche kapselumgebene längliche Diplococcen, einzelne auch in den oben beschriebenen Stellen der I. Lunge und im Milzsaft. Fränkel'sche Pneumococcen.

Es wurden beide Orbitae mit den Augen in Alkohol conserviert und dann in Celloidin gebettet, die Schnitte, welche durch

die ganze Länge des Opticus und die Papille gingen, nach der Weigert'schen Fibrinmethode gefärbt.

Mikroskop. Untersuchung:

bds. Vord. Augenabschnitt abgesehen von den oberflächl. Hornhautveränderungen normal. Hinter der Ora serrata zu beiden Seiten Netzhaut in Gestalt einer etwa 2 mm hohen steilen Falte gegen den Glaskörper vorspringend, obwohl sie sonst anliegt. Papille bds. mässig geschwollen: in den erweiterten Maschen der Zwischenkörnerschichten der Netzhaut in grösserer Ausdehnung eingelagertes Fibrin, desgleichen im Innern der Gefässe, die z. Th. zahlreichere Rundzellen enthalten. Einzelne Blutungen in der Nervenfaserschicht. Stäbchen und Zapfen gut erhalten. Aderhaut ohne stärkere Veränderungen.

Scheidenraum der Sehnerven in ganzer Länge deutlich erweitert und mit dichten, meist mehrkernigen Rundzellen gefüllt, bds. Trabekel ödematös. Entlang den letzteren, zwischen den Rundzellen und massenhaft auch in denselben lanzettförmige Diplococcen ohne deutliche Kapsel; sie sind am zahlreichsten hinten und in der Mitte der Orbita, aber auch noch unmittelbar hinter der Sclera an der Lamina cribrosa angehäuft. Eine Fortsetzung dieser Coccen in die Lamina cribr., den Sehnerven und den Bulbus hinein liess sich nirgends mit Sicherheit nachweisen. Auch ein unmittelbarer Uebergang aus dem Scheidenraum in die Orbita, etwa entlang den Centralgefässen, liess sich nicht feststellen. (cf. Fig. 7, Taf. I.)

Wiewohl also nicht in nachweisbarem Zusammenhang mit den intravaginalen Coccen, sind doch r. in der Papilla solche mit Sicherheit nachzuweisen. Sie liegen hier zwischen den Sehnervenfasern in Gestalt einer schmalen, länglichen lockeren Zoogloeamasse, die einer verstopften Capillare entspricht. Die Länge dieser cylindrischen Coccenmasse beträgt nicht über 2 mm. In ihrer nächsten Umgebung Rundzellen und Fibrin, zwischen welchen bereits vereinzelte freie Diplococcen sich finden.

An anderen Stellen im Auge wurden sie nicht gefunden, links überhaupt nicht intrabulbär an den darauf untersuchten Schnitten.

Ausser in den Opticusscheiden waren bes. Diplococcen auch frei in den Gewebsspalten des orbitalen Fettzellgewebes in grösserer Zahl, in lockeren Zügen angeordnet, bis etwa zur Mitte der Augenhöhle hin zu verfolgen. Sie stehen in keiner nachweisbaren Beziehung zu den thrombosierten Gefässen, sondern ziehen von der Gegend

der Fissuren her entlang den grösseren Septen und von diesen aus ins Netzwerk des Fettzellgewebes; in der Umgebung der Gefässe, in deren Lumen die Rundzellen mässig vermehrt sind, an verschiedenen Stellen beginnende entzündliche Fibrinausscheidung.

Es handelt sich bei dem Kinde um eine sporadische, der epidemischen jedenfalls sehr nahestehende Pneumococcenmeningitis mit Infection des Blutes. (In demselben Jahre sind im pathol. Institut eine grössere Zahl solcher Fälle von Pneumococcenmeningitis bei kleinen Kindern zur Section gelangt.) Es ist hier also auch die Möglichkeit metastatischer Processe gegeben und in der That geht die intraoculare Infection von einer Capillarembolie aus. Eine direkte Ueberwanderung der Coccen aus dem Scheidenraum in die Lamina cribrosa und das Auge ist trotz ihrer Massenhaftigkeit (auch noch hinter der Sklera) nicht zu beobachten. Es muss berücksichtigt werden, dass in vorgeschrittneren Stadien, in einem Falle wie dem vorliegenden, die von der Papille wuchernden Coccen mit denen im Scheidenraum zusammen treffen könnten. Es kann sich daher, auch wenn man zwischen Scheideninfection und intraocularer Infection eine anatomische Grenze nicht mehr findet, doch um 2 selbständige entzündliche Processe handeln, deren Zusammenhang nur mit grosser Vorsicht gedeutet werden darf. Dies ist bei der Frage der Infection des Auges von den Scheiden aus zu berücksichtigen.

Es wird weiteren Beobachtungen über die Verbreitung der Pneumococcen in den Scheidenräumen des Opticus bei Meningitis vorbehalten bleiben müssen zu entscheiden, ob dieselben nicht doch die Lamina cribrosa durchwandern können. Wohl möglich, dass bei der eigentlich epidemischen Form der in seiner Virulenz und Eigenart so mannigfaltige Pn. sich auch in dieser Hinsicht verschieden

verhält, und ich möchte deshalb diesen Fall, der tödtlich endete, nicht ohne Einschränkung mit den genesenen, von Ophthalmie complicirten Fällen zusammenstellen.

Vielleicht können wir uns für manche Fälle der Ophthalmie den Sachverhalt so erklären: Durch das Uebergreifen der meningealen Entzündung auf den Sehnervenscheidenraum wird, wie so häufig, Neuritis optica hervorgerufen und die damit verbundenen Circulationsstörungen im Auge, besonders in der Netzhaut, können es veranlassen, dass im Blut circulirende Mikroben sich gerade hier ansiedeln, vermehren und die eitrige Entzündung herbeiführen.

Es lässt uns diese Hypothese die isolirte Erkrankung des Auges verstehen, deren rein metastatische Deutung misslich und auch durch die Auffassung Berlin's, der Krankheitsstoff localisire sich gleichzeitig in der Pia cerebri und der Pia oculi, nicht erklärt ist. Und wenn sich bestätigt, dass die Infection des Blutes bei der Meningitis nicht die Regel ist, so würde damit auch die relative Seltenheit der Ophthalmie verständlicher sein, als bei der direkten Ueberwanderung, zu welcher ausserdem Coccen nothwendig sind, die unter Ueberwindung der Widerstände zwar das Auge erreichen und hier Eiterung verursachen, trotzdem aber gerade in diesen Fällen eine gutartige Meningitis erzeugen. Das meist einseitige Auftreten der Ophthalmie bleibt freilich gerade so unerklärt, wie bei der direkten Ueberwanderung. Es verdient aber vielleicht der Umstand Beachtung, dass die meningeale Exsudation nicht selten in ungleichem Grade beide Hälften der vorderen und mittleren Schädelgrube befällt; ob nun aber dicke Eiterbildung in der Umgebung des Opticus oder dünnflüssigere Trübung diesen und seine Scheiden mehr schädigen, ist nicht sicher zu sagen (s. u.).

Die geschilderte Auffassung¹⁾ erhebt nicht den An-

¹⁾ Sie hat eine gewisse Aehnlichkeit mit der Vermittlungs-

spruch auf allgemeinere Gültigkeit, verdient aber vielleicht, bei weiteren Untersuchungen in Erwägung gezogen zu werden. Auch ich möchte für möglich halten, dass das, was heute als „Ophthalmie bei Meningitis“ geführt wird, auf verschiedenem Wege eingeleitet wird, dann aber erst ganz beurtheilt werden kann, wenn wir die Meningitis selbst noch genauer kennen.

Besonders wird sich die genaue Untersuchung von Augen auch solcher Personen empfehlen, die äusserlich noch keine Zeichen der Entzündung bieten. Dass nicht bei jeder Pneumococcenmeningitis die Ausbreitung der Mikroben in den Sehnervenscheiden im Verhältniss steht zum Grade der meningealen Eiterung, geht daraus hervor, dass in dem Fall V (p. 91) sich in der Mitte der Orbita die Scheiden bereits ganz normal fanden, obwohl die Eiterung gerade in der Umgebung der intracraniellen Optici, diesem Lieblingssitz des Exsudates, viel hochgradiger war als bei Kind Stroh. Ja es ist nicht ausgeschlossen, dass gerade eine sehr intensive Eiterbildung an der Basis mit Verlagerung der intracraniellen Scheidenöffnungen durch dichte Zellmassen die bacterielle Infection der Scheiden erschwert, während bei nur mässiger entzündlicher Trübung des noch dünnflüssigeren Liquor cerebrospinalis und damit auch geringerer Störung der normalen Lymphcirculation die Mikroben leichter auch passiv nach dem Auge hin transportirt werden könnten. Solche geringe Trübung mit ausgedehnter Verbreitung der Coccen findet sich freilich auch bei ganz acuten, tödtlichen Fällen und ist deshalb für die gutartige, zur Ophthalmie führende Form nicht ohne weiteres in Anspruch zu nehmen.

Die Mannigfaltigkeit der Entstehungsmöglichkeiten des klinischen Bildes der Meningitisophthalmie ergibt sich auch aus folgender Untersuchung:

theorie Schmidt-Rimpler's zur Erklärung der sympathischen Ophthalmie.

Fall IX.

Den hinteren Augenabschnitt mit den Sehnerven verdanke ich Herrn Prof. Marchand. Ueber die Krankengeschichte sei kurz angegeben, dass es sich um einen etwa 10jährigen Knaben handelte, der das Bild der acuten Cerebrospinalmeningitis bot. Die wenige Tage vor dem Tode im Verlauf der Meningitis aufgetretene einseitige Ophthalmie bot das gewöhnliche Bild tiefer Glaskörper-Eiterung und wurde von Herrn Prof. von Hippel in Giessen als von der Meningitis vermuthlich durch die Sehnervenscheiden fortgeleitet aufgefasst; sie führte bis zum Tode nicht bis zur Panophthalmie.

Die Section ergab eine ausgedehnte eitrige Cerebrospinalmeningitis an Convexität und Basis, ferner eine ulceröse Endocarditis; (also vielleicht eine kryptogenetische Pyämie mit metast. Meningitis?) Culturen sind nicht angelegt worden. Der bis etwa an die Ora serrata hin herausgenommene hintere Bulbusabschnitt wurde längere Zeit in Müller'scher Flüssigkeit, später Alkohol conservirt. Paraffineinbettung. Färbungen mit Fuchsin, Löffler'schen und Borax-Methylenblau blieben trotz guter Kernfärbung völlig negativ. Dagegen gelang nach Weigert'scher (nicht nach Gram'scher) Methode noch eine z. Th. sehr schöne Mikroorganismenfärbung, freilich nicht gleichmässig in allen Theilen des Präparates. Es fanden sich nur längliche, kleine, lanzettförmige Diplococcen, hier und da die bekannten Involutionsformen, ferner massenhafte Phagocyten; keine Ketten, nirgends zoogloeartige Massen. Die Diplococcen liegen vielmehr zwar äusserst massenhaft, aber locker zwischen und in den Zellen. Es handelt sich um eine metast. Retinitis mit starker eitriger Entzündung der Papille und Netzhaut, aber ohne eigentliche Nekrose der letzteren, obwohl die Diplococcen die Netzhaut vielfach in ihren gesamten Schichten durchsetzen. Centralgefässe hinter der Lamina cribrosa nicht deutlich verändert, bluthaltig. Aderhaut nur sehr wenig gleichmässig verdickt, mit dichter Rundzelleninfiltration der inneren Schichten. Pigmentepithel und Glashaut intakt. In der Aderhaut sind Mikroben nicht gefunden, ebensowenig im Opticus und seinen Scheiden, welch letztere keine stärkere Anhäufung von Rundzellen erkennen lassen, dem Nerven vielmehr dicht anliegen. Von einem von den Scheiden aus fortgeleiteten Process kann nicht wohl die Rede sein, obwohl der Mikrobenfund auch hier nicht absolut verwerthbar ist, da sich die schon oben

gemachte Erfahrung der ungleichmässigen Färbung auch hier leider wiederholte. In den untersuchten Schnitten, welche freilich nur den papillaren Teil des Präparates betrafen, waren Beziehungen der Mikroorganismen zu den Gefässen nicht mehr nachweisbar.

Die Wahrscheinlichkeitsdiagnose „Fränkel-Weichselbaum'sche Pneumococcen“, welche Herr Prof. Marchand bestätigte, dürfte nach den oben geschilderten Grundsätzen berechtigt sein.

Es handelt sich hier um eine rein metastat. Ophth. ähnlich der von Oeller beschriebenen, auf welche die obige Hypothese keine Anwendung findet.

Die letztgenannten Fälle beweisen also, dass auch eine hochgradige Pneumococcenmeningitis mindestens acht Tage lang bestehen kann, ohne wesentliche Infection der Scheidenräume des Opticus auch in ihren hinteren Theilen. Die Verbreitung dieser Mikroben und auch des Eiters erfolgt hier jedenfalls nicht nur durch Transport mit dem Lymphstrom, auf welchen Deutschmann (l. c.) für andere infectiöse Stoffe so grossen Werth legt. Von welchen Bedingungen hier die Infection der Scheidenräume abhängt, lässt sich zur Zeit noch nicht angeben. Und dass selbst bei einer massenhaften Anwesenheit von Pneumoc. dicht hinter der Sklera diese noch nicht sofort in die Lamina cribrosa und das Auge übergehen, dürfte durch Fall Stroh bewiesen sein. Eine ähnliche Beobachtung, freilich ohne bacteriolog. Untersuchung enthält der bekannte Fall von v. Hofmann (Neurol. Centralblatt 1886, p. 357), der einen klein-fingerdicken Abscess des Scheidenraumes fand und incidirte, ohne dass das Auge selbst vereitert war.

Jedenfalls aber ist die Vermuthung von Knies (l. c. p. 161) bis jetzt nicht begründet, dass die Neuritis optica durch Stoffwechselprodukte der meningealen Mikroben bedingt sei, während bei ihrem Eindringen in den Scheidenraum es zur eitrigen Ophthalmie käme.

Ganz unzweckmässig ist auch der vielfach ge-

bräuchliche Ausdruck der „eitrigen Chorioiditis“; in vorliegenden 2 Fällen ist die Netzhaut der Ausgangspunkt. Denn wenn auch der Eiter bei der Mehrzahl der Fälle von intraocularer septischer Entzündung der Hauptmenge nach von der Aderhaut stammt, ist es doch klarer, die Benennung entweder nach der primär erkrankten Membran zu wählen oder in Dubio sich mit dem allgemeineren Begriff: „Ophthalmie“ zu begnügen.

Es ist ferner hervorzuheben, dass die Pneumococcen sich in die Gewebsspalten der Orbita verbreitet haben; die von ihnen hier hervorgerufenen entzündlichen Veränderungen sind freilich noch im ersten Beginn und intra vitam nur durch eine geringe Chemose l. angedeutet worden.

Eine Vermittelung durch eine Thrombophlebitis war nicht nachzuweisen und wir haben somit den Beweis vor uns, dass in der That sich der infectiöse Process auch unmittelbar durch die Fiss. supraorb. einmal sich in die Orbita fortsetzen und wahrscheinlich auch zur Abscedirung des Fettzellgewebes führen kann, wie Leyden¹⁾ und Klebs²⁾ es angenommen haben; die bisherige Erfahrung (Berlin³⁾), dass es sich bei der im Anschluss an Meningitis entstehenden Orbitalphlegmone stets um eine fortschreitende Thrombophlebitis des Sinus cavernosus handelt, trifft demnach nicht ganz ausnahmslos zu.

Dass aber die Vermittelung durch die venösen Bahnen doch wohl die Regel bildet, ist nach den Untersuchungen Leber's⁴⁾ als wahrscheinlicher anzunehmen, in dessen Fällen die eitrige Thrombophlebitis mit Sicherheit nachzuweisen war.

Ob die gefundene direkte Infection des orbitalen Gewebes auch mit der intraocularen Eiterung bei der Meningitis in

¹⁾ Chemosis conj. als Symptom eitriger Meningitis. Virch. Arch. XXIX, 1864, p. 199 ff.

²⁾ Virchow's Arch. XXXIV, p. 345.

³⁾ Arch. f. Psych. u. Neurol. XI, 1880, p. 273.

⁴⁾ v. Graefe's Arch. f. Ophth. XXVI. 3., p. 212 ff.

aetiologische Beziehung zu bringen ist, vermag ich nicht zu sagen. Ich halte es aber für wenig wahrscheinlich, da wir doch sonst häufiger auch eine stärkere Betheiligung der Orbita finden müssten.

Es sei bei dieser Gelegenheit hervorgehoben, dass umgekehrt eine eitrige Entzündung im Schädelinneren von einer metastat. Ophthalmie aus durch aufsteigende Infection durch die Venen oder Lymphbahnen zwar möglich, aber bisher niemals mit Sicherheit nachgewiesen ist. Die relativ seltenen Fälle, in denen überhaupt eine gleichartige Meningitis vorlag, beruhen auf gleichzeitiger oder späterer eigener Metastase.

(Wenn übrigens die epidemische Cerebrospinalmeningitis wirklich durch direkte Infection von den Nebenhöhlen der Nase aus entsteht, ohne dass dieselben selbst erst deutlich erkranken, so ist eine ähnliche Entstehungsweise auch für manche Fälle von scheinbar spontanen „Erkältungs“(-?)-Orbitalphlegmonen vielleicht zu erwägen. Durch genaue bakteriolog. Untersuchungen würde sich auch feststellen lassen, wieweit vorübergehende (latente) erysipelatöse Zustände (Leber, l. c. p. 218) in Frage kommen, oder etwa Pneumococcen-Infectionen, deren Verhalten in der That durch „rheumatische“ und ähnliche Veränderungen beeinflusst zu werden scheint.)

Wenn in der Einleitung aus den anatomischen Verhältnissen des Auges heraus es als wahrscheinlich angenommen werden musste, dass überall, wo sich eine Disposition desselben zu embolischer Erkrankung zeigen würde, deren capilläre Entstehung in erster Linie anzunehmen sei, und nachdem die bisherigen Betrachtungen die hervorragende Bedeutung der Embolie der feinsten Capillaren für die metastat. Ophthalmie trotz mancher Unterschiede der angenommenen Gruppen, übereinstimmend gezeigt haben, sei noch kurz darauf verwiesen, dass die Bedeutung der besonderen Capillarverhältnisse des Auges auch dadurch schon dargethan werden kann, dass man zum Vergleich die metastatische Orbitalphlegmone heranzieht. Obwohl die übrigen Aeste der Ophthalmica die ocularen so bedeutend übertreffen, ist doch die metastat. Entzündung

in ihren orbitofacialen Zweigen ungleich seltener. Im Gefolge einiger Infectionskrankheiten, z. B. des Typhus soll sie nach einigen älteren Angaben angeblich häufiger sein, z. Th. epidemieartig auftreten (Carrons de Villars), und in manchen Lehrbüchern (z. B. Stellwag von Carion) wird sie auch fürs Puerperium und andere pyämische Zustände als nicht selten bezeichnet. Die Zahl der genaueren Mittheilungen ist aber so gering, dass sie trotzdem hinter der Ophthalmie weit zurückzustehen scheint. So enthält die Arbeit von Schwendt¹⁾ nur die eine Beobachtung von Rosas, desgl. die Arbeit Berlin's im Handbuch von Graefe-Saemisch.

Die wenigen Fälle, die ich finden konnte, sind:

Rosas (österr. med. Jahrbücher 1836. Bd. VIII.) Orbitalphlegmone bei Puerperalfieber.

Strzeminsky. J. Medizinskoje Obosrenje XXX, 1888. Nr. 17, p. 104. Desgl.

Würdemann, Metastatic. Abscess and Cellulitis of the orbit, following double suppuration Chaneroidal Buboos of the inguinal region.

The American journ. of Ophth. 1891, Mai.

(Denti, Flemmone retrobulbare destro nach Furunkel im Nacken? Annali di ottalmol. XII. 1883, p. 555.)

Ferner einige Fälle nach Influenza (Lyder-Borthen, Socor, Wicherkiewicz), zu denen auch noch die Fälle von „Tenonitis“ kommen (Fuchs, Schapringner u. a.). Rechnet man ferner hinzu die Fälle, bei denen auch ausserhalb des Auges in den Muskeln etc. Embolien sich fanden, ferner die sehr seltenen von metastatischer Lidgangrän (Mitvalsky) und schliesslich noch einen Theil der als „spontane Orbitalphlegmone“ beschriebenen Fälle so erscheint die Zahl der orbitalen Metastasen immer noch unverhältnissmässig klein gegenüber den bulbären. Dass etwa orbitale Embolien uns leichter entgehen können, als die intra-ocularen, ist zwar nicht ohne Bedeutung; aber wir müssen doch annehmen, dass, wenn infectiöses Material sich hier festgesetzt hat, dieses auch hier meist in kurzer Zeit flagrante Erscheinungen macht, jedenfalls innerhalb mehrerer Tage.

¹⁾ Orbitalphlegmone, Inaug.-Diss., Basel 1890.

Ist diese grössere Häufigkeit der metastat. Ophthalmie gegenüber der metastat. Orbitalphlegmone zutreffend, so spricht auch dies, freilich viel unbestimmter, als die andern Daten, für die Bedeutung der feinsten Capillaren.

Die ganzen statistischen Untersuchungen haben ferner für alle Formen der Pyämie die erheblich schlechtere vitale Prognose der mit doppels. metastat. Ophthalmie complicirten Fälle gegenüber denjenigen übereinstimmend ergeben, wo nur ein Auge befallen war, wie sich herausstellte, in verschiedenem Grade bei den von uns angenommenen Gruppen (ganz ausgen. sind die Pneumonie- und Meningitisfälle). Es ist demnach in dem gefundenen Verhältniss die doppelseitige metastat. Ophthalmie als ein vitales Prognosticum eigener, schlimmster Bedeutung von grossem Werth, die einseitige nicht (ausgen. vielleicht die puerperale).

Da demnach die einseitige metastat. Ophthalmie in ihrer prognostischen Bedeutung für das Leben vor den Metastasen anderer Körpertheile nichts Besonderes voraus hat, so haben wir bei der jetzt folgenden Besprechung der für die metastat. Ophthalmie wichtigen anatomisch-bacteriologischen Verhältnisse ganz besonders uns mit der Entstehung der doppelseitigen Form zu beschäftigen; dabei ist zu berücksichtigen, wie weit die als hochwahrscheinlich anzunehmende Embolie der feinsten Capillaren in Einklang zu bringen ist mit den vorliegenden Befunden über die eitrige Ophthalmie. Zunächst aber ist es nothwendig zu untersuchen, was bei der anatomischen Untersuchung überhaupt als charakteristisch für eine endogene Infection und besonders eine stattgehabte Embolie angesprochen werden darf.

Erklärung der Abbildungen auf Tafel I,
Fig. 1—7.

- Fig. 1. Phthisis bulbi mit lippenförmiger Hornhautfistel nach metastat. Strept. Ophth. bei Phlegmone cubiti. 5 Wochen nach der Perforation noch Strept.-Massen in der Tiefe (p. 48). $1\frac{1}{2}$ fache Loupenvergr.
- Fig. 2. Traubenförmige, myelinartige Degenerationsproducte der Stäbchen und Zapfen. Oc. I, Obj. VII (p. 91).
- Fig. 3. Metast. Pneumococcenophth. bei kryptogen. Pyämie nach Cholelithiasis. Umschriebene eitrige Herde in der Ret. neben der Papille. Sehnervenscheiden normal. $2\frac{1}{2}$ fache Vergr. (p. 91).
- Fig. 4. Arteriitis obliterans bei metast. Ophth. *a* Beginnende Organisation. *b* Starke Endothelwucherung, hyaline Degen. der Wandung. Oc. I, Obj. VII (p. 98).
- Fig. 5. Phagocyten mit Fraenkel-Weichselbaum'schen Pneumococcen bei metast. kryptogen. Retinochor. Oc. I. Leitz'scher Pantachromat (p. 78, 99).
- Fig. 6. Degenerationsformen des Fraenkel-Weichselbaum'schen Pneumococcus im Glaskörpereiter. Oc. I, Leitz'scher Pantachromat (p. 99).
- Fig. 7. Pneumococcen in den Opticusscheiden und Lymphspalten der Orbita bei sporad. Meningitis, ohne Uebergang in's Auge. Capillarembolie der linken Papille. 2fache Vergr. (p. 119).

Bei Fig. 1 u. 2 sind die Umrissse mittelst des Edinger'schen Zeichenapparates skizzirt.

Fig. 1.

Fig. 3.

Fig. 5.

Fig. 6.

Fig. 2.

Fig. 4.

Fig. 7.