Ueber Maltose. Zur Darstellung reiner Maltose schlug E. Schulze*) folgendes Verfahren ein: Mit einer Lösung der aus einem wässerigen Malzauszug mit Weingeist ausgefällten Diastase wurde Stärkekleister bei einer Temperatur von circa 60° C. verzuckert. Die zuckerhaltige Lösung wurde auf ein geringes Volum verdunstet und mit Weingeist versetzt, wodurch eine Ausscheidung von Dextrin entstand. Die davon abgegossene Lösung wurde zum Syrup verdunstet und letzterer mit starkem Weingeist ausgekocht. Nach dem Erkalten wurde die klare Lösung von dem ungelösten abgegossen und über Schwefelsäure der Verdunstung überlassen. Die gelöste Substanz schied sich an den Wandungen und am Boden des Gefässes anfangs in der Regel als Syrup aus; in demselben zeigten sich aber bald kleine Krystalle und bei längerem Verweilen unter der Mutterlauge verwandelte sich die syrupartige Substanz vollständig in eine weisse Krystallmasse. — Löst man dieselbe in Wasser, verdunstet zum dünnen Syrup und lässt letzteren längere Zeit an einem kühlen Orte stehen, so beginnt er zu krystallisiren und verwandelt sich schliesslich in einen Brei feiner weisser Krystalle. Dieselben wurden auf ein Filter gebracht, mit etwas verdünntem Weingeist gewaschen, abgepresst und an der Luft getrocknet. Sie bilden dann eine vollkommen weisse, harte, aus sehr feinen Krystallen bestehende Masse. 100 Th. Maltose besitzen das gleiche Reductionsvermögen gegen Kupferoxyd wie 66 — 67 Th. Traubenzucker.

Die Analyse der lufttrocknen Maltose führte zu der Formel $C_{12}H_{22}O_{11} + H_2O$.

Die spec. Drehkraft der wasserfreien Substanz wurde = 149,5 gefunden.

Durch Kochen mit verdünnten Säuren geht die Maltose in Traubenzucker über.

Ueber den Nachweis von Aloë und ähnlichen Bitterstoffen. Zur Auffindung von Aloë etc. in Medicamenten, Liqueur, Essenz etc. empfiehlt O. Bach**) das folgende Verfahren: Man extrahirt die zur Trockne eingedampfte Flüssigkeit mit Alkohol, welcher sämmtliche Stoffe aufnehmen wird. Die erhaltene Lösung verdunstet man unter Zusatz von Sand auf dem Wasserbade zur Trockne. Der erhaltene trockene Rückstand wird dann, nachdem er gepulvert, mit kaltem Wasser behandelt. Hierbei gehen die wirksamen Bestandtheile von Aloë, Coloquinten, Wermuth und

*) Berichte der deutschen chem. Gesellschaft 7, 1047.

**) Journ. f. prakt. Chemie [N. F.] 9, 188.

Enzian in Lösung. Wird vom Wasser nichts mehr aufgenommen, so engt man die erhaltene mehr oder weniger gefärbte Flüssigkeit auf dem Wasserbade ein und versetzt in der Kälte mit einer Lösung von salpeters. Quecksilberoxydul im Ueberschuss: Coloquinten und Wermuth fallen sofort als voluminöse Niederschläge aus. Man filtrirt dieselben schnell ab, wäscht aus und löst den Niederschlag in verdünnter Salpetersäure. Bei Gegenwart von Coloquinten bleiben in der gelbgefärbten Flüssigkeit unlösliche Flocken. Ist dagegen gleichzeitig Wermuth zugegen, so erscheint die Lösung braun und die Flocken sind nicht gut wahrzunehmen. Man behandelt deshalb die saure Lösung mit überschüssigem Ammon, welches das Quecksilber fällt, dagegen Coloquinten und Wermuth löst. Man filtrirt und erhält bei Gegenwart von Coloquinten ein schön gelbes, bei Gegenwart von Wermuth oder beiden zusammen ein braunes Filtrat. Man dampft dasselbe zur Trockne ein und behandelt es noch warm auf dem Wasserbade mit Essigsäure. In Lösung geht Wermuth, während Coloquinten unlöslich zurückbleiben. Letztere geben nun mit conc. Schwefelsäure eine hochrothe, mit Fröhde'schem Reagens eine kirschrothe Lösung. Die essigsaure Lösung gibt zur Trockne verdunstet einen gelbbraunen Rückstand, welcher sich in conc. Schwefelsäure zu einer braungelben Flüssigkeit löst und mit Fröhde'schem Reagens eine anfangs braune, beim Rühren grüne und endlich violett werdende Lösung gibt. — In der vom Quecksilberniederschlag abfiltrirten Flüssigkeit kann Aloë und Enzian enthalten sein. Zum Nachweis wird mit Ammon das Quecksilber ausgefällt und die Flüssigkeit mit einer conc. wässerigen Lösung von essigsaurem Baryt versetzt. Entsteht ein Niederschlag, so ist Enzian zugegen; erscheint dagegen die Flüssigkeit orangeroth gefärbt, so deutet dies auf Gegenwart von Aloë. Man verdunstet die Lösung zur Trockne, zieht mit Alkohol aus, verdunstet und behandelt den Rückstand mit Salpetersäure in der Wärme. Die erhaltene gelbrothe Lösung wird zur Trockne verdampft und gibt in wenig Wasser gelöst, auf Zusatz von Kali und Traubenzucker eine blutrothe Lösung bei Gegenwart von Aloë. Den auf Zusatz von essigsaurem Baryt erhaltenen Niederschlag, welcher Enzian enthält, extrahirt man gleichfalls mit Alkohol, verdunstet und behandelt entweder mit conc. Salpetersäure oder Schwefelsäure, in der er sich gelb, oder mit Kalilauge, in der er sich schön goldgelb löst. —

Der beim Behandeln der ursprünglichen Substanz mit Wasser erhaltene Rückstand kann die harzigen Bestandtheile des Lärchenschwammes, des Scammoniums, sowie der Jalappe enthalten. Zur Trennung behandelt

man den Rückstand mit Aether. In Lösung gehen Lärchenschwamm und Scammonium. Man verdampft zur Trockne und behandelt mit wässriger Sodalösung in der Wärme. Wenn Scammonium vorhanden ist, so bleibt ein Rückstand, welcher in Salpetersäure zu einer gelben Masse aufquillt, in conc. Schwefelsäure aber sich orangefarben löst und beim Stehen eine blutrothe Farbe annimmt. In der Sodalösung kann der harzige Bestandtheil des Lärchenschwamms gelöst sein. Durch Versetzen mit einer Säure fällt man das etwa gelöste Harz wieder aus und prüft mit Salpetersäure, in der es unlöslich ist, während es sich in conc. Schwefelsäure orangefarben löst. — Schliesslich verbleibt als in Aether und Wasser unlöslicher Rückstand Jalappenharz, welches daran erkannt wird, dass es mit conc. Schwefelsäure eine anfangs braune, nach einiger Zeit sich blutroth färbende Lösung bildet, welche den dem Jalappenharze eigenthümlichen aromatischen Geruch sofort stark zeigt.

Nachweis von Mineralsäuren im Essig. Strohl*) gründet eine Methode zum Nachweis von Mineralsäuren im Essig darauf, dass oxalsaurer Kalk in verdünnter Essigsäure unlöslich ist, dagegen von Mineralsäuren aufgenommen wird. Zu genanntem Zweck versetzt der Verfasser den zu prüfenden Essig mit aequivalenten Mengen von oxalsaurem Ammon und Chlorcalcium in so verdünnter Lösung, dass in einem von Mineralsäuren freien Essig eben noch eine Trübung, aber doch eine deutlich sichtbare, entsteht. Zur Herstellung der Reagentien löst man am zweckmässigsten 1,5 Aeq. von jedem zum Liter. Gibt man von jeder dieser Lösungen $\frac{1}{2}$ CC. zu 50 CC. Essig, der frei von Mineralsäuren ist, so entsteht bald eine schwache, aber doch deutlich wahrnehmbare Trübung. Durch besondere Versuchsreihen hat der Verfasser nun weiter ermittelt, welche Quantitäten von Salz-, Salpeter- oder Schwefelsäure dazu gehören, um den entstandenen Niederschlag zu lösen. Es ergaben sich folgende Resultate: Verschwindet nach gründlichem Umschütteln der Niederschlag nicht vollständig, so enthält der fragliche Essig im Liter weniger als 2,85 Grm. Salzsäure, oder 4,40 Grm. Salpetersäure, oder 1,70 Grm. Schwefelsäure. Tritt jedoch nach dem Umschütteln vollständige Klärung ein, so enthält der fragliche Essig mehr von den genannten Säuren.

*) Journ. de Pharm. et Chim. [4] 20., 172.