Neue Untersuchungen über die Zusammensetzung der organischen Basen;

von *V. Regnault*.

Die organischen Basen wurden von mehreren ausgezeichneten Chemikern untersucht und ihre Zusammensetzung wurde vorzüglich in neuester Zeit von den Hrn. Pelletier, Dumas und Liebig untersucht. Liebig gelangte zu dem merkwürdigen Resultate, daß alle organischen Basen in einem Atom Basis 2 Atome Stickstoff enthielten, daß ihre Sättigungscapacität folglich dieselbe ist, als wenn der Stickstoff im Zustande von Ammoniak darin vorhanden wäre, in Verbindung mit einer Substanz, die in nichts dessen Basicität neutralisire. Dieses Gesetz, welches die Zusammensetzung der vegetabilischen Basen regulirt, wurde durch eine große Zahl von Analysen festgestellt und von den Chemikern allgemein angenommen. Wenn man indessen mit Aufmerksamkeit die Reihe der Salze untersucht, welche diese Basen mit Säuren bilden, so bemerkt man ziemlich sonderbare Anomalien. So würden z. B. das schwefelsaure Chinin und Cinchonin, durch Auflösung dieser Basen in einem geringen Ueberschuß von Schwefelsäure und Krystallisiren erhalten, basische Salze seyn so gut als die Salze, die man durch Auflösung in Chlorsäure und Jodsäure erhält. Die chlorwasserstoffsäuren Salze des Strychnins und Brucins, erhalten durch Behandlung dieser Basen mit einem Ueberschuß von Säure oder durch doppelte Zersetzung, würden nach den Analysen von Pelletier anderthalb basische Salze seyn; die chlorwasserstoffsäuren Salze des Chinins und Cinchonins, erhalten durch Auflösung dieser Basen in überschüssiger Salzsäure und Krystallisation würden zweifach basische Salze sein.

Diese Anomalien schienen mir auffallend genug, um mich zu bestimmen, neue Untersuchungen über die Zusammensetzung der organischen Salzbasen zu unternehmen. In dem Falle, wo diese Anomalien sich bestätigen würden, schien es mir nicht unmöglich, daß sie einem tieferen Studium unterworfen, zu einer genauen Kenntniß über die intime Zusammensetzungsart dieser interessanten Körperklasse führen könnten.

Ich theile diese Abhandlung in 3 Abtheilungen, in der ersten werde ich mich mit der Zusammensetzung der hauptsächlichsten vegetabilischen Salzbasen beschäftigen; in der zweiten werde ich das in den Salzen, welche diese Basen mit Sauerstoff-Säuren bilden, enthaltene Wasser untersuchen; ob die vegetabilische Salzbasen sich, nach Art der basischen Oxyde des Mineralreichs, mit den Sauerstoffsäuren verbinden und wasserfreie Salze bilden können, oder ob sie, wie das Ammoniak, hierzu Wasser nöthig haben und ob sie Salze bilden, die nach dem Trocknen immer ein zu ihrer Constitution nothwendiges Atom Wasser zurückhalten. In der dritten Abtheilung endlich werde ich die Reactionen studiren, welche einige Substanzen auf die Alkaloide ausüben, namentlich die Wirkung der Haloide, des Chlors, Broms und Jods.

Erste Abtheilung.

Analyse der vegetabilischen Salzbasen.

Chinin.

Allgemein gibt man dem Chinin folgende Zusammensetzung:

24 At. Wasserstoff	140,7	7,25
20 — Kohlenstoff	1528,8	74,39
2 — Stickstoff	177,0	8,82
2 — Sauerstoff	200,0	9,74
	2055,5	100,00

12 *Regnault, über Zusammensetzung der organ. Basen*

Liebigs Analysen stimmen aber mit dieser Formel ziemlich schlecht überein; dieser berühmte Chemiker fand in der That in 3 Analysen die nachstehenden Resultate:

	I.	II.	III.
Wasserstoff	7,72	7,50	7,50
Kohlenstoff	75,32	75,44	75,78

Durch Sättigen des Chinins mit Chlorwasserstoffsäuregas fand Liebig sein Atomgewicht = 1900; die Analyse des schwefelsauren Chinins gab ihm die Zahl 4300, Liebig betrachtet dieses Salz aber als ein zweifach basisches, wonach das Atomgewicht des Chinins = 2150 wäre.

Das Chinin, mit welchem ich arbeitete, wurde aus durch mehrere Krystallisationen gereinigtem schwefelsaurem Chinin dargestellt.

I. 0,965 lufttrockenes Chinin bis zum Schmelzen erhitzt, verloren 0,137 Wasser = 14,19 Procent.

II. 1,375 Chinin, das mehrere Tage trockener Luft ausgesetzt war, verloren bei 130° 0,185 Wasser = 13,46 Procent.

0,335 trockenes Chinin gaben 0,209 Wasser und 0,822 Kohlensäure.

0,320 lieferten 22,74 C. C. feuchtes Stickgas bei 8° und 0,766 M. Druck; hieraus ergibt sich folgende Zusammensetzung:

Wasserstoff	7,65
Kohlenstoff	74,89
Stickstoff	8,55
Sauerstoff	8,91
	100,00

Zur Bestimmung der Sättigungscapacität des Chinins befolgte ich zuerst das Verfahren von Liebig, welches in der Sättigung eines bekannten Gewichts der Base mit Chlorwasserstoffsäuregas und Bestimmung der Gewichtszunahme besteht,

aber ich konnte durch dieses Mittel nicht zu constanten Zahlen gelangen. Das Chinin absorbiert eine sehr beträchtliche Menge Säure, und wenn man dann die Materie einem trockenen Luftstrom bei einer nach und nach wachsenden Temperatur aussetzt, so entzieht man ihr fortwährend Säure, und wenn die Verluste nicht mehr merklich seyn sollen, ist man genöthigt, die Temperatur sehr hoch zu treiben. 0,751 trockenes mit Chlorwasserstoffsäure gesättigtes und eine Stunde lang einer nach und nach auf 145° steigenden Temperatur ausgesetzt, hielten 0,145 Chlorwasserstoffsäure zurück. Betrachtet man diese Verbindung als das neutrale Salz und leitet man daraus das Atomgewicht der Base ab, so findet man die Zahl 2357. Man leitete nun von neuem Chlorwasserstoffsäure-Gas zu und erhielt die Temperatur auf 160°; die zurückgehaltene Säure betrug 0,141, was für das Aequivalent der Base die Zahl 2424 gibt. Einige Grade darüber fing die Materie an gelb zu werden. In Wasser aufgenommen, erhielt man eine sehr stark saure Auflösung, die beim Abdampfen eine gummiartige Masse ohne krystallinisches Ansehen lieferte. Es schien mir sehr wenig wahrscheinlich, daß diese Materie das neutrale Salz war. Die Hoffnung aufgebend, nach diesem Verfahren das wahre Aequivalent des Chinins zu erhalten, nahm ich meine Zuflucht zu der Analyse des auf nassem Wege bereiteten chlorwasserstoffsäuren Chinins. Man erhält dieses Salz leicht durch Auflösen des Chinins in der Wärme in einem schwachen Ueberschuß verdünnter Chlorwasserstoffsäure; beim Erkalten setzt die Flüssigkeit das Salz in langen seidenartigen Nadeln ab.

1,107 lufttrocknes krystallisirtes salzsaures Chinin wurden bei 140° einem trockenen Luftstrom ausgesetzt, bis sich das Gewicht nicht mehr verminderte; es verlor 0,078 Wasser = 7,05 Proc.

1. 1,029 trocknes Salz lieferten 0,306 geschmolzene-

14 *Regnault, über Zusammensetzung der organ. Basen.*

Chlorsilber oder 0,0977 Salzsäure, was das Atomgewicht 4338 gibt.

II. 0,891 bei 130° getrocknetes Salz lieferten 0,303 Chlorsilber, entsprechend 0,07686 Salzsäure, wornach das Aequivalent 4287 beträgt.

I. 0,385 trockenes Salz gaben 0,250 Wasser und 0,934 Kohlensäure.

II. 0,3848 trockenes Salz gaben 0,246 Wasser und 0,937 Kohlensäure.

0,504 gaben 34 C. C. Stickgas bei 12° und 0,757 M. Druck.
Hiernach erhält man:

	I.	II.
Wasserstoff	7,21	7,10
Kohlenstoff	67,08	67,33
Stickstoff	8,02	8,02
Sauerstoff	8,46	8,22
Chlor	9,23	9,33
	100,00	100,00

Diese Zahlen führen zu der Formel:

52 At. Wasserstoff	324,5	6,98
41 — Kohlenstoff	3133,9	67,33
4 — Stickstoff	354,0	7,61
4 — Sauerstoff	400,0	8,58
2 — Chlor	442,6	9,50
trockenes Salz	4655,0	100,00
3 At. Wasser	337,5	6,61
krystall. Salz	4992,5	

Die Zusammensetzung des Chinias würde alsdann seyn:

50 At. Wasserstoff	312,0	7,43
41 — Kohlenstoff	3133,9	74,62
4 — Stickstoff	354,0	8,43
4 — Sauerstoff	400,0	9,52
1 Atom trocknes Chinin	4199,9	100,00.
6 Atome Wasser	675,0	13,83
1 At. wasserhaltig. Chinin	4874,9	

Diese theoretische Zusammensetzung stimmt mit der, welche wir durch die directe Analyse gefunden haben, überein.

Cinchonin.

Die für das *Cinchonin*, nach der Analyse von Liebig, angenommene theoretische Zusammensetzung ist die folgende:

22 At. Wasserstoff	137,3	7,06
20 — Kohlenstoff	1528,8	78,67
2 — Stickstoff	177,0	9,11
1 — Sauerstoff	100,0	5,16
	1943,1	100,00.

Durch die Sättigung der Base mit Salzsäuregas fand Liebig für das Atomgewicht die Zahl 2005,1.

Das von mir analysirte Cinchonin war vollkommen weiß und regelmäfsig krystallisirt; beim Trocknen verlor es kein Wasser, es ist diese Base also wasserfrei.

I. 0,336 gaben 0,234 Wasser und 0,947 Kohlensäure.

II. 0,3397 gaben 0,236 Wasser und 0,961 Kohlensäure.

I. 0,475 gaben 37 C. C. Stickgas bei 11° und 0,766 M. Druck.

II. 0,522 gaben 43,1 C. C. Stickgas bei 13° und 0,752 M. Druck.

Hieraus erhält man:

Wasserstoff	7,73	7,71
Kohlenstoff	77,93	78,22
Stickstoff	9,29	9,08
Sauerstoff	5,06	4,39
	100,00	100,00

0,885 Cinchonin wurden mit Salzsäuregas gesättigt und dann in einem trockenen Luftstrom einer bis 165° steigenden Temperatur ausgesetzt, bis keine Gewichtsverminderung mehr Statt fand. Die Materie hatte 0,200 Salzsäure zurückgehalten. Nimmt man es als neutrales Salz an, so findet man für das Atomgewicht des Cinchonins die Zahl 2013,8, was vollkommen mit dem von Liebig gefundenen übereinstimmt. Wenn man aber die Materie in Wasser aufnimmt, so erhält man eine außerordentlich saure Auflösung, die nicht krystallisirt und die beim Verdampfen zu einer gummiartigen Masse wurde.

Es schien mir wenig wahrscheinlich, daß diese Verbindung das neutrale Salz war und ich suchte das Aequivalent des Cinchonins, wie das des Chinins, durch die Analyse eines krystallisirten auf nassem Wege dargestellten Salzes, zu bestimmen. Ich wählte hierzu das hydriodsaure Cinchonin, das wenig löslich und viel leichter krystallisirbar ist, als das salzsaure.

1,199 krystallisirtes hydriodsaures Cinchonin wurden bei 140° getrocknet. Das Salz schmolz und verlor 0,052 Wasser = 4,34 Procent. 1,147 trockenes Salz gaben 0,646 Jodsilber, woraus 0,3344 Hydriodsäure, was für das Aequivalent des Cinchonins die Zahl 3866 gibt, d. h. fast das Doppelte von dem, was durch die directe Sättigung mittelst Salzsäuregas erhalten wurde.

Hiernach nehme ich für das Cinchonin nachstehende Formel an;

48 At. Wasserstoff	299,5	7,66
40 — Kohlenstoff	3057,6	78,18
4 — Stickstoff	354,0	9,05
2 — Sauerstoff	200,0	5,11
	3911,1	100,00

und das krystallisirte hydriodsaure Cinchonin würde bestehen aus:

1 At. Hydriodsäure	1590,8	
1 — Cinchonin	3911,2	
1 At. trockenes Salz	5502,0	
2 At. Wasser	225,0	3,94
	5727,0	

Wir werden später sehen, daß diese Zusammensetzung des Cinchonins sich durch die Analyse des schwefelsauren Salzes bestätigt findet.

Strychnin.

Liebig fand für das Strychnin folgende Zusammensetzung:

Wasserstoff	6,70
Kohlenstoff	76,43
Stickstoff	5,81
Sauerstoff	11,06
	100,00

woraus er die Formel ableitet:

32 At. Wasserstoff	190,7	6,72
30 — Kohlenstoff	2293,1	77,16
2 — Stickstoff	177,0	5,95
3 — Sauerstoff	300,0	10,11
	2969,8	100,00

Durch Sättigen mit Salzsäuregas fand er für das Atomgewicht die Zahl 3034, was sehr gut mit der vorstehenden theoretischen Zusammensetzung übereinstimmt.

Das Strychnin, welches zu meinen Versuchen diente, war vollkommen weiß und sehr deutlich in Octaedern krystallisiert.

Ich suchte zuerst seine Sättigungscapacität durch die Verbindung der trockenen Base mit Salzsäuregas zu bestätigen; aber ich fand, daß das Strychnin ebenso wie die beiden vorhergehenden Basen eine beträchtlichere Quantität Gas absorbierte, als zur Sättigung erforderlich war, und daß man die Substanz lange Zeit einer erhöhten Temperatur aussetzen müsse, um diesen Ueberschuß an Säure zu verjagen.

0,675 Strychnin, bei 150° mit Salzsäuregas gesättigt, hielten 0,072 Säure zurück, was für das Aequivalent des Strychnins 4267 gibt. Das bei diesem Versuch erhaltene salzsaure Salz wurde mit ein wenig schwacher Salzsäure befeuchtet, zur Trockene verdampft und bei 130° getrocknet.

0,685 dieses Salzes gaben eine vollkommen neutrale Auflösung; man erhielt 0,257 Chlorsilber, woraus 0,085 Salzsäure, und als Atomgewicht 4326, was mit dem vorhergehenden übereinstimmt.

I. 0,3165 lieferten 0,214 Wasser und 0,949 Kohlensäure.

II. 0,362 — 0,218 — — 0,995 —

Bei dieser Analyse wendete ich chloresäures Kali an, um einer vollkommenen Verbrennung sicher zu seyn.

III. 0,3435 gaben 0,213 Wasser und 0,919 Kohlensäure.

I. 0,061 gaben 48 C. C. Stickgas bei 15° u. 0,749 M. Druck.

II. 0,461 gaben 33 C. C. Stickgas bei 14° u. 0,760 M. Druck.

Hieraus erhält man:

	I.	II.	III.
Wasserstoff	6,86	6,00	6,89
Kohlenstoff	75,73	76,00	75,67
Stickstoff	8,43	8,46	
Sauerstoff	8,98	8,85	
	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	

Diese Zahlen stimmen vollkommen mit nachstehender theoretischen Zusammensetzung überein

46 At. Wasserstoff	287,0	6,63
43 — Kohlenstoff	3286,8	75,94
4 — Stickstoff	354,0	8,18
4 — Sauerstoff	400,0	9,25
	4327,8	100,00

was gleichfalls mit der obengefundenen Sättigungscapacität harmonirt.

Diese Zusammensetzung entfernt sich beträchtlich von der von Liebig gefundenen, wenigstens für den Stickstoff. Ich suchte sie durch die Analyse des direct bereiteten salzsauren Strychnins zu bestätigen. Hierzu löste ich in mit Salzsäure angesäuertem heissen Wasser eine gewisse Quantität von Strychnin. Die Flüssigkeit gestand beim Erkalten zu einer aus einer Menge kleiner seidenartigen Nadeln bestehenden Masse. Sie wurde gepresst, mit wenig kaltem Wasser gewaschen, und bei 130° getrocknet.

0,983 trockenes salzsaures Strychnin gaben 0,309 Chlorsilber, woraus 0,00386 Salzsäure und als Aequivalent der Base die Zahl 4311,6.

0,3535 gaben 0,221 Wasser und 0,904 Kohlensäure.

0,602 gaben 38,1 C. C. Stickgas b. 13,5° u. 0,7495 M. Druck.

Hieraus erhält man:

Wasserstoff	6,75
Kohlenstoff	68,77
Stickstoff	7,30

Diese Zusammenaetzung stimmt mit der nach der vorhergehenden Formel berechneten überein. Sie gibt in der That:

48 At. Wasserstoff	299,5	6,27
43 — Kohlenstoff	3286,8	68,72
4 — Stickstoff	354,0	7,49
4 — Sauerstoff	400,0	
2 — Chlor	442,8	
	4782,9	

Pelletier gibt in seiner Abhandlung*) über die Wirkung des Jods auf die organischen Basen eine Analyse des hydriodsauren Strychnins, das er als ein anderthalb basisches Salz betrachtet, und die mit vorstehenden Resultaten in Einklang steht.

1,139 hydriodsaures Strychnin gaben ihm 0,552 Jodsilber. Betrachtet man dieses Hydriodat als ein neutrales Salz, so findet man als Aequivalent der Base die Zahl 4157, was mit den von uns oben gefundenen ziemlich übereinstimmt.

0,510 gaben 1,030 Kohlensäure = 55,83 Kohlenstoff.

Nach obiger Formel erhält man durch Berechnung Kohlenstoff = 55,53.

Brucin.

Nach den Analysen von Liebig hat das Brucin folgende Zusammensetzung:

			berechnet	gefunden
36 At. Wasserstoff	224,6	—	6,50	6,66
82 — Kohlenstoff	2446,1	—	70,96	70,88
2 — Stickstoff	177,0	—	5,14	5,07
6 — Sauerstoff	600,0	—	17,40	17,39
	<u>3447,7</u>	—	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>

Durch Sättigen mit salzsaurem Gas fand Liebig für das Atomgewicht des Brucins die Zahl 3485,2, was vorstehende Zusammensetzung verificirt. Meine Analysen dieser Substanz führten mich indeß zu einer ganz verschiedenen Zusammensetzung. Das dazu verwendete Brucin schien sehr rein;

1,151 krystallisirtes Brucin wurden in einem trockenen Luftstrom nach und nach bis 130° erhitzt, bis kein Gewichtsverlust mehr stattfand. Die Materie war theilweise geschmolzen. Verlust 0,199 = 18,41 Procent.

I. 0,325 trocknes Brucin gaben 0,195 Wasser und 0,835 Kohlensäure.

*) Annal. d. Pharm. J. XXII. 5. 120.

II. 0,313 trocknes Brucin gaben 0,194 Wasser und 0,861 Kohlensäure.

I. 0,472 gaben 28 C. C. Stickgas bei 11,2° und 0,753 M. Druck.

II. 0,440 gaben 26,5 C. C. Stickgas bei 13° und 0,768 M. Druck.

Hieraus erhält man:

	I.	II.
Wasserstoff	6,67	6,88
Kohlenstoff	70,60	70,85
Stickstoff	7,05	7,09
Sauerstoff	15,68	15,18
	100,00	100,00

Diese Zahlen führen zu nachstehender theoretischen Zusammensetzung:

54 At. Wasserstoff	337,0	6,53
48 — Kohlenstoff	3669,1	71,10
4 — Stickstoff	354,0	6,86
8 — Sauerstoff	800,0	15,51
	5160,1	100,00
10 At. Wasser	1124,8	17,89

1 At. wasserhalt. Brucin 6284,9.

Zur Bestätigung dieser Zusammensetzung suchte ich das Aequivalent des Brucins durch Sättigen der Base mit salzsaurem Gas und dann durch die directe Analyse des auf nassem Wege bereiteten salzsauren Brucins.

0,925 mit salzsaurem Gas bei 130° gesättigtes Brucin absorbirten 0,096, woraus man als Aequivalent der Base die Zahl 5038 erhält. Das gebildete salzsaure Salz wurde in Wasser aufgelöst und mit salpetersaurem Silber niedergeschlagen; man erhielt 0,338 Chlorsilber, entsprechend 0,08574 Salzsäure, was als Aequivalent 5053 gibt. Diese zweite Bestimmung zeigt, daß das zur Sättigung verwendete Brucin ganz wasserfrei war.

Ich bereitete das salzsaure Brucin durch Auflösen des Bru-

22 Regnault, über Zusammensetzung der organ. Basen.

eins in der Wärme in sehr verdünnter Salzsäure. Beim Erkalten setzte sich das Salz in kleinen krystallinischen Büscheln ab.

0,768 gaben 0,242 Chlorsilber, entsprechend 0,0614 Salzsäure. Dies gibt als Atomgewicht 5,237.

I. 0,365 trockenes salzsaures Brucin gaben 0,226 Wasser und 0,855 Kohlensäure.

II. 0,3856 gaben 0,234 Wasser und 0,903 Kohlensäure.

0,532 gaben 29,3 C. C. Stickgas bei 13° u. 0,760 M. Druck.

Hieraus erhält man:

	I.	II.
Wasserstoff	6,88	6,74
Kohlenstoff	61,77	61,78
Stickstoff	6,54	

Diese Resultate stimmen gut mit den nach der vorhergehenden Formel berechneten Zahlen. Diese letztere gibt in der That:

58 At. Wasserstoff	361,9	6,44
48 — Kohlenstoff	3609,1	65,19
4 — Stickstoff	354,0	6,29
8 — Sauerstoff	800,0	
2 — Chlor	442,6	
	5627,6	

Endlich stimmt die vorhergehende Formel sehr gut mit einer von Herrn Pelletier gemachten Analyse des hydriodsauren Brucins.

1,027 hydriodsaures Brucin gaben ihm 0,448 Jodsilber, wornach das Aequivalent des Brucins 5130 ist, eine mit der durch die Formel gegebene, fast identische Zahl.

0,500 gaben ihm 0,983 Kohlensäure, entsprechend 54,36 Proc. Kohlenstoff; nach der Berechnung müßte man 54,25 Kohlenstoff haben.

Wir werden später sehen, daß die Analysen des schwefelsauren und salpetersauren Brucins zu der nemlichen Zusammensetzung führen.

Morphin.

Die für das Morphin angenommene Formel ist folgende:

36 At. Wasserstoff	224,6	6,24
34 — Kohlenstoff	2598,0	72,20
2 — Stickstoff	177,0	4,92
6 — Sauerstoff	600,0	16,66
	<u>3600,6</u>	<u>100,00</u>

Durch Sättigen mit Salzsäuregas fand Liebig für das Aequivalent des Morphins die Zahl 3613, was sehr gut mit vorstehender Formel übereinstimmt.

I. 0,746 krystallisirtes Morphin wurde bei 130° getrocknet, sie verloren 0,049 Wasser = 6,57 Proc.

II. 0,641 verloren 0,059 Wasser = 6,20 Proc.

I. 0,332 trockenes Morphin gaben 0,205 Wasser und 0,875 Kohlensäure.

II. 0,341 trockenes Morphin gaben 0,210 Wasser und 0,893 Kohlensäure.

0,598 gaben 24½ C. C. Stickgas bei 8° u. 0,740 M. Druck.

Hieraus erhält man:

	I.	II.
Wasserstoff	6,86	6,84
Kohlenstoff	72,87	72,41
Stickstoff	5,01	5,01
Sauerstoff	15,26	15,74
	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>

Diese Analysen führen zu der Formel:

40 At. Wasserstoff	249,6	6,74
35 — Kohlenstoff	2675,4	72,28
2 — Stickstoff	177,3	4,90
6 — Sauerstoff	600,0	16,18
1 At. wasserfreies Morphin	<u>3702,0</u>	<u>100,00</u>
2 At. Wasser	225,0	

1 At. krystall. Morphin 3927,0

Hiermit stimmen übrigens auch Liebigs Analysen über-

24 *Regnault, über Zusammensetzung der organ. Basen.*

ein. Letzterer untersuchte zwei Proben von Morphin, die ihm nachstehende Resultate gaben:

	Morphin v. Wittstock.		v. Merck.
	I.	II.	III.
Wasserstoff	6,73	6,78	6,34
Kohlenstoff	72,34	72,38	

Die Aequivalentenzahl des Morphins wäre alsdann 3702 statt 3000. Wir werden sehen, daß die vorhergehende Formel sehr gut mit der Analyse des salzsauren Morphins übereinstimmt.

Das von mir analysirte salzsaure Salz war in sehr weissen, seidenartigen Fasern krystallisirt. 0,998 verloren bei 130° 0,142 Wasser = 14,23 Proc. Die dann auf 160° erhitzte Materie erlitt keinen gröfseren Gewichtsverlust.

I. 0,856 trockenes Salz gaben 0,372 Chlorsilber, entsprechend 0,0944 Salzsäure. Dies gibt als Atomgewicht 3671.

II. 0,952 gaben 0,411 Chlorsilber = 0,1043 Salzsäure. Dies gibt als Atomgewicht 3699.

0,398 gaben 0,230 Wasser und 0,926 Kohlensäure.

Hieraus erhält man:

	I.	II.
Wasserstoff	6,42	
Kohlenstoff	64,33	
Chlor	10,72	10,65

Die Formel $H_{40} C_{35} N_2 O_4 + H_2 Cl_2$ gibt:

42 At. Wasserstoff	262,0	6,30
35 — Kohlenstoff	2675,4	64,36
2 — Stickstoff	177,0	4,26
6 — Sauerstoff	600,0	14,44
2 — Chlor	442,6	10,64
1 — trockenes Salz	4157,0	100,00
6 — Wasser	675,0	13,08
1 — krystallis. Salz	4832,0	

Ich suchte gleichfalls das Aequivalent des Morphins durch

Sättigen mit salzsaurem Gas zu bestimmen. 0,882 trockenes Morphin absorbirten 0,111 Salzsäure, bei 140°. Hieraus erhält man das Aequivalent 3616, was besser mit der von Liebig angenommenen Formel übereinstimmt. Das von diesem Versuch herrührende salzsaure Salz wurde in etwas destillirtem Wasser aufgenommen, verdampft, und bei 130° getrocknet.

0,918 trockenes Salz gaben 0,397 Chlorsilber, wobei die größte Vorsicht genommen wurde, um kein Chlorür zu verlieren. Man erhält hieraus 0,1007 Salzsäure, was das Aequivalent 3693,7 gibt, das mit der von uns angenommenen Formel zusammenfällt.

Codein.

Das Codein wurde von Robiquet und von Couërbe analysirt. Beide Chemiker fanden darin:

	Robiquet.	Couërbe.
Wasserstoff	7,585	7,148
Kohlenstoff	71,339	72,846
Stickstoff	5,353	5,281
Sauerstoff	15,723	14,775
	100,000	100,000

Die am besten mit diesen Analysen übereinstimmende Formel ist die folgende:

39 At. Wasserstoff	243,4	7,23
32 — Kohlenstoff	2446,1	72,66
2 — Stickstoff	177,0	5,26
5 — Sauerstoff	500,0	14,85
	3366,5	100,00

Aber diese Formel harmonirt keineswegs mit der von Robiquet bestimmten Sättigungscapacität. Dieser geschickte Chemiker fand, daß 1 Gr. Salzsäure 7,63 Gr. Codein sättige, was als Atomgewicht die Zahl 3566,9 gibt.

Das von mir analysirte Codein war sehr weiß und deutlich krystallisirt.

In der Wärme gibt das Codein kein Wasser ab, man kann es selbst schmelzen ohne Gewichtsverlust. Robiquet hatte gefunden, daß das krystallisirte Codein 6,5 Proc. Wasser verliert; er hat aber wahrscheinlich mit aus einer wässrigen Auflösung krystallisirtem Codein gearbeitet, während das von mir untersuchte sich aus einer ätherischen Auflösung abgesetzt hatte.

Das Codein ist sehr schwer durch Kupferoxyd zu verbrennen, in einer ersten Analyse erhielt ich Zahlen, die sich den von Robiquet erhaltenen, näherten; ich erkannte aber sogleich, daß die Verbrennung unvollkommen war und daß sich an den Theilen der Röhre, die nicht mit Kupferoxyd in Berührung waren, Kohlenstoff abgesetzt hatte. Um eine vollkommene Verbrennung zu erhalten, mußte ich an das Ende der Röhre eine gewisse Quantität chloresaures Kali bringen.

I. 0,295 gaben 0,191 Wasser und 0,793 Kohlensäure.

II. 0,301 — 0,196 — — 0,805 —

0,418 gaben $16\frac{1}{4}$ C. C. Stickgas bei 10° und 0,76 M. Druck.

Hieraus erhält man:

	I.	II.
Wasserstoff	7,19	7,23
Kohlenstoff	74,32	73,94
Stickstoff	4,89	4,89
Sauerstoff	13,60	13,94
	100,00	100,00

Diese Zahlen führen zu folgender theoretischen Zusammensetzung:

40 At. Wasserstoff	249,6	6,93
36 — Kohlenstoff	2675,3	74,27
2 — Stickstoff	177,0	4,92
5 — Sauerstoff	509,0	13,88
	3601,9	100,00

0,055 mit trockenem salzsaurem Gas behandelt, und dann bei einer Temperatur von 120° in einem trockenen Luftstrom erhalten, bis kein Gewichtsverlust mehr eintrat, absorbirten 0,0825 Säure. Die Materie löste sich ohne Rückstand im Wasser auf; die Auflösung war farblos, vollkommen neutral gegen Reactionspapiere. Das Aequivalent des Codeins beträgt hiernach 3613,2, was so gut als man es erwarten kann, mit dem Berechneten übereinstimmt.

Es ist bemerkenswerth, daß das Codein sich von dem Morphin nur durch 1 Atom Sauerstoff unterscheidet, das es weniger als diese letztere Base enthält.

Narcotin.

Für das Narcotin nimmt man allgemein die folgende Zusammensetzung an:

40 At. Wasserstoff	240,50	5,32
40 — Kohlenstoff	3057,10	65,27
2 — Stickstoff	177,04	3,78
12 — Sauerstoff	1200,00	25,63
	<u>4684,03</u>	<u>100,00</u>

Sie wurde durch die Analysen von Pelletier und von Liebig ermittelt. Sie erhielten:

	Pelletier.	Liebig.
Wasserstoff	5,45	5,50
Kohlenstoff	65,16	65,09
Stickstoff	4,31	2,51
Sauerstoff	25,08	26,99
	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>

Liebig fand durch Sättigen des Narcotins mit salzsaurem Gas für sein Aequivalent die Zahl 4769.

Vorstehende Analysen differiren beträchtlich unter sich und von der theoretischen Zusammensetzung durch die Stickstoffmenge. Ich glaube, daß zur Feststellung der Zusam-

28 *Regnault, über Zusammensetzung der organ. Basen.*

mensetzung des Narcotins neue Analysen nöthig wären. Das von mir analysirte Narcotin war sehr weiss und regelmässig krystallisirt. Es gab bei 130° kein Wasser ab.

I. 0,337 gaben 0,181 Wasser und 0,791 Kohlensäure.

II. 0,334 — 0,180 — — 0,790 —

0,510 gaben 15 C. C. Stickgas bei 12° und 0,743 M. Druck.

Hieraus erhält man:

	I.	II.
Wasserstoff	5,96	5,99
Kohlenstoff	64,91	65,30
Stickstoff	3,46	3,46
Sauerstoff	25,67	25,25
	100,00	100,00

Das Narcotin kann eine grosse Menge salzsaures Gas absorbiren, wovon es einen Theil bei 100° abgibt. Man muss bei der Bestimmung der Sättigungscapacität dieser organischen Base auf diesen Umstand Rücksicht nehmen.

I. 1,084 wurden mit salzsaurem Gas behandelt, und dann 24 Stunden lang über Aetzkali in den leeren Raum gebracht; nach dieser Zeit hatten sie 0,148 Säure zurückgehalten. Dieselbe Materie verlor in einem trockenen Luftströme bei 100° eine gewisse Menge Säure. Als kein Gewichtsverlust mehr zu bemerken war, hatte die Materie 0,096 Salzsäure zurückgehalten. Sie gab mit Wasser eine vollkommen klare Auflösung von stark saurer Reaction, wie alle Narcotinsalze. Betrachtet man diese Materie als das neutrale Salz, so erhält man für das Aequivalent des Narcotins die Zahl 5139.

II. 1,070 auf gleiche Weise behandelt, hielten 0,0955 Säure zurück. Bei 115° erlitt die Materie keinen gröfseren Gewichtsverlust. Aus diesem zweiten Versuch erhält man die Zahl 5127,6.

III. 1,064 wurden nach dem Sättigen mit salzsaurem Gas bis 130° erhitzt, die Materie schmolz, färbte sich, was eine

beginnende Zersetzung anzeigte. Sie hatte 0,092 Säure zurückgehalten, wornach das Atomgewicht 5253 beträgt.

Wir nehmen die beiden ersten Zahlen an, die außerdem vollkommen gut mit einer von Robiquet ausgeführten Analyse des aus Alkohol krystallisirten salzsauren Narcotins übereinstimmt. Dieser Chemiker fand die Verhältniszahl des Narcotins = 5100,3.

Diese Untersuchungen leiten uns, für das Narcotin folgende Zusammensetzung anzunehmen:

46 At. Wasserstoff	287,0	5,00
44 — Kohlenstoff	3363,4	65,60
2 — Stickstoff	177,0	3,45
13 — Sauerstoff	1300,0	25,35
	5127,4	100,00

Die vorstehenden Analysen zeigen, daß das Gesetz der Zusammensetzung, das Liebig bei den organischen Basen zu beobachten glaubte, und das seitdem von allen Chemikern angenommen wurde, nicht allgemein gültig ist. Diese Basen enthalten nicht immer 2 Atome Stickstoff, eine große Zahl davon enthalten 4 Atome. Ihre Sättigungscapacität ist folglich nicht dieselbe, als wenn der Stickstoff als Ammoniak darin vorhanden wäre. Wenn man in den vegetabilischen Salzbasen fertig gebildetes Ammoniak annehmen wollte, was mir nach der Gesammtheit ihrer Reactionen wenig wahrscheinlich erscheint, so könnte in den Basen mit 2 Atomen Stickstoff, das Ammoniak durch die damit verbundene Materie nicht gesättigt seyn, während in den Basen mit 4 Atomen Stickstoff die Hälfte des Ammoniaks neutralisirt seyn würde. Es ist bemerkenswerth, daß die aus dem Opium dargestellten organischen Salzbasen alle 2 Atome Stickstoff enthalten, während die der China- und Strychnos-Arten vier Atome enthalten.

Das von Liebig angegebene einfache und sinnreiche Verfahren zur Bestimmung der Sättigungscapacität der organischen Basen, das in der Sättigung eines bekannten Gewichts der gut getrockneten Base mit salzsaurem Gas und Bestimmung der Gewichtszunahme besteht, kann oft zu genauen Resultaten führen, es muß aber mit vieler Umsicht angewendet werden, da die meisten dieser Basen eine viel größere Quantität Salzsäure absorbiren können, als zu ihrer Sättigung erforderlich ist. Sie geben diesen Ueberschuß condensirter Säure im leeren Raume nicht ab, sondern nur in einer ziemlich hohen Temperatur, oft weit über 100°. Einige davon, wie das Chinin und Cinchonin, zersetzen sich selbst bevor sie in den Zustand neutraler salzsaurer Salze zurückgeführt sind. In allen Fällen ist es rathlich, das erhaltene Atomgewicht durch die Analyse eines auf nassem Wege dargestellten neutralen Salzes zu verificiren.

Zweite Abtheilung.

Ueber das in den Salzen, der organischen Basen mit Sauerstoffsäuren, enthaltene Wasser.

Die bis jetzt über die Salze, welche die organischen Basen mit Sauerstoffsäuren bilden, ausgeführten Untersuchungen scheinen darzuthun, daß diese Salze, oder wenigstens mehrere davon, im wasserfreien Zustande erhalten werden können. So verlieren nach Baup das schwefelsaure Chinin und Cinchonin bei 120° alles Krystallisationswasser und werden vollkommen wasserfrei. Dasselbe gilt nach den Analysen von Liebig für das schwefelsaure Strychnin und Morphin. Der letztere Chemiker nimmt dagegen an, daß das getrocknete schwefelsaure Chinin noch 2 Atome Wasser zurückhält. Die Analysen von Sorullas und Pelletier der chlorsauren und jodsauren Salzen scheinen anzuzeigen, daß diese letzteren Salze beim Trocknen ihren ganzen Wassergehalt verlieren.

Wenn man die Resultate der Analysen dieser verschiedenen Chemiker ins Auge faßt, so sieht man bald, daß sie zur Entscheidung dieser Frage unzureichend sind. So haben Serullas, Baup und Pelletier nur die in den getrockneten Salzen enthaltene Wassermenge bestimmt, und diese Bestimmung, selbst mit der ängstlichsten Sorgfalt ausgeführt, ist keiner genügenden Genauigkeit fähig, um die Gegenwart von einem Atom Wasser zu entscheiden. Neue Untersuchungen waren folglich nothwendig.

Alle Salze, die ich zu diesem Zweck analysirt habe, waren deutlich krystallisirt, größtentheils von mir selbst mit den sehr reinen Basen dargestellt. Diese Salze wurden in einem trockenen Luftstrom getrocknet, bei einer Temperatur die der, wobei sie sich zersetzten, nahe lag. Ich fand, daß sie unter 120° ihr Krystallisationswasser leicht abgaben, und daß die meisten dann auf 100 bis 160° ohne Zersetzung erhitzt werden konnten; viele schmolzen bei diesen Temperaturen ohne Veränderung.

Schwefelsaures Chinin.

1,358 krystallisirtes schwefelsaures Chinin wurde in einem trocknen Luftstrom bei einer nach und nach wachsenden Temperatur getrocknet, bis sich das Gewicht nicht mehr verminderte. Die Austrocknung war bei 120° vollkommen, die Temperatur wurde aber bis auf 140° gesteigert. Der Verlust war 0,189 Wasser = 13,99 Proc.

0,3735 trockenes Salz gaben 0,235 Wasser und 0,882 Kohlensäure.

Hieraus erhält man:

Wasserstoff 6,98

Kohlenstoff 65,29

Die Zahlen führen zu der Formel $H_{5,0} C_{41} N_4 O_4 SO_3$
+ $H_2 O$, was gibt:

32 *Regnault, über Zusammensetzung der organ. Basen.*

			wasserfr. Salz
52 At. Wasserstoff	324,5.	6,74	6,64
41 — Kohlenstoff	3133,9	65,11	63,65
4 — Stickstoff	354,9		
5 — Sauerstoff	500,0		
1 — Schwefelsäure	501,2		
	4813,6		
7 At. Wasser	787,5	44,06	
	5601,1		

Liebig fand in dem bei 120° getrockneten schwefelsauren Chinin 64,98 — 65,08 Kohlenstoff, was vollkommen mit vorstehender Formel übereinstimmt.

Schwefelsaures Cinchonin.

1,645 verloren 0,082 Wasser = 4,98 Proc.

I. 0,391 gaben 0,260 Wasser und 0,953 Kohlensäure.

II. 0,394 — 0,258 — — 0,963 —

Man erhält hieraus:

	I.	II.
Wasserstoff	7,39	7,27
Kohlenstoff	67,89	67,58

Die Formel $H_{40} C_{40} N_4 O_2 SO_3 + H_2 O$ gibt:

			wasserfr. Salz.
50 At. Wasserstoff	312,0	6,89	6,78
40 — Kohlenstoff	3057,6	67,57	69,30
4 — Stickstoff	354,0		
3 — Sauerstoff	300,0		
1 — Schwefelsäure	501,2		
	4524,8		
2 At. Wasser	225,6		
	4740,8.		

Schwefelsaures Strychnin.

1,460 verloren bei 135° — 0,191 Wasser = 13,08 Proc.

I. 0,397 gaben 0,218 Wasser und 0,954 Kohlensäure.

II. 0,3792 bei 180° getrocknetes Salz gaben 9,208 Wasser und 0,909 Kohlensäure.

III. 0,394 bei 205° getrocknetes Salz gaben 0,216 Wasser und 0,941 Kohlensäure.

Man erhält hieraus:

	I.	II.	III.
Wasserstoff	6,10	6,09	6,10
Kohlenstoff	60,45	66,28	66,04
Die Formel $H_{46} C_{43} N_4 O_4 SO_3 + H_2 O$ gibt:			
			wasserfr. Salz.
48 At. Wasserstoff	298,5	6,66	5,94
43 — Kohlenstoff	3286,8	86,52	68,06
4 — Stickstoff	354,0		
5 — Sauerstoff	500,0		
1 — Schwefelsäure	501,2		
	4941,5		
7 — Wasser	787,5	13,74	
	5729.		

Schwefelsaures Brucin.

1,706 verloren bei 130° — 0,210 Wasser = 12 Proc.

1,495 gaben 0,382 schwefelsauren Baryt.

0,495 — 0,270 Wasser und 1,042 Kohlensäure.

0,588 — 31,5 C. C. Stickgas bei 12,5° u. 0,760 M. Druck.

Hieraus erhält man:

Wasserstoff	0,53
Kohlenstoff	62,77
Stickstoff	6,38
Sauerstoff	15,54
Schwefelsäure	8,78
	100,00

Diese Zahlen führen zu der Formel $H_{46} C_{43} N_4 O_4 SO_3 + H_2 O$.

34 Regnault, über Zusammensetzung der organ. Basen.

			wasserfr. Salz.
56 At. Wasserstoff	340,4	6,06	5,95
48 — Kohlenstoff	3669,5	63,56	64,82
4 — Stickstoff	354,0	6,13	
9 — Sauerstoff	900,0	15,59	
1 — Schwefelsäure	500,0	8,66	
	<u>5772,5</u>	<u>100,00</u>	
7 — Wasser	787,5	11,99	
	<u>6560.</u>		

Schwefelsaures Morphin.

1,346 verloren bei 130° — 0,156 Wasser = 11,59 Proc.

I. 0,388 bei 130° getrocknetes Salz gaben 0,228 Wasser und 0,873 Kohlensäure.

II. 0,397 bei 130° getrocknetes Salz gaben 0,235 Wasser und 0,888 Kohlensäure.

III. 0,3925 bei 185° getrocknetes Salz gaben 0,224 Wasser und 0,883 Kohlensäure.

Man erhält hieraus:

	I.	II.	III.
Wasserstoff	6,53	6,57	6,34
Kohlenstoff	62,21	61,85	62,29

Die Formel $H_{40} C_{35} N_2 O_6 SO_3 + H_2 O$ gibt:

			wasserfr. Salz.
42 At. Wasserstoff	262,0	6,07	5,93
35 — Kohlenstoff	2675,4	61,99	63,03
2 — Stickstoff	177,0		
7 — Sauerstoff	700,0		
1 — Schwefelsäure	501,2		
	<u>4815,6</u>		
5 — Wasser	562,5	11,58	
	<u>4878,1</u>		

Jodsaures Cinchonin.

Das jodsaure Cinchonin krystallisirt in langen seidenartigen Fasern; es verpufft heftig bei 120°. Das analysirte Salz war bei 105° in einem trockenen Luftstrom getrocknet.

I. 0,399 gaben 0,185 Wasser und 0,713 Kohlensäure.

II. 0,382 — 0,180 — — 0,690 —

Man erhält hieraus:

	I.	II.
Wasserstoff	5,15	5,24
Kohlenstoff	49,41	49,94

Die Formel $H_{40} C_{40} N_4 O_2, J_2 O, + H_2 O$ gibt:

			trocknes Salz.
50 At. Wasserstoff	372,0	5,11	5,00
40 — Kohlenstoff	3057,6	50,10	51,06
4 — Stickstoff	354,0		
3 — Sauerstoff	300,0		
1 — Jodsäure	2078,3		
	6101,9.		

Salpetersaures Strychnin.

Dieses Salz wurde durch Auflösen des Strychnins in überschüssiger Salpetersäure dargestellt. Aus der heißen Auflösung krystallisirte beim Erkalten das salpetersaure Strychnin in langen seidenartigen, hellgelben Nadeln.

I. 0,322 bei 130° getrocknetes Salz gaben 0,174 Wasser und 0,751 Kohlensäure.

II. 0,361 gaben 0,188 Wasser und 0,833 Kohlensäure.

0,3085 gaben 25½ C. C. Stickgas bei 5° und 0,766 M. Druck.

Man erhält hieraus:

	I.	II.
Wasserstoff	6,09	5,79
Kohlenstoff	64,40	63,80
Stickstoff	10,35	10,35
Sauerstoff	19,16	20,06
	100,00	100,00

36 *Regnault, über Zusammensetzung der organ. Basen.*

Nach der Formel $H_{48} C_{48} N_4 O_{11} N_2 O_3 + H_2 O$ muß man haben:

			wasserfr. Salz,
48 At. Wasserstoff	299,5	5,85	5,73
48 — Kohlenstoff	3286,8	64,23	65,67
6 — Stickstoff	531,0	10,38	
10 — Sauerstoff	1000,0	19,54	
	5117,3	100,00	

Salpetersaures Brucin.

I. 0,925 lufttrockenes krystallisirtes salpetersaures Brucin verloren bei 130° — 0,065 Wasser, = 7,02 Proc.

II. 0,805 verloren 0,060 Wasser = 7,45 Proc.

I. 0,367 trockenes Salz gaben 0,200 Wasser und 0,816 Kohlensäure.

II. 0,381 gaben 0,208 Wasser und 0,845 Kohlensäure.

0,3045 gaben $26\frac{1}{4}$ C. C. Stickgas bei 7° und 0,754 M. Druck.

Hieraus erhält man:

	I.	II.
Wasserstoff	6,05	6,07
Kohlenstoff	61,48	61,33
Stickstoff	8,92	8,92
Sauerstoff	23,55	23,68
	100,00	100,00

Die Formel $H_{74} C_{48} N_4 O_{81} N_2 O_7 + H_2 O$ gibt:

			wasserfr. Salz.
56 At. Wasserstoff	349,4	5,87	5,77
48 — Kohlenstoff	3669,1	61,67	62,86
6 — Stickstoff	531,0	8,92	
14 — Sauerstoff	1400,0	23,54	
	5949,5	100,00	
4 — Wasser	450,0	7,03	
	6399,5		

Phosphorsaures Strychnin.

Dieses Salz wurde durch Auflösen des Strychnins in heisser sehr verdünnter Phosphorsäure bereitet. Beim Erkalten setzte sich das Salz in kleinen glänzenden Schuppen ab. Es wurde bei 140° getrocknet.

0,385 gaben 0,203 Wasser und 0,845 Kohlensäure, woraus:

Wasserstoff 5,86

Kohlenstoff 69,69

Die Formel $H_{45} C_{43} N_4 O_4, P_2 O_5 + H_2 O$ gibt:

			wasserfr. Salz.
48 At. Wasserstoff	299,5	5,62	5,40
43 — Kohlenstoff	3286,8	61,63	62,96
5 — Stickstoff	354,0		
4 — Sauerstoff	500,0		
1 — Phosphorsäure	802,3		
	<u>5322,6.</u>		

Kleesaures Chinin.

Es wurde dargestellt durch kaltes Niederschlagen einer Auflösung von essigsaurem Chinin mit kleesaurem Ammoniak; der mit wenig kaltem Wasser gewaschene Niederschlag wurde in kochendem Alkohol wieder aufgelöst. Beim Erkalten setzte sich das Salz in kleinen, außerordentlich feinen Nadeln ab. Es wurde bei 125° getrocknet.

0,342 gaben 0,217 Wasser und 0,845 Kohlensäure.

Man erhält hieraus:

Wasserstoff 7,05

Kohlenstoff 68,32

Nach der Formel $H_{50} C_{43} N_4 O_7, C_2 O_3 + H_2 O$ müßte man haben:

			wasserfr. Salz.
52 At. Wasserstoff	324,5	6,81	6,71
43 — Kohlenstoff	3286,9	68,97	70,64
4 — Stickstoff	354,0		
8 — Sauerstoff	800,0		
	<u>4705,4.</u>		

Essigsäures Chinin.

Dieses Salz war in langen, seidenartigen Nadeln krystallisiert; bis 140° erhitzt, schmolz es zu einem fast farblosen Glase, stiefs aber einen sehr deutlichen Geruch nach Essigsäure aus.

0,355 des geschmolzenen Salzes gaben 0,236 Wasser und 0,909 Kohlensäure, oder:

Wasserstoff   7,38

Kohlenstoff   70,80

Diese Zahlen stimmen ziemlich gut mit der Zusammensetzung eines wasserfreien Salzes, da aber das Salz evident Essigsäure verloren hatte, während dem Austrocknen, so versuchte ich es bei einer niedrigeren Temperatur zu trocknen, und erhitzte es nur im Wasserbade in einem trockenen Luftstrom; aber selbst bei dieser Temperatur entwickelte sich Essigsäure, denn ein dem über das Salz streichenden Luftströme ausgesetztes Lacomuspapier röthete sich nach einigen Augenblicken. Man kann das essigsäure Chinin folglich nicht als eine Ausnahme von dem Gesetz der Zusammensetzung betrachten, welches wir bei den andern untersuchten Salzen bemerken.

Die vorstehenden Analysen zeigen sehr klar, daß alle Salze, die durch die organischen Salzbasen mit Sauerstoffsäuren gebildet werden, ein zu ihrer Constitution nothwendiges Atom Wasser enthalten, das ihnen ohne Zersetzung nicht entzogen werden kann.

In ihrem Verhalten gegen die Säuren bieten diese Basen also eine vollkommene Analogie mit dem Ammoniak dar. Sie verbinden sich direct mit den Wasserstoffsäuren ohne Zersetzung, indem sie salzsaure Salze und keine Chlorüre bilden, wie die basischen Oxyde des Mineralreichs, und mit den in Wasser aufgelösten Sauerstoffsäuren verbinden sich die vegetabilischen Salzbasen, indem sie ein Atom Wasser aufnehmen, das in ihre innere Constitution eingeht.

Die Anhänger der Ammoniumtheorie müssen für die organischen Basen eine analoge Theorie annehmen. Nach diesem Gesichtspunkt wäre es interessant, die Wirkung zu studiren, welche die wasserfreien Sauerstoffsäuren auf die trockenen Basen ausüben, allein hier treten viel grössere Schwierigkeiten auf, als bei dem Ammoniak. Diese Schwierigkeiten beruhen einerseits auf der geringen Stabilität und der großen Complication der Zusammensetzung dieser Basen und andererseits darauf, daß sich zu dieser Reaction nur sehr wenige Säuren eignen. Ich stellte indessen einige Versuche an, um zu bestimmen, was vorgeht, wenn man die trockenen Basen mit schwelliger Säure sättigt. Man wird meine Untersuchungen über diesen Gegenstand in der dritten Abtheilung meiner Arbeit vorfinden.

Es ist bemerkenswerth, daß die in der letzten Zeit von Liebig entdeckten, so interessanten basischen Substanzen in mehreren ihrer Salze, die sie mit Sauerstoffsäuren bilden, ein Atom Wasser enthalten. Es ist sehr wahrscheinlich, daß alle ihre anderen Salze eine analoge Zusammensetzung haben.

Endlich macht der Harnstoff, der nach allen seinen Eigenschaften nicht anders als eine organische Base betrachtet werden kann, keine Ausnahme von dieser allgemeinen Zusammensetzungsweise, wie ich dies durch die Analyse des klee- und salpetersauren Harnstoffs, die bis jetzt für wasserfrei gehalten wurden, fand.

Kleesaurer Harnstoff.

Dieses Salz wurde vor der Analyse bei 110° getrocknet; es gab kein Wasser ab.

0,700 gaben 0,302 Wasser und 0,555 Kohlensäure.

Man erhält hieraus:

Wasserstoff	4,79
Kohlenstoff	22,11

Die Formel $H_8 C_2 N_4 O_2, O_2 O_2 + H_2 O$ gibt:

			wasserfr. Salz.
10 At. Wasserstoff	62,4	4,72	4,18
4 — Kohlenstoff	305,7	22,12	25,20
4 — Stickstoff	354,0	26,77	
6 — Sauerstoff	600,0	45,39	
	<u>1322,1</u>	<u>100,00</u>	

Salpetersaurer Harnstoff.

Er verlor bei 110° kein Wasser.

0,9985 gaben 0,368 Wasser und 0,363 Kohlensäure.

I. 0,200 gaben 56 C. C. Stickgas bei $9,5^\circ$ und 0,762 M. Druck.

II. 0,2913 gaben 82 C. C. Stickgas bei $8,5^\circ$ n. 0,742 M. Druck.

Man erhält hieraus:

	I.	II.
Wasserstoff	4,09	
Kohlenstoff	10,04	
Stickstoff	34,03	34,29

Die Formel $H_8 C_2 N_4 O_2, N_2 O_2 + H_2 O$ gibt:

			wasserfr. Salz.
10 At. Wasserstoff	62,4	4,03	3,48
2 — Kohlenstoff	152,0	9,90	10,67
6 — Stickstoff	581,0	34,30	
8 — Sauerstoff	800,0	51,73	
	<u>1546,3</u>	<u>100,00</u>	

Es lassen sich also die verschiedenen Substanzen, welche die Rolle von Basen spielen, in 2 Gruppen abtheilen:

Die erste Gruppe enthält die Basen, die sich ohne Zersetzung nicht direct mit den Wasserstoffsäuren verbinden, die mit der Salzsäure, z. B. Wasser und ein Chlormetall bilden, und die mit Sauerstoffsäuren Salze bilden, die wasserfrei erhalten werden können. Hierzu gehören alle basischen Substanzen des Mineralreichs.

In die zweite Gruppe reihen sich alle die basischen Verbindungen, die sich mit Wasserstoffsäuren ohne Zersetzung vereinigen und die mit Sauerstoffsäuren nur bei Gegenwart von Wasser wahre Salze bilden. Diese Salze nehmen in diesem Fall immer ein Atom Wasser auf, das ihnen nicht entzogen werden kann. Diese Gruppe schließt alle wirklich bekannten basischen Substanzen des organischen Reichs ein, und welche alle Stickstoff enthalten.

Nachstehende Tabelle zeigt die Zusammensetzung der hauptsächlichsten wasserfreien Basen dieser Gruppe.

Wasserfreie Basen.	Formeln.	Aequivalent.	H.	C.	N.	O.
Ammoniak . .	$N_3 H_6$	214,6	17,46		82,54	
Morphin . . .	$H_{40} C_{22} N_2 O_6$	3702	6,74	72,28	4,80	16,18
Codein . . .	$H_{40} C_{25} N_2 O_5$	3601,9	6,93	74,27	4,92	13,88
Narcotin . . .	$H_{46} C_{44} N_2 O_{13}$	5127,4	5,60	68,60	3,45	25,35
Harnstoff . . .	$H_8 C_2 N_4 O_2$	765,9	6,6	20,2	40,8	26,4
Chinin	$H_{40} C_{41} N_4 O_4$	4199,9	7,43	74,62	8,42	9,52
Cinchonin . .	$H_{48} C_{40} N_4 O_2$	3911,1	7,66	76,18	9,05	5,11
Strychnin . .	$H_{48} C_{43} N_4 O_4$	4327,8	6,63	75,94	8,18	9,25
Brucin	$H_{54} C_{48} N_4 O_4$	5100,1	6,53	71,10	6,86	15,51
Ammelin (Liebig)	$H_{10} C_{12} N_{10} O_2$	1606,2	3,88	28,55	55,11	12,45
Melamin . . .	$H_{12} C_{12} N_{12}$	1595,7	4,69	28,74	66,56	

Bemerkungen zu vorstehender Abhandlung;

von *Justus Liebig*.

Im Herbste vorigen Jahres theilte mir Herr Regnault mit, daß er eine früher in meinem Laboratorium begonnene Analyse des Codeins beendigt und gefunden habe, daß auch bei diesem Körper das Verhältniß des Stickstoffs in Beziehung