die Röhrrchen auf dem Boden des Gefäßes aufstehen und somit eine Luftzirkulation im Röhrrchen verhindert wird. Um die Röhrrchen bequem vertikal trocknen zu können, ließ ich mir ein Gestell anfertigen, das in beigefügter Skizze abgebildet und dessen Konstruktion leicht ersichtlich ist.

An dem oberen Teil des Gestells, das aus starkem Zinkblech besteht, sind Messingspangen angebracht, die sich durch einen leichten Fingerdruck an die verschiedenen Durchmesser der Röhrrchen anpassen lassen. Es ist somit ermöglicht, die Röhrrchen in jede beliebige Höhe zu bringen. Stellt man die Röhrrchen so hinein, daß sie mit ihrem verengten Teil etwa 1 cm über den Boden des Gestells zu stehen kommen, und sorgt man weiter dafür, daß im Dampftrockenschrank eine leichte Luftzirkulation stattfindet, so ist ein vollständiges Trocknen der richtig ausgewaschenen Röhrrchen schon nach 15—20 Minuten mit Sicherheit erreicht.

Dieses Gestell, das daneben vielseitige Verwendung im Laboratorium finden kann — z. B. als Reagensglasgestell, als Gestell zum Kochen von Flüssigkeiten im Reagensglase im kochenden Wasserbade und besonders noch als Gestell für einen später zu beschreibenden Katalaseapparat usw. — wird von der Firma Franz Hugershof in Leipzig, die dessen Fabrikation und Vertrieb übernommen hat, geliefert.

Referate.

Ernährungslehre.

D. W. Wilson und P. B. Hawk: Fastenstudien. 12. Teil. Die Ammoniak-, Phosphat-, Chlorid- und Säureausscheidung bei einem fastenden Menschen. (Journ. Amer. Chem. Soc. 1914, **36**, 137—146.) — Die Versuche wurden an einer Person vorgenommen, die zu Beginn derselben 76,6 kg, am Ende 71,4 kg wog. Die Diät für die Vorperiode bestand aus 600 g Grahambrot, 1350 g Vollmilch, 150 g Butter und 1050 ccm Wasser, wovon 750 ccm sich in der Nahrung befanden. Die Vorperiode dauerte 4 Tage, darauf folgte eine Hungerperiode von 7 Tagen mit täglichem Wassergenuß von 1500 ccm. Dabei war die Harnmenge am ersten Tage niedrig, wuchs am zweiten Tage und blieb bis zum Ende ziemlich gleich. Die Ammoniakausscheidung nahm bis zum sechsten Tage um etwa das achtfache der Vorperiode zu (1,463 g Stickstoff am sechsten Tage). Am siebenten Tage ging die Ammoniakausscheidung wieder etwas zurück (1,394 g Stickstoff). Die Phosphatausscheidung nahm am ersten Tage zu, fiel am zweiten, erreichte das Maximum am dritten und fiel dann allmählich wieder. Die Chloridausscheidung sank sehr stark während der ersten 3 Tage, an den darauffolgenden Tagen weniger. Die Säureausscheidung stieg gleich am ersten Tage an, verdoppelte sich etwa am zweiten Tage und stieg weiter am dritten. Dann folgte allmähliches Sinken bis zum Ende der Fastenperiode. Sodann folgte eine 4-tägige Nachperiode, in welcher die Versuchsperson ein Viertel der Nahrung der Vorperiode erhielt (5,23 g Stickstoff und

1800 Kalorien täglich), wobei die Harnmenge anfangs niedrig war, aber wuchs, die Ammoniakausscheidung anfangs höher war als in der Fastenperiode, dann stark abfiel. Die Säureausscheidung verminderte sich sehr, die Phosphatausscheidung fiel anfangs stark, um schließlich wieder zu steigen, die Chloridausscheidung verminderte sich ständig. Schluß der Versuche war eine Periode von 5 Tagen, in der die Nahrungszufuhr wieder auf die Höhe der ersten Periode gebracht wurde. Die Harnmenge war dabei durchgängig größer als in der ersten Periode, die Ammoniakausscheidung niedrig, die Säureausscheidung etwa so groß wie in der ersten Periode, die Phosphatausscheidung erhöht. Die Chloridausscheidung war anfangs niedrig, wuchs dann aber sehr beträchtlich. Tabelle wie graphische Darstellung geben ein anschauliches Bild von den Ergebnissen der Versuche. *A. Behre.*

N. R. Blatherwick und P. B. Hawk: Fastenstudien. 13. Teil. Die Ausscheidung von Fäkalbakterien, beeinflußt durch Fasten und durch niedrige oder hohe Proteingaben. (Journ. Amer. Chem. Soc. 1914, **36**, 147—152.) — Durch siebentägiges Fasten eines 76 kg schweren Mannes wurde die tägliche Ausscheidung an Fäkalbakterienstickstoff von 1,571 g auf 0,101 g vermindert, während das wahre Gewicht der ausgeschiedenen Bakterien von 14,336 auf 0,920 g herabsank. Der Prozentgehalt des Fäkalstickstoffs, der als Bakterienstickstoff vorhanden war, nahm während des Fastens von 55,82 auf 32,29 % ab. Der Gehalt an trockenen Bakterien in den trockenen Fäzes verringert sich wenig. Die Ausscheidung an Bakterienstickstoff und Bakteriensubstanz war beim Fasten die gleiche wie bei geringer Eiweißdiät. Mit dem Beginn einer hohen Eiweißdiät steigen diese Werte erheblich. Der Prozentgehalt an Fäkalstickstoff, der aus Bakterienstickstoff bestand, war während der Perioden der hohen oder niedrigen Eiweißdiät etwa der gleiche. Deutliche Beziehungen zwischen der Fäkalausscheidung und dem Indicangehalt des Urins waren nicht vorhanden. Einer Gabe von 5,23 g Stickstoff nach dem Fasten folgte eine Fäkalbakterienausscheidung, die nur $\frac{1}{14}$ so groß war, als wenn die vierfache Menge Stickstoff vor dem Fasten gegeben war. *A. Behre.*

N. R. Blatherwick und P. B. Hawk: Studien über Wassertrinken. XVI. Der Einfluß, den das Trinken destillierten Wassers bei den Mahlzeiten auf die Ausnutzung von Fett und Kohlenhydraten ausübt. (Journ. Amer. Chem. Soc. 1914, **36**, 152—157.) — Zwei junge Personen wurden auf gleicher Diät erhalten und die Wirkung reichlicher Mengen destillierten Wassers während der Mahlzeit auf die Ausnutzung des eingeführten Fettes (155,4 g) und der Kohlenhydrate (293,2 g) bestimmt. Die Versuche wurden in drei Perioden geteilt, in deren mittlerer die reichlichen Wassermengen gegeben wurden. An der Hand von 6 Tabellen kommen die Verf. zu dem Schluß, daß die Ausnutzung von Fett und Kohlenhydraten durch Trinken von großen Wassermengen während der Mahlzeit nicht merkbar beeinflußt wird. *A. Behre.*

F. Wills und P. B. Hawk: Studien über Wassertrinken. XVII. Die Ammoniakausscheidung als ein Zeichen für die Anregung gastrischer Ausscheidung nach der Aufnahme von Wasser. (Journ. Amer. Chem. Soc. 1914, **36**, 158—165.) — Verf. fassen das Ergebnis ihrer Versuche folgendermaßen zusammen: Die Wasseraufnahme während der Mahlzeit wurde bei den zwei Versuchspersonen von einer Vergrößerung der Ammoniakausscheidung begleitet, die im direkten Verhältnis zu der Wasservermehrung stand. Es ist als sicher anzunehmen, daß Wasser das Fließen eines sauren gastrischen Saftes anregt, und einige andere Versuche zeigten, daß die Bildung von Säure im Körper und die Einführung von Säure von außen her ein Anwachsen des Ammoniakgehaltes des Urins bewirkt. Daher ist die beobachtete Vergrößerung der Ammoniakausscheidung unmittelbar der An-

regung einer gastrischen Sekretion durch das Wasser zuzuschreiben. Die einheitliche Beziehung zwischen der Wasseraufnahme und der Ammoniakausscheidung kann vielleicht als Anzeichen dafür betrachtet werden, daß bei den gastrischen Zellen das Bestreben vorherrscht, eine gleichmäßige Säurekonzentration zu behalten. Wenn man die vergrößerte Ammoniakausscheidung auf der Basis einer 100 ccm-Vergrößerung in der Wasseraufnahme berechnet, so ergibt sich, daß die Ausscheidung während einer mäßigen Wasserzufuhr um ein wenig höher ist als während einer reichlichen Wasserzufuhr. Das würde zeigen, daß nach Erreichung einer bestimmten Höchstgrenze der Wasseraufnahme jede weiteren 100 ccm von geringerer Anregung sind, als wenn sie eingeführt wären, bevor die oben erwähnte Grenze erreicht war. Daß verschiedene Organismen sich gegenüber gleichen Anregungen verschieden verhalten, zeigte die Tatsache, daß das Anwachsen der Ammoniakausscheidung der einen Person um 100 % größer war als bei der anderen, obgleich die Vergrößerung in der Wasseraufnahme in beiden Fällen die gleiche war. Daß die Vergrößerung der Ammoniakausscheidung nicht die Folge einer Darmfäulnis ist, ging daraus hervor, daß während der Periode der hohen Wasseraufnahme erniedrigte Indicanwerte gefunden wurden. *A. Behre.*

Allgemeine analytische Methoden und Apparate.

A. Fornet: Neuer Schnellwasserbestimmer für Nahrungs- und Futtermittel. (Chem.-Ztg. 1913, **37**, 1400.) — An Stelle der bisher üblichen, langdauernden und teilweise zu niedrige Werte liefernden Trocknungsverfahren schlägt Verf. ein kurzes Trocknen bei höheren Temperaturen vor und konstruierte zu diesem Zwecke einen Trockenschrank, der die Temperatur von 160° C schnell erreicht und gut konstant erhält, verbunden mit einer gewichtslosen Hebelwage, in der die zu trocknende Substanz auf tarierten Metallschalen abgewogen, etwa 10 Minuten getrocknet und noch heiß zurückgewogen wird. Es ist zu beachten, daß die Schnell-trocknungsmethode konventionelle Werte liefert und bei noch nicht geprüften Stoffen die Trocknungszeit erst analytisch ermittelt werden muß. *J. Groffeld*

F. H. Thies: Die Bestimmung des Kohlenstoffes auf nassem Wege. (Chem.-Ztg. 1914, **38**, 115—116.) — Bei der nassen Oxydation mittels Schwefelsäure und Kaliumbichromat läßt sich die Bestimmung des Kohlenstoffes mit derjenigen der Halogene verbinden, indem zur Absorption Calciumoxyd verwendet wird. Handelt es sich um chlor- und bromhaltige Substanzen, so zersetzt man diese in der üblichen Weise, ist Jod vorhanden, so gibt man vorher eine hinreichende Menge Silbernitrat in den Oxydationskolben, wodurch nur Jod als Jodsilber gefällt wird, während Chlor und Brom ausgetrieben werden. Der Kolbenaufsatz wird mit Glasstücken und Kugeln gefüllt, Glaswolle hat sich nicht bewährt. Die entweichenden Gase werden durch ein 30 cm langes, 6 mm weites Rohr aus Kaliglas geleitet, dessen dem Kolben zugekehrte Hälfte zwischen Asbestpfropfen eine Füllung von Calciumoxyd enthält; richtige, nicht zu feste und nicht zu lockere Füllung ist für die quantitative Absorption ausschlaggebend. Während des Absorbierens wird das Rohr erhitzt. An das Kaliglasrohr schließt sich ein mit Natronkalk — festem Ätzkali — Natronkalk beschicktes U-Rohr, an dieses ein Schutzrohr mit Natronkalk an. Nach Beendigung der Reaktion (30—40 Min.) wird das U-Rohr einfach gewogen. Der Kalk im Kaliglasrohr wird nach Entfernung des der leeren Hälfte zugekehrten Asbestpfropfens in einen Kohlensäurebestimmungsapparat nach Bunsen gebracht, man läßt halogenfreie Salpetersäure zufließen und bestimmt das Kohlendioxyd nach der Vertreibung aus der Gewichts Differenz. Hierauf wird die Lösung in ein Becherglas gespült und Chlor und Brom in ihr mittels Silbernitrat gefällt und in bekannter Weise bestimmt. Die Konzentration des Chromsäuregemisches muß möglichst hoch