hängt nicht sowohl vom Zustande des Gesättigt- oder Ungesättigtseins ab, als vielmehr von der spezifischen Eigenart jedes Lösungsmittels. Ferner spielt die Natur des gelösten Stoffes bei der Ionisation eine Hauptrolle«.

»Der elektrolytischen Spaltung sind am ehesten die binären Salze unterworfen; in denselben Lösungsmitteln, in welchen die letzteren eine weitgehende Spaltung zeigen, sind Säuren undissoziiert. Ternäre und quaternäre Salze zeigen nur eine geringe Neigung zur elektrolytischen Spaltung und können in Lösungsmitteln, die binäre Salze stark dissoziieren, manchmal undissoziiert bleiben. Die Ionisierungstendenz eines Lösungsmittels ist, wie schon gesagt, daher sowohl von der spezifischen Natur desselben als auch vom Typus und der Natur des zu dissoziierenden Salzes abhängig«.

Von organischen Lösungsmitteln wurden die verschiedensten Klassen untersucht: Alkohole, Aldehyde, Säuren, Säureanhydride, Säurechloride, Ester etc. Es zeigte sich, dass Karboxyl-, Hydroxyl-, Keto- und Aldehydgruppen, das heisst Radikale, die Sauerstoff enthalten, auch ionisierend wirken, ebenso die Cyan-, die Rhodan-, sowie die Nitro- und die Sulfogruppe. Auch der Einfluss der Assoziation wurde studiert.

Die dissoziierende Kraft der Lösungsmittel steht nun in einem bestimmten Verhältnis zu den Dielektrizitätskonstanten. Man kann also den einen Wert aus dem anderen berechnen. Kennt man die Dielektrizitätskonstante, so lässt sich die dissoziierende Kraft berechnen und umgekehrt kann man aus dem Dissoziationsgrad die Dielektrizitätskonstante ermitteln.

Die elektrische Leitfähigkeit des Meerwassers hat nach Karsten's¹⁾ Vorschlag M. Knudsen²⁾ zur Bestimmung des Salzgehaltes herangezogen. Neuerdings hat E. Ruppin³⁾ Messungen der Leitfähigkeit des Meerwassers ausgeführt; untersucht wurden verschiedene Proben mit wechselndem Salzgehalt. Aus den erhaltenen Zahlen geht hervor, dass zwar die Bestimmung des Salzgehaltes durch Titration genauer ist, dass aber die Bestimmung der Leitfähigkeit unter Umständen geeignet ist, die aräometrische Bestimmung zu ersetzen. In der Arbeit finden sich

1) Wissenschaftliche Meeresuntersuchungen, herausgegeben von der Kommission zur Untersuchung der deutschen Meere. N. F. Bd. I, Heft 2.

2) Beretning fra Kommissionen for Videnskabelig Undersøgelse af de danske Farvande Bd. II, Heft 3.

3) Wissenschaftliche Meeresuntersuchungen. N. F. Bd. 9, S. 179.

Fresenius, Zeitschrift f. analyt. Chemie. XLV. Jahrgang. 3. u. 4. Heft. 17

die absoluten Werte für die Leitfähigkeit des Meerwassers; diese ist zum Beispiel bei 25° C. und einem Salzgehalt von $20,14 \frac{0}{00} = 0,03248$.

Der Einfluss von feuchtem Alkohol und Chloräthyl auf den Siedepunkt des Chloroforms ist von J. Wade und H. Finnemore¹⁾ festgestellt worden.

Da aus Azeton dargestelltes Chloroform in der anästhesierenden Wirkung hinter den aus Alkohol hergestellten Präparaten zurückblieb, untersuchten die Verfasser beide Proben. Es ergab sich, dass das aus Alkohol hergestellte Chloroform etwa $0,05 \frac{0}{0}$ Chloräthyl enthält, und dass dadurch der Siedepunkt des Chloroforms erniedrigt wird. Der Siedepunkt verschiedener Gemische von Chloroform, Alkohol und Wasser wurde ermittelt.

Die Natur einer Lösung von Jod in wässriger Jodkaliumlösung ist schon des öfteren Gegenstand der Untersuchung gewesen.

Jakowkin²⁾ und später Dawson³⁾ fanden, dass sich eine solche Lösung verhält, als ob sie die Verbindung KJ_3 enthielte. Dawson stellte in seinen theoretischen Erwägungen fest, dass die Ionisationskonstante von KJ und KJ_3 gleich seien. Bestätigt wird das durch die bei der Messung der relativen Wanderungsgeschwindigkeiten der J^- - und der J_3^- -Ionen von C. H. Beagers und D. L. Chapman⁴⁾ erhaltenen Resultate. Die Messung geschah durch die Vergleichung der mit demselben Strom zur Anode übergeführten Menge Jod in wässrigen Lösungen, die einerseits Jodkalium, andererseits Jod in Jodkalium enthielten, ferner durch Ermittlung der Leitfähigkeit der beiden Lösungen.

II. Chemische Analyse anorganischer Körper.

Von

H. Weber.

Zur Analyse des Aluminiums und seiner Legierungen. Im Anschluss an den früheren Bericht über die Bestimmung und die Trennung des Aluminiums⁵⁾ berichte ich weiter über die Analyse des

1) Journal of the chemical Society **85**, 938; durch Zeitschrift f. physikal. Chemie **52**, 111.

2) Journal of the chemical Society **13**, 539.

3) Ebenda **37**, 633.

4) Ebenda **85**, 1305.

5) Diese Zeitschrift **44**, 710 u. 769 (1905).