Bremen $25' 54''$ zum Grunde gelegt, ergeben sich nun aus den verbesserten Conjunctionszeiten folgende Längen der Orte, denen ich zugleich die Längen, so wie sie aus Herrn *Rosenbergers* Conjunctionszeiten Nr. 50. S. 24. sich ergeben, unter dem Zeichen R beigefügt habe.

Königsberg.	R.	Göttingen.	R.
η 72' 37,36	• 37,34	η 30' 25,91	• 26,15
f 40,65	• 40,58	p 26,39	• 25,55
h 37,83	• 37,81	f 26,56	—
s 37,42	• 37,45		
Mitt. 72 38,31	72 38,30	Mitt. 30 26,19	30 25,85

	R.	R.
Berlin η	44' 11,31	44' 10,89
Wien h	56 10,00	56 9,98
Modena h	34 23,74	34 23,91
Prag f	48 20,65	—
Moskau η *)	141 12,96	—

Zur Vergleichung setze ich zuletzt noch kurz die früheren Resultate der Berechnung mit meinen eigenen, für den Ort des Mondes und der bedeckten Sterne unveränderten Elementen bei. Verschiedene Verbindungen der Ein- und Austritte gaben mir als die wahrscheinlich sicherste Correction des Unterschieds der Mond- und Sternbreite $+ 5''$,5 und als Correction des Halbmessers $- 2''$,5, wodurch die anfänglich von mir gefundenen Conjunctions-

*) Den Austritt von η in Moskau hat Herr Dr. *Jänisch* um $11^h 47' 58''$,6 m. Z. beobachtet. Astr. Jahrb. 1824. S. 118. Ich folgte der Lesart des Beobachters, nicht der *Rümker'schen*. S. ebendas. S. 190.

W.

zeiten verbessert wurden. Für jeden Stern besonders α oder die Breiten correction zu bestimmen, war nicht möglich, weil nicht bei allen Sternen zugleich Ein- und Austritt beobachtet worden war; wirklich ließen sich auch die gewählten Correctionen nicht allen Sternen gleich gut anpassen, am wenigsten dem Sterne s . Die verbesserten Conjunctionszeiten gaben mir nun, indem ich, wie oben, Bremen zum Grunde legte, nachfolgende geographische Längen.

Königsberg.	Göttingen.	
η 72' 36,6	η 30' 25,7	Berlin η 44' 10,9
f 41,0	f 26,6	Wien h 56 10,7
h 38,4		Modena h 34 24,5
s 34,4		Prag f 48 20,9
p 42,3		Moskau η 141 11,1

Das Mittel aus fünf Beobachtungen ist für Königsberg $72' 38''$,54, oder, wenn die zwei letzten wegfallen, aus den drei ersten $72' 38''$,66. Das Mittel aus den zwei Göttinger Beobachtungen (die dritte, oben berechnete, oder den Austritt p kannte ich früher noch nicht) ist $30' 25''$,15. Sowohl diese beiden, als die übrigen früher von mir gefundenen Längen sind demnach von den genaueren oben berechneten im Ganzen nur wenig verschieden, ob sie gleich zu einer Zeit, da mir die richtigeren Sternbreiten noch nicht zu Gebote standen, nach einer minder vollkommenen Methode abgeleitet werden mußten. Werden nur genau dieselben Elemente bei allen Beobachtungen angewendet, so können sich in manchen, freilich nicht in allen Fällen, die Fehler so ziemlich ausgleichen, da es hier nicht auf eine absolut, sondern bloß relativ richtige Bestimmung der Conjunctionszeit ankommt.

W u r m.

Zusatz zu dem in Nr. 60 der Astronomischen Nachrichten abgedruckten Aufsatz über eine Aufgabe der practischen Geometrie.

Von Herrn Professor und Ritter *Bessel*.

Die Orientirung des Meßtisches, welche man, wie ich in dem Aufsatz zeigte, worauf das Gegenwärtige sich bezieht, durch die Auftragung der dort durch a' und c' bezeichneten Punkte, leicht erhalten kann, kann auch unabhängig von diesen Punkten, oder irgend einer anderen Vorbereitung, durch eine verschiedene Anwendung derselben geometrischen Eigenschaft, welche der dortigen Vorschrift zum Grunde liegt, gefunden werden. Ein ehe-

maliger, sehr geschätzter Schüler von mir, Herr Fähnrich *Kulenkamp*, welcher die von mir auf die Erfindung der Richtungslinie db angewandte Vorschrift, auch auf die beiden anderen Richtungslinien de und dc ausdehnte, machte mich darauf aufmerksam, daß die beiden Hilfspunkte a' und c' füglich entbehrt werden können; — da dieses, für die Praxis auf dem Felde, ohne Zweifel, eine wesentliche Verbesserung ist, so unterlasse ich nicht, eine

zweite Vorschrift mitzutheilen, welche, vor der ersten diesen Vorthail voraus hat.

Ich beziehe mich auf die vorigen Figuren, und nenne die Winkel ADB und $BDE \dots u$ und v .

„Wenn man den Mefstisch so vor sich hat, daß „ a, b, c von der linken Hand nach der rechten aufeinander folgen, so legt man den Winkel v an den Punkt a „der Linie ca , und u an den Punkt c derselben Linie, „beide vom Beobachter abwärts; der Punkt e , in welchem die Schenkel dieser Winkel sich schneiden, liegt „dann auf der Linie bd , und giebt daher die Orientirung „des Mefstisches.“

Die Richtigkeit dieser Vorschrift ist leicht zu beweisen: die Winkel e und d des Vierecks $aecd$, ergänzen sich, der Construction zufolge, zu zwei Rechten; daher kann um dieses Viereck ein Kreis beschrieben werden,

und man hat die, den Seiten ae und be gegenüberstehenden Peripheriewinkel gleich, oder

$$W. ace = u = W. adb \\ W. cae = v = W. cdb. \quad Q.E.D.$$

Unter den vielen ähnlichen Constructionen, welche man durch Verwechselung der drei gegebenen Punkte erhalten kann, wird es zweckmäfsig seyn, sich an eine zu gewöhnen. Durch die Wahl einer anderen, wird man zwar oft die Unbequemlichkeit vermeiden können, daß der Punkt e über den Mefstisch hinausfällt; allein da man, mittelst des Diopterlineals, eine Parallele mit ac so leicht ziehen kann, so scheint mir das dadurch gegebene Mittel, die Figur, wenn es nöthig ist, zu verkleinern, die Unbequemlichkeit leichter zu beseitigen. Ich glaube daher, daß es am zweckmäfsigsten seyn wird, immer der oben gegebenen Vorschrift zu folgen, und, wenn es nöthig ist, eine Parallele mit ac zu Hülfe zu nehmen.

B e s s e l.

Auszug aus einem Briefe des Herrn Professors und Ritters *Bessel* an den Herausgeber.

Königsberg 1824. April 12.

Die wenigen Beobachtungen der Mondculminationen, welche im Jahre 1823 zwischen Herrn *Bouvard* und mir correspondirend sind, habe ich Herrn Dr. *Argelander* mitgetheilt, welcher folgende Meridiandifferenzen daraus bestimmt hat.

		^h ['] ["]	Werth
1823	April 21	1 12 44,2	0,00220
	Juli 20	40,2	0,00176
	Sept. 16	39,1	0,00209
	— 19	31,3	0,00196
	Oct. 11	34,1	0,00166
	Nov. 13	35,8	0,00199

Verbessert man den Druckfehler bei der Beobachtung vom

15ten Mai 1821 (*Astron. Nachr.* Nr. 34) so giebt dieselbe nicht mehr $1^h 12' 50'',3$ sondern $1^h 12' 38'',5$; schließt man ferner die Beobachtung vom 19ten September 1823 aus, weil sie hier bei unruhiger Luft gemacht ist, so ist das Mittel aus den 19 übrig bleibenden Bestimmungen (siehe *A. N.* No. 32)

$1^h 12' 38'',56$ mit dem Werthe 0,04323

Die nahe Uebereinstimmung mit dem Mittagsunterschiede, welcher aus den Sternbedeckungen folgt, zeigt, daß zwischen den Mondshalbmessern, welche Herrn *Bouvard's* Fernrohr, und das meinige angiebt, kaum ein Unterschied seyn kann.

B e s s e l.

I n h a l t.

Eine neue Methode, die Biegung der Fernröhre astronomischer Instrumente zu bestimmen, von Herrn Professor und Ritter *Bessel.* p. 209.

Opposition der Juno von 1824, hergeleitet aus den Beobachtungen des Hrn. *Hansen* auf der Alt. Sternwarte. p. 213.

Ueber die Abweichung des Sterns 69 oder s im Löwen. p. 215.

Länge und Breite der Hauptsterne in den Plejaden. für 1800

und 1820 aus den neuen *Besselschen* Bestimmungen dieser Sterne. p. 215.

Berechnung der am 29. Aug. 1820 beobachteten Plejadenbedeckung. p. 217.

Zusatz zu dem in Nr. 60 der *Astr. Nachr.* abgedruckten Aufsätze über eine Aufgabe der pract. Geometrie. p. 221.

Auszug aus ein. Briefe des Hrn. Prof. u. R. *Bessel* an d. Herausg. p. 223.

Altona im Juli 1824.