Katalyse von Estern und Imidoestern durch Säuren, nimmt Verfasser zur Erklärung der Tatsache, daß die Wirksamkeit von Pepsin durch Säure, die von Trypsin durch Alkali gesteigert wird, an, daß die Fermentwirkung vom Pepsin- bzw. Trypsin- und nicht von undissoziierten Fermentmolekeln ausgeht. Im Sinne dieser Annahme sind die genannten Fermente entweder als schwache Base (Pepsin) bzw. Säure (Trypsin) aufzufassen, deren Ionenkonzentration bei Zusatz von Säure bzw. Lauge durch die starke elektrolitische Dissoziation des gebildeten Salzes vermehrt wird, oder als amphotere Elektrolyte, deren Dissoziationsform (Säure oder Lauge) nach dem Massenwirkungsgesetz davon abhängt, ob man Lauge bzw. Säure zufügt, was weiter zur Annahme führt, daß Pepsin nur in der Form eines Kations, Trypsin nur in der Form eines Anions die Proteolyse beschleunigen. Mit dieser Auffassung stehen die kataphoretischen Versuche von L. Michaelis in Übereinstimmung. C. Schorr.

Arbeiten über Medizin und Pharmakologie

Foà, C., und Aggazzotti, A., Ueber die physiologische Wirkung kolloider Metalle. (Biochem. Zeitschr. 19, 1–82, 1909.)

Die Verfasser untersuchten die physiologischen Folgen der intravenös, subkutan oder per os erfolgenden Verabreichung kolloider Metalle an Versuchstieren, wobei sowohl Sole, die auf chemischem Wege (Kollargol, Hyrgol, Eisenhydrat, Wismut, Arsensulfid) als auch solche, die nach G. Bredig's Methode hergestellt wurden (Platin, Gold, Silber, Mangan, Quecksilber), und zwar in verschiedenen Dispersitätsgraden, zur Verwendung kamen. Die sehr mannigfaltigen Ergebnisse lassen sich nicht kurz zusammenfassen bzw. nicht auf wenige einheitliche Kolloidwirkungen zurückführen. Ferner werden Beobachtungen über die katalytische und die oxydierende Wirksamkeit derselben Metallsole und endlich über das bakterientötende und antitoxische Vermögen des kolloiden Silbers mitgeteilt. C. Schorr.

Gros, O., Ueber die Hämolyse durch Ammoniak, Natriumhydroxyd und Natriumkarbonat. (Biochem. Zeitschr. 29, 350, 1910.)

Die Bindung von Ammoniak (sowie NaOH und Na_2CO_3) kann eine chemische Reaktion sein, oder sie kann entsprechend der Verteilung eines gelösten Stoffes zwischen zwei Lösungsmitteln vor sich gehen, oder sie kann endlich den Adsorptionsgesetzen gehorchen. Nun hat O. Gros schon früher gezeigt, daß in den untersuchten Konzentrationsbreiten von NH_3 fast alles NH_3 von den Blutkörperchen aufgenommen wird. In Anbetracht der leichten Löslichkeit des NH_3 in H_2O kann also von einer Verteilung dieses Hämolytikums zwischen Wasser und Blutkörperchen nicht die Rede sein. Um eine chemische Bindung kann es sich nach O. Gros auch nicht handeln. Denn wenn man eine konstante Blutkörperchenmenge mit Lösungen versetzt, die einen Ueberschuß von NH_3 in verschiedener Konzentration enthalten, müßten die Blutkörperchen immer dieselbe Menge Ammoniak aufnehmen. Tatsächlich ist aber die von ihnen gebundene Menge von NH_3 von der Konzentration desselben abhängig. Die Aufnahme dieses Hämolytikums durch die Blutkörperchen muß also ein Adsorptionsprozeß sein. Unter Zugrundelegung der Annahme, daß die Geschwindigkeit der Hämolyse proportional sei der Menge des adsorbierten Ammoniaks, operiert O. Gros mit konstanten Blutmengen und be-

obachtet die Zeit, die bis zur vollendeten Hämolyse verstreicht und prüft auf diese Weise die Gültigkeit der Formel $c \cdot m \cdot t = K$. (c = Konzentration des Ammoniaks, t = Zeit.) Die mit Hilfe der c - und t -Werte konstruierte Kurve hat die hyperbolische Form der Adsorptionskurven. Der Exponent liegt zwischen 0,65 und 0,71.

Variiert man die Blutkonzentration in einem Konzentrationsgebiet des Ammoniaks, wo ein sehr großer Teil desselben adsorbiert wird, so sind die Auflösungszeiten der Konzentration des Blutes (c) umgekehrt proportional, also $t = K/c$. Bei höhern Konzentrationen des

NH_4OH gilt diese Beziehung aber nicht mehr. Die Hämolyse durch Na_2CO_3 folgt den gleichen Gesetzen wie die Ammoniakhämolyse. Die Hämolyse durch NaOH aber verläuft anders. Bei Verwendung von NH_4OH und Na_2CO_3 bleibt die Konzentration des wirksamen Agens, der Hydroxylionen im Verlauf der Reaktion praktisch konstant, weil die aufgebrauchten OH-Ionen durch fortwährende Dissoziation immer wieder ersetzt werden. NaOH hingegen ist in den Konzentrationen, in denen es zu Experimenten verwendet werden kann, beinahe vollständig dissoziiert, es findet also bei der Hämolyseaktion kein Ersatz von OH statt, die Reaktionsgeschwindigkeit muß also abnehmen im Verlauf der Reaktion. Diesen Vorgang stellt O. Gros durch die Interpolationsformel $C/3 \cdot t = K$ dar.

Der Temperaturkoeffizient der Ammoniak- und Natriumkarbonathämolyse zwischen 34° und 40° ist ein wenig größer als der chemischer Reaktionen. W. F.

Bauer, J., Zur Praxis der Komplementbindungsreaktion. (Biochem. Zeitschr. 29, 488, 1910.)

Bei der Ausführung der Komplementbindungsreaktion zum Antigennachweis zu forensischen Zwecken und zur Nahrungsmitteluntersuchung hat man mit Eiweißauszügen aus verschiedenem Material zu arbeiten, die oft an sich schon hämolysehemmend wirken, wie z. B. Extrakte aus Säcken, Lappen, Strümpfen, Leder, ferner Urin, Peptone, Tuberkulin, manche Blutsera. In solchen Fällen ist die Komplementbindungsreaktion unbrauchbar. B. hat nun gefunden, daß die Hemmungswirkung der Extrakte meist durch Salze und andere leicht diffundierende Stoffe bedingt ist. Deshalb entfernt er diese Substanzen durch Dialyse aus den Extrakten und es gelingt ihm, Auszüge, die wegen zu starker Eigenhemmung vor der Dialyse nicht zur Komplementbindung brauchbar waren, durch Entzug der Salze zur Komplementbindungsreaktion verwendbar zu machen. W. F.

Izar, G., Viskositätserniedrigung durch Gelatine-Antiserum. (Zeitschr. f. Immunitätsforschung 7, 199, 1910.)

Einige neuere Methoden in der Immunitätsforschung dienen der Untersuchung des physikalisch-chemischen Verhaltens des (Kolloid-) Systems, in welchem Antigen und Antikörper vorhanden sind, d. h. die Veränderungen, welche durch das Aufeinanderwirken der beiden Reaktionskomplexe in dem (heterogenen) Reaktionssystem entstehen. Es werden die Änderungen der Diffusionsgeschwindigkeit im System untersucht (Epiphaninreaktion, Weichardt), Änderungen der Oberflächenspannung (Meiostagminreaktion, M. Ascoli und G. Izar), die Änderungen des optischen Drehvermögens (Abderhalden). Hieran reiht nun Verf. die Beobachtung der Änderung der inneren Reibung. Wird das Serum von Kaninchen, welches wiederholt Gelatine eingespritzt worden ist, mit Gelatinelösung versetzt, so tritt bei 37° in zwei Stunden eine beträchtliche