ASTRONOMISCHE NACHRICHTEN.

Band 197.

Nr. 4725.

21.

Über die Verteilung der Sternengeschwindigkeiten. Von *E. von der Pahlen*.

Die modernen Untersuchungen über die Eigenbewegungen der Fixsterne haben zu der Erkenntnis geführt, daß die Verteilung der Sternengeschwindigkeiten im Raume, nach Abzug der sich in ihnen spiegelnden Geschwindigkeit der Sonne, keine völlig regellose sein kann, sondern eine gewisse, uns noch sehr unvollständig bekannte Gesetzmäßigkeit verrät. In einer Reihe von Untersuchungen, die sich die Erforschung dieser Gesetzmäßigkeit zum Ziele setzten, ist der Versuch gemacht worden, die beobachtete Verteilung der Eigenbewegungen der Sterne an der Himmelskugel durch hypothetisch angesetzte räumliche Verteilungsgesetze der Sternengeschwindigkeiten darzustellen, welche sich mehr oder weniger eng an das *Maxwellsche* Verteilungsgesetz der Geschwindigkeiten der Moleküle eines Gases anschließen. Die Arbeiten der Herren *Eddington* und *Schwarzschild* haben gezeigt, daß man zu sehr befriedigenden Darstellungen der beobachteten Verteilung der Eigenbewegungen gelangt, wenn man die räumliche Verteilung der Sternengeschwindigkeiten, nach Abzug der Sonnen Geschwindigkeit, als das Resultat der Superposition der Geschwindigkeitsverteilungen zweier nach bestimmten Richtungen strömender Gase betrachtet, von denen jedes für sich genommen, dem *Maxwellschen* Gesetze genügt, oder wenn man für die (von der Sonnenbewegung befreiten) Sternengeschwindigkeiten ein dem *Maxwellschen* Gesetze analog gebautes, erweitertes Verteilungsgesetz mit drei aufeinander senkrecht stehenden ausgezeichneten Richtungen einführt. Macht man von einer sehr anschaulichen, in der Gastheorie stets benutzten, geometrischen Konstruktion Gebrauch, nach der jede Sternengeschwindigkeit durch einen »Geschwindigkeitspunkt« dargestellt wird, dessen Koordinaten den Komponenten der Geschwindigkeit des Sterns in irgend einem festen Koordinatensysteme gleich sind, und nennt man die räumliche Dichteverteilung aller solcher Punkte, die allen vorhandenen Sternengeschwindigkeiten eines Raumbereiches entsprechen, den »Geschwindigkeitskörper« der Sterne dieses Gebietes, so kann man das Ergebnis der erwähnten Untersuchungen auch folgendermaßen zusammenfassen: die Verteilungen der Eigenbewegungen der Sterne in den verschiedenen Himmelsgegenden lassen sich annähernd als die aus verschiedenen Richtungen gesehenen Projektionen gleichartiger Geschwindigkeitskörper interpretieren, und zwar können diese sowohl als das Resultat der Superposition zweier verschiedener sphärischer Geschwindigkeitskörper und der Sonnenbewegung, als auch eines einzigen ellipsoidischen Geschwindigkeitskörpers und der Sonnenbewegung betrachtet werden. Bemerkenswert ist dabei, daß die Parameter, welche in den theoretischen Ansätzen für den Geschwindigkeitskörper vorkommen, und welche für die verschiedenen Himmelsgegenden bei den bisherigen Untersuchungen stets besonders berechnet werden, in allen Teilen des Himmels, innerhalb der Genauigkeits-

grenzen, in denen sich diese Untersuchungen überhaupt bewegen, sehr ähnliche numerische Werte erhalten, wodurch die Annahme nahe gelegt wird, daß die Geschwindigkeitskörper der Sterne in allen Raumteilen nicht nur gleichartig sind, sondern annähernd als identisch betrachtet werden dürfen.

Die Prüfung der Richtigkeit dieser Annahme ist aber auch unabhängig von irgendwelchen hypothetischen Voraussetzungen über die nähere Beschaffenheit des Gesetzes der Geschwindigkeitsverteilung versucht worden. In einer in den *Monthly Not.* 70.578 erschienenen Arbeit haben die Herren *Hough* und *Halm* die Bemerkung gemacht, daß, wenn die Voraussetzung der Identität des Geschwindigkeitskörpers in allen Raumteilen wirklich zuträfe, die Verteilungen der Eigenbewegungen in zwei diametral entgegengesetzten Teilen des Himmels sich zueinander spiegelbildlich verhalten müßten, da man es in diesem Falle mit einer und derselben aus zwei entgegengesetzten Richtungen gesehenen Projektion des Geschwindigkeitskörpers auf die zum Visionsradius normale Ebene zu tun hätte. Die Untersuchung der Eigenbewegungen der *Bradley*-Sterne durch die Herren *Hough* und *Halm* hat gezeigt, daß dies tatsächlich mit ziemlich großer Annäherung der Fall ist. — Eine weitere Folge der Voraussetzung der Gleichheit des Geschwindigkeitskörpers in allen Himmelsgegenden ist, wie Herr *Schwarzschild* in A. N. 4561 gezeigt hat, daß die Differenzen der Anzahlen der sich längs eines größten Kreises der Himmelskugel in entgegengesetzten Richtungen bewegendem Sterne für alle Punkte dieses Kreises durch eine einfache Sinusfunktion seiner Bogenlänge dargestellt werden können. Herr *Schwarzschild* hat an den Sternen des *Preliminary General Catalogue* von *Boss* für drei größte Kreise gezeigt, daß dieses Theorem in Wirklichkeit mit ziemlich großer Genauigkeit erfüllt ist.

Da nun durch alle diese Tatsachen die Wahrscheinlichkeit dafür, daß die Gestalt des Geschwindigkeitskörpers dieselbe bleibt, aus welchem Teile des Raumes man auch die Sternengeschwindigkeiten zu seiner Konstruktion entnehmen mag, sehr groß zu sein schien, habe ich auf Anregung von Herrn *Schwarzschild*, versucht, die Gestalt dieses Geschwindigkeitskörpers, oder wenigstens seine hauptsächlichsten Eigenschaften, unabhängig von irgend welchen weiteren hypothetischen Voraussetzungen, nur auf Grund der Gesamtheit der bekannten Eigenbewegungen der Sterne abzuleiten. Das Resultat einer solchen Untersuchung würde also zunächst nur eine neue möglichst voraussetzungslose Zusammenfassung des gesamten Beobachtungsmaterials, ausgedrückt in einem Geschwindigkeitskörper, sein, die dann zur Prüfung der verschiedensten Theorien, wofern sie nur einen in allen Raumteilen gleichen Geschwindigkeitskörper voraussetzen, verwandt werden könnte.

Da die Verwertung der absoluten Größen der Eigenbewegungen der Sterne, in Ermangelung genauer Kenntnisse über ihre Entfernungen, nur bei Einführung einer hypothetischen Annahme über ihre räumliche Verteilung möglich ist, habe ich mich entschlossen, (wie auch sonst meist geschehen ist) zunächst nur die Richtungen der Eigenbewegungen in Betracht zu ziehen. Bei dieser Einschränkung besteht das zu behandelnde Problem nicht in der Bestimmung der räumlichen Dichteverteilung der Geschwindigkeitspunkte aller Sterne, deren Eigenbewegungen bekannt sind, sondern in folgendem: aus der Verteilung der Richtungen der Eigenbewegungen der Sterne an der Himmelssphäre soll die räumliche Verteilung dieser Richtungen, bezogen auf ein gegen das Sonnensystem ruhendes Koordinatensystem, berechnet werden.

Die theoretischen Grundlagen für die Lösung dieses Problems können in der folgenden Weise zusammengefaßt werden.

Es bedeute $W(x, y, z)$ die auf irgend ein mit dem Sonnensysteme fest verbundenes Koordinatensystem bezogene räumliche Verteilungsfunktion der Geschwindigkeitspunkte (den Geschwindigkeitskörper); es ist also $W(x, y, z) \cdot dx dy dz$ die Anzahl der Sterne, deren Geschwindigkeiten in dem betrachteten Systeme Komponenten haben, die in den Grenzen x bis $x + dx$, y bis $y + dy$, z bis $z + dz$ eingeschlossen sind. Die einzige Voraussetzung, die wir der Untersuchung zugrunde legen, ist die, daß die Funktion W für die Sterne aller Raumgebiete dieselbe Gestalt hat. (Wenn wir die absoluten Größen der Eigenbewegungen benutzen könnten, würde die Bestimmung gerade dieser Funktion W unsere Aufgabe bilden.) Es bedeute ferner $\varrho(\alpha, \delta, \psi)$ die Verteilungsfunktion der Richtungen der Eigenbewegungen der Sterne an der Himmelssphäre, derart, daß $\varrho(\alpha, \delta, \psi) \cdot d\psi$ die Anzahl der in der Umgebung eines Punktes der Rektaszension α und der Deklination δ liegenden Sterne angibt, mit Eigenbewegungen, deren Positionswinkel zwischen den Werten ψ und $\psi + d\psi$ enthalten sind. Betrachtet man irgend einen Punkt (α, δ) der Himmelssphäre (Fig. 1), bezieht man die Funktion W auf ein sphärisches Koordinatensystem r, ϑ, ψ , dessen Polarachse die durch den Punkt (α, δ) bestimmte Richtung hat, und denkt man sich den Geschwindigkeitskörper für die Sterne des in der Richtung (α, δ) liegenden Raumgebietes so konstruiert, daß sein Anfangspunkt auf dem nach (α, δ) weisenden Visionsradius liegt, so sieht man, daß zwischen den Funktionen $W(r, \vartheta, \psi)$ und $\varrho(\alpha, \delta, \psi)$ an dieser Stelle die folgende Beziehung besteht:

$$\varrho(\alpha, \delta, \psi) \cdot d\psi = \int_{\vartheta=0}^{\vartheta=\pi} \int_{r=0}^{r=\infty} W(r, \vartheta, \psi) r^2 \sin \vartheta dr d\vartheta d\psi. \quad (1)$$

In der Tat stellt sowohl $\varrho d\psi$, wie auch das rechts stehende Doppelintegral die Anzahl der Geschwindigkeitspunkte dar, welche in dem räumlichen Winkel enthalten sind, den zwei durch den Visionsradius hindurch gehende, um den kleinen Winkel $d\psi$ gegeneinander geneigte Ebenen bilden. An der Fig. 1 läßt sich die Richtigkeit der Gleichung (1) auch sofort

Fig. 1.

einsehen, wenn man den willkürlich zu wählenden Anfangspunkt des Koordinatensystems x, y, z (oder r, ϑ, ψ), auf welches die Funktion W bezogen ist, zuerst in einen beliebig entfernten Punkt des Visionsradius und dann in den Mittelpunkt der Sphäre verlegt denkt.

Wenn man nun eine über die Kugeloberfläche ausgebreitete Funktion $\Omega(\alpha, \delta)$ oder $\Omega(\vartheta, \psi)$ durch folgende Definition einführt:

$$\int_{r=0}^{r=\infty} W(r, \vartheta, \psi) r^2 dr = \Omega(\vartheta, \psi) \quad (2)$$

so erhält die Gleichung (1) die Gestalt:

$$\varrho(\alpha, \delta, \psi) = \int_{\vartheta=0}^{\vartheta=\pi} \Omega \sin \vartheta d\vartheta. \quad (3)$$

Die durch (2) definierte über die Oberfläche der Kugel ausgebreitete Funktion Ω ist gerade diejenige, deren empirische Bestimmung unsere Aufgabe bildet; ihr Wert an einer Stelle (α, δ) , multipliziert mit dem Flächenelemente der Einheitskugel $d\sigma$, gibt an, wieviele Sterne Geschwindigkeiten besitzen, deren Richtungen in einem Kegel enthalten sind, dessen Achse nach dem betrachteten Punkte (α, δ) weist und der aus der Oberfläche der Einheitskugel die kleine Fläche $d\sigma$ ausschneidet. Die mathematische Formulierung des Problems ist in der Gl. (3) enthalten, welche den Zusammenhang zwischen der gesuchten räumlichen Verteilungsfunktion $\Omega(\alpha, \delta)$ der Geschwindigkeitsrichtungen der Sterne und der als gegeben vorausgesetzten Verteilungsfunktion $\varrho(\alpha, \delta, \psi)$ der Richtungen ihrer Eigenbewegungen an der Himmelssphäre herstellt. Die Integration auf der rechten Seite ist über alle Werte von Ω zu erstrecken, welche auf dem halben Bogen eines vom Punkte (α, δ) unter dem Positionswinkel ψ ausgehenden größten Kreises liegen, dessen vom Punkte (α, δ) gezählte Bogenlänge die Variable ϑ bedeutet. Man sieht, daß, wenn die der Erfahrung zu entnehmende Funktion $\varrho(\alpha, \delta, \psi)$ mit Hilfe eines analytischen Ausdruckes dargestellt wird, das Problem in der Lösung einer Integralgleichung besteht, wobei zu bemerken ist, daß es sich hier um die Bestimmung einer Funktion von zwei Variablen α, δ , mit Hilfe einer Funktion von drei Variablen α, δ, ψ handelt, also um die Lösung einer überbestimmten Aufgabe. Begnügt man sich, wie es bei der praktischen Anwendung der Gleichung (3) am einfachsten ist, mit einem Systeme von diskreten Werten der Funktion $\varrho(\alpha, \delta, \psi)$, dann kann die Lösung der Aufgabe durch ein Näherungsverfahren auf die Auflösung eines endlichen Gleichungssystems zurückgeführt werden, welches wiederum ein überbestimmtes ist und dessen Auflösung (nach der Methode der kleinsten Quadrate) ein über die Kugeloberfläche verteiltes System von diskreten Werten der Funktion Ω liefert.

Die Rechnungen, welche auf Grund der eben dargestellten theoretischen Betrachtungen unternommen wurden und die zu einer eingehenderen Kenntnis der Funktion Ω führen sollen, sind gegenwärtig im Gange. Da sie aber aus äußeren Gründen erst später zu Ende geführt werden können, möchte ich hier die Resultate der von mir gemachten Abzählungen, die vielleicht auch zu anderen Untersuchungen benutzt werden können, sowie das Ergebnis einer zur Orien-

tierung vorgenommenen Rechnung, die eine erste Näherung an die Lösung der Aufgabe liefert, mitteilen.

Das Erfahrungsmaterial, welches den weiteren Untersuchungen zugrunde gelegt werden soll, ist im Preliminary General Catalogue von *L. Boss* enthalten. Ich habe eine Umrechnung dieses Katalogs auf galaktische Koordinaten benutzt, die von Herrn *J. C. Kapteyn* dem Astrophysikalischen Observatorium zu Potsdam zur Verfügung gestellt worden ist und die es mir ermöglichte, bei meinen Abzählungen und Rechnungen ausschließlich galaktische Koordinaten zu gebrauchen. Die erste Aufgabe bestand darin, sich über die Verteilung der Eigenbewegungen der Sterne einen Überblick zu verschaffen und zunächst an gegenüberliegenden Stellen des Himmels zu prüfen, ob die Annahme der Gleichheit des Geschwindigkeitskörpers in allen Raumteilen für die Sterne des Katalogs von *Boss* zulässig ist. Es erschien wünschenswert, Abzählungen der Richtungen der Eigenbewegungen für die Umgebungen eines auf der Kugel gleichmäßig verteilten Systems von Punkten zu machen. Ein solches System wird dadurch erhalten, daß man der Kugel einen regulären Körper, z. B. ein Ikosaeder einschreibt. Ein Ikosaeder berührt die Kugeloberfläche in zwölf auf ihr vollkommen gleichmäßig verteilten Punkten, durch welche sie in 20 gleichseitige sphärische Dreiecke zerlegt wird (Fig. 2). Die Seitenlänge dieser Dreiecke beträgt $63^{\circ}26'$, ihre Winkel sind alle genau gleich 72° , sodaß um jeden der zwölf »Ikosaederpunkte« der Kugelfläche fünf Dreiecke liegen. Die zwölf Punkte liegen paarweise einander diametral gegenüber. In der nachstehenden Tabelle sind die galaktischen Koordinaten der zwölf Eckpunkte des von mir benutzten Ikosaeders angeführt; sie sind in einer solchen Weise numeriert worden, daß die Summe der Indizes zweier diametral entgegengesetzter Punkte immer gleich 13 ist.

Fig. 2.

Punkt	b	l	Punkt	b	l
1	$b = +90^{\circ}$		12	$b = -90^{\circ}$	
2	$b = +26^{\circ}34'$	$l = 0^{\circ}$	11	$b = -26^{\circ}34'$	$l = 180^{\circ}$
3	$b = +26^{\circ}34'$	$l = 72^{\circ}$	10	$b = -26^{\circ}34'$	$l = 252^{\circ}$
4	$b = +26^{\circ}34'$	$l = 144^{\circ}$	9	$b = -26^{\circ}34'$	$l = 324^{\circ}$
5	$b = +26^{\circ}34'$	$l = 216^{\circ}$	8	$b = -26^{\circ}34'$	$l = 36^{\circ}$
6	$b = +26^{\circ}34'$	$l = 288^{\circ}$	7	$b = -26^{\circ}34'$	$l = 108^{\circ}$

Nimmt man für die äquatorealen Koordinaten des Nordpols der Milchstraße die Werte $\delta = +27^{\circ}1/2^{\circ}$, $\alpha = 190^{\circ}$ an, so folgen für die äquatorealen Koordinaten der zwölf Ikosaederpunkte die in der folgenden Tabelle enthaltenen Werte:

Punkt	δ	α	ρ	Punkt	δ	α	ρ
1	$+27^{\circ}1/2^{\circ}$	190°	0°	12	$-27^{\circ}1/2^{\circ}$	10°	0°
2	$+12^{\circ}$	$256^{\circ}1/2^{\circ}$	65	11	-12°	$76^{\circ}1/2^{\circ}$	295
3	$+74^{\circ}$	280	82	10	-74°	100	278
4	$+42^{\circ}1/2^{\circ}$	112	284	9	$-42^{\circ}1/2^{\circ}$	292	76
5	-15°	$141^{\circ}1/2^{\circ}$	312	8	$+15^{\circ}$	$321^{\circ}1/2^{\circ}$	48
6	-33°	$209^{\circ}1/2^{\circ}$	19	7	$+33^{\circ}$	$29^{\circ}1/2^{\circ}$	341

Die mit ρ überschriebene Kolumne enthält die Winkel, welche in jedem dieser Punkte an die dort in gewöhnlicher Weise (von N über O nach S und W) gezählten Positionswinkel addiert werden müssen, um die entsprechenden in analoger Weise gezählten Positionswinkel gegen den galaktischen Meridian zu erhalten.

Um nun noch die ganze Kugeloberfläche in zwölf gleiche Bereiche einzuteilen, sind die Mittelpunkte der 20 Dreiecke, die den Spitzen eines eingeschriebenen Pentagon-Dodekaeders entsprechen, untereinander durch Bögen größter Kreise verbunden worden, wodurch auf der Sphäre zwölf reguläre Bogenfünfecke erhalten wurden, in deren Mittelpunkten die Ikosaederpunkte liegen. Auf eine stereographische Projektion der Sphäre eingezeichnet, gab dieses Netz von regulären Fünfecken die Möglichkeit, die Einteilung der Sterne des Katalogs nach Bereichen in einer sehr einfachen Weise, ohne jede Rechnung, auszuführen. Die Reduktion der aus dem Kataloge entnommenen Positionswinkel der Eigenbewegungen auf die Mittelpunkte der Bereiche, wurde in derselben Weise ausgeführt, wie bei allen derartigen Rechnungen bis jetzt geschehen ist, d. h. unter der Annahme, daß sich die Sterne eines Bereiches in einer die Himmelskugel im Mittelpunkte des Bereiches berührenden Ebene befinden.

Das Ergebnis der Abzählungen, die von 6° zu 6° gemacht wurden, ist in der folgenden Tabelle I enthalten. Die Positionswinkel in den Bereichen 1 und 12, die den galaktischen Polen entsprechen, beziehen sich auf den galaktischen Meridian 90° (also, wie im Kataloge, auf die durch diese Punkte gehenden Deklinationskreise) in den übrigen Bereichen sind die Positionswinkel vom galaktischen Meridian gerechnet, auf dem ihr Mittelpunkt liegt.

Tabelle I.

ψ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$0^{\circ} - 5^{\circ}$	0	6	3	2	4	0	2	1	2	1	6	0
$6 - 11$	4	8	2	4	2	0	2	1	3	3	6	2
$12 - 17$	2	7	3	4	1	0	0	3	3	1	9	6
$18 - 23$	0	4	3	3	0	0	3	2	1	6	9	4
$24 - 29$	0	3	2	2	1	1	4	3	2	2	12	2
$30 - 35$	0	3	4	4	0	3	2	3	3	1	11	5
$36 - 41$	0	2	5	2	2	1	4	2	0	4	4	5
$42 - 47$	1	2	6	7	1	0	3	1	5	3	7	3
$48 - 53$	0	4	7	4	2	0	3	4	1	2	13	7
$54 - 59$	2	3	21	7	3	0	7	3	1	1	5	5
$60 - 65$	0	3	24	8	4	0	11	4	1	6	8	12
$66 - 71$	2	5	25	8	4	0	18	4	0	5	12	14
$72 - 77$	1	2	25	7	4	1	9	3	1	4	11	19
$78 - 83$	1	1	27	19	4	0	18	3	3	5	12	22
$84 - 89$	2	7	36	17	4	1	30	5	1	6	17	18
$90 - 95$	1	2	38	22	14	2	27	9	2	5	16	12
$96 - 101$	4	4	29	26	7	2	39	19	4	4	16	12
$102 - 107$	2	10	27	24	7	0	31	14	2	4	21	18
$108 - 113$	7	3	21	38	10	3	25	9	2	3	14	11
$114 - 119$	5	5	17	36	11	6	23	15	2	4	18	12
$120 - 125$	7	4	10	30	9	5	26	22	4	8	9	17
$126 - 131$	4	4	7	34	4	4	21	19	5	2	13	12
$132 - 137$	8	4	14	24	11	2	15	19	3	8	20	17
$138 - 143$	10	3	10	27	12	6	12	17	2	5	7	9

ψ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144°-149°	9	5	6	22	11	8	8	14	7	9	7	13
150-155	6	2	6	21	7	8	11	10	8	11	15	6
156-161	5	3	3	16	8	4	7	11	7	4	12	3
162-167	5	7	5	8	6	7	9	16	6	11	10	7
168-173	7	6	8	5	19	5	10	17	7	11	15	5
174-179	8	8	7	9	14	8	8	14	10	7	5	6
180-185	3	1	3	8	14	10	5	14	9	14	6	6
186-191	5	6	8	3	19	6	8	20	20	18	6	6
192-197	8	6	3	4	22	9	7	11	14	10	5	11
198-203	5	5	7	3	31	5	11	8	19	16	9	8
204-209	9	13	7	5	19	7	9	6	21	13	6	10
210-215	13	5	8	4	17	6	10	13	25	9	7	8
216-221	5	8	8	5	16	14	9	10	22	19	5	6
222-227	16	10	2	7	32	22	8	9	18	14	4	12
228-233	16	7	8	0	26	28	4	14	23	23	7	10
234-239	19	21	5	2	16	43	10	13	29	20	6	12
240-245	12	13	9	3	19	47	8	10	37	31	3	10
246-251	18	15	4	2	21	54	4	14	20	26	6	5
252-257	17	16	13	3	11	32	6	14	38	29	7	8
258-263	14	12	12	4	2	40	2	8	26	25	6	7
264-269	18	18	7	5	3	36	0	11	19	37	3	5
270-275	27	11	14	1	4	26	1	8	17	24	9	4
276-281	19	21	6	0	6	29	2	13	6	20	5	3
282-287	11	11	12	1	6	15	3	6	11	13	7	0
288-293	17	11	14	1	3	11	2	9	12	12	7	3
294-299	2	14	4	3	4	9	1	3	12	12	16	0
300-305	6	19	6	0	0	7	0	4	9	12	4	3
306-311	6	9	5	1	1	2	4	5	5	8	6	0
312-317	2	8	3	2	2	2	4	3	5	7	8	1
318-323	2	11	5	4	0	2	4	1	6	6	8	4
324-329	4	7	8	3	2	1	2	1	5	3	10	3
330-335	1	8	3	2	0	3	2	3	3	6	6	3
336-341	1	5	1	8	2	5	1	3	7	5	5	0
342-347	0	3	2	4	1	2	6	2	3	0	7	2
348-353	0	2	6	6	0	0	0	1	4	3	4	1
354-359	0	3	7	2	2	0	0	2	6	2	9	4

Die Anzahlen der Sterne in den verschiedenen Bereichen sind die folgenden:

Bereich 1	379 St.	Bereich 5	487 St.	Bereich 9	549 St.
2	429 »	6	550 »	10	583 »
3	601 »	7	521 »	11	537 »
4	536 »	8	506 »	12	439 »
6117 St.					

Die Gesamtzahl der verwendeten Sterne ist 6117 statt 6188 (der Gesamtzahl der Sterne im Kataloge), da bei den Abzählungen 71 Sterne, diejenigen des Taurus-Stromes ¹⁾, des Ursa maj.-Stromes ²⁾ und des Perseus-Stromes ³⁾ ausgeschlossen worden sind.

Ein jeder der 12 Ikosaederpunkte, i , kann mit dem ihm diametral entgegengesetzten Ikosaederpunkte, j , ($j = 13 - i$), durch zehn größte Halbkreise verbunden werden, von denen zwei benachbarte immer in dem Winkelabstande von 36° voneinander liegen, und von denen jeder, außer den beiden Endpunkten i und j , nur noch einen einzigen Ikosaederpunkt, k , (abwechselnd im Abstände von 63° 26' und 116° 34' von i) trifft. Bildet man in jedem Bereiche die Summen der Sterne, deren Bewegungsrichtungen um höchstens $\pm 18^\circ$ von den Richtungen dieser größten Kreise abweichen, und reduziert man sie alle auf gleiche Sternanzahlen, indem man sie durch die Gesamtzahl der Sterne im Bereiche dividiert, so erhält man die in der nachstehenden Tabelle angeführten 120 Größen (10 für jeden Bereich), die wir mit $q_{i,k}$ bezeichnen wollen, wo also $q_{i,k}$ den Bruchteil der Sterne des Bereiches i bedeutet, welche sich, bis auf $\pm 18^\circ$ genau, in der Richtung des die Punkte i und k verbindenden größten Kreises bewegen. Wenn wir es an den Punkten i und $j = 13 - i$ wirklich mit den aus zwei entgegengesetzten Richtungen gesehenen Projektionen eines und desselben Geschwindigkeitskörpers zu tun haben, muß nach der Bemerkung der Herren *Hough* und *Halm*

$$q_{i,k} = q_{j,k} \quad (j = 13 - i)$$

sein. Bis zu welchem Grade diese Forderung in Wirklichkeit erfüllt ist, läßt sich aus der nachstehenden Tabelle ersehen:

Tabelle II.

(1)	(12)	I	(12)	(1)	XII
$q_{1,3} = 0.016$	$q_{12,3} = 0.030$	$q_{1,3} = 0.023$	$q_{12,7} = 0.043$	$q_{1,7} = 0.016$	$q_{12,7} = 0.030$
$q_{1,2} = 0.029$	$q_{12,2} = 0.061$	$q_{1,2} = 0.045$	$q_{12,11} = 0.230$	$q_{1,11} = 0.280$	$q_{12,11} = 0.255$
$q_{1,6} = 0.106$	$q_{12,6} = 0.112$	$q_{1,6} = 0.109$	$q_{12,10} = 0.091$	$q_{1,10} = 0.113$	$q_{12,10} = 0.102$
$q_{1,5} = 0.227$	$q_{12,5} = 0.178$	$q_{1,5} = 0.202$	$q_{12,9} = 0.125$	$q_{1,9} = 0.108$	$q_{12,9} = 0.117$
$q_{1,4} = 0.092$	$q_{12,4} = 0.105$	$q_{1,4} = 0.098$	$q_{12,8} = 0.025$	$q_{1,8} = 0.013$	$q_{12,8} = 0.019$
(2)	(11)	II	(11)	(2)	XI
$q_{2,1} = 0.068$	$q_{11,1} = 0.076$	$q_{2,1} = 0.072$	$q_{11,5} = 0.104$	$q_{2,5} = 0.112$	$q_{11,5} = 0.108$
$q_{2,3} = 0.049$	$q_{11,3} = 0.089$	$q_{2,3} = 0.069$	$q_{11,10} = 0.175$	$q_{2,10} = 0.221$	$q_{11,10} = 0.198$
$q_{2,8} = 0.049$	$q_{11,8} = 0.071$	$q_{2,8} = 0.060$	$q_{11,12} = 0.087$	$q_{2,12} = 0.079$	$q_{11,12} = 0.083$
$q_{2,9} = 0.112$	$q_{11,9} = 0.138$	$q_{2,9} = 0.125$	$q_{11,7} = 0.058$	$q_{2,7} = 0.065$	$q_{11,7} = 0.062$
$q_{2,6} = 0.203$	$q_{11,6} = 0.121$	$q_{2,6} = 0.162$	$q_{11,4} = 0.080$	$q_{2,4} = 0.042$	$q_{11,4} = 0.061$
(3)	(10)	III	(10)	(3)	X
$q_{3,1} = 0.038$	$q_{10,1} = 0.017$	$q_{3,1} = 0.028$	$q_{10,6} = 0.031$	$q_{3,6} = 0.042$	$q_{10,6} = 0.036$
$q_{3,4} = 0.263$	$q_{10,4} = 0.160$	$q_{3,4} = 0.211$	$q_{10,9} = 0.048$	$q_{3,9} = 0.083$	$q_{10,9} = 0.066$
$q_{3,7} = 0.077$	$q_{10,7} = 0.161$	$q_{3,7} = 0.119$	$q_{10,12} = 0.122$	$q_{3,12} = 0.057$	$q_{10,12} = 0.089$
$q_{3,8} = 0.067$	$q_{10,8} = 0.068$	$q_{3,8} = 0.067$	$q_{10,11} = 0.288$	$q_{3,11} = 0.236$	$q_{10,11} = 0.262$
$q_{3,2} = 0.093$	$q_{10,2} = 0.046$	$q_{3,2} = 0.070$	$q_{10,5} = 0.060$	$q_{3,5} = 0.045$	$q_{10,5} = 0.052$

¹⁾ L. Boss, *Astronomical Journal* 28.31 (1908). ²⁾ E. Hertzsprung, *Astrophysical Journal* 30.135. ³⁾ Eddington, *Monthly Notices* 71.43.

(4)		(9)		IV	(9)		(4)		IX
$q_{4,1} = 0.041$	$q_{9,1} = 0.038$	$q_{4,1} = 0.040$	$q_{9,2} = 0.022$	$q_{4,2} = 0.037$	$q_{9,2} = 0.029$	$q_{4,2} = 0.035$	$q_{9,8} = 0.029$	$q_{4,8} = 0.035$	$q_{9,8} = 0.032$
$q_{4,5} = 0.123$	$q_{9,5} = 0.122$	$q_{4,5} = 0.122$	$q_{9,12} = 0.120$	$q_{4,12} = 0.069$	$q_{9,12} = 0.095$	$q_{4,12} = 0.069$	$q_{9,10} = 0.308$	$q_{4,10} = 0.328$	$q_{9,10} = 0.318$
$q_{4,11} = 0.269$	$q_{9,11} = 0.233$	$q_{4,11} = 0.251$	$q_{9,6} = 0.057$	$q_{4,6} = 0.041$	$q_{9,6} = 0.049$				
$q_{4,7} = 0.045$	$q_{9,7} = 0.058$	$q_{4,7} = 0.052$							
$q_{4,8} = 0.011$	$q_{9,8} = 0.013$	$q_{4,8} = 0.012$							
(5)		(8)		V	(8)		(5)		VIII
$q_{5,1} = 0.021$	$q_{8,1} = 0.020$	$q_{5,1} = 0.020$	$q_{8,8} = 0.030$	$q_{5,8} = 0.014$	$q_{8,8} = 0.022$	$q_{5,8} = 0.014$	$q_{8,7} = 0.174$	$q_{5,7} = 0.148$	$q_{8,7} = 0.161$
$q_{5,6} = 0.047$	$q_{8,6} = 0.085$	$q_{5,6} = 0.066$	$q_{8,12} = 0.182$	$q_{5,12} = 0.193$	$q_{8,12} = 0.187$	$q_{5,12} = 0.193$	$q_{8,9} = 0.138$	$q_{5,9} = 0.119$	$q_{8,9} = 0.129$
$q_{5,10} = 0.109$	$q_{8,10} = 0.119$	$q_{5,10} = 0.114$	$q_{8,2} = 0.032$	$q_{5,2} = 0.012$	$q_{8,2} = 0.022$				
$q_{5,11} = 0.290$	$q_{8,11} = 0.178$	$q_{5,11} = 0.234$							
$q_{5,4} = 0.047$	$q_{8,4} = 0.044$	$q_{5,4} = 0.045$							
(6)		(7)		VI	(7)		(6)		VII
$q_{6,1} = 0.004$	$q_{7,1} = 0.019$	$q_{6,1} = 0.011$	$q_{7,4} = 0.037$	$q_{6,4} = 0.027$	$q_{7,4} = 0.032$	$q_{6,4} = 0.027$	$q_{7,11} = 0.328$	$q_{6,11} = 0.458$	$q_{7,11} = 0.393$
$q_{6,2} = 0.004$	$q_{7,2} = 0.017$	$q_{6,2} = 0.010$	$q_{7,12} = 0.090$	$q_{6,12} = 0.082$	$q_{7,12} = 0.086$	$q_{6,12} = 0.082$	$q_{7,8} = 0.058$	$q_{6,8} = 0.033$	$q_{7,8} = 0.045$
$q_{6,9} = 0.058$	$q_{7,9} = 0.098$	$q_{6,9} = 0.078$	$q_{7,3} = 0.033$	$q_{6,3} = 0.009$	$q_{7,3} = 0.021$	$q_{6,3} = 0.009$			
$q_{6,10} = 0.179$	$q_{7,10} = 0.142$	$q_{6,10} = 0.146$							
$q_{6,5} = 0.176$	$q_{7,5} = 0.179$	$q_{6,5} = 0.178$							

Die in den nebeneinander stehenden, mit arabischen Zahlen überschriebenen Spalten enthaltenen Werte sind miteinander zu vergleichen; die Größen $q_{i,k}$, welche in den mit lateinischen Zahlen überschriebenen Spalten stehen, stellen die arithmetischen Mittelwerte von $q_{i,k}$ und $q_{j,k}$ dar. Man sieht, daß die Übereinstimmung, trotz gelegentlicher, ziemlich starker Abweichungen, im allgemeinen doch eine ganz gute ist, besonders, wenn man in Betracht zieht, daß die Gesamtzahlen der in den verschiedenen Bereichen verwendbaren Sterne für eine solche statistische Untersuchung verhältnismäßig gering sind. Jedenfalls wird durch die hier angeführten Abzählungsergebnisse die für die weitere Untersuchung zu machende Annahme, daß der Geschwindigkeitskörper der Sterne in allen Teilen des Raumes annähernd dieselbe Gestalt hat, unterstützt.

Die Zahlen der obenstehenden Tabelle wurden nun dazu benutzt, eine erste Annäherung an die räumliche Verteilungsfunktion Ω der Richtungen der Sternengeschwindigkeiten zu erhalten; es lassen sich nämlich aus ihnen die Werte dieser Funktion für die zwölf Ikosaederpunkte, also für zwölf gleichmäßig verteilte, zur Milchstraße symmetrisch liegende Richtungen angenähert ableiten. Um die zu ihrer Berechnung notwendigen Formeln zu erhalten, gehen wir von der Gleichung (3) aus; die Integration ist in ihr über diejenigen Werte Ω auszudehnen, welche auf einem vom Punkte (α, δ) aus, unter dem Positionswinkel ψ , ausgehenden halben Bogen eines größten Kreises liegen. Betrachtet man die Funktion Ω in gewissen, nicht zu weit auseinander liegenden Punkten dieses Bogens als gegeben, und stellt man den Verlauf der Funktion zwischen diesen Werten mit Hilfe einer Interpolationsformel dar, in der diese Werte linear vorkommen, so kann man die Integration auf der rechten Seite ausführen und erhält eine Gleichung, in der die als gegeben vorausgesetzten Funktionswerte linear enthalten sind, und deren Koeffizienten gewisse konstante Werte haben:

$$q(\alpha, \delta, \psi) = \sum C_i \Omega_i. \quad (4)$$

Bildet man ähnliche Gleichungen, zunächst von demselben Punkte (α, δ) ausgehend, für verschiedene Positionswinkel ψ , dann für eine Reihe von weiteren Punkten der Sphäre, für die man die Werte $q(\alpha, \delta, \psi)$ bestimmt hat, so erhält man, bei passender Wahl der Punkte und Richtungen, auf die sich die als gegeben vorausgesetzten Werte Ω_i und die durch Abzählungen erhaltenen Werte q beziehen, ein System von Gleichungen mit den Unbekannten Ω_i , dessen Auflösung ein System von Werten der Funktion Ω für eine Anzahl von Punkten der Sphäre liefert.

Das bei den Abzählungen benutzte System der zwölf Ikosaederpunkte kann nun zur Aufstellung eines brauchbaren Gleichungssystems verwendet werden. Die in den mit I, II... XII überschriebenen Spalten der Tabelle II stehenden Werte $q_{i,k}$ betrachten wir als die Werte der Funktion $q(\alpha, \delta, \psi)$ in den zwölf Ikosaederpunkten für die von jedem ausgehenden, durch die Indizes i, k bestimmten und auf der Figur 2 dargestellten fünf größten Kreise¹⁾. Als gesuchte Werte der Funktion Ω führen wir ihre Werte Ω_i in den zwölf Ikosaederpunkten ein; da aber auf jedem der fünf von einem Ikosaederpunkte ausgehenden Halbkreise nur noch zwei andere Ikosaederpunkte liegen, können wir uns mit den Werten Ω_i nicht begnügen, sondern benutzen noch die Werte der Funktion für die Mittelpunkte der Dreieckseiten, indem wir näherungsweise annehmen, daß diese den arithmetischen Mitteln der den Endpunkten entsprechenden Werte Ω gleich sind. Da die Seitenlänge der Dreiecke gleich $63^\circ 26'$ ist und die Höhe $58^\circ 17'$ beträgt, erhalten wir auf diese Weise für jeden Halbkreis vier Funktionswerte, die in Abständen von ungefähr 60° voneinander liegen. Somit erhalten wir zur Bestimmung der 12 Unbekannten Ω_i 60 Gleichungen von der Form:

$$q_{i,k} = C_1 \Omega_i + C_2 \Omega_k + C_3 (\Omega_l + \Omega_m) + C_4 \Omega_j \quad (5)$$

wo $j = 13 - i$ und die Indizes l und m am einfachsten aus der Betrachtung der Figur 2 ermittelt werden können. Die Koeffizienten C_1, C_2, C_3, C_4 , sind gewisse Konstanten, deren

¹⁾ Die Einführung der anderen fünf, in den Intervallen zwischen diesen liegenden größten Kreise, würde nichts Neues liefern, da sie den fünf größten Kreisen des jeweils diametral entgegengesetzten Ikosaederpunktes entsprechen.

Werte von der Wahl der die Funktionswerte Ω_i , Ω_k , $\frac{1}{2}(\Omega_i + \Omega_m)$, Ω_j verbindenden Interpolationsformel abhängen und deren Berechnung wir vorläufig übergehen. Die Anwendung der Methode der kleinsten Quadrate auf diese 60 Gleichungen führt zu einem System von zwölf Normalgleichungen mit zwölf Unbekannten, dessen Auflösung uns die gesuchten Werte von Ω in den zwölf Ikosaederpunkten liefert¹⁾. Um dieses System von Normalgleichungen wirklich zu erhalten, wird es genügen, die Normalgleichung für eine einzige Unbekannte zu bilden, da alle übrigen, wegen der vollständigen Gleichberechtigung der zwölf Punkte, aus dieser durch zyklische (im räumlichen Sinne, also eigentlich »sphärische«) Vertauschung der Unbekannten und der Werte $\varrho_{i,k}$ hervorgehen müssen. Um aber z. B. die Normalgleichung für Ω_1 abzuleiten, müssen wir aus den nach der in (5) gegebenen Vorschrift konstruierten 60 Bedingungsgleichungen diejenigen herausgreifen, in denen die Unbekannte Ω_1 vorkommt. Dies sind zunächst (wie man aus der Figur 2 ersieht) die fünf Gleichungen, in denen Ω_1 mit dem Koeffizienten C_1 auftritt:

$$\begin{aligned}\varrho_{1,2} &= C_1 \Omega_1 + C_2 \Omega_2 + C_3 (\Omega_8 + \Omega_9) + C_4 \Omega_{12} \\ \varrho_{1,3} &= C_1 \Omega_1 + C_2 \Omega_2 + C_3 (\Omega_7 + \Omega_8) + C_4 \Omega_{12} \\ \varrho_{1,4} &= C_1 \Omega_1 + C_2 \Omega_4 + C_3 (\Omega_{11} + \Omega_7) + C_4 \Omega_{12} \\ \varrho_{1,5} &= C_1 \Omega_1 + C_2 \Omega_5 + C_3 (\Omega_{10} + \Omega_{11}) + C_4 \Omega_{12} \\ \varrho_{1,6} &= C_1 \Omega_1 + C_2 \Omega_6 + C_3 (\Omega_9 + \Omega_{10}) + C_4 \Omega_{12}\end{aligned}$$

Sodann weitere fünf Gleichungen, die Ω_1 mit dem Koeffizienten C_2 enthalten:

$$\begin{aligned}\varrho_{2,1} &= C_1 \Omega_2 + C_2 \Omega_1 + C_3 (\Omega_4 + \Omega_5) + C_4 \Omega_{11} \\ \varrho_{3,1} &= C_1 \Omega_3 + C_2 \Omega_1 + C_3 (\Omega_5 + \Omega_6) + C_4 \Omega_{10} \\ \varrho_{4,1} &= C_1 \Omega_4 + C_2 \Omega_1 + C_3 (\Omega_6 + \Omega_2) + C_4 \Omega_9 \\ \varrho_{5,1} &= C_1 \Omega_5 + C_2 \Omega_1 + C_3 (\Omega_2 + \Omega_3) + C_4 \Omega_8 \\ \varrho_{6,1} &= C_1 \Omega_6 + C_2 \Omega_1 + C_3 (\Omega_3 + \Omega_4) + C_4 \Omega_7\end{aligned}$$

Hierauf folgen zehn Gleichungen mit $C_3 \Omega_1$:

$$\begin{aligned}\varrho_{7,4} &= C_1 \Omega_7 + C_2 \Omega_4 + C_3 (\Omega_1 + \Omega_5) + C_4 \Omega_6 \\ \varrho_{7,3} &= C_1 \Omega_7 + C_2 \Omega_3 + C_3 (\Omega_1 + \Omega_2) + C_4 \Omega_6 \\ \varrho_{8,3} &= C_1 \Omega_8 + C_2 \Omega_3 + C_3 (\Omega_1 + \Omega_4) + C_4 \Omega_5 \\ \varrho_{8,2} &= C_1 \Omega_8 + C_2 \Omega_2 + C_3 (\Omega_1 + \Omega_6) + C_4 \Omega_5 \\ \varrho_{9,2} &= C_1 \Omega_9 + C_2 \Omega_2 + C_3 (\Omega_1 + \Omega_3) + C_4 \Omega_4 \\ \varrho_{9,6} &= C_1 \Omega_9 + C_2 \Omega_6 + C_3 (\Omega_1 + \Omega_5) + C_4 \Omega_4 \\ \varrho_{10,6} &= C_1 \Omega_{10} + C_2 \Omega_6 + C_3 (\Omega_1 + \Omega_2) + C_4 \Omega_3 \\ \varrho_{10,5} &= C_1 \Omega_{10} + C_2 \Omega_5 + C_3 (\Omega_1 + \Omega_4) + C_4 \Omega_3 \\ \varrho_{11,5} &= C_1 \Omega_{11} + C_2 \Omega_5 + C_3 (\Omega_1 + \Omega_6) + C_4 \Omega_2 \\ \varrho_{11,4} &= C_1 \Omega_{11} + C_2 \Omega_4 + C_3 (\Omega_1 + \Omega_3) + C_4 \Omega_2\end{aligned}$$

und endlich noch fünf Gleichungen, in denen Ω_1 mit dem Koeffizienten C_4 behaftet ist:

$$\begin{aligned}\varrho_{12,7} &= C_1 \Omega_{12} + C_2 \Omega_7 + C_3 (\Omega_3 + \Omega_4) + C_4 \Omega_1 \\ \varrho_{12,8} &= C_1 \Omega_{12} + C_2 \Omega_8 + C_3 (\Omega_2 + \Omega_3) + C_4 \Omega_1 \\ \varrho_{12,9} &= C_1 \Omega_{12} + C_2 \Omega_9 + C_3 (\Omega_6 + \Omega_2) + C_4 \Omega_1 \\ \varrho_{12,10} &= C_1 \Omega_{12} + C_2 \Omega_{10} + C_3 (\Omega_5 + \Omega_6) + C_4 \Omega_1 \\ \varrho_{12,11} &= C_1 \Omega_{12} + C_2 \Omega_{11} + C_3 (\Omega_4 + \Omega_5) + C_4 \Omega_1\end{aligned}$$

¹⁾ Wenn man die Funktionswerte in den Mittelpunkten der 30 Dreiecksseiten als unabhängige neue Variablen einführt, oder statt ihrer die Werte Ω in den Dreiecksmittelpunkten (Dodekaederpunkten), erhält man ein System von 42 bzw. 32 Normalgleichungen mit ebensovielen Unbekannten, die sich wegen ihrer symmetrischen Gestalt leicht übersehen lassen. Jedoch sind die Lösungen dieser Systeme unbestimmt. Es wird sich wohl durch Verbindung der Ikosaeder-, Dodekaeder- und Seitenhalbierenden-Punkte, eventuell unter Benutzung neuer Abzählungsergebnisse in diesen Punkten ein Gleichungssystem ableiten lassen, welches ein System von Werten Ω für eine größere Anzahl von Punkten an der Kugel ergeben wird.

Die Normalgleichung, welche aus diesen 20 Bedingungsgleichungen für Ω_1 folgt, lautet:

$$A \Omega_1 + B (\Omega_2 + \Omega_3 + \Omega_4 + \Omega_5 + \Omega_6) + \Gamma (\Omega_7 + \Omega_8 + \Omega_9 + \Omega_{10} + \Omega_{11}) + A \Omega_{12} = P_1 \quad (6)$$

wo die Koeffizienten A , B , Γ , A durch die Formeln gegeben sind:

$$\left. \begin{aligned}A &= 5(C_1^2 + C_2^2 + 2C_3^2 + C_4^2) \\ B &= 2(C_1 C_2 + 2C_2 C_3 + 2C_3 C_4 + C_3^2) \\ \Gamma &= 2(C_2 C_4 + 2C_1 C_3) \\ A &= 10 C_1 C_4\end{aligned} \right\} \quad (7)$$

und die rechte Seite P_1 , die folgende Struktur hat:

$$\left. \begin{aligned}P_1 &= R_1' + R_1'' + R_1''' + R_1'''' \\ R_1' &= C_1 (\varrho_{1,2} + \varrho_{1,3} + \varrho_{1,4} + \varrho_{1,5} + \varrho_{1,6}) \\ R_1'' &= C_2 (\varrho_{2,1} + \varrho_{3,1} + \varrho_{4,1} + \varrho_{5,1} + \varrho_{6,1}) \\ R_1''' &= C_3 (\varrho_{7,4} + \varrho_{7,3} + \varrho_{8,3} + \varrho_{8,2} + \varrho_{9,2} + \varrho_{9,6} \\ &\quad + \varrho_{10,6} + \varrho_{10,5} + \varrho_{11,5} + \varrho_{11,4}) \\ R_1'''' &= C_4 (\varrho_{12,7} + \varrho_{12,8} + \varrho_{12,9} + \varrho_{12,10} + \varrho_{12,11})\end{aligned} \right\} \quad (8)$$

Nach den in den Formeln (6), (7) und (8) enthaltenen Vorschriften kann nun die Normalgleichung für irgend eine andere Unbekannte Ω_i mit Hilfe der Fig. 2 leicht gebildet werden. Es ist z. B. für Ω_7 :

$$A \Omega_7 + B (\Omega_3 + \Omega_4 + \Omega_8 + \Omega_{11} + \Omega_{12}) + \Gamma (\Omega_1 + \Omega_2 + \Omega_5 + \Omega_9 + \Omega_{10}) + A \Omega_6 = P_7$$

wo die Koeffizienten die frühere Bedeutung haben, und

$$P_7 = R_7' + R_7'' + R_7''' + R_7''''$$

ist, wobei die letzten vier Größen den Größen (8) vollkommen analog, nach demselben an der Figur leicht zu bemerkenden geometrischen Gesetze gebildet sind.

Die Auflösung des Systems von Gleichungen (6) gestaltet sich sehr einfach wegen der Kugelsymmetrie, die in diesen Gleichungen zu Tage tritt. Es ist zunächst klar, daß die Lösungen lineare Funktionen der Größen P_i sein müssen; ferner ist aber auch von vornherein klar, daß diejenigen P_i , die sich auf die Punkte beziehen, welche zum Punkte i analog liegen, mit demselben Koeffizienten multipliziert in dem Ausdrucke für Ω_i auftreten müssen. Diese Erwägungen führen zu dem folgenden Ansatz für die Lösungen:

$$\Omega_i = \alpha P_i + \lambda \sum P_k + \mu \sum' P_l + \nu P_j \quad (9)$$

wo j wie früher $= 13 - i$ ist, $\sum P_k$ die Summe der fünf P bedeutet, welche sich auf die Punkte beziehen, die auf einem um den Punkt i mit einem Bogenradius von $63^\circ 26'$ beschriebenen Kreise liegen, und $\sum' P_l$ die Summe derjenigen fünf P ist, deren Indizes mit den Indizes der in $\sum P_k$ vorkommenden Größen durch die Relation: $l = 13 - k$ verbunden sind. Die ganze Aufgabe reduziert sich dann auf die Berechnung der vier Konstanten: α , λ , μ , ν .

Schreibt man alle zwölf Lösungen in der Form (9) wirklich hin und setzt sie in irgend eine der Normalgleichungen (6) ein, so sieht man, daß diese für willkürliche Werte P_i nur dann befriedigt werden kann, wenn die Größen α , λ , μ , ν den folgenden Bedingungen genügen:

$$\left. \begin{aligned} A\kappa + 5B\lambda + 5\Gamma\mu + A\nu &= 1 \\ B\kappa + E\lambda + Z\mu + \Gamma\nu &= 0 \\ \Gamma\kappa + Z\lambda + E\mu + B\nu &= 0 \\ A\kappa + 5\Gamma\lambda + 5B\mu + A\nu &= 0 \end{aligned} \right\} (10)$$

wo zur Abkürzung:

$$\left. \begin{aligned} A + 2B + 2\Gamma &= E \\ A + 2B + 2\Gamma &= Z \end{aligned} \right\} (11)$$

gesetzt ist. Bezeichnet man die Determinante dieses Gleichungssystems (welche bei irgendwie gewählten $C_1 \dots C_4$ nicht gleich null ist) mit D , so sieht man, daß:

$$\begin{aligned} D\kappa &= + \begin{vmatrix} E & Z & \Gamma \\ Z & E & B \\ 5\Gamma & 5B & A \end{vmatrix} & D\lambda &= - \begin{vmatrix} B & Z & \Gamma \\ \Gamma & E & B \\ A & 5B & A \end{vmatrix} \\ D\mu &= + \begin{vmatrix} B & E & \Gamma \\ \Gamma & Z & B \\ A & 5\Gamma & A \end{vmatrix} & D\nu &= - \begin{vmatrix} B & E & Z \\ \Gamma & Z & E \\ A & 5\Gamma & 5B \end{vmatrix} \end{aligned}$$

sein muß, oder in entwickelter Form:

$$\left. \begin{aligned} D\kappa &= + (E^2 - Z^2) \cdot A - 5E \cdot (B^2 + \Gamma^2) + 10Z \cdot B\Gamma \\ D\lambda &= - (AB - \Gamma A) \cdot E + (A\Gamma - BA) \cdot Z + 5B(B^2 - \Gamma^2) \\ D\mu &= - (A\Gamma - BA) \cdot E + (AB - \Gamma A) \cdot Z - 5\Gamma(B^2 - \Gamma^2) \\ D\nu &= - (E^2 - Z^2) \cdot A - 5Z(B^2 + \Gamma^2) + 10E \cdot B\Gamma \end{aligned} \right\} (12)$$

Hat man die Größen $D\kappa$, $D\lambda$, $D\mu$, $D\nu$ aus den Formeln (12) berechnet, so erhält man den numerischen Wert von D aus der ersten der Gleichungen (10) und somit auch die Werte von κ , λ , μ , ν . Mit diesen und den zwölf Größen P_i können dann nach der Formel (9) und den ihr analog gebauten, die zwölf Werte der Unbekannten Ω_i berechnet werden, wodurch das Problem gelöst ist.

Die Formeln (7) bis (12) wollen wir nun auf das in der Tabelle II enthaltene Erfahrungsmaterial anwenden. Zunächst müssen wir aber numerische Werte für die Koeffizienten $C_1 \dots C_4$ erhalten. Der Einfachheit halber nehmen wir an, daß die in den Gleichungen (5) auftretenden vier Funktionswerte: Ω_i , Ω_k , $\frac{1}{2}(\Omega_i + \Omega_m)$, Ω_j den vier Punkten des Halbkreises entsprechen, welche genau in Abständen von 60° voneinander liegen. In den so entstehenden drei gleichen Intervallen stellen wir dann den Verlauf der Funktion Ω zwischen den oberen vier Werten durch lineare Funktionen der Bogenlänge ϑ dar. Es ist also:

im Intervalle I, von $\vartheta = 0$ bis $\vartheta = \frac{1}{3}\pi$:

$$\Omega_I = \Omega_i + (\Omega_k - \Omega_i) \left(\frac{3}{\pi} \right) \vartheta,$$

im Intervalle II, von $\vartheta = \frac{1}{3}\pi$ bis $\vartheta = \frac{2}{3}\pi$:

$$\Omega_{II} = \Omega_k + \left[\frac{1}{2}(\Omega_i + \Omega_m) - \Omega_k \right] \left(\frac{3}{\pi} \right) \left(\vartheta - \frac{1}{3}\pi \right),$$

im Intervalle III, von $\vartheta = \frac{2}{3}\pi$ bis $\vartheta = \pi$:

$$\Omega_{III} = \frac{1}{2}(\Omega_i + \Omega_m) + \left[\Omega_j - \frac{1}{2}(\Omega_i + \Omega_m) \right] \left(\frac{3}{\pi} \right) \left(\vartheta - \frac{2}{3}\pi \right).$$

Um nun die Werte der Koeffizienten $C_1 \dots C_4$ zu erhalten, haben wir nur noch das in (3) auftretende Integral in drei Bestandteile zu zerlegen:

$$\int_{\vartheta=0}^{\vartheta=\pi} \Omega \sin \vartheta d\vartheta = \int_{\vartheta=0}^{\vartheta=\frac{1}{3}\pi} \Omega_I \sin \vartheta d\vartheta + \int_{\vartheta=\frac{1}{3}\pi}^{\vartheta=\frac{2}{3}\pi} \Omega_{II} \sin \vartheta d\vartheta + \int_{\vartheta=\frac{2}{3}\pi}^{\vartheta=\pi} \Omega_{III} \sin \vartheta d\vartheta,$$

in diesen drei Integralen die oberen Werte für Ω_I , Ω_{II} und Ω_{III} einzusetzen, die Integration auszuführen und die sich auf jeden der fünf Funktionswerte Ω_i , Ω_k , $\frac{1}{2}(\Omega_i + \Omega_m)$, Ω_j beziehenden Glieder zusammenzufassen. Da die Werte der dabei auftretenden bestimmten Integrale die folgenden sind:

$$\left. \begin{aligned} \int_0^{\frac{1}{3}\pi} \sin \vartheta d\vartheta &= +\frac{1}{2} & \int_0^{\frac{1}{3}\pi} \vartheta \sin \vartheta d\vartheta &= \frac{1}{2} \sqrt{3} - \frac{1}{6} \pi \\ \int_{\frac{1}{3}\pi}^{\frac{2}{3}\pi} \sin \vartheta d\vartheta &= +1 & \int_{\frac{1}{3}\pi}^{\frac{2}{3}\pi} \vartheta \sin \vartheta d\vartheta &= \frac{1}{2} \pi \\ \int_{\frac{2}{3}\pi}^{\pi} \sin \vartheta d\vartheta &= +\frac{1}{2} & \int_{\frac{2}{3}\pi}^{\pi} \vartheta \sin \vartheta d\vartheta &= \frac{2}{3} \pi - \frac{1}{2} \sqrt{3} \end{aligned} \right\}$$

so folgen für die Koeffizienten die Werte:

$$\left. \begin{aligned} C_1 &= 1 - \frac{3}{2} \sqrt{3} / \pi = 0.17302 \\ C_2 &= \frac{3}{2} \sqrt{3} / \pi = 0.82698 \\ C_3 &= \frac{3}{4} \sqrt{3} / \pi = 0.41349 \\ C_4 &= 1 - \frac{3}{2} \sqrt{3} / \pi = 0.17302 \end{aligned} \right\} (13)$$

Da hier also $C_1 = C_4$ und $C_2 = 2C_3$ ist, lassen sich die Formeln (7) bedeutend vereinfachen und auf die Gestalt bringen:

$$\left. \begin{aligned} A &= 10(C_1^2 + 3C_3^2) \\ B &= 2C_3(4C_1 + 5C_3) \\ \Gamma &= 8C_1C_3 \\ A &= 10C_1^2 \end{aligned} \right\} (7')$$

und zwischen den auf diametral entgegengesetzt liegende Punkte (i und j) bezüglichen Größen R des Formelsystems (8) bestehen die Beziehungen:

$$R_i' = R_j''' \quad R_i'''' = R_j'.$$

Die Durchführung der Rechnung mit den oben angeführten Werten (13) der Koeffizienten gibt folgende Resultate. Es sind zunächst:

$$\begin{aligned} A &= +5.42875 & \Gamma &= +0.57235 \\ B &= +2.28205 & A &= +0.29936 \end{aligned}$$

und damit:

$$\left. \begin{aligned} \log \kappa &= 9.56640 - 10 \\ \log \lambda &= 8.99093n \\ \log \mu &= 8.68363 \\ \log \nu &= 8.84600n \end{aligned} \right\} (14)$$

Andererseits erhält man mit Hilfe der in der Tabelle II enthaltenen Abzählungswerte und den Koeffizienten (13), nach den Formeln (8):

$$\left. \begin{aligned} P_1 &= 0.49307 & P_{12} &= 1.13480 \\ P_2 &= 0.50133 & P_{11} &= 2.03578 \\ P_3 &= 0.42651 & P_{10} &= 1.62934 \\ P_4 &= 1.00279 & P_9 &= 0.96404 \\ P_5 &= 1.39119 & P_8 &= 0.57246 \\ P_6 &= 0.90905 & P_7 &= 0.94007 \end{aligned} \right\} (15)$$

und aus (14) und (15) ergeben sich die gesuchten Werte Ω_i nach den Formeln (9) zu:

$$\left. \begin{aligned} \Omega_1 &= -0.0158 & \Omega_{12} &= -0.0137 \\ \Omega_2 &= +0.0067 & \Omega_{11} &= +0.2802 \\ \Omega_3 &= +0.0097 & \Omega_{10} &= +0.1097 \\ \Omega_4 &= +0.0133 & \Omega_9 &= +0.0752 \\ \Omega_5 &= +0.0694 & \Omega_8 &= +0.0179 \\ \Omega_6 &= +0.0311 & \Omega_7 &= +0.0164 \end{aligned} \right\} (16)$$

Dies ist das Resultat der bisherigen Untersuchung, an das folgende Bemerkungen angeschlossen seien:

Der größte Wert Ω_i entspricht, wie auch zu erwarten war, dem Punkte 11, da der ihm diametral gegenüberliegende Punkt 2, mit den Koordinaten: $\delta = +12^\circ$, $\alpha = 256\frac{1}{2}^\circ$ in

der Nähe des Sonnenapex liegt. Etwa 80 % aller Sterne bewegen sich nach vorstehenden Zahlen nach der Seite des Antiapex. Die zwei negativen Werte, welche den beiden Polen der Milchstraße entsprechen, haben natürlich keine reale Bedeutung, sondern verdanken ihre Entstehung der ungenügenden Genauigkeit des Materials und der Interpolationsmethode. Ihr Auftreten an den Polen der Milchstraße (und nicht etwa am Apex) ist immerhin beachtenswert und legt

die Vermutung nahe, daß, bei einem durch die galaktische Achse gehenden Schnitte des Geschwindigkeitskörpers, die Kurven gleicher Dichte vielleicht mehr Ähnlichkeit mit Lemniskaten, als mit Ellipsen haben würden.

Setzt man die zwölf Werte Ω_i in die 60 Bedingungengleichungen ein, so erhält man die Reste, welche in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt sind:

Tabelle III.

R B R-B				R B R-B				R B R-B			
(1)				(2)				(3)			
$Q_{1,3}$	0.017	0.023	-0.006	$Q_{2,1}$	0.071	0.072	-0.001	$Q_{3,1}$	0.049	0.028	+0.021
$Q_{1,2}$	0.039	0.045	- 6	$Q_{2,3}$	0.070	0.069	+ 1	$Q_{3,4}$	0.176	0.211	- 35
$Q_{1,6}$	0.097	0.109	- 12	$Q_{2,8}$	0.066	0.060	+ 6	$Q_{3,7}$	0.144	0.119	+ 25
$Q_{1,5}$	0.213	0.202	+ 11	$Q_{2,9}$	0.151	0.125	+ 26	$Q_{3,8}$	0.061	0.067	- 6
$Q_{1,4}$	0.129	0.098	+ 31	$Q_{2,6}$	0.149	0.162	- 13	$Q_{3,2}$	0.070	0.070	0
(4)				(5)				(6)			
$Q_{4,1}$	0.018	0.040	-0.022	$Q_{5,1}$	0.009	0.020	-0.011	$Q_{6,1}$	0.005	0.011	-0.006
$Q_{4,5}$	0.131	0.122	+ 9	$Q_{5,6}$	0.075	0.066	+ 9	$Q_{6,2}$	0.025	0.010	+ 15
$Q_{4,11}$	0.287	0.251	+ 36	$Q_{5,10}$	0.131	0.114	+ 17	$Q_{6,9}$	0.072	0.078	- 6
$Q_{4,7}$	0.031	0.052	- 21	$Q_{5,11}$	0.248	0.234	+ 14	$Q_{6,10}$	0.209	0.146	+ 63
$Q_{4,3}$	0.024	0.012	+ 12	$Q_{5,4}$	0.037	0.045	- 8	$Q_{6,5}$	0.187	0.178	+ 9
(7)				(8)				(9)			
$Q_{7,4}$	0.041	0.032	+0.009	$Q_{8,3}$	0.022	0.022	0.000	$Q_{9,2}$	0.018	0.029	-0.011
$Q_{7,11}$	0.314	0.393	- 79	$Q_{8,7}$	0.150	0.161	- 11	$Q_{9,8}$	0.041	0.032	+ 9
$Q_{7,12}$	0.073	0.086	- 13	$Q_{8,12}$	0.165	0.187	- 22	$Q_{9,12}$	0.127	0.095	+ 32
$Q_{7,8}$	0.057	0.045	+ 12	$Q_{8,9}$	0.135	0.129	+ 6	$Q_{9,10}$	0.251	0.318	- 67
$Q_{7,3}$	0.012	0.021	- 9	$Q_{8,2}$	0.027	0.022	+ 5	$Q_{9,6}$	0.063	0.049	+ 14
(10)				(11)				(12)			
$Q_{10,6}$	0.043	0.036	+0.007	$Q_{11,5}$	0.113	0.108	+0.005	$Q_{12,7}$	0.018	0.030	-0.012
$Q_{10,9}$	0.093	0.066	+ 27	$Q_{11,10}$	0.184	0.198	- 14	$Q_{12,11}$	0.261	0.255	+ 6
$Q_{10,12}$	0.023	0.089	- 66	$Q_{11,12}$	0.077	0.083	- 6	$Q_{12,10}$	0.127	0.102	+ 25
$Q_{10,11}$	0.265	0.262	+ 3	$Q_{11,7}$	0.075	0.062	+ 13	$Q_{12,9}$	0.072	0.117	- 45
$Q_{10,5}$	0.077	0.052	+ 25	$Q_{11,4}$	0.058	0.061	- 3	$Q_{12,8}$	0.016	0.019	- 3

Die Übereinstimmung ist, wenn auch nicht besonders gut, so doch jedenfalls nicht schlechter, als die Übereinstimmung der gegenüberliegenden Werte $Q_{i,k}$, $Q_{j,k}$ in der Tabelle II. Wenn es den Herren *Eddington* und *Schwarzschild* gelungen ist, von hypothetischen Ansätzen für den Geschwindigkeitskörper ausgehend, die Abzählungsergebnisse in den verschiedenen Himmelsgegenden mit einer bedeutend größeren Genauigkeit darzustellen, so ist dies bis zu einem gewissen Maße dem schon genannten Umstande zu verdanken, daß die numerischen Werte der Parameter für jeden Bereich

unabhängig von ihren Werten in den anderen bestimmt wurden, während es sich bei der hier angewandten Methode um die Berechnung eines einzigen Geschwindigkeitskörpers aus den sämtlichen bekannten Eigenbewegungen der Sterne in allen Teilen des Himmels handelt. Die in (16) zusammengestellten Werte stellen allerdings nur eine erste, ziemlich rohe Annäherung an die Lösung dieser Aufgabe dar, und es muß den weiteren Rechnungen vorbehalten bleiben, die durch die vorliegenden Zahlen nur angedeuteten Eigenschaften des Geschwindigkeitskörpers näher zu bestimmen.

Potsdam, Astrophysikalisches Observatorium, 1913 Dezember.

E. von der Pahlen.

Positionsbestimmungen der Nova Geminorum 2 am Meridiankreis zu Königsberg Pr.

1913 Jan. 28	Ost	α 1913.0 = 6 ^h 49 ^m 15 ^s .74	δ 1913.0 = +32° 15' 0".8
» 29	»	.72	0.0 *)
» 30	»	.69	0.2
Febr. 12	»	.71	0.0
1913.09		6 49 15.715	+32 15 0.29

*) Nur ein Äquatorpunkt, $p\delta = 1/2$, verwaschen und unruhig.

E. Fost.

Inhalt zu Nr. 4725. E. von der Pahlen. Über die Verteilung der Sternengeschwindigkeiten. 337. — E. Fost. Positionsbestimmungen der Nova Geminorum 2 am Meridiankreis zu Königsberg Pr. 351.