Julius Maemecke in Berlin: Verfahren zum Trocknen saftreicher Pflanzenteile. D.R.P. 135 082 vom 11. November 1900. (Patentbl. 1902, **23**, 1625.) — Das Verfahren besteht darin, daß man das gemäß dem Hauptpatent zum Erhitzen der Pflanzenteile benutzte Wasser oder das bei Anwendung von Dampf entstandene Kondenswasser vor dem Pressen oder Centrifugieren der erhitzten Pflanzenteile entfernt, indem man dasselbe einfach abfließen läßt oder die erhitzten Materialien in einer perforierten Schnecke oder über ein Schüttelsieb den Pressen bezw. Centrifugen zuführt.

Gerhard Beckers u. Co., G. m. b. H. in Kempen, Rhein: Verfahren zur Herstellung von Sauerkraut. D.R.P. 134 690 vom 10. Juli 1901. (Patentbl. 1902, **23**, 1476.) — Zur Erhaltung der weißen Farbe des Sauerkrauts und zur Einleitung der erforderlichen reinen Milchsäuregärung ist es ein Haupterfordernis, dem Gemüse möglichst bald etwa 50% seines Wassers zu entziehen, wodurch dann zugleich die zwischen den einzelnen Gemüseteilchen befindliche Luft aus den Gärbottichen verdrängt wird. Dieser für das Gelingen des Gärprozesses so notwendigen Bedingung wurde bisher dadurch genügt, daß man dem Kraut Kochsalz zusetzte. Nach vorliegendem Verfahren werden nun dem Sauerkraut an Stelle des Kochsalzes stärker wasserentziehende Mittel, nämlich Alkali- oder Erdalkalisalze bezw. Gemische derselben zugesetzt. Infolge des hierdurch bewirkten schnelleren Wasseraustritts kann die Arbeit des Einstampfens und die Belastung der Bottiche erheblich vermindert werden. *A. Oelker.*

Konservierungsmittel.

A. Berg: Über die Bestimmung der Schwefligen Säure durch titrierte Jodlösung. (Bull. Soc. Chim. Paris 1902 [3], **27**, 1077—1083.) — Die Tatsache, daß die Bestimmung der Schwefligen Säure mittels Jodlösung nur in stark verdünnter Lösung (0,03—0,04%), oder wenn man die Lösung der Schwefligen Säure zu der Jodlösung fließen läßt, genaue Werte gibt, ist von Bunsen durch eine Reaktion der Schwefligen Säure mit Jodwasserstoffsäure erklärt worden. Volhard (Ann. Chem. **242**, 93) gibt an, daß während der Titration eine Reaktion nach der Gleichung $3\text{SO}_2 + 2\text{H}_2\text{O} = \text{S} + \text{H}_2\text{SO}_4$ stattfindet. Verf. hat bereits früher festgestellt, daß diese letztere Reaktion jedenfalls sehr langsam vor sich geht: Ein Gemisch von Schwefliger Säure- und Jodwasserstoff-Lösungen wurde erst nach 4 bis 5 Tagen durch ausgeschiedenen Schwefel getrübt. Bei Titrierversuchen unter Benutzung geschlossener, mit Kohlensäure gefüllter Gefäße, wobei das Entweichen von Schwefliger Säure ausgeschlossen war, ergab sich, daß sehr genaue Bestimmungen erhalten werden konnten. Verf. schließt daher, daß die einzige Ursache für ungenaue Ergebnisse die leichte Oxydierbarkeit und Flüchtigkeit der Schwefligen Säure sind. *G. Sonntag.*

W. Herz: Gleichzeitige titrimetrische Bestimmung von Borsäure und starken Säuren. (Ztschr. anorg. Chem. 1902, **33**, 353—354.) — Verf. benutzt als Indikator für die Titration der starken Säure Nitrophenol. In der mit Nitrophenol versetzten farblosen Lösung der starken Säure und Borsäure wird zunächst durch Titration mit Natronlauge bis zur Gelbfärbung die starke Säure, dann nach Zusatz von Mannit und Phenolphthalein die Borsäure bestimmt. *G. Sonntag.*

W. Herz: Über die Löslichkeit von Borsäure in Säuren. (Zeitschr. anorg. Chem. 1903, **33**, 355—356 u. **34**, 205—206.) — Die Mitteilung in Dammers Handbuch der anorganischen Chemie, daß Borsäure in Salzsäure leichter löslich sei, als in Wasser, veranlaßte den Verf. zur Bestimmung der Löslichkeit der Borsäure in Säuren verschiedener Konzentration. Er fand, daß die Löslichkeit der Borsäure in Salzsäure, Schwefelsäure, Salpetersäure und Essigsäure übereinstimmend bei steigendem Säuregehalt kleiner wird. Bei Weinsäure war die Löslichkeit erhöht, doch ergaben die Bestimmungen nicht genaue Werte, da die Endpunkte der Titrationen wenig scharf zu erkennen waren. *G. Sonntag.*

Charles E. Cassal und Henry Gerrans: Neue Farbreaktionen mit Borsäure. (Chem. News 1903, **87**, 27.) — Beim Eindampfen von Borsäurelösungen

mit Kurkumin und Oxalsäure entsteht eine lebhaftere, von der bei der üblichen Kurkumareaktion eintretenden verschiedene Magentarot-Färbung, welche zehn bis elf Stunden beständig bleibt; auch ist die Reaktion empfindlicher. Der Farbstoff ist ohne Veränderung in Alkohol und Äther löslich, wird aber durch Wasser zerstört. Bei der Behandlung mit Alkali wird Blaufärbung erhalten, die ebenfalls von der bei der gewöhnlichen Kurkuma-Reaktion entstehenden verschieden ist. Für den Nachweis von Borsäure in Milch und anderen Nahrungsmitteln wird die Asche mit einigen Tropfen verdünnter Salzsäure, dann mit gesättigter Oxalsäurelösung und mit Kurkuminlösung versetzt, auf dem Wasserbade getrocknet und der Rückstand mit wenig Alkohol aufgenommen. Wenn sehr geringe Mengen von Borsäure vorhanden sind, muß die Substanz vor dem Trocknen und Veraschen mit Baryumhydroxyd alkalisch gemacht werden; kaustische Alkalien und Alkalisalze in großem Überschuß stören die Reaktion.

G. Sonntag.

Charles E. Cassal und Henry Gerrans: Ein kolorimetrisches Verfahren für die Bestimmung der Borsäure. (Chem. News 1903, 87, 27—28.) — Die Verff. benutzen das im vorstehenden Referat beschriebene Verfahren für eine kolorimetrische Bestimmung. Wegen der Flüchtigkeit der Borsäure in saurer Lösung sind besondere Vorsichtsmaßregeln bei der Bereitung der Aschenauszüge erforderlich: Von Milch werden 15 bis 20 g mit Barytwasser stark alkalisch gemacht und bei 105° eingetrocknet. Der Rückstand wird mit Salzsäure angesäuert und mit kleinen Mengen heißen Wassers ausgezogen, die Auszüge werden filtriert. Das Filter wird ebenfalls verbrannt, und die Asche ausgezogen. Die vereinigten Auszüge werden auf 100 ccm aufgefüllt. Dann werden 10 ccm mit 10 bis 15 g Sand gemischt und getrocknet. Der Rückstand wird mit Salzsäure angesäuert und mit 2 ccm gesättigter Oxalsäurelösung und 2 ccm alkoholischer Kurkuminlösung (1 g im Liter) gemischt. Die das Gemisch enthaltende Schale wird mit einem Trichter bedeckt und dessen Rohr mit einem Barytwasser enthaltenden Absorptionsapparat verbunden. Im Paraffinbade wird nun bei 105° Luft durchgesaugt, bis die Masse trocken ist. Dann wird sie mit 1 ccm Kurkuminlösung durchgemischt, getrocknet und mit Alkohol oder Methylalkohol ausgezogen. Die Flüssigkeit in dem Absorptionsapparat wird in die Schale gegeben, eingetrocknet und ebenso behandelt; der gewonnene Farbstoffauszug wird dem ersten zugefügt. Die gefärbte Lösung wird nun mit Alkohol soweit verdünnt, daß sie dieselbe Färbung zeigt, wie eine ähnlich bereitete Vergleichslösung von bekanntem Borsäuregehalt.

G. Sonntag.

A. Desmoulières: Erklärung der Einwirkung von Eisenchlorid auf Salicylsäure, Salicylsäuremethylester, Hydrosalicylsäure und einige andere Phenolverbindungen. (Ann. chim. analyt. 1903, 8, 85—87.) — Das von Schneegans und Gerock (Apoth.-Ztg. 1891/92) angegebene Verfahren zum Nachweis von Salicylsäure in Salicylsäuremethylester beruht auf dem Umstande, daß eine durch Eisenchlorid gefärbte Lösung des letzteren beim Ausschütteln mit Chloroform entfärbt wird, während bei Gegenwart einer Spur freier Salicylsäure die Färbung bestehen bleibt. Versuche zur Erklärung dieser Erscheinung ergaben, daß beim Schütteln einer mit Eisenchlorid gefärbten wässrigen Lösung von Salicylsäuremethylester mit Chloroform, Äther, Petroläther und Benzol der Ester vollständig in diese übergeht und das Eisenchlorid im wässrigen Teil zurückbleibt. Der Grund liegt in der Unbeständigkeit der gebildeten violetten Eisenverbindung und der viel größeren Löslichkeit des Methylesters in den genannten Lösungsmitteln, gegenüber dem Wasser. Das gleiche gilt von der Hydrosalicylsäure, während im Gegensatz hierzu die Eisenverbindung der Salicylsäure beständig ist und im Wasser gelöst bleibt. Die Reaktion kann zur Trennung des Salicylsäuremethylesters, der Hydrosalicylsäure und des Salicylaldehydes von Salicylsäure dienen.

C. A. Neufeld.

Manget und Marion: Reagens auf Aldehyde. (Ann. chim. analyt. 1903, 8, 107—108.) — Fügt man zur Lösung eines Aldehyds in Alkohol, Äther oder Wasser, Amidol oder Diamidophenol und schüttelt um, so zeigt sich in einigen Minuten eine gelbe Färbung; dieselbe wird noch deutlicher, wenn man warme Milch als Auflösungsmittel verwendet oder wenn man die Milch der Aldehydlösung zufügt. Es genügt dann, die Oberfläche der Flüssigkeit mit wenigen Krystallen Amidol zu bestreuen um die Gelbfärbung erscheinen zu sehen. Die Färbung wurde erhalten mit Acetaldehyd, Formaldehyd, Anisaldehyd, Benzaldehyd, Cuminaldehyd, Salicylaldehyd und Vanillin. Valeraldehyd und Glykose gaben die Reaktion nicht. Die Reaktion gestattet einen schnellen Nachweis der Aldehyde, wenn dieselben als Verunreinigungen organischer Körper, wie Äther, Handelsalkohole oder gewisser Arzneimittel auftreten.

A. Kirsten.

G. Lemme: Über eine Bestimmung des Formaldehyds in Lösungen. (Chem.-Ztg. 1903, 27, 896.) — Formaldehyd gibt mit einer neutralen Lösung von Natriumsulfit sofort die Bisulfitverbindung:

Das frei gewordene Natriumhydroxyd läßt sich titrimetrisch bestimmen. Zu 100 ccm einer Lösung von 250 g krystallisiertem Natriumsulfit in 750 g Wasser, die vorher durch einige Tropfen Natriumbisulfitlösung gegen Phenolphthalein neutralisiert worden ist, gibt man 5 ccm der zu prüfenden Formaldehydlösung. Die Flüssigkeit wird dann mit Normal-Schwefelsäure titriert. Der Farbumschlag erfolgt nicht ganz scharf, es können Differenzen von 0,1—0,2 ccm vorkommen, welche nicht sehr ins Gewicht fallen (0,1 ccm Normal-Säure entspricht 0,003 g Formaldehyd).

G. Sonntag.

Bernard H. Smith: Eine vergleichende Studie über Verfahren der Formaldehydbestimmung. (Journ. Amer. Chem. Soc. 1903, 25, 1028—1035.) — Verf. hat folgende Verfahren geprüft: 1. Verfahren von Blank und Finkenbeiner (*Z.* 1900, 3, 88 u. 583; 1902, 5, 124 u. 685). — Es ist brauchbar bei konzentrierten Lösungen. — 2. Legler's Methode (*Z.* 1902, 5, 123 u. 685). — Übereinstimmende Ergebnisse wurden bei Lösungen von weniger als 5% Formaldehydgehalt erzielt. — 3. Gewichtsanalytische Hexamethylentetramin-Methode: Eine abgewogene Menge Formaldehydlösung wird mit überschüssigem Ammoniak versetzt, nach mehreren Tagen wird die Lösung bei gelinder Wärme, zuletzt im Exsikkator, getrocknet. Das Gewicht des Hexamethylentetramins nimmt im Exsikkator beständig ab; das Verfahren ist praktisch wertlos. — 4. Jodometrische Methode (Zeitschr. analyt. Chem. 1900, 39, 60): Normalnatronlauge und verdünnte Formaldehydlösung werden mit $\frac{1}{5}$ N-Jodlösung eine Minute geschüttelt, dann wird die Flüssigkeit angesäuert und das überschüssige Jod mit $\frac{1}{10}$ N-Thiosulfatlösung zurücktitriert. — Das Verfahren ist brauchbar bei verdünnten Lösungen (vergl. *Z.* 1902, 5, 123). — 5. Cyankalium-Verfahren (Zeitschr. analyt. Chem. 1897, 36, 18): Die Formaldehydlösung wird mit Cyankaliumlösung im Überschuß versetzt und das nicht gebundene Cyankalium bestimmt, indem 10 ccm $\frac{1}{10}$ N-Silberlösung mit 6 Tropfen Salpetersäure (5%) und 10 ccm Kaliumcyanidlösung (3,1 g in 500 ccm) geschüttelt werden; dann wird filtriert und in einem aliquoten Teile des Filtrats das überschüssige Silbernitrat nach Volhard titriert. Andererseits werden 10 ccm Silberlösung nach dem Ansäuern mit 10 ccm Kaliumcyanidlösung, der eine bestimmte Menge der zu prüfenden Formaldehydlösung zugesetzt wurde, gemischt, dann filtriert und im Filtrat ebenfalls das überschüssige Silbernitrat bestimmt. Aus dem Unterschied zwischen beiden Werten ergibt sich die Menge des an Formaldehyd gebundenen Kaliumcyanids. Dieses Verfahren liefert die besten Ergebnisse bei der Bestimmung sehr kleiner Mengen Formaldehyd. — 6. Volumetrisches Anilinverfahren

(Pharm. Zeitg. 1895, 40, 611): Behandlung der Formaldehydlösung mit Anilinlösung und Bestimmung des überschüssigen Anilins durch Titration mit Säure. Das Verfahren ist unbrauchbar. — Zum Schluß macht Verf. auf die Abhandlung von Wallnitz (Deutsche Gerber-Ztg. 1903, No. 1; Zeitschr. angew. Chem. 1903, 326) aufmerksam, der Untersuchungen mit 7 verschiedenen Methoden angestellt hat und zu dem Ergebnis gelangt, daß das Wasserstoffsuperoxyd- und das jodometrische Verfahren den übrigen überlegen sind, wenn die Reagenzien frisch bereitet werden; daß bei der Salmiakmethode von Schiff (Z. 1903, 6, 1038), der Legler'schen und der Anilinmethode der Endpunkt der Reaktion nicht sicher erkannt werden kann, und daß das gewichtsanalytische Verfahren von Vanino (Z. 1902, 5, 686) praktisch unbrauchbar ist. Das Cyankaliumverfahren war nicht geprüft worden. G. Sonntag.

K. Farnsteiner, K. Lendrich, J. Zink und P. Buttenberg: Die Zusammensetzung einiger Konservierungsmittel. (4. Bericht des Hygienischen Instituts Hamburg 1900—1902, 18—19.) — Die Untersuchung verschiedener Konservierungsmittel für Fleisch u. s. w. hatte folgendes Ergebnis:

Bezeichnung des Präparates	Borsäure (H ₃ BO ₃)	Natrium- borat (Na ₂ B ₄ O ₇ + 10 H ₂ O)	Natrium- nitrat (Na NO ₃)	Kalium- nitrat (KNO ₃)	Chlor- natrium (Na Cl)	Chlorkalium (K Cl)	Saccha- rose
Australia-Salt {	8,25	—	—	22,12	52,62	—	14,82
Einfaches Konservsalz . .	—	8,25	—	57,67	34,32	—	—
Hydrin, Pökelsalz	—	6,08	—	62,37	30,14	—	—
Dreifaches Konservsalz . .	—	17,15	—	46,86	32,93	—	—
Nicht rötendes Konservsalz	55,94	44,50	—	—	—	—	—
Dauer-Konservsalz	—	45,85	—	—	1,06	51,76	—
	32,06	—	31,96	—	—	35,26	—
Peptin, Konservsalz ¹⁾ . .	Natrium- sulfat (Na ₂ SO ₄)	Natrium- sulfat (Na ₂ SO ₄)	Wasser				
	7,14	9,43	15,88	1,56	48,98	—	17,01
Hansa-Konservsalz	Benzo- säure	Benzo- säures Natron	Calcium- sulfat ²⁾			Calcium- karbonat	
	1,94	12,23	1,41	2,10	72,40	0,02	8,50

¹⁾ Nach der beigelegten Gebrauchsanweisung sollen von diesem „vollständig unschädlichen Mittel“ auf 5 kg Hackfleisch 25—30 g zugesetzt werden.

²⁾ Berechnet als wasserhaltiges Calciumsulfat (CaSO₄ + 2H₂O).

Als konservierendes Packmaterial für Fleisch- und Wurstwaren wurde unter dem Namen „Pafmehl“ ein bräunlich-graues feines Pulver in den Handel gebracht. Dieses fast geruch- und geschmacklose Mehl bestand aus Infusorienerde, in der sich keine Borsäure, Salicylsäure und kein Formalin nachweisen ließen. Vier Proben bestanden aus einem Gemisch von Salpeter mit Phosphorsaurem Natron, eine davon enthielt außerdem etwas Zucker. Zwei Proben Präservesalz als „Carniform B“ bezeichnet, erwiesen sich gleichfalls als Gemische von Salpeter und Phosphorsaurem Natron, welchem in einem Falle kleine Mengen Borsäure zugefügt waren. Eine Probe „Hamburger Präservesalz“ war Kochsalz, Salpeter und Zucker, während das Präservesalz „Protektor“ ein Gemisch von Kochsalz, Benzoessäure und Spuren Salpeter darstellte. C. Mai.

R. Racine: Über die Zusammensetzung einiger neuer Fleisch-konservierungsmittel. (Zeitschr. öffentl. Chem. 1903, 9, 163—164.) — Die

Zusammensetzung der vom Verf. untersuchten Präparate war die folgende: I. Pökelsalz bestand rund aus: 50 Teilen Natriumnitrat, 45 Teilen gepulverter Borsäure und 5 Teilen Salicylsäure. II. Präservesalz enthielt rund 70 Teile Kaliumnitrat, 15 Teile Natriumbikarbonat und 15 Teile Natriumchlorid. III. Ein anderes „Präservesalz“ erwies sich als technisch reine, gepulverte Borsäure. IV. Gruner's Pökelsalz war ein Gemisch von Kaliumnitrat, Natriumchlorid und Zucker. V. Erhaltungspulver enthielt vorwiegend Borsäure neben Natriumchlorid und etwas Kaliumnitrat. VI. Pökelsalz (rötend) war ähnlich wie IV ein Gemisch von Kalisalpeter, Kochsalz und Zucker. VII. Macilin für Wurstwaren als Gewürz und Bindemittel angepriesen, war ein Gemisch von Weizen- und Kartoffelmehl, welches durch einen gelben Azofarbstoff intensiv gelb gefärbt und mit Macisöl getränkt war. VIII. Pökelsalz, „den Anforderungen des § 21 des Gesetzes vom 3. Juni 1900 unter Garantie entsprechend“ bestand rund aus 50 Teilen Kaliumnitrat, 20 Teilen Natriumchlorid, 20 Teilen gepulverter Borsäure und 10 Teilen Zucker. IX. Ein anderes Pökelsalz war ähnlich wie IV und VI aus Kalisalpeter, Kochsalz und Zucker gemischt. X. Fleischkonservierungs- und Rötungsmittel „Viandol“, bildete eine opalisierende Flüssigkeit, die sich an der Luft trübte, von süßlich zusammenziehendem Geschmack und nach Essigsäure riechend; Spezifisches Gewicht 1,0729; der Preis für die Flasche von etwa 800 ccm Inhalt betrug 4 Mark. Das Mittel erwies sich als eine Lösung von basisch-essigsaurer Tonerde, die mit etwas Zucker versetzt war. *Max Müller.*

Berichte über die Tätigkeit von Untersuchungsämtern etc.

Jahresbericht des Kantonschemikers von St. Gallen über das Jahr 1902. Sonderabdruck aus dem Jahresbericht über die Verwaltung des Medizinalwesens und der öffentliche Gesundheitspflege des Kantons St. Gallen 1902. — Die Zahl der untersuchten Proben betrug 4432, von denen 1194 von Privaten, die übrigen von Behörden eingeliefert und wovon 19,75 % zu beanstanden waren. Es wurden u. a. untersucht: 1920 Milch (63 beanstandet), 355 Wasser (151), 26 Bier (9), 54 Obstmost (33), 774 Wein (168), 37 Limonaden (13), 39 Branntweine (24), 14 Mehl, 8 Teigwaren, 211 Wurst (72), 9 Fleisch (2), 165 Butter (25), 12 Kunstbutter (4), 45 Speisefette (5), 122 Speiseöle (22), 30 Gewürze (5), 18 Honig (7), 1 Thee, 181 Hausgeräte (26), 241 technische und Verbrauchsartikel (74). — Butter: 3 Proben waren gefälscht oder falsch deklariert, 13 ranzig oder sauer und 9 zu wenig ausgeknetet. — Speisefette: Als Surrogate für Butter und billige Speisefette wurden vielfach Waren von schlechter Beschaffenheit angetroffen; ein aus Talg und Kottonöl bestehendes Kochfett war unbrauchbar. — Fleischwaren: Deutsche Mettwurst war künstlich gefärbt; amerikanisches Schweinefleisch und italienische Salami enthielten Borsäure. — Gewürze: Ein gemahlener Safran bestand aus Saflor mit 20,1 % Eisenoxyd. — Wein: Zur Auffärbung mißfarbiger Weine brachte eine Firma in Mannheim einen gelben Teerfarbstoff unter der Bezeichnung „garantiert gesundheitszulässiger Zucker-Coleur-Ersatz“ in den Handel. — Obstmost: Eine Probe war mit viel Rohrzucker versetzt. — Bier: Bierextrakt von Hildebrand in Hannover-Kleefeld war gewöhnliche Biercouleur. *C. Mai.*

Tätigkeit des städtischen chemisch-bakteriologischen Laboratoriums in Lodz. (Ruß.-Polen) im Jahre 1903. Von Dr. S. Serkowski. Das Laboratorium erledigte im Jahre 1903 im Auftrage der sanitären und polizeilichen Behörden 2439 Untersuchungen und zwar 1124 chemische und 1315 bakteriologische. Es wurden u. a. untersucht: 31 Milch (23 beanstandet), 19 Butter (10), 2 Bier (2), 17 Wein (7), 8 Met (2), 184 Sodawasser (183), 105 Fruchtsäfte (57), 20 Kwas (16), 61 Wasser (7), 102 Zuckerwaren (96), 10 Marmeladen (7), 17 Kakaopräparate (14), 7 Mehl (2), 3 Fleisch (3), 6 Thee, 210 Teigwaren (193) u. s. w. — Butter: 3 Proben enthielten Margarine, 3 Kartoffelbrei, 4 zu viel Wasser und Schmutz. — Bier: 1 Probe enthielt Saccharin und 1 Teerfarbe. — Wein: 7 Proben enthielten Salicylsäure. — Sodawasser war in vielen Fällen blei- oder kupferhaltig. Flüssigkeit zur Bonbonbereitung war mit Salicylsäure versetzte Seifenlösung. — Essig enthielt Mineralsäuren. — Teigwaren: Von allen untersuchten Proben Makkaroni und Nudeln waren nur 17 unverfälscht, aber ohne Eizusatz; 169 Proben waren mit Naphtolfarben, 5 mit schädlichen Anilinfarben und 14 mit künstlichem Safran gefärbt. — Christbaumkerzen: 2 grüne Proben enthielten Arsen. *C. Mai.*