Beobachtungen des neuen Cometen:

auf der Wiener Sternwarte, von Herrn Director von Littrow.

April 10 12^h26^m m. W. Zt. $\alpha \simeq 11^{\text{h}}5^{\text{m}}4^{\text{s}}$ $\delta \simeq +77^{\circ}9'7''$

abgeleitet aus einer Einstellung ins Centrum des Feldes.

Auf der Berliner Sternwarte, von den Herren Dr. Förster und Dr. Bruhns.

April 14 13^h38^m56^s m. B. Zt. $\alpha \simeq 9^{\text{h}}7^{\text{m}}42^{\text{s}}37$ $\delta \simeq +74^{\circ}53'19''7$

Der Comet ward verglichen mit № 1507 des Catalogs von Fedorenko.

Auf der Altonaer Sternwarte am Repsold'schen Aequatoreal, vom Herausgeber.

April 18 11^h3^m12^s8 m. Alt. Zt. $\alpha \simeq 7^{\text{h}}53^{\text{m}}12^{\text{s}}44$ $\delta \simeq +69^{\circ}50'7''2$ Der Comet gleicht einem Nebel von 4' Durchm., mit schwacher Verdichtung in der Mitte und war bei Mondschein ein etwas schwieriges Object. P.

Elemente und Ephemeride des Cometen I. 1859, von Herrn Dr. Pape.

Aus den vorstehenden Beobachtungen, Wien, April 10, Berlin, April 14, und Altona, April 18, habe ich nachfolgende Elemente für den neuen Cometen abgeleitet:

 $T = \text{Mai } 29, 1830 \text{ mittl. Berl. Zt.}$

$$\left. \begin{array}{l} \pi = 77^{\circ}38'8'' \\ \Omega = 359^{\circ}16'1'' \\ i = 87^{\circ}20'51'' \end{array} \right\} \text{sch. Aeq. Ap. 14}$$
 $\log q = 9,314042$

Retr.

Darstellung der mittleren Beob. R--B $\Delta \lambda \cos \beta +45''$
 $\Delta \beta -63$

Ich habe mich hiermit begnügt, indem die Wiener Position doch nur als beiläufiger Ort gelten kann. Die Beobachtung Padua, April 7, habe ich nicht hinzugezogen, indem eine der beiden Positionen fehlerhaft zu sein scheint, und es bislang ungewiss ist, welche von beiden.

Die Elemente haben mit denen früherer Cometen keine Aehnlichkeit. Ich habe aus ihnen die nachfolgenden Oerter abgeleitet, welche das Aufsuchen erleichtern werden und zugleich eine Uebersicht der Sichtbarkeit des Cometen bis Ende Juni geben.

Ephemeride für 12^h Berlin:

	$\alpha \simeq$	$\delta \simeq$	$\log r$	$\log \Delta$
April 18	118° 15' 1	+69° 47' 6	0,0538	9,8661
19	114 52,8	68 12,7		
20	111 56,2	66 33,7		
21	109 21,3	64 51,3		
22	107 4,6	63 6,1	0,0201	9,8466

Altona, 1859 April 20.

	$\alpha \simeq$	$\delta \simeq$	$\log r$	$\log \Delta$
April 23	105° 3' 5	+61° 18' 1		
24	103 15,9	59 28,3		
25	101 40,2	57 37,5		
26	100 13,8	55 45,8	9,9826	9,8466
27	98 55,1	53 53,4		
28	97 43,0	52 0,6		
29	96 36,3	50 8,0		
30	95 34,8	48 15,8	9,9401	9,8530
Mai 1	94 37,9	46 24,2		
2	93 44,0	44 33,2		
3	92 52,6	42 43,1		
4	92 3,2	40 54,3	9,8912	9,8653
5	91 15,7	39 6,7		
6	90 30,0	37 20,4		
7	89 45,8	35 35,4		
8	89 2,4	33 51,9	9,8337	9,8824
9	88 18,9	32 9,8		
10	87 35,2	30 29,6		
11	86 51,2	28 51,1		
12	86 7,0	27 14,5	9,7645	9,9036
13	85 21,7	25 39,9		
14	84 34,9	24 7,4		
15	83 46,7	22 37,1		
16	82 56,6	21 9,2	9,6785	9,9281
Juni 1	60 20,8	13 34,4	9,3811	0,0444
30	50 19,3	+51 54,4	9,9789	0,1102

Die Zunahme der Lichtstärke zeigen die folgenden Zahlen:

April 18 = 1, April 30 = 1,8, Mai 16 = 4,2,

Juni 1 = 9,7, Juni 30 = 0,5.

C. F. Pape.