Über die Bahn des Trojaners 884 Priamus. Von A. Klose.

§ 1. Einer Anregung von Herrn Prof. *Wilkens* folgend, unternahm ich die folgende Untersuchung.

884 Priamus [1917 CQ], zur Jupitergruppe gehörig, wurde 1917 Sept. 22 von Prof. *Wolf* in Heidelberg entdeckt. Prof. *Berberich* berechnete aus den Königstuhler Beobachtungen 1917 Sept. 24, Nov. 8 und 1918 Jan. 3 das folgende Elementensystem:

Epoche und Oskulation 1917 Sept. 24.5 m. Z. Greenw.

$$\begin{aligned} M &= 83^\circ 18' 55''.3 \\ \omega &= 329 \ 32 \ 18.4 \\ \Omega &= 300 \ 48 \ 28.1 \\ (I) \quad i &= 8 \ 51 \ 27.9 \\ \varphi &= 6 \ 46 \ 53.4 \\ \mu &= 294''.427 \\ \log a &= 0.720686 \end{aligned} \quad 1925.0$$

Es liegen bisher 21 Beobachtungen vor, 19 aus der ersten und 2 aus der zweiten Opposition. Die untenstehende Tabelle gibt die Differenzen gegen dieses Elementensystem wieder, im Sinne Beobachtung — Rechnung. Die Störungen durch Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun sind dabei ihrem vollen Betrage nach in Rechnung gestellt. Die in AN 208 Nr. 4969 angeführte Beobachtung Königstuhl 1918 Nov. 23 fehlt, da das beobachtete Objekt wegen der starken Differenzen gegen die Ephemeride ($\Delta\alpha = +0^h5$, $\Delta\delta = -8^\circ$) unmöglich mit Priamus identisch sein kann¹⁾. Die Beobachtungen Nr. 20 und 21 übermittelte mir in liebenswürdiger Weise Herr Prof. *Wolf* in Heidelberg.

Nr.	M. Z. Gr. — Ab.-Zt.	Sternwarte	$\Delta\alpha$	$\Delta\delta$
1	1917 Sept. 22.4042	Königstuhl	— 0.47	— 5.8
2	» 23.4337	»	— 0.29	+ 2.4
3	» 24.4331	»	+ 0.22	+ 5.2
4	» 25.5194	»	— 0.21	— 1.1
5	» 26.5302	»	— 0.29	0.0
6	Okt. 6.3343	Wien	+ 0.09	— 0.9
7	» 11.3912	»	— 0.22	+ 1.4
8	» 11.4710	»	— 0.06	— 0.8
9	» 13.3867	»	— 0.37	+ 2.3
10	» 16.3690	»	+ 0.22	+ 3.0
11	Nov. 8.3213	Königstuhl	0.00	— 0.2
12	Dez. 4.2115	»	+ 0.05	+ 2.6
13	» 4.3019	Bergedorf	+ 0.13	+ 1.6
14	» 4.3150	Königstuhl	+ 0.33	— 0.1
15	1918 Jan. 2.2395	Bergedorf	+ 0.49	— 4.6
16	» 2.3172	»	+ 0.40	— 3.4
17	» 3.2314	Königstuhl	— 0.08	— 0.1
18	» 3.2654	»	+ 0.05	+ 0.4
19	» 14.2383	Bergedorf	— 0.02	+ 0.9
20	Okt. 5.3657	Königstuhl	— 12.48	— 73.6
21	» 30.3799	»	— 13.49	— 78.5

Trotzdem das Beobachtungsmaterial, besonders aus der 2. Opposition, recht spärlich ist, schien doch schon jetzt der Versuch einer Verbesserung der vorläufigen Bahn angezeigt. Wie *Andersen* in seinen Untersuchungen der Bahn des Nestor²⁾, der bekanntlich auch zur Trojanergruppe gehört, nachgewiesen hat, bedarf bei diesen Planeten die aus der ersten Opposition

bestimmte Ellipse noch starker Korrekturen, ehe sie den Charakter einer definitiven Bahn annimmt. Zu demselben Resultat führt übrigens auch ein Vergleich der geringen mittleren Bewegung mit der verhältnismäßig großen Bahnachse, woraus mit Rücksicht auf die Kleinheit des jeder ersten Bahnbestimmung zugrunde liegenden Bahnstückes die Möglichkeit ziemlich stark voneinander abweichender oskulierender Ellipsen folgt.

Bei der Bildung der Normalörter wurden alle 21 Beobachtungen in gleicher Weise berücksichtigt und dabei den Normalörtern das Gewicht erteilt, das der Anzahl der zusammengefaßten Beobachtungen entsprach.

Nr.	M. Z. Greenw. 1917-18	(I)		(II)		Gew.
		$\Delta\alpha \cos \delta$	$\Delta\delta$	$\Delta\alpha \cos \delta$	$\Delta\delta$	
I	Sept. 24.5	— 3.05	+ 0.14	+ 6.67	+ 1.91	5
II	Okt. 10.5	— 1.00	+ 1.00	0.89	— 1.92	5
III	Nov. 7.5	0.00	— 0.20	— 3.47	— 3.73	1
IV	Dez. 5.5	+ 2.52	+ 1.37	+ 1.16	— 4.07	3
V	Jan. 6.5	+ 2.48	— 1.36	+ 10.72	+ 2.22	5
VI	Okt. 5.5	— 169.49	— 73.60	— 5.94	+ 0.81	1
VII	29.5	— 184.37	— 78.50	+ 9.75	— 0.76	1

Die Spalten (I) geben die Differenzen gegen das ursprüngliche System, die Spalten (II) die Differenzen gegen die durch die Ausgleichung bestimmte Bahn, deren Elemente hier folgen:

Epoche und Oskulation 1917 Sept. 24.5 m. Z. Greenw.

$$\begin{aligned} M &= 82^\circ 22' 46''.5 & dM &= -56' \ 8''.8 \\ \omega &= 329 \ 51 \ 18.5 & d\omega &= +19 \ 0.1 \\ \Omega &= 300 \ 49 \ 27.3 & d\Omega &= +0 \ 59.2 \\ (II) \quad i &= 8 \ 51 \ 24.4 & di &= -0 \ 3.5 \\ \varphi &= 7 \ 5 \ 52.7 & d\varphi &= +18 \ 59.3 \\ \mu &= 294''.427 & d\mu &= 0''.000 \\ \log a &= 0.720686 \end{aligned} \quad \begin{matrix} (I) \\ (II) \end{matrix}$$

Der Gewinn ist nicht sehr bedeutend, besonders sind die Normalörter der ersten Opposition im allgemeinen weniger gut dargestellt als in System (I). Doch war dies bei der Größe der an die Elemente anzubringenden Korrekturen nicht anders zu erwarten. Durch eine erneute Ausgleichung würde sicher eine weit größere Annäherung als bisher erreicht werden, da erst jetzt der differentielle Charakter der Korrekturen, der die Grundvoraussetzung einer jeden Ausgleichungsmethode bildet, zur Tatsache würde. Der Erfolg würde jedoch kaum dem Arbeitsaufwand entsprechen; erst durch neue Beobachtungen wird eine weitergehende Verbesserung zu erzielen sein.

§ 2. Zur Berechnung einer Ephemeride für die 3. Opposition wurde, unter Berücksichtigung der Störungen, auf eine neue Oskulationsepoche übergegangen und die beiden folgenden Elementensysteme bestimmt:

Epoche und Oskulation 1918 Okt. 29.5 m. Z. Greenw.

$$\begin{aligned} M &= 115^\circ 11' 58''.52 & 115^\circ 33' 18''.78 \\ \omega &= 329 \ 45 \ 48.94 & 329 \ 24 \ 41.89 \\ \Omega &= 300 \ 49 \ 27.14 & 300 \ 49 \ 27.14 \\ (III) \quad i &= 8 \ 51 \ 23.76 & (IIIa) \ 8 \ 51 \ 23.76 \\ \varphi &= 7 \ 5 \ 58.08 & 7 \ 7 \ 33.74 \\ \mu &= 294''.5850 & 295''.0965 \\ \log a &= 0.7205306 & 0.7201665 \end{aligned}$$

¹⁾ AN 208.167 ist schon angegeben, daß die betreffende Beobachtung nicht zu 884 Priamus gehört. *Red.* ²⁾ AN 206, Nr. 4923.

Das System (IIIa) ist nach der von Herrn Prof. *Wilkins* stammenden Methode¹⁾ berechnet, es bezieht sich auf eine Brennpunktsmasse Sonne + Jupiter, wodurch, wie Verfasser früher²⁾ gezeigt hat, der weitaus größte Teil der Jupiterstörungen bereits erfaßt wird. Die Bewegungsgleichungen erhalten dann nach Formel (14) der erstgenannten Arbeit die Form:

$$d^2x/dt^2 = -k^2(1+m')x/r^3 + X$$

$$X = k^2 m' \left\{ [1 - (1 + \zeta/r^2)^{-3/2}] [(x-x')/r^3] + -3\varrho(x/r^3)[1 + \varrho + 1/3\varrho^2] \right\}$$

wo x, y, z, r die Koordinaten des Trojaners bedeuten, x', y', z', r', m' Jupiter zugehören und ζ und ϱ aus den Gleichungen $A^2 = r'^2 + \zeta$ und $r = r'(1 + \varrho)$

bestimmt sind. In erster Näherung erhält man also die Ellipsengleichung

$$d^2x_0/dt^2 = -k^2(1+m')x_0/r_0^3$$

deren Elemente unter (IIIa) angeführt sind.

Bezeichnet schließlich $\xi = x - x_0$ die an diese Ellipse anzubringenden Störungen, so ergibt sich die Differentialgleichung: $d^2\xi/dt^2 = k^2(1+m')[x_0/r_0^3 - x/r^3] + X$.

Die Komponente X ist mit Hilfe der in AN 205 Nr. 4906 gegebenen Tafel sehr rasch zu finden, während sich das erste Glied der Gleichung noch in die bei *Encke* übliche Form:

$$X' = [k^2(1+m')/r_0^3](x \cdot f \cdot q - \xi)$$

bringen läßt, die sich nur durch den Faktor $(1+m')$ von dem aus der *Enckeschen* Störungstheorie bekannten Term unterscheidet.

Berücksichtigt man noch die Störungen durch Saturn, so ergibt sich die folgende Ephemeride:

Oppositionsephemeride von 884 Priamus. 12^h m. Z. Greenwich.

1919	α vera	Differenz	δ vera	Differenz	log A	Ab.-Zt.
Nov. 1	4 ^h 19 ^m 7 ^s .00	— 1 ^m 54 ^s .12	+ 30° 22' 32".7	— 2' 47".8	0.693351	41 ^m 0 ^s
5	4 17 12.88	2 1.24	30 19 44.9	3 38.6	0.690976	40 47
9	4 15 11.64	2 7.20	30 16 6.3	4 29.5	0.688982	40 36
13	4 13 4.44	2 11.77	30 11 36.8	5 19.2	0.687390	40 27
17	4 10 52.67	2 14.88	30 6 17.6	6 7.4	0.686217	40 20
21	4 8 37.79	2 16.40	30 0 10.2	6 52.7	0.685482	40 16
25	4 6 21.39	2 16.31	29 53 17.5	7 34.5	0.685195	40 15
29	4 4 5.08	2 14.64	29 45 43.0	8 11.9	0.685362	40 16
Dez. 3	4 1 50.44	2 11.48	29 37 31.1	8 43.9	0.685980	40 19
7	3 59 38.96	2 6.91	29 28 47.2	9 10.4	0.687044	40 25
11	3 57 32.05	2 1.05	29 19 36.8	9 31.1	0.688544	40 33
15	3 55 31.00	1 53.88	29 10 5.7	9 45.5	0.690467	40 44
19	3 53 37.12	1 45.48	29 0 20.2	9 53.3	0.692799	40 57
23	3 51 51.64	1 36.01	28 50 26.9	9 54.4	0.695517	41 13
27	3 50 15.63	— 1 25.63	28 40 32.5	— 9 49.0	0.698597	41 30
31	3 48 50.00		+ 28 30 43.5		0.702009	41 50

Opposition in RA. 1919 Nov. 26. Größe = 15^m0.

Sternwarte Breslau, 1919 Sept. 2.

A. Klose.

¹⁾ AN 205 Nr. 4906. *A. Wilkins*, Methoden zur Ermittlung der Koordinatenstörungen der Planeten der Jupitergruppe durch Jupiter.

²⁾ AN 207 Nr. 4960. *A. Klose*. Über die Störungen des Trojaners [1917 CQ].

Elemente des Kopffschen Kometen 1919a.

Aus den Beobachtungen 1919 Juli 31, Aug. 20 Königstuhl und Sept. 16 Wien habe ich die folgenden Elemente abgeleitet:

$$\begin{aligned} M &= 12^\circ 1' 8".7 & \mu &= 538".904 \\ \omega &= 19 43 51.0 & \log a &= 0.545664 \\ \Omega &= 263 48 51.4 & T &= 1919 \text{ Juni } 28.210 \text{ Gr.} \\ i &= 8 41 30.1 & U &= 6^\circ 58' 41". \\ \varphi &= 30 56 40.6 \end{aligned}$$

Heliozentrische Äquatorialkoordinaten 1919.0.

$$\begin{aligned} x &= [9.995043] \cdot r \cdot \sin(\nu + 13^\circ 28' 25".7) \\ y &= [9.966436] \cdot r \cdot \sin(\nu + 279 54 42.4) \\ z &= [9.609774] \cdot r \cdot \sin(\nu + 303 24 15.6). \end{aligned}$$

Die Elemente weichen verhältnismäßig wenig von meinen aus der Erscheinung 1906 IV abgeleiteten Elementen (AN 172.303) ab, die Störungen sind in der Zwischenzeit gering gewesen. Eine Verbindung beider Erscheinungen ist nicht versucht. Die mittlere Umlaufzeit zwischen den Perihelien 1906 und 1919 ergibt sich zu 6^a5766. Eine mit den neuen Elementen gerechnete Ephemeride, die für die diesjährige Erscheinung ausreichen dürfte, wird im Beob.-Zirk. erscheinen.

Kiel, Bureau der Astron. Nachrichten, 1919 Oktober 5.

M. Ebell.

Berichtigung zu Nr. 5006 Bd. 209 p. 216 letzte Zeile statt 0.34120 lies 0.34135. *Karin Schults.*

Inhalt zu Nr. 5016. *K. Lundmark*. Die Stellung der kugelförmigen Sternhaufen und Spiralnebel zu unserem Sternsystem. 369. — *K. Graff*. Neuer Veränderlicher 36.1919 Ophiuchi. 379. — *A. Klose*. Über die Bahn des Trojaners 884 Priamus. 381. — *M. Ebell*. Elemente des Kopffschen Kometen 1919a. 383. — Berichtigung. 383.