Die mittleren Oerter geben die Differenzen (B—R):

I. März 17: $d\lambda = +0''.8$ $d\beta = +0''.9$

II. März 25: $d\lambda = -1.4$ $d\beta = -0.9$.

Eine nachträglich verglichene Hamburger Beobachtung vom 3. April giebt:

$d\lambda = -1''.1$ $d\beta = +3''.2$.

Heliocentrische Aequatorealcoordinaten:

$x = [9.9229637] r. \sin(\varphi + 349^\circ 1' 51''.82)$

$y = [9.9997808] r. \sin(\varphi + 257^\circ 50' 34''.28)$

$z = [9.7383217] r. \sin(\varphi + 345^\circ 3' 30''.33)$

Ephemeride für 12^h M. Z. Berlin.

1892	α app.	δ app.	$\log r$	$\log A$	H
Mai 31	23 ^h 52 ^m 24 ^s	+37° 16' 2"	0.1363	0.1775	0.40
Juni 1	54 36	37 39.9			
2	56 46	38 3.2	0.1429	0.1821	0.38
3	23 58 54	38 26.0			
4	0 1 1	38 48.4			
5	3 6	39 10.4			
6	5 10	39 32.0	0.1560	0.1908	0.34
7	7 12	39 53.2			
8	9 11	40 14.0			
9	11 9	40 34.5			
10	13 5	40 54.5	0.1691	0.1989	0.31
11	14 59	41 14.2			
12	16 51	41 33.5			
13	18 41	41 52.5			
14	20 30	42 11.1	0.1820	0.2064	0.28
15	0 22 17	+42 29.4			

1892	α app.	δ app.	$\log r$	$\log A$	H
Juni 15	0 ^h 22 ^m 17 ^s	+42° 29' 4"			
16	24 1	42 47.4			
17	25 44	43 5.1			
18	27 24	43 22.5	0.1948	0.2133	0.26
19	29 2	43 39.6			
20	30 39	43 56.4			
21	32 14	44 12.8			
22	33 47	44 29.0	0.2073	0.2196	0.24
23	35 18	44 44.9			
24	36 47	45 0.5			
25	38 13	45 15.9			
26	39 37	45 31.0	0.2196	0.2253	0.22
27	40 59	45 45.8			
28	42 19	46 0.4			
29	43 37	46 14.7			
30	0 44 52	+46 18.8	0.2317	0.2304	0.20

Einheit von H ist die Helligkeit zur Zeit der Entdeckung des Cometen.

Berlin, Kgl. Recheninstitut, 1892 April 13.

A. Berberich.

Aus einem Schreiben von Herrn Prof. Wolf in Zürich

betr. Nr. 79 seiner Astronomischen Mittheilungen.

Die soeben in der Vierteljahrschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich erschienene Nr. 79 meiner »Astronomischen Mittheilungen« enthält ausser der Bestimmung einer Variationsformel für Tiflis, der Fixirung des letzten Sonnenflecken-Minimums auf

1889.6

und einer Fortsetzung des Sammlungs-Verzeichnisses der Züricher Sternwarte, eine längere Reihe von Auszügen aus

Zürich 1892 März 20.

Briefen von *Emile Gautier* und *Urbain Leverrier*, welche über das Verhältniss dieser beiden Männer, die Geschichte der Entdeckung Neptuns, und den oft verkannten Charakter von Leverrier viele wichtige Aufschlüsse geben und daher ein allgemeines Interesse haben dürften.

Für die Freunde meines neuen Handbuches füge ich bei, dass der dritte Halbband desselben demnächst erscheinen wird.

Rud. Wolf.

Aufforderung betr. Beobachtungen des Cometen 1890 II.

Herr Cand. *E. Strömgren* in Lund beabsichtigt die Bahn dieses Cometen zu berechnen und bittet um Mittheilung etwa noch nicht publicirter Beobachtungen.

Lund 1892 März 22.

Folke Engström.

Inhalt:

Zu Nr. 3088. A. Berberich. Die Bahnneigungen der kleinen Planeten. 265. — R. Luther. Kreismikrometer-Beobachtungen von kleinen Planeten am Siebenfüsser zu Düsseldorf. 267. — N. von Konkoly. Versuch einer vorläufigen geographischen Längenbestimmung. 271. — K. Bohlin. Elemente des Planeten (315) Constantia. 273. — A. Berberich. Elemente und Ephemeriden der Planeten (324) und (326). 275. — A. Berberich. Ephemeriden der Planeten (325) und (329). 275. — A. Berberich. Ephemeride des Planeten (304) Olga. 277. — E. Millosevich. Orbita ellittica del pianetino (306) Unitas. 277. — D. Klumpke. Beobachtungen des Planeten (325) (Wolf März 4). 277. — A. Berberich. Elemente und Ephemeride des Cometen 1892... (Swift März 6). 277. — Aus einem Schreiben von Herrn Prof. Wolf in Zürich. 279. — Aufforderung betr. Beobachtungen des Cometen 1890 II. 279.