plan des trois corps auront leurs intersections communes dans un même point.

Ce point sera le centre de gravité des trois masses, si chaque masse est augmentée proportionnellement au cube de la distance des deux autres.

On peut étendre ce théorème à toutes les lois possibles d'attraction, en introduisant une modification convenable dans la seconde partie de l'énoncé. En effet, soient A_1, A_2, A_3 des forces accélératrices quelconques rapportées à l'unité de masse, qui expriment l'action mutuelle des corps $m_2, m_3, m_1, m_3, m_1, m_2$ respectivement. Les équations du mouvement d'un des corps, par exemple de m_1 , seront:

$$\begin{aligned}\frac{d^2 x_1}{dt^2} &= m_2 \frac{A_3}{a_3} (x_2 - x_1) + m_3 \frac{A_2}{a_2} (x_3 - x_1), \\ \frac{d^2 y_1}{dt^2} &= m_2 \frac{A_3}{a_3} (y_2 - y_1) + m_3 \frac{A_2}{a_2} (y_3 - y_1), \\ \frac{d^2 z_1}{dt^2} &= m_2 \frac{A_3}{a_3} (z_2 - z_1) + m_3 \frac{A_2}{a_2} (z_3 - z_1).\end{aligned}$$

En posant:

$$\begin{aligned}m_1 \frac{a_1}{A_1} + m_2 \frac{a_2}{A_2} + m_3 \frac{a_3}{A_3} &= M, \\ m_2 \frac{a_1}{A_1} x_1 + m_2 \frac{a_2}{A_2} x_2 + m_3 \frac{a_3}{A_3} x_3 &= M X, \\ m_1 \frac{a_1}{A_1} y_1 + m_2 \frac{a_2}{A_2} y_2 + m_3 \frac{a_3}{A_3} y_3 &= M Y, \\ m_1 \frac{a_1}{A_1} z_1 + m_2 \frac{a_2}{A_2} z_2 + m_3 \frac{a_3}{A_3} z_3 &= M Z,\end{aligned}$$

ces équations deviennent:

$$\begin{aligned}\frac{d^2 x_1}{dt^2} &= \frac{M}{a_2 a_3} A_2 A_3 (X - x_1), \\ \frac{d^2 y_1}{dt^2} &= \frac{M}{a_2 a_3} A_2 A_3 (Y - y_1), \\ \frac{d^2 z_1}{dt^2} &= \frac{M}{a_2 a_3} A_2 A_3 (Z - z_1),\end{aligned}$$

et l'on arrive, pour les deux autres corps, à des expressions tout-à-fait symétriques.

On peut arriver à ces conclusions au moyen d'une réflexion très-simple, qu'on peut faire, en général, pour un nombre quelconque n de corps. Supposons qu'on arrête soudainement le mouvement de ces corps, et qu'on les relie au moyen de verges inflexibles et inextensibles. On aura ainsi un système invariable, qui restera en équilibre sous l'action des attractions réciproques des différents corps. Donc si l'on considère les n résultantes des attractions qui agissent sur les n corps, ces résultantes seront en équilibre entre elles, et elles devront satisfaire aux conditions qui ont lieu pour un système de n forces en équilibre.

On conclut de là, que pour le cas de trois corps, les résultantes doivent être contenues dans un même plan, et passer par un même point. Car trois forces ne sauraient être en équilibre, si ces conditions n'ont lieu.

De même on peut dire, d'après un théorème démontré par Möbius (Statique, §§ 98, 99) que pour le cas de quatre corps les quatre résultantes agissent suivant quatre génératrices d'un même hyperboloïde à une nappe, et que ces génératrices appartiennent au même système. On conclut aisément de là, que le plan osculateur d'une quelconque des quatre trajectoires coupe les résultantes appliquées aux trois autres corps suivant trois points en ligne droite.

Ensuite, on peut dire, que pour cinq corps les résultantes agissent suivant cinq droites telles, qu'il soit possible d'en trouver deux autres qui les rencontrent toutes cinq à la fois.

Et pour six corps les droites qui contiennent les résultantes auront entre elles cette relation de position, que M. Sylvester (Comptes Rendus, vol. LII 741) appelle involution dans l'espace.

En général, les résultantes, quelque soit leur nombre, doivent satisfaire aux six équations générales d'équilibre des systèmes invariables. Entre ces équations trois expriment que la somme des composantes des forces suivant trois directions est nulle. Les autres expriment que la somme des moments par rapport à trois axes est nulle. Des trois premières dérive le théorème de la conservation du mouvement du centre de gravité; des trois autres le théorème de la conservation des aires.

J. V. Schiaparelli.

Aus einem Schreiben des Herrn Prof., Dr. Klinkerfues, Directors der Sternwarte in Göttingen, an den Herausgeber.

Die erste Abtheilung meines Fixstern-Catalogs ist jetzt druckfertig. Sie enthält ca. 4500 Oerter, auf 1860 reducirt; eine zweite und dritte Abtheilung von nahe derselben Stärke,

welche ich im nächsten Jahre zu expediren hoffen darf, wird die bis jetzt von mir angestellten Beobachtungen für diesen Zweck erledigen. Bei den Reductionen habe ich einige Ab-

kürzungen gefunden, in ihrer Gesamtheit bedeutend genug, die Arbeit von jetzt an auf weniger als die Hälfte von der, die sie mir früher ausmachte, zu bringen. Dabei spielt folgende Transformation der bekannten Reductionsformeln für Herleitung des scheinbaren Ortes aus dem mittleren eine Rolle. In

$$\Delta \alpha = f + g \sin(G + \alpha) \operatorname{tg} \delta + h \sin(H + \alpha) \sec \delta,$$

$$\Delta \delta = i \cos \delta + g \cos(G + \alpha) + h \cos(H + \alpha) \sin \delta$$

setze man:

$$h \sin(H - G) = k \sin(K - G) = l \cos(L + G),$$

$$g \sin(G - H) = k \sin(K - H) = -l \cos(L + H),$$

so wird, wenn p den Polar-Abstand bezeichnet:

$$\Delta \alpha = f + \frac{1}{2} k \sin(\alpha + K) \cotg \frac{p}{2} + \frac{1}{2} l \cos(\alpha - L) \operatorname{tg} \frac{p}{2},$$

$$\sec \delta \cdot \Delta \delta = i + \frac{1}{2} k \cos(\alpha + K) \cotg \frac{p}{2} + \frac{1}{2} l \sin(\alpha - L) \operatorname{tg} \frac{p}{2}.$$

Es ist $k^2 = g^2 + h^2 + 2gh \cos(H - G),$
 $l^2 = g^2 + h^2 - 2gh \cos(H - G),$

k und l sind also die Seiten zweier ebenen Dreiecke, welche beide g und h zu Seiten und beziehungsweise $180^\circ - (H - G)$ und $H - G$ als von den gegebenen Seiten eingeschlossene Winkel haben. Wegen der Relationen:

$$\frac{h}{k} = \frac{\sin(K - G)}{\sin(H - G)}, \quad \frac{g}{k} = \frac{\sin(K - H)}{\sin(G - H)}$$

sind, wenn man vom Zeichen dieser Sinusse, d. h. von der danach vorzunehmenden Wahl des Quadranten absieht, $K - G$ und $K - H$ ebenfalls Stücke des ersten Dreiecks, und zwar liegen diese Winkel beziehungsweise den Seiten h und g gegenüber. Dasselbe gilt von den Winkeln $90^\circ - (L + G)$ und $90^\circ - (L + H)$ in dem zweiten Dreiecke.

Die Berechnung von k, l, K, L wird wohl am kürzesten, wenn man erst

$$k^2 = (g + h)^2 \cos^2 \frac{1}{2}(H - G) + (g - h)^2 \sin^2 \frac{1}{2}(H - G),$$

$$l^2 = (g + h)^2 \sin^2 \frac{1}{2}(H - G) + (g - h)^2 \cos^2 \frac{1}{2}(H - G)$$

bestimmt und dann durch Substitution K und L ableitet; dabei hat man mehrere in die Augen fallende Prüfungen.

Göttingen, 1864 Juli 4.

W. Klinkerfues.

Zählung der nördlichen Sterne im Bonner Sternverzeichnisse nach Grössen.

Von Herrn Professor von Lüttrou.

Durch die eben erscheinende neue Auflage der „Wunder des Himmels“ veranlasst, benutzte ich eine mir für solche Zwecke zu Gebote stehende Kraft, um während der letzten Monate die in der Ueberschrift genannte Zählung vorzunehmen. Damit gerade das kostbarste Material in *Argelander's* erstaunlichem Werke für die letzten Sternklassen möglichst in Verwendung komme, liess ich die Arbeit so ausführen, wie es die Köpfe

der folgenden Columnen zeigen. Auf diese Weise wurde nur die letzte Rubrik, die ohnehin bloss eine halbe Sterngrösse umfasst, von der Unbestimmtheit berührt, die bei *Argelander* für diese letzten Classen in Bezug auf Vollständigkeit der Aufnahme des Himmels herrscht; überdies war durch diese Anordnung die Zählung sehr erleichtert.

Zone.	Grössen.										
δ	1-1.9	2-2.9	3-3.9	4-4.9	5-5.9	6-6.9	7-7.9	8-8.9	9-9.5	Neb.	Var.
0°	.	.	2	3	13	40	149	887	3992	1	1
+ 1	.	.	.	1	12	40	154	800	3825	.	.
2	.	.	7	10	22	46	165	862	3640	1	1
3	.	1	.	7	6	36	156	870	3858	.	1
4	.	.	2	7	13	26	136	911	3997	1	.
5	1	.	1	3	13	38	141	976	4090	.	.
6	.	2	3	6	9	40	165	908	4108	1	1
7	.	.	.	5	14	31	150	868	4058	.	3
8	1	.	2	6	12	34	150	924	4041	1	4
9	.	.	4	7	17	51	159	895	4188	.	3
10	.	.	4	3	13	47	178	882	3897	.	1
11	.	.	2	3	22	51	184	923	3911	1	.
12	1	1	.	4	12	52	166	899	3925	8	3
13	.	.	2	.	19	61	163	817	4141	5	1
14	.	2	3	6	19	76	191	817	3984	.	2
15	.	1	4	3	14	78	206	808	3820	2	2
16	1	1	2	4	25	71	200	802	3936	.	1
+ 17	.	.	3	5	16	71	169	807	3967	.	.