und also keine klare Ansicht über ihr Wesen gewinnen konnte. Und doch liegt es so nahe, einen terrestrischen Lichtstrahl als das Bruchstück eines cölestischen anzusehen, und die terrestrische Refraktion als ein Bruchstück der astronomischen zu betrachten. Ich werde mit ein paar Worten den Werth einer solchen Auffassung der terrestrischen Refraktion nachzuweisen versuchen. Sei ABS die Kurve eines Lichtstrahls, der von einem Gestirne S herkommend in die Atmosphäre tritt, um über einen irdischen Punkt B nach dem Ende A des Strahls zu gelangen, so ist, wenn R_1 und R_2 die astronomische Strahlenbrechung des S in A und B bezeichnen, die irdische Strahlenbrechung des Punktes B in A , oder A in B :
$$r = \frac{R_1 - R_2}{2}$$
, wenn in A der Punkt B einen Höhenwinkel bildet. Für den Fall aber, wo B aus A und A aus B unter einem Tiefenwinkel erscheint, ist $r = R_3 - \frac{R_1 + R_2}{2}$, wenn

R_3 den Werth der astronomischen Strahlenbrechung (in der Horizontale) für denjenigen Punkt zwischen A und B bezeichnet, wo der Strahl der Erdoberfläche parallel geht. Eine einfache Betrachtung der bildlichen Darstellung dessen, was hier in wenigen Buchstaben und Worten niedergelegt ist, wird die mathematische Schärfe des Resultats darthun. Der Höhenwinkel in $A = a$ gesetzt, giebt ihn für $B = a + 0,91 \cdot c$ mit hinreichender Genauigkeit für irdische Distanzen; c aber ist der Centriwinkel im Mittelpunkte der Erde für den Bogen AB . Mit Hülfe astronomischer Strahlenbrechung, begleitet von den beobachteten oder berechneten meteorologischen Daten zweier terrestrischer Punkte A und B , kann man folglich mit Leichtigkeit die terrestrische Refraktion des A in B und des B in A sehr angenähert finden.

Eglisau, im Kanton Zürich, den 30^{sten} Mai 1842.

Hs. Heinrich Denzler.

Schreiben des Herrn Hofraths *Mädler*, Directors der Dorpater Sternwarte, an den Herausgeber.

Dorpat 1842. April 10.

[Ich habe „die Bahnbewegungen der Doppelsterne“ zum Thema einer Abhandlung gewählt, die mit dem unter der Presse befindlichen 9^{ten} Bande der Dorpater Beobachtungen erscheinen wird. Die Zahl derer, bei denen eine Bewegung dieser Art mit Sicherheit zu erkennen ist, steigt gegenwärtig schon auf

110, und für einen kleinen Theil derselben konnte der Versuch gemacht werden, die Elemente einer Keplerschen Ellipse abzuleiten. Ich gebe hier vorläufig diese Elemente selbst und verweise wegen des näheren Details auf die erwähnte Abhandlung.

	Umlaufzeit.	Mittl. jährliche Bewegung.	Zeit des Perihels.	Knoten.	Neigung.	Perihel vom Knoten.	Excentricität.	Halbe große Axe.	$M^{\frac{1}{3}}\pi$	
γ Ophiuchi	92,870 J.	— 232' 584	1812,73	126° 54' 9	64° 51' 4	142° 52' 8	0,44380	4' 192	0' 20441	
δ 62 Struve	94,765	+ 227,93	1837,414	15 2,6	35 31,3	135 27,4	0,44958	1,255	0,06038	
γ Virginis	145,409	— 148,453	1836,313	60 37,6	24 39,2	78 22,1	0,86815	3,402	0,12300	
γ Cancri	58,910	— 366,66	1853,371	1 28,1	63 16,8	266 0,0	0,23486	1,2922	0,08515	
γ Herculis	31,4678	— 730,45	1829,50	39 26,2	50 52,7	262 4,0	0,45454	1,189	0,1193	
γ Coronæ	43,2459	+ 499,469	1815,230	24 18,5	71 7,7	261 20,6	0,33760	1,0879	0,08831	
γ Coronæ	608,45	+ 35,500	1826,60	25 7,0	29 29,1	64 28,3	0,69978	3,918	0,05456	sehr unsicher.
γ Leonis	82,533	+ 261,72	1849,76	135 11,1	46 33,5	185 27,2	0,64338	0,857	0,04520	
γ Ursæ maj.	60,4596	— 357,263	1816,95	95 0,3	52 15,5	129 40,5	0,40368	2,290	0,1487	
γ Geminor.	232,124	— 93,054	1913,9	23 5,0	70 58,3	87 36,8	0,79725	7,008	0,1860	
γ Ophiuchi	88	+ 245	1798	184	45° — 50°	0	0,37	1,1	0,05	höchst beiläufig.

Für die meisten dieser Bahnen lagen bereits frühere Versuche vor; aber alle sind aufs neue untersucht, nur ξ Ursæ majoris, bei welchem auch die neuesten Beobachtungen noch sehr gut übereinstimmen, ist unverändert so angenommen, wie ich die Bahn 1836 gegeben habe.

Bereits dreimal habe ich in gegenwärtigem Frühjahr teleskopische Sternschnuppen durch das Feld des Refraktors ziehen sehen. So wenig nun solche isolirte Wahrnehmungen für specielle Berechnungen dienen können, so

werde ich sie doch von jetzt ab sorgfältig notiren. Aus der Zahl derselben, verglichen mit der Größe des Gesichtsfeldes und der Zeit, während welcher überhaupt beobachtet wurde, läßt sich vielleicht mit der Zeit ein allgemeiner Schluß auf die Menge dieser Körper gewinnen.

Dorpat 1842. Mai 23.

Für heute nur gelegentliche Bemerkungen über einige Doppelsterne, welche mir die Aufmerksamkeit der Beobachter zunächst zu verdienen scheinen.

Drei derselben, die ich im vorigen Jahre noch länglicht erblickte, sind jetzt für das hiesige Fernrohr schon völlig rund Es sind dies

ω Leonis. 1356 Struve.

1841 Mai 8. $194^{\circ} 0' \dots 0'' 3$

1842 März 17.)

Mai 1. } völlig rund.

und sonst noch öfter.

42 Comae Berenices. 1728 Struve.

1841,40 $4^{\circ} 42' 5 \dots 0'' 324$ aus 8 Abenden.

1842 April 3. 13 $8 \dots 0,16$ nur Muthmaßung.

Mai 22. einfach.

γ Coronae. 1967 Struve.

1841,50 $332^{\circ} 18' 2 \dots 0'' 184$ aus 11 Abenden. Keilförmige Figur.

1842 Mai 20 einfach.

Der umgekehrte Fall ist eingetreten bei

1663 Struve.

1841 Mai 25 einfach.

1842,33 $123^{\circ} 18' 2 \dots 0'' 55$ aus 2 Abenden.

1938 Struve (nahe bei μ Bootis)

wird vielleicht bald ein ähnliches Phänomen darbieten: er rückt immer näher zusammen.

1841,47 $308^{\circ} 43' 5 \dots 0'' 825$ (2 Abende.)

1842,40 305 41,8 0,70 (2 Abende.)

Vor 21 Jahren war die Distanz die doppelte der gegenwärtigen.

Mädler.

Sternbedeckungen beobachtet auf der Hamburger Sternwarte.

1842. R. Weyer. Funk.

Mai 12. | 118 Tauri | Eintr. $9^h 6' 44'' 16$ | $44'' 6$ | $44'' 4$ | M. Z.

Der Comes etwa eine Secunde früher.

Am 14^{ten} Mai war beim Eintritte von p Geminorum die Witterung so ungünstig, daß es sich nicht mit Bestimmtheit angeben läßt, ob der Stern hinter dem Monde oder Wolken verschwand. Herr Weyer hat den Eintritt zu $8^h 19' 1'' 7$ angegeben.

R. Weyer. Funk.

Austr. von p Geminor. | $9^h 15' 24'' 05$ | $9^h 15' 22'' 0$ | $9^h 15' 25'' 0$.

Es ist wohl überflüssig zu bemerken, daß vom Austritte eines Sterns 6^r Gröfse aus dem hellen Mondrande nicht dieselbe Präcision als von seinem Austritte aus dem dunkeln Rande zu erwarten steht.

Rümcker.

Schreiben des Herrn Professors v. Boguslawski, Directors der Breslauer Sternwarte, an den Herausgeber.

Breslau 1842. Mai 13.

Gestern Abend habe ich den Eintritt von 118 Tauri am dunkeln Mondrande am $4\frac{1}{2}$ füs. Fraunh. mit 72mal. Vergrößerung wie ich glaube sehr gut beobachtet, wenn die Zeit auch noch einer kleinen Correction bedarf, deren (gewiß immer nur kleinen)

Betrag ich später mitzuthellen nicht verfehlen werde. Er erfolgte nach meiner Beobachtung um $12^h 56^m 11^s 17$ St.Zt. Herr Dr. Gröshang erhielt (seine erste Beobachtung dieser Art) am 4f. Fr. mit 42mal. Vergr. $12^h 56^m 12^s 44$.

v. Boguslawski.

I n h a l t.

(zu Nr. 451.) Bericht über die Bibliothek der Hauptsternwarte in Pulkova, nach deren Bereicherung durch den Ankauf der Büchersammlung des verstorbenen Dr. Olbers in Bremen, nebst einigen angehängten bibliographischen Notizen. Von Sr. Excellenz dem Herrn Staatsrath und Ritter v. Struve. (Beschluss.) p. 321.
Vermischtes. p. 335.

(zu Nr. 452.) Mondculminationen in Altona 1842. Von Herrn Th. Clausen. p. 337.

Vergleichung der Gaussischen Theorie des Erdmagnetismus, mit A. Ermans magnet. Beobachtungen. Von Herrn H. Petersen. (Fortsetzung.) p. 341.

Ueber die terrestrische Refraction. Von Herrn H. H. Denzler. p. 347.

Schreiben des Herrn Hofraths Mädler, Directors der Sternwarte in Dorpat, an den Herausgeber. p. 349.

Sternbedeckungen beobachtet auf der Hamburger Sternwarte. p. 351.

Schreiben des Herrn Professors v. Boguslawski, Directors der Breslauer Sternwarte, an den Herausgeber. p. 451.

Altona 1842. Juli 7.