Kulturversuche mit *Aspergillus niger* auf einigen Aminosäuren und Peptiden.

Von

Emil Abderhalden und Yutaka Terunchi.

(Aus dem I. chemischen Institute der Universität Berlin.)

(Der Redaktion zugegangen am 11. März 1906.)

Daß die meisten α -Aminosäuren ein gutes Nährmaterial für Pilze darstellen, ist bekannt. O. Emmerling¹⁾ hat außerdem nachgewiesen, daß in der Nährflüssigkeit als Abbauprodukt derselben oxalsaures Ammon auftritt. Uns interessierte die Frage, ob die verschiedenartigen synthetischen Polypeptide in gleicher Weise von *Aspergillus niger* als Nahrung benutzt werden, wie die Aminosäuren, und ob sich in bezug auf das Wachstum bei verschiedenen Peptiden Unterschiede zeigen. Als Nährlösung verwandten wir: 1000 g destilliertes Wasser, 0,5 g Magnesiumsulfat, 1,0 g Kaliumphosphat, 0,5 g Kaliumchlorid, 0,01 g Ferrosulfat und 3% Rohrzucker. In einem Teil der Versuche wurde der Zuckerzusatz weggelassen.

Zu den einzelnen Versuchen verwandten wir je 25 ccm der genannten Lösung. Jede Probe wurde nach Zusatz der betreffenden Aminosäure resp. des Polypeptides im Dampftopf sterilisiert und dann mit *Aspergillus*sporen geimpft. Nach sieben-tägigem Verweilen im Brutraum wurde die Pilzmasse auf einem gewogenen Filter gesammelt, bei 100° getrocknet, und dann das Gewicht bestimmt. Die abfiltrierte Flüssigkeit prüften wir auf Oxalsäure. Wie die untenstehende Tabelle zeigt, ließen sich wohl Unterschiede im Wachstum auf verschiedenen Aminosäuren und Peptiden feststellen. Als sehr geeignet erwiesen sich Gly-

¹⁾ O. Emmerling, Oxalsäurebildung durch Schimmelpilze. Zentralbl. für Bakteriöl., Parasitenkunde und Infektionskrankheiten. Bd. X, S. 273, 1903.

kokoll, Glycyl-glycin und Triglycin. Auch auf Glycinanhydrid wuchs *Aspergillus niger* ganz gut und ebenso auf den entsprechenden Alaninverbindungen.

Zugesetzte Aminosäuren resp. Peptide in Gramm = 0,05 g Stickstoff		Versuch I ohne Rohrzucker		Versuch II ohne Rohrzucker		Versuch III mit Rohrzucker	
		Pilz in mg	Nach- weis *) der Oxal- säure	Pilz in mg	Nach- weis der Oxal- säure	Pilz in mg	Nach- weis der Oxal- säure
Glykokoll	0,27	15	++			231	⁺ ++
Glycyl-glycin	0,24	15	++			254	⁺ ++
Diglycyl-glycin	0,23	17	++			228	⁺ ++
Alanin	0,32	18	⁺ ++			209	⁺ ++
Alanyl-alanin	0,29	10	—	10	—	202	⁺ ++
Glycinanhydrid	0,21	16	+	17	+	244	—
Alaninanhydrid	0,26	13	+	27	++	246	—
Leucyl-glycin	0,24	21	++	19	++	159	⁺ ++
Glycyl-alanin	0,25	12	—	20	⁺ ++	167	—
Leucyl-glycyl-glycin	0,29	11	—			192	⁺ ++
Leucylasparagin	0,34	20	++			224	⁺ ++
Aminobutyryl-aminobutter- säure A	0,29	10	—			208	—

*) — bedeutet negativ, + Spur, ++ deutlich, ⁺++ sehr viel.

Glycyl-alanin, Leucyl-glycyl-glycin, Aminobutyryl-aminobuttersäure A scheinen am wenigsten geeignet gewesen zu sein. Die Menge der gebildeten Oxalsäure erwies sich im allgemeinen als der gewachsenen Masse an Pilzrasen entsprechend. Wir haben sie nicht genau bestimmt, sondern uns mit der rohen Beobachtung begnügt, weil wir vorläufig zu wenig über die Entstehung des oxalsauren Ammons und vor allem über seine Beziehung zu dem Wachstum des Pilzes und dessen Stoffwechsel wissen. Es ist wohl möglich, daß es fortwährend weiter Verwendung findet, und die Menge des gebildeten oxal-

sauren Ammons durchaus kein Maß der Wachstumsintensität des Pilzes ist. Am besten würde man seine Menge wohl mit der gebildeten Stickstoffsubstanz des Pilzes in Beziehung bringen. Die Wägung der Pilze vermag uns auch kein genaues Bild über die Stickstoffassimilation aus den beigegebenen Aminosäuren und Peptiden zu geben. Der verschiedene Salzgehalt kann bei so kleinen Pilzmengen die Vergleichung sehr stören. Auch hier wäre es korrekter, die gebildeten Stickstoffsubstanzen in Rechnung zu setzen. Bei so kleinen Pilzmengen waren dergleichen Bestimmungen ausgeschlossen. Wir hoffen, diese Versuche in der angedeuteten Richtung bald weiterführen zu können.