Ein neues Hieracium der Wiener Flora.

Von J. Juratzka.

Wenn ich im Folgenden das Bild eines der Wiener Flora angehörigen Hieraciums zu entwerfen versuche, so liegt es vorläufig weder in meiner Absicht, mich darüber auszusprechen, ob es eine gute Art, eine *hybrida proles* oder ein *lusus extraordinarius* sei, noch für oder gegen eine bezügliche Meinung Anderer in die Schranken zu treten. Bevor ich dieses thue, glaube ich nicht umhin zu können, vorerst jene Resultate abzuwarten, welche sich aus den, in der freien Natur und mittelst Cultur anzustellenden Beobachtungen ergeben werden. Die bekannten Schwierigkeiten bei dieser Gattung werden hoffentlich meinen vorläufigen Rückhalt in dieser Beziehung vor dem botanischen Publicum rechtfertigen.

Hieracium polycladum m., *hypophyllopodum*, *viride*, *hirsutum*, *caule ex incurvata basi erecto, folioso, nunc simplici corymbifero pleio-rarius submonocephalo, nunc ramoso-paniculato polycephalo; foliis a basi ad medium altiusve ultra argute dentatis, imis elliptico-acutis in petiolum attenuatis, superioribus subovato-ellipticis oblongisve acuminatis sessilibus; pedunculis tomentoso-puberulis canis, bracteolatis; involucre 4—5½ lin. longo atroviridi basi ovata subcanescente pilisque, immixtis albis basi nigris simplicibus, glanduliferis adperso, squamis adpressis subacutis, ligulis obsolete ciliatis, stylo vivo fusco, acheniis fusco-atris*

In sylvis caeduis montium calcareorum prope Vindobonam. Fl. Julio et Augusto. 4.

Rhizoma simplex debile subtortuosum, horizontale, undique fibris radicalibus longis septum; apice adscendens, caulemque gignens utplurimum solitarium, turionibus foliigeris antheleos tempore nullis vel quandoque obsoletis basi stipatum. Caulis ½—3 pedalis, inferne, praesertim basi dense longeque albo-hirsutus, reliqua parte parcior pube crispata cana subtomentosus, pilisque immixtis brevibus bulbosis plus minusve scaber, nunc a basi virgato-ramosus altiusque irregulariter paniculatus, nunc superne solum, nisi subsimplex, corymboso-ramosus, ramis foliolosis. Folia firmiuscula plus minusve hirsuta, supra interdum glabrescentia, subtus paulo pallidiora triplinervia, a basi ad medium usque argute dentata vel inciso-dentata, altius ultra integerrima v. parcius obsoletiusque denticulata, dentibus antrorsis; radicalia pauca antheleos tempore utplurimum jam emarcida, caulina sensim magnitudine decrescentia sursumque remotiora, attenuata v. altem angustata nec rotundata basi sessilia; stirpium ½—2 pedali maxima computato petiolo 2½—4 poll., altiorum ac ramosiorum 4½—6 pollicaria, medio 8"—2 poll. lata; majorum petioli plus minusve alati, dorso longe hirsuti, lamina plerumque breviores, radicalium eam subinde subaequant. Pedunculi elongati, incano-tomentosuli, passim pilis raris glanduliferis simplicibus adpersi. Involucre pluriseriate, subinterruptum, 4—5½

lin. longum, squamis subacutis linearibus, basi ad summum $\frac{3}{4}$ lin. latis, intimis margine pallidioribus 18—22 Achaenia $1^6-\frac{8}{12}$ lin. lg., pappo potissimum 3 lin. longo.

Inter Hieracium boreale et H. vulgatum quasi medium; ab illo imprimis foliis radicalibus et florendi tempore praecociore, ab hoc capitulis acheniisque majoribus (magnitudine scilicet H. borealis) facile distinguendum. Proximum quidem videtur H. tridentato et H. rigido: his vero capitula minora (illo insuper deflorata medio constricta), achaenia breviora ($1^2-\frac{4}{12}$ lg.) et folia medio praecipue dentata.

Wien den 5. Februar 1857.

Verzeichniss

derjenigen Pflanzen, die bisher in dem böhmischen Erzgebirge und in der Gegend von Rothenhaus und Umgebung aufgefunden worden sind.

Von A. Roth.

(Fortsetzung.)

XI. Droseraceen.

Drosera rotundifolia L. Sumpfwiesen bei Quinau 5. Juli 1847. Auf Moorwiesen bei Prossnitz 24. Juli 1851 (A. Roth).

Parnassia palustris L. Rothenhauser Fischhauswiese 6. August 1843. Auf Wiesen zwischen Görkau und Udwitz 31. August 1843. Auf den Wiesen im tiefen Thal zwischen Rothenhaus und Weingarten etc. 12. August 1847 (A. Roth).

XII. Polygaleen.

Polygala vulgaris L. Rothenhauser Park und Waldrevier Juni 1842 (A. Roth).

„ *flore rubro*. Rothenhauser Waldrevier gegen Hannersdorf 1851 (A. Roth).

„ *γ. alba* Tausch. Rothenhauser Waldrevier Juni 1852 (A. Roth).

„ *δ. carnea* Pettermann. Rothenhaus, Dörnerwiese Juni 1846 (A. Roth).

„ *ε. densiflora* Tausch. Prossnitzer Torfmoore 26. Juni 1851 (A. Roth).

depressa Wenderoth. Rothenhauser Waldrevier 2. Juli 1854 (A. Roth).

Chamaebuxus L. In den Rothenhauser Waldungen Mai 1843 (A. Roth).

(Fortsetzung folgt.)