Für № 45 in der Breite = -11° :

1864	b	l	ber. l	Δl
April 8,485	$-11^{\circ} 14'$	$190^{\circ} 28'$	$190^{\circ} 31'$	$+0^{\circ} 03'$
12,451	$-11^{\circ} 22'$	$246,76$	$246,66$	$-0,10$
14,485	$-11^{\circ} 19'$	$275,49$	$275,56$	$+0,07$
April 11,807	$-11^{\circ} 18'$	$237^{\circ} 51'$		

$$\xi = 14,2077, \quad T = 25,338,$$

täglich $\Delta \xi = -5'14''$; stündlich Oststurm: 6 Meilen.

Durch die verschiedene Bewegung der beiden Flecke № 44 und 45 wird der gegenseitige Abstand vergrössert. Aus den Beobachtungen folgt der Abstand:

		in Länge	in Breite
H	April 6, 7, 8	$3^{\circ} 8'$	$0^{\circ} 41'$
S	≈ 8	$3 \ 13$	$1 \ 5$
S	≈ 12	$4 \ 0$	$1 \ 43$
H	≈ 13	$4 \ 20$	$1 \ 41$
S	≈ 14	$4 \ 26$	$1 \ 43$

Die Fackeln, welche die beiden Flecke trennten, erlangten also zwischen den Flecken eine grössere Ausdehnung. Ein noch mehr auffallendes Beispiel für die Verbreiterung der Fackeln giebt der später zu erwähnende grosse Fleck № 86. Derselbe wurde bei Einschiebung eines Fackelarmes in zwei grosse behofte Stücke getrennt, welche sich dann mit zunehmender Breite des Fackelarmes sehr beträchtlich von einander entfernten.

№ 58 in der Breite = $-5^{\circ} 13'$.

1864	beob. l	Δl	beob. b	Δb
April 20,445	$197^{\circ} 64'$	$0^{\circ} 00'$	$-5^{\circ} 70'$	$-0^{\circ} 04'$
21,473	$212,35$	$0,00$	$-5,57$	$+0,04$
23,448	$240,66$	$-0,04$	$-5,40$	$+0,26$
24,446	$254,77$	$+0,13$	$-4,83$	$-0,11$
25,480	$269,80$	$-0,09$	$-4,57$	$-0,16$
April 23,0584	$235,044$		$-5,214$	

$$\xi = 14,3131, \quad T = 25,152,$$

täglich in Länge = $+1'5''$; stündlich West: 1 Meile,
täglich in Breite dem Aequator zu = $0^{\circ} 12'$; stündl. 14 Meil.

№ 60 nahe dem Aequator.

1864	l	b
April 21,4734	$192^{\circ} 68'$	$-0^{\circ} 48'$
23,4475	$193,54$	$-0 \ 38$

$$\xi = 14,73, \quad T = 24,44,$$

täglich in Länge = $+0^{\circ} 26'$; stündlich West: 30 Meilen.

Er näherte sich dem Aequator noch mehr. — Es ist oben bemerkt, dass die Oerter dieses wegen seiner Kleinheit für die Beobachtung sehr günstigen Flecks als besonders genau angesehen werden dürfen, mithin das aus den beiden einander nahen Orten hergeleitete Resultat für hinreichend zuverlässig erachtet werden kann.

Anclam, 1864 Nov. 17.

Prof. Spörer.

Beobachtungen und Elemente des Cometen I. 1864.

Von Herrn Tebbutt, Director der Sternwarte zu Windsor in New-South-Wales.

I now send you further observations and also my determination of the orbit of the comet, which formed the subject of my letter to you of the 19. August. The observations, extending from the 14. to the 21. August and from the 4. to the 17. September were made under the disadvantage of strong moonlight, and on the 15. September a strong west-wind blew into the shutters, which circumstance interfered much with the accuracy of the work on that evening. The observations are corrected for refraction where necessary. The calculation of the orbit has been peculiarly tedious and difficult owing to the observations in the first approximation being near the perihelion, and the comet's radius vector in two of the observations for the second approximation being nearly perpendicular to the visual ray from the earth to the comet. I think, however, the subjoined elements will be found to be a pretty close approximation of the true orbit; the observations for Aug. 14 and 25 and Sept. 4, taking into account the corrections for aberration and parallax, are represented as follows:

	Calculation — Observation
Aug. 14	Long. = $+0^{\circ} 1'$, Lat. = $0^{\circ} 0'$
25	$-5,5$ $+15,7$
Sept. 4	$-2,0$ $-0,1$

So far as I have been able to learn, the comet was first seen in these colonies by Mr. E. Quaise of Windsor about $6^h 30^m$ on the 10. August, but I have no doubt, it was long previously discovered in the observatories of Europe. It is remarkable for its proximity to the earth during the first week of August, the small inclination of its orbit, and its near approach to the earth's orbit at the descending node.

Elements.

$T = 1864$ August 15,59985 Greenwich M. T.

$$\left. \begin{aligned} \pi &= 304^{\circ} 10' 14'' 9 \\ \Omega &= 95 \ 8 \ 32,3 \\ i &= 1 \ 52 \ 3,7 \end{aligned} \right\} \text{M. Equin. 1864,0}$$

$$\log q = 9,9587215.$$

Motion: Retrograde.

1864	Windsor M. T.	Comet — Star		Comp.	Comet's		Star
		AR	N. P. D.		App. AR	App. N. P. D.	
Aug. 18	8 ^h 40 ^m 42 ^s	— 12 ^m 30 ^s 59	+ 11' 28'' 5	3	13 ^h 53 ^m 10 ^s 46	99 ^o 49' 57'' 4	<i>a</i>
19	6 39 41	+ 0 20,29	+ 4 10,9	6			<i>b</i>
21	6 36 37	— 1 34,88	— 1 56,8	4	14 2 17,48	101 16 41,5	<i>c</i>
22	8 32 47	— 1 23,36	+ 0 1,3	4	14 2 29,00	101 18 39,6	<i>c</i>
25	6 33 46	— 2 12,89	— 17 35,4	3	14 9 34,88	102 27 10,5	<i>d</i>
26	8 19 58	— 2 6,92	— 16 37,2	5	14 9 40,85	102 28 8,7	<i>d</i>
27	8 14 13	— 0 51,79	— 5 2,5	4	14 10 55,97	102 39 43,3	<i>d</i>
30	8 6 7	+ 2 31,71	+ 12 36,7	3	14 12 4,12	102 51 56,5	<i>d</i>
Sept. 2	9 15 49	— 25 7,21	+ 2 36,6	1	14 16 47,28	103 37 32,2	<i>f</i>
3	8 15 2	— 24 35,98	+ 8 23,8	2	14 17 18,50	103 43 19,4	<i>f</i>
4	8 16 22	— 24 5,45	+ 13 42,2	2	14 17 49,02	103 48 37,7	<i>f</i>
6	7 54 2	— 1 17,15	— 15 16,1	3			<i>g</i>
11	7 20 6	+ 0 32,62	+ 2 53,7	4			<i>g</i>
12	7 29 36	+ 0 51,31		3			<i>g</i>
13	7 25 36	+ 1 9,32	+ 9 0,6	2			<i>g</i>
15	7 19 14	+ 1 43,06	+ 15 0,7	4			<i>g</i>
16	7 26 6	+ 24 51,17	+ 11 50,5	1	14 21 58,93	104 30 56,1	<i>h</i>
17	7 32 20	+ 25 7,60	+ 14 34,6	2	14 22 15,35	104 33 40,1	<i>h</i>

Mean places of the stars of comparison for 1864.0.

	AR	N. P. D.	Authority
<i>a</i>	14 ^h 5 ^m 38 ^s 63	99 ^o 38' 20'' 6	432. Greenw. Observations. 1859.
<i>b</i>	13 56 11	100 19	Approx. position by Equat.
<i>c</i>	14 3 49,96	101 18 29,5	B. A. C. 4702.
<i>d</i>	14 11 45,35	102 44 37,4	437. Greenw. Observations. 1859.
<i>e</i>	14 12 12	103 5	Approx. position by Equat.

Windsor, New-South-Wales, 1864 September 20.

	AR	N. P. D.	Authority
<i>f</i>	14 ^h 41 ^m 52 ^s 00	103 ^o 34' 49'' 1	449. Greenw. Observ. 1859.
<i>g</i>	14 19 58	104 13,5	Approx. position by Equat.
<i>h</i>	13 57 5,64	104 18 57,2	B. A. C. 4679.

The stars *b*, *e* and *g* are of the 7. magn., *e* and *g* are identical with 199 and 347 of *Weisse's* Catalogue, Hora XIV.
 Long. of Observatory = 10^h 3^m 20^s E. of Greenwich,
 Lat. = = = 33^o 36' 30'' S. = =

John Tebbutt junr.

Elemente und Ephemeride der Terpsichore (81). Von Herrn Dr. F. Tietjen.

Da die in den Astr. Nachr. № 1498 gegebenen Elemente des Planeten (81) Terpsichore schon beträchtlich vom Himmel abweichen, so berechnete ich aus den Berliner Beob. Oct. 6, Oct. 23 und Nov. 13 folgendes neue Elementensystem:

1864 Nov. 13.0 mittl. Berl. Zt.

$$\begin{aligned} M &= 341^{\circ} 17' 46'' 8 \\ \pi &= 48 17 29,6 \\ \Omega &= 2 31 45,1 \\ i &= 7 55 22,0 \\ \varphi &= 12 7 30,2 \\ \mu &= 737'' 2946 \\ \log a &= 0,454910. \end{aligned} \quad \text{mittl. Aeq. 1864,0.}$$

Die Beobachtung von Nov. 13 ist:

$$9^{\text{h}} 7^{\text{m}} 14^{\text{s}} \text{ m. Z. B. Sch. } \alpha = 23^{\text{h}} 52^{\text{m}} 47^{\text{s}} 40, \text{ sch. } \delta = +2^{\circ} 56' 0'' 3.$$

Der Vergleichstern wurde durch Anschluss an mehrere *Bessel'sche* Sterne bestimmt, und für dessen mittl. Ort 1864 angenommen: $\alpha = 23^{\text{h}} 51^{\text{m}} 25^{\text{s}} 94, \delta = +2^{\circ} 48' 44'' 4.$

Aus obigen Elementen ergibt sich nachstehende Ephemeride:

12 ^h Berl. Zt.			1864		
1864	α	δ	Dec. 10	α	δ
Nov. 24	23 ^h 54 ^m 53 ^s	+ 3 ^o 35' 1	11	0 ^h 3 ^m 48 ^s	+ 5 ^o 0' 3
25	55 15	39,4	12	4 34	6,7
26	55 38	43,9	13	5 21	13,2
27	56 3	48,5	14	6 10	19,8
28	56 30	53,3	15	7 0	26,5
29	56 58	+ 3 58,3	16	7 51	33,3
30	57 28	+ 4 3,2	17	8 43	40,2
Dec. 1	57 59	8,3	18	9 37	47,2
2	58 32	13,6	19	10 32	+ 5 54,4
3	59 7	19,0	20	11 28	+ 6 1,6
4	23 59 43	24,6	21	12 25	9,0
5	0 0 20	30,2	22	13 24	16,4
6	0 59	36,0	23	14 24	24,0
7	1 39	41,9	24	15 24	31,6
8	2 21	47,9	25	16 26	39,4
9	3 4	+ 4 54,0	26	17 29	47,2
				18 33	55,1

Berlin, 1864 Nov. 19.

F. Tietjen.