Beobachtungen des Cometen von Coggia 1874 c auf der Sternwarte in Breslau.

1874	Mittl. Bresl. Zt.	AR.	D.	Anz. d. Vgl. *
Mai 16	10 ^h 58 ^m 49 ^s .1	96°47' 7''5	+68°47' 9''9	4 a
22	11 1 48.5	98 13 25.3	+68 47 55.7	4 a
Juni 5	11 2 48.7	102 57 47.0	+69 0 50.6	12 b
6	10 35 11.5	103 21 23.3	+69 1 23.9	6 b
8	10 47 34.2	104 11 31.0	+69 2 12.3	8 c
11	10 42 50.0	105 29 20.7	+69 1 9.5	10 d

Mittlere Oerter der Vergleichsterne 1874.0.

* a = B. D. +68°447 = Bonn. Beob. VI, p. 307.	96°58' 47''2	+68°45' 12''2
• b = B. D. +69 402 = Arg. Oeltzen 7411.	102 43 1.6	69 4 14.2
* c = B. D. +69 405 = Bonn. Beob. VI, p. 309.	104 17 18.7	69 5 19.5
* d = B. D. +69 413 = Bonn. Beob. VI, p. 309.	105 21 47.4	+69 0 35.1

Die Beobachtungen sind an dem Kreismikrometer des 4¹/₂füssigen Fraunhofer angestellt, die Reduktionen von Herrn Dr. *Neugebauer* ausgeführt.

Breslau, 1875, April 28.

J. G. Galle.

Der neue Veränderliche von R. Falb (Astr. Nachr. Nr. 2026).

Der Umstand, dass ein Stern fünfter Grösse in irgend einer Gegend des Himmels, die dem 52° Polhöhe entsprechenden Horizonte nicht gar zu nahe liegt, gesehen wird und nicht in meinem neuen Himmelsatlas vorkommt, spricht dafür, dass der Stern ein veränderlicher sei. Unabhängig von den verschiedenen Karten und von der Aussage der verschiedenen Kataloge habe ich während 27 Jahren die einzelnen Partien des Himmels untersucht und glaube den Ausspruch thun zu können, dass mir kein Stern 5. oder 6. Grösse entgangen ist. Unter besonders günstigen Witterungsverhältnissen wird es einem scharfen Auge gelingen, zu den von mir gesehenen Sternen 6. bis 7. Grösse noch einige hinzu zu entdecken. Ist der von *Falb* angegebene Stern Lal. 10527 ein Veränderlicher, so wird es zur Feststellung der Periode der Veränderung, vorausgesetzt, dass dieselbe eine regelmässige und nicht, wie

es bei dem von mir entdeckten Veränderlichen ϵ Aurigae der Fall ist, eine unregelmässige ist, von Wichtigkeit sein, zu welchen Zeiten dieser Stern für mein Auge unsichtbar, also unter 6.7 Grösse war. Das zwischen den hellen Sternen ζ , β und κ Orionis liegende Dreieck wurde, wie meine Originalbeobachtungen nachweisen, zu folgenden Zeiten durchmustert:

1844, Januar 13 und 23; December 6 und 8.

1853, März 3.

1854, October 31.

1862, Februar 22.

1863, Januar 9.

1864, Januar 1 und 29.

Zu den genannten 10 Zeiten war also der genannte Stern für das blosse Auge unsichtbar.

Münster.

Professor *Heis.*

Elements of τ Ophiuchi.

Node = 67°1', λ = 36°26', γ = 46°8', e = 0.6055, T = 1818.50, P = 217^m 87, a = 1'193.

	Nr.	Epoch	Θ_0	Θ_c	$\Theta_0 - \Theta_c$	ρ_0	ρ_c	$\rho_0 - \rho_c$
Herschel	1	1783.27	331°36'	332°35'	— 0°59'	elongated	—	—
W. Struve	2	1825.67	single	—	—	round	—	—
	3	27.28	146 0	170 40	—24 40	elongated	—	—
	4	35.68	192 54	209 49	—16 55	0''35	0''68	—0''33
	5	36.62	199 54	212 20	—12 26	0.44	0.71	—0.27

	Nr.	Epoch	Θ_0	Θ_c	$\Theta_0 - \Theta_c$	ρ_0	ρ_c	$\rho_0 - \rho_c$
J. Herschel	6	1830...	single	—	—	round	—	—
Mädler	7	1835...	256°42'	207°58	—	—	—	—
	8	41.53	217 21	222 27	— 5° 6'	0''75	0''89	—0''14
	9	42.57	225 36	224 11	+ 1 25	0.77	0.91	—0.14
	10	52.66	238 34	236 8	+ 2 26	1.27	1.18	+0.09
	11	53.79	232 17	237 10	— 4 53	1.17	1.20	—0.03
	12	54.71	238 11	237 59	+ 0 12	1.09	1.23	—0.14
Smyth	13	1838.58	214 0	216 44	— 2 44	0.5	0.79	—0.29
	14	42.52	227 0	224 5	+ 2 55	0.9	0.93	—0.03
	15	55.34	238 48	238 32	+ 0 16	1.1	1.24	—0.14
Dawes	16	1840.68	221 32	220 58	+ 0 34	0.88	0.85	+0.03
	17	41.66	225 42	222 42	+ 3 0	0.79	0.89	—0.10
	18	42.64	226 54	224 18	+ 2 36	—	—	—
	19	43.61	228 58	225 45	+ 3 13	0.95	0.95	0.00
	20	48.66	232 45	232 11	+ 0 34	1.01	1.08	—0.07
	21	54.67	238 3	237 57	+ 0 6	1.22	1.23	—0.01
Dembowski	22	1856.22	240 8	239 15	+ 0 53	1.2	1.26	—0.06
	23	58.16	241 35	240 46	+ 0 49	1.2	1.30	—0.10
	24	63.05	244 34	244 15	+ 0 19	1.4	1.39	+0.01
	25	65.47	245 37	245 48	— 0 11	1.4	1.44	—0.04
	26	67.06	246 6	246 46	— 0 40	1.44	1.47	—0.03
	27	69.05	247 3	247 55	— 0 52	1.41	1.49	—0.08
	28	71.00	247 35	249 2	— 1 27	1.48	1.53	—0.05
Mitchell	29	1846.51	229 24	229 39	— 0 15	0.78	1.02	—0.24
Fletcher	30	1851.66	239 22	235 12	+ 4 10	1.0	1.16	—0.16
Jacob	31	1852.65	239 31	236 8	+ 3 23	1.10	1.18	—0.08
Winnecke	32	1856.62	242 39	239 34	+ 3 5	1.29	1.27	+0.02
Secchi	33	1855.53	236 54	238 40	— 1 46	1.38	1.25	+0.13
	34	66.72	247 33	246 34	+ 0 59	1.60	1.46	+0.14
Kaiser	35	1865.52	249 23	245 50	+ 3 33	1.50	1.44	+0.06
Main	36	1870.50	250 13	248 46	+ 1 27	1.63	1.51	+0.12

Markree-observatory, 1875, May 27.

W. Doberck.

Entdeckung zweier Planeten.

Schreiben des Herrn Dr. V. Knorre an den Herausgeber.

Peters in Clinton hat folgende zwei Planeten entdeckt:

(144), 1875, Juni 6, 11^h23^m17^s (mittlere Zeit Berlin) 17^h18^m33^s57 —23°22'58''7
 Grösse 11 Bewegung —59° —1'
 (145), 1875, Juni 5, 12^h (mittlere Zeit Washington) 17^h14^m —23° 8'
 Bewegung südlich, Grösse 12.

V. Knorre.

Kiel. 1875, Juni 10.

Druck von Fiencke & Schachel in Kiel.