1.

Application de la méthode des moyennes à la transformation, au calcul numérique et à la détermination des limites du reste des séries.

(Mémoire lu à l'Académie des sciences de Paris, le lundi 30 Juillet 1833;
par M. J. V. Poncelet, chef de Bataillon du Génie.)

Nous commencerons ces recherches par l'examen des séries qui procèdent avec des termes alternativement positifs et négatifs, et nous insisterons particulièrement sur les moyens de calculs et de transformations à leur appliquer, parcequ'elles conduisent à des résultats utiles; qu'elles se présentent fréquemment dans les applications de l'analyse, et qu'il est souvent très facile d'y ramener le calcul des séries à termes constamment positifs, au moyen d'un changement de signe ou d'une transformation convenable, opérés dans les fonctions génératrices: c'est ce qui a lieu notamment pour les développemens des fonctions

$(1-x)^{\frac{1}{n}} = \left(1 + \frac{x}{1-x}\right)^{-\frac{1}{n}}, \quad a^x = \frac{1}{a^{-x}}, \quad \log(1-x) = -\log\left(1 + \frac{x}{1-x}\right),$
dans lesquelles x est censé plus petit et n plus grand que l'unité.

Des séries purement numériques dont les termes, alternativement positifs et négatifs, décroissent indéfiniment ainsi que leurs différences.

1.

Représentons par s_n la somme des n premiers termes $a_0, a_1, a_2, \dots, a_{n-1}$ d'une pareille série, supposés quelconques, et par $a_n, a_{n+1}, a_{n+2}, a_{n+3}, \dots$ les valeurs absolues ou numériques des termes suivans, enfin par S la véritable valeur s_∞ de la série poussée à l'infini, ou ce qu'on nomme sa *limite*; de sorte qu'on ait

$$(a.) \quad S = s_n + a_n - a_{n+1} + a_{n+2} - a_{n+3} + a_{n+4} \text{ etc.}$$

En désignant, en général, par Δa_n la différences $a_n - a_{n+1}$ entre les valeurs absolues de deux termes consécutifs quelconques dont le premier est a_n et le second a_{n+1} , afin de n'avoir à considérer que des différences positives dans des suites qui seront ici supposées naturellement

décroissantes, on pourra successivement mettre la série proposée sous les formes suivantes :

$$(b) \quad S = s_n + \Delta a_n + \Delta a_{n+1} + \Delta a_{n+2} + \Delta a_{n+3} + \text{etc.}$$

$$(c.) \quad S = s_n + a_n - \Delta a_{n+1} - \Delta a_{n+2} - \Delta a_{n+3} - \text{etc.}$$

$$(d.) \quad S = s_n + a_n - a_{n+1} + \Delta a_{n+2} + \Delta a_{n+3} + \Delta a_{n+4} + \text{etc.}$$

. . . . .

ce qui montre généralement que, dans une série à termes alternativement positifs et négatifs décroissants : 1°. La valeur absolue d'un terme quelconque, est plus grande que celle de la somme de tous les termes qui suivent, pris avec leurs signes ; 2°. qu'en arrêtant la série à ce terme, la somme obtenue sera trop forte, si ce terme est positif, et trop faible, s'il est négatif, d'une quantité comprise entre les valeurs absolues du terme suivant et de sa différence à celui qui vient immédiatement après ; 3°. qu'une pareille série sera toujours convergente, ou aura une limite $S = s_\infty$ finie, dès que les valeurs absolues de ses termes iront sans cesse en décroissant ; ce que nous supposeront expressément dans tout ce qui va suivre *).

Ainsi, par exemple, on aura alternativement, dans la série proposée,

$$s_n < S, \quad s_n + a_n = s_{n+1} > S, \quad s_n + a_n - a_{n+1} = s_{n+2} < S \text{ etc. ;}$$

et, si l'on prend successivement $S = s_n$, $S = s_n + a_n$, $S = s_n + a_n - a_{n+1}$ etc., l'erreur commise sera au dessous de a_n pour la 1^{ière}, de a_{n+1} pour la suivante, de a_{n+2} pour la 3^{ième}, et ainsi de suite.

2.

Ces notions fondamentales étant rappelées, on remarquera que, puisque la valeur de S se trouve comprise entre celles de s_n et de $s_n + a_n$, elle pourra différer moins de leur moyenne arithmétique $s_n + \frac{1}{2} a_n$, que de chacune d'elles en particulier. Prenant, en effet, la demi-somme des expressions (b.) et (c.) de S , on trouve

$$(e.) \quad S = s_n + \frac{1}{2} a_n + \frac{1}{2} (\Delta a_n - \Delta a_{n+1} + \Delta a_{n+2} - \Delta a_{n+3} + \Delta a_{n+4} - \text{etc.}),$$

relation que nous appellerons la *transformée du 1^{er} ordre* de la proposée

---

*) Nous supposerons en outre, afin d'éviter toute espèce de difficultés, que ces valeurs convergent vers zéro, ou que a_n devienne rigoureusement nul pour n infini. Dans le cas où elles convergeraient vers une valeur finie quelconque, il se présenterait, généralement parlant, une détermination relative au signe ou au rang du terme a_∞ placé à l'infini, vers la droite de la série ; et cette indétermination ne pourrait être levée que dans des cas tout particuliers, où l'origine de la série serait bien connue ; la même remarque est applicable aux séries de différences etc. dont il sera question par la suite.

(a.), relative au terme a_n , et dans laquelle la partie entre parenthèses, forme une série d'un genre analogue et jouissant des mêmes propriétés, si les différences $\Delta a_n, \Delta a_{n+1}, \Delta a_{n+2} \dots$ sont continuellement décroissantes, ou, ce qui est la même chose, si les différences du 2^o ordre

$\Delta a_n - \Delta a_{n+1} = \Delta^2 a_n, \Delta a_{n+1} - \Delta a_{n+2} = \Delta^2 a_{n+1}, \Delta a_{n+2} - \Delta a_{n+3} = \Delta^2 a_{n+2}$ etc. sont toutes positives: circonstance qui a lieu dans une infinité de cas.

La série entre parenthèses, étant donc convergente, on aura,

$$S = s_n + \frac{1}{2} a_n \text{ à moins de } \frac{1}{2} \Delta a_n = \frac{1}{2} (a_n - a_{n+1});$$

de sorte que cette valeur de S , qui est trop faible, sera d'autant plus approchée que la série proposée sera moins convergente dans ses premiers termes, ou que le rapport de a_n à a_{n+1} s'approchera davantage de l'unité.

Mais, pour que cette même valeur de S soit plus exacte que celle $S = s_n + a_n$, il faut, tout au moins, que la limite de l'erreur qui lui est relative soit moindre que celle de cette dernière quantité, ou qu'on ait

$$\frac{1}{2} \Delta a_n < a_{n+1}, \text{ c'est à dire } \Delta a_n < 2 a_{n+1}, a_n < 3 a_{n+1},$$

et l'on en sera complètement certain si la condition

$$\frac{1}{2} \Delta a_n < a_{n+1} - a_{n+2}, \text{ c'est à dire } \Delta a_n < 2 \Delta a_{n+1},$$

se trouve en même tems satisfaite, puisque l'erreur de $s_n + a_n$ surpasse nécessairement $a_n - a_{n+1}$ ou Δa_n .

3.

Si le contraire avait lieu, il faudrait s'en tenir à la valeur $s_n + a_n$ donnée immédiatement par la série proposée, ou plutôt à la valeur $s_n + a_n - \frac{1}{2} a_{n+1} = s_{n+1} - \frac{1}{2} a_{n+1}$ que donne la transformée du 1^{er} ordre

(f.) $S = s_n + a_n - \frac{1}{2} a_{n+1} - \frac{1}{2} (\Delta a_{n+1} - \Delta a_{n+2} + \Delta a_{n+3} - \Delta a_{n+4} + \text{etc.})$, relative aux termes qui suivent a_n dans la proposée, et qu'on obtient soit en prenant la demi-somme des expressions (c.) et (d.) de S , soit en remplaçant n par $n+1$ dans la transformée précédente (e.), après y avoir changé le signe des termes qui suivent s_n , soit enfin en faisant simplement sortir de la parenthèse de cette même transformée le 1^{er} terme Δa_n ; ce qui donne:

(f.) $S = s_n + \frac{1}{2} a_n + \frac{1}{2} \Delta a_n - \frac{1}{2} (\Delta a_{n+1} - \Delta a_{n+2} + \Delta a_{n+3} - \Delta a_{n+4} + \text{etc.})$; relation identique avec celle dont il s'agit à cause de $\Delta a_n = a_n - a_{n+1}$, et sur laquelle d'ailleurs on peut raisonner comme on l'a fait ci dessus pour la relation (e.).

Ainsi on devra prendre

$$S = s_n + \frac{1}{2} a_n + \frac{1}{2} \Delta a_n = s_n + a_n - \frac{1}{2} a_{n+1},$$

valeur exacte à moins de $\frac{1}{2} \Delta a_{n+1}$, si l'on a

$a_{n+1} < 3a_{n+2}$ ou, plus rigoureusement, $\Delta a_{n+1} < 2\Delta a_{n+2}$,
 et $S = s_n + a_n - a_{n+1} + \frac{1}{2}a_{n+2}$ à moins de $\frac{1}{2}\Delta a_{n+2}$,
 si l'inverse avait précisément lieu; ce qui revient à n'opérer la transformation qu'à partir du terme suivant a_{n+2} de la série proposée.

4.

En continuant à raisonner ainsi, de proche en proche, on voit si l'on avait constamment pour un indice quelconque η , $a_\eta > 3a_{\eta+1}$, il n'y aurait aucun avantage sous le rapport de l'approximation, à remplacer la série (a.) par l'une de ses transformées du 1^{er} ordre, à quelque terme qu'elle appartînt; ce qui tient à ce que cette série serait, par elle-même, très convergente. Nous verrons, plus tard, comment, dans cette circonstance, on doit modifier le procédé qui nous occupe; contentons nous pour le présent d'examiner le cas des séries peu convergentes où l'on a, dès le terme a_n et pour les suivans, $\Delta a_\eta < 2\Delta a_{\eta+1}$ ou, tout au moins, $a_\eta < 3\Delta a_{\eta+1}$. Voici comment, dans cette hypothèse, on pourra obtenir de nouvelles expressions de S plus approchées que les précédentes, ou dont les erreurs aient de plus petites limites.

Mettant les transformées (e) et (f.) sous cette forme:

$$S = s_n + \frac{1}{2}a_n + \frac{1}{2}(\Delta^2 a_n + \Delta^2 a_{n+2} + \Delta^2 a_{n+4} + \text{etc.}),$$

$$S = s_n + a_n - \frac{1}{2}a_{n+1} - \frac{1}{2}(\Delta^2 a_{n+1} + \Delta^2 a_{n+3} + \Delta^2 a_{n+5} + \text{etc.}),$$

relations dont la dernière revient à la suivante:

$$S = s_n + \frac{1}{2}a_n - \frac{1}{2}\Delta a_n - \frac{1}{2}(\Delta^2 a_{n+1} + \Delta^2 a_{n+3} + \Delta^2 a_{n+5} + \text{etc.});$$

prenant leur demi-somme membre à membre, il viendra, pour la transformée, du second ordre, relative à a_n ,

$$(g.) \quad \begin{cases} S = s_n + \frac{3}{4}a_n - \frac{1}{4}a_{n+1} + \frac{1}{4}(\Delta^2 a_n - \Delta^2 a_{n+1} + \Delta^2 a_{n+2} - \Delta^2 a_{n+3} + \text{etc.}), \\ \text{ou} \\ S = s_n + \frac{1}{2}a_n + \frac{1}{4}\Delta a_n + \frac{1}{4}(\Delta^2 a_n - \Delta^2 a_{n+1} + \Delta^2 a_{n+2} - \Delta^2 a_{n+3} + \text{etc.}), \end{cases}$$

ce qui prouve que si les différences secondes $\Delta^2 a_n$, $\Delta^2 a_{n+1}$, $\Delta^2 a_{n+2}$ . . . des termes successifs de la série proposée sont décroissantes comme les différences premières, ou si les différences 3^{èmes} sont toutes positives, on aura

$$S = s_n + \frac{3}{4}a_n - \frac{1}{4}a_{n+1} = s_n + \frac{1}{2}a_n + \frac{1}{4}\Delta a_{n+1}, \text{ à moins de } \frac{1}{4}\Delta^2 a_n.$$

Cette valeur est nécessairement plus approchée que celle de $s_n + \frac{1}{2}a_n$; mais elle ne surpassera, en exactitude la valeur de $s_n + a_n - \frac{1}{2}a_{n+1}$ fournie par la transformée du 1^{er} ordre (f.), qu'autant qu'on aurait, tout au moins,

$$\frac{1}{4}\Delta^2 a_n < \frac{1}{2}\Delta a_{n+1} \text{ ou } \Delta a_n < 3\Delta a_{n+1}.$$

S'il en était autrement, il faudrait recourir à la transformée du second ordre

$S = s_n + a_n - \frac{3}{4}a_{n+1} + \frac{1}{4}a_{n+2} - \frac{1}{4}(\Delta^2 a_{n+1} - \Delta^2 a_{n+2} + \Delta^2 a_{n+3} - \text{etc.})$,
ou $S = s_n + \frac{1}{2}a_n + \frac{1}{4}\Delta a_n + \frac{1}{4}\Delta^2 a_n - \frac{1}{4}(\Delta^2 a_{n+1} - \Delta^2 a_{n+2} + \Delta^2 a_{n+3} - \text{etc.})$,
qu'on déduit des précédentes (g'), en faisant sortir, de la parenthèse, le 1^{er} terme $\Delta^2 a_n$, et qui donne

$S = s_n + \frac{1}{2}a_n + \frac{1}{4}\Delta a_n + \frac{1}{4}\Delta^2 a_n = s_n + a_n - \frac{3}{4}a_{n+1} + \frac{1}{4}a_{n+2}$,
à moins de $\frac{1}{4}\Delta^2 a_{n+1}$; valeur par conséquent plus exacte que celle

$$s_n + \frac{1}{2}a_n + \frac{1}{4}\Delta a_{n+1}.$$

5.

On peut poursuivre ce raisonnement tant que les différences des ordres successifs seront constamment décroissantes, ou que celles de l'ordre $\mu + 1$ immédiatement supérieur à l'ordre μ auquel on s'arrête, demeureront toutes positives. Si, de plus, la condition $\Delta^\mu a_n < 3\Delta^\mu a_{n+1}$ se trouve satisfaite pour tous les ordres inférieurs à μ , l'approximation sera très rapide, et elle le sera le plus qu'il est possible, eu égard au nombre des termes employés, si l'on a, en même tems, $\Delta^{\mu+1} a_n < 2\Delta^{\mu+1} a_{n+1}$ pour ces différens ordres. On trouvera ainsi, pour la transformée de l'ordre μ relative au terme a_n ,

$$(h). \quad S = s_n + \frac{1}{2}a_n + \frac{1}{4}\Delta a_n + \frac{1}{8}\Delta^2 a_n \dots \\ \dots + \frac{1}{2^\mu} \Delta^{\mu-1} a_n + \frac{1}{2^\mu} (\Delta^\mu a_n - \Delta^\mu a_{n+1} + \Delta^\mu a_{n+2} - \Delta^\mu a_{n+3} + \text{etc.});$$

et par conséquent

$$(i.) \quad S = s_n + \frac{1}{2}a_n + \frac{1}{4}\Delta a_n + \frac{1}{8}\Delta^2 a_n \dots + \frac{1}{2^\mu} \Delta^{\mu-1} a_n, \text{ à moins de } \frac{1}{2^\mu} \Delta^\mu a_n.$$

6.

Cette dernière expression de S , supposée prolongée à l'infini, est précisément celle à laquelle *Euler* est arrivé, par une autre voie, dans ses *Institutiones calculi differentialis* (Pars II. de transformatione serierum, pag. 232 et seq.), et dont il a tiré un très grand parti pour la sommation des séries peu convergentes ou mêmes divergentes*). Mais *Euler* n'a pas fait connaître l'expression ci-dessus du reste ou complément

*) Voyez aussi, au sujet de ces recherches d'*Euler*, l'excellent *Traité de calcul différentiel et intégral* de Mr. *Lacroix*, 2^{ème} édition, in 4^o. Tome III. pag. 346. No. 1124. Ce célèbre professeur observe, avec raison, que le résultat d'*Euler* peut conduire à des difficultés dans beaucoup de cas, et notamment quand on l'applique à des séries divergentes, ainsi que l'a fait cet illustre géomètre à l'égard de plusieurs séries, purement numériques, parmi lesquelles M. *Lacroix* a principalement cité la série

$$1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - \text{etc.}$$

qui, ayant toutes ses différences nulles, conduit à la valeur $s = \frac{1}{2}$, tandis que, dans la

de la transformée supposé arrêtée à un terme quelconque; reste qui constitue, par lui même, une série remarquable du genre de la proposée, qu'on obtiendrait difficilement par l'analyse de cet illustre géomètre, et qui, en permettant d'assigner les limites de l'erreur commise, règle la marche à suivre dans chaque cas, lorsqu'il s'agit d'obtenir la plus grande approximation possible de l'emploi d'un nombre de termes donné de la série proposée. Ce qui précède montre, en effet, qu'il arrivera bien des cas où la transformée (*i.*) relative au terme a_n de la série et à ses différences, pourra conduire à des valeurs moins exactes que celles qu'on obtiendrait, à moins de frais, des transformées d'ordres inférieurs, mais relatives à des termes plus avancés de cette série.

Pour démontrer la chose d'une manière générale, nous reprendrons nos premiers raisonnemens en les appliquant à la transformée ci-dessus (*h.*) de l'ordre quelconque μ . Supposant notamment que cette transformée soit celle pour laquelle on cesse précisément d'avoir $\Delta^\mu a_n < 3 \Delta^\mu a_{n+1}$, de sorte qu'on ait, au contraire $\Delta^\mu a_n > 3 \Delta^\mu a_{n+1}$, on voit qu'on devra arrêter la série (*i.*) au terme $\frac{1}{2^\mu} \Delta^{\mu-1} a_n$, puisque les limites de l'erreur relative aux termes suivans, deviendraient supérieures à celles qui se rapportent à des termes moins avancés dans les séries analogues concernant a_{n+1} , a_{n+2} , a_{n+3} .

7.

Fesant, en effet, sortir de la parenthèse, dans l'équation (*h.*), le 1^{er} terme $\Delta^\mu a_n$, on obtiendra la nouvelle transformée de l'ordre μ ,

$$S = s_n + \frac{1}{2} a_n + \frac{1}{4} \Delta a_n + \frac{1}{8} \Delta^2 a_n \dots \\ \dots + \frac{1}{2^\mu} \Delta^{\mu-1} a_n + \frac{1}{2^\mu} \Delta^\mu a_n - \frac{1}{2^\mu} (\Delta^\mu a_{n+1} - \Delta^\mu a_{n+2} + \Delta^\mu a_{n+3} - \text{etc.}),$$

qui d'après ce que nous avons vu (3. et 4.) pour le cas particuliers de $\mu = 1$, $\mu = 2$, coïncide avec cette autre :

---

réalité, la somme de cette série est susceptible d'une infinité de limites distinctes selon l'origine dont elle provient.

Cette difficulté qui a été levée ou plutôt expliquée par *Lagrange* (Voy. la note de la p. 160 du T. III. de l'ouvrage cité), n'a pas lieu quand on a soin de n'appliquer les transformations qu'à des séries convergentes ou dont les termes s'approchent indéfiniment de 0 (1.), conformément à ce qui a été admis dans tout ce qui précède, et de façon qu'on puisse assigner avec certitude, pour chaque cas, les limites des erreurs commises.

$$(i.) \quad S = s_n + a_n - \frac{1}{2} a_{n+1} - \frac{1}{4} \Delta a_{n+1} - \frac{1}{8} \Delta^2 a_{n+1} \dots \\ \dots - \frac{1}{2^\mu} \Delta^{\mu-1} a_{n+1} - \frac{1}{2^\mu} (\Delta^\mu a_{n+1} - \Delta^\mu a_{n+2} + \Delta^\mu a_{n+3} - \text{etc.}),$$

relative au terme suivant a_{n+1} de la série proposée: ce qu'on peut d'ailleurs constater directement et très simplement en observant qu'on a généralement

$$\frac{1}{2^x} \Delta^{x-1} a_n + \frac{1}{2^x} \Delta^x a_n = \frac{1}{2^{x-1}} \Delta^{x-1} a_n - \frac{1}{2^x} \Delta^{x-1} a_{n+1},$$

puis en faisant, membre à membre, la somme de toutes les relations pareilles obtenues en donnant successivement à x les différentes valeurs comprises depuis 1 jusqu'à μ inclusivement.

On aura donc, avec un degré d'approximation nécessairement supérieur à celui que comporte l'expression (i.),

$$(k.) \quad \begin{cases} S = s_n + \frac{1}{2} a_n + \frac{1}{4} \Delta a_n + \frac{1}{8} \Delta^2 a_n \dots + \frac{1}{2^\mu} \Delta^{\mu-1} a_n + \frac{1}{2^\mu} \Delta^\mu a_n, \\ S = s_n + a_n + \frac{1}{2} a_{n+1} - \frac{1}{4} \Delta a_{n+1} - \frac{1}{8} \Delta^2 a_{n+1} \dots - \frac{1}{2^\mu} \Delta^{\mu-1} a_{n+1}, \end{cases}$$

à moins de $\frac{1}{2^\mu} \Delta^\mu a_{n+1}$.

Si, de plus, on prend la demi-somme des transformées (h.) et (i.), il viendra, pour celle de l'ordre $\mu+1$, relative au terme a_n et à ses différences successives,

$$(l.) \quad S = s_n + \frac{1}{2} a_n + \frac{1}{4} \Delta a_n + \frac{1}{8} \Delta^2 a_n \dots + \frac{1}{2^\mu} \Delta^{\mu-1} a_n + \frac{1}{2^{\mu+1}} \Delta^\mu a_n \\ + \frac{1}{2^{\mu+1}} (\Delta^{\mu+1} a_n - \Delta^{\mu+1} a_{n+1} + \Delta^{\mu+1} a_{n+2} - \Delta^{\mu+1} a_{n+3} + \text{etc.});$$

et, par conséquent, si les différences $\Delta^{\mu+1} a_n$, $\Delta^{\mu+1} a_{n+1}$, $\Delta^{\mu+1} a_{n+3}$, relatives à cet ordre, continuent à être décroissantes, ce qui exige simplement que celles de l'ordre $\mu+2$ soient toutes positives, on aura

$$(m.) \quad S = s_n + \frac{1}{2} a_n + \frac{1}{4} \Delta a_n + \frac{1}{8} \Delta^2 a_n \dots + \frac{1}{2^\mu} \Delta^{\mu+1} a_n + \frac{1}{2^{\mu+1}} \Delta^\mu a_n,$$

à moins de $\frac{1}{2^{\mu+1}} \Delta^{\mu+1} a_n$.

Cette expression est, à la vérité, plus approchée que ne l'est celle (i.) qui lui correspond dans l'ordre immédiatement inférieur, mais elle pourra l'être moins que (k.), quand sa limite surpassera celle de cette dernière, ou qu'on aura

$$\frac{1}{2^{\mu+1}} \Delta^{\mu+1} a_n > \frac{1}{2^\mu} \Delta^\mu a_{n+1}, \text{ c'est à dire } \Delta^\mu a_n > 3 \Delta^\mu a_{n+1};$$

par conséquent si cette dernière inégalité continue à avoir lieu dans les ordres supérieurs à μ , il sera avantageux, sous le rapport de l'approximation, de substituer $(k.)$ à $(i.)$; ce qui suppose d'ailleurs que l'on ait, pour la première et pour tous ces ordres, $\Delta^\mu a_{n+1} < 3 \Delta^\mu a_{n+2}$. En effet, dès que cette condition cessera d'être satisfaite, on devra remplacer, à son tour, l'expression $(k.)$ par celle qui se rapporte au terme a_{n+2} de la proposée, et ainsi de suite, à mesure qu'on admettra un plus grand nombre de termes de cette dernière série dans les calculs, ou qu'on voudra atteindre des ordres de plus en plus élevés.

8.

On se rappellera, au surplus, d'après ce qui a été dit relativement au cas de $\mu = 1$, $\mu = 2$, que la condition $\Delta^\mu a_n > 3 \Delta^\mu a_{n+1}$, n'offre qu'un indice ou, en quelque sorte, une présomption de la supériorité d'exactitude de la formule $(k.)$ sur celle $(m.)$, et que, pour en acquérir la certitude parfaite, il est nécessaire de recourir aux conditions relatives aux limites inférieures des erreurs qu'on risque de commettre dans chaque cas.

Posant, en effet,

$$\begin{aligned} b_n &= \Delta^\mu a_n - \Delta^\mu a_{n+1} + \Delta^\mu a_{n+2} - \Delta^\mu a_{n+3} + \text{etc.} \\ &= \Delta^{\mu+1} a_n + \Delta^{\mu+1} a_{n+2} + \Delta^{\mu+1} a_{n+4} + \text{etc.}, \\ b'_n &= \Delta^\mu a_n - b_n = \Delta^\mu a_{n+1} - \Delta^\mu a_{n+2} + \Delta^\mu a_{n+3} - \text{etc.} \\ &= \Delta^{\mu+1} a_{n+1} + \Delta^{\mu+1} a_{n+3} + \Delta^{\mu+1} a_{n+5} + \text{etc.}, \\ b_{n+1} &= b_n - b'_{n+1} = \Delta^{\mu+1} a_n - \Delta^{\mu+1} a_{n+1} + \Delta^{\mu+1} a_{n+2} - \Delta^{\mu+1} a_{n+3} + \text{etc.} \\ &= \Delta^{\mu+2} a_n + \Delta^{\mu+2} a_{n+2} + \Delta^{\mu+2} a_{n+4} + \text{etc.}; \end{aligned}$$

de sorte que les restes ou erreurs relatives à $(i.)$, à $(k.)$ et à $(m.)$, seront respectivement représentées par les expressions

$$\frac{1}{2^\mu} b_n, \quad \frac{1}{2^\mu} b'_n, \quad \frac{1}{2^{\mu+1}} b_{n+1},$$

on aura évidemment, d'après les propriétés des séries ci-dessus, supposées convergentes,

$$\begin{aligned} b_n < \Delta^\mu a_n > \Delta^{\mu+1} a_n = \Delta^\mu a_n - \Delta^\mu a_{n+1}, \quad b'_n < \Delta^\mu a_{n+1} > \Delta^{\mu+1} a_{n+1} = \Delta^\mu a_{n+1} - \Delta^\mu a_{n+2}, \\ b_{n+1} < \Delta^{\mu+1} a_n > \Delta^{\mu+2} a_n = \Delta^{\mu+1} a_n - \Delta^{\mu+1} a_{n+1}; \end{aligned}$$

ce qui donne, *a fortiori*,

$$\begin{aligned} \frac{1}{2^{\mu+1}} b_{n+1} &> \frac{1}{2^\mu} b'_n \text{ si } \frac{1}{2^{\mu+1}} \Delta^{\mu+2} a_n > \frac{1}{2^\mu} \Delta^\mu a_{n+1}, \text{ ou } \Delta^\mu a_n > 3 \Delta^\mu a_{n+1} + \Delta^{\mu+1} a_{n+1}, \\ \frac{1}{2^{\mu+1}} b_{n+1} &< \frac{1}{2^\mu} b'_n \text{ si } \frac{1}{2^{\mu+1}} \Delta^{\mu+1} a_n < \frac{1}{2^\mu} \Delta^{\mu+1} a_{n+1}, \text{ ou } \Delta^\mu a_n < 3 \Delta^\mu a_{n+1} - 2 \Delta^\mu a_{n+2}. \end{aligned}$$

Lors donc que cette dernière condition sera satisfaite, on pourra affirmer, *a fortiori*, que l'erreur relative à (*m.*), sera moindre que celle qui se rapporte à (*k.*); et, si c'est, au contraire, la première qui l'est, on sera certain que l'inverse aura précisément lieu. Mais, dans tous les cas où l'on aurait, à la fois

$$\Delta^\mu a_n > 3 \Delta^\mu a_{n+1} - 2 \Delta^\mu a_{n+2} < 3 \Delta^\mu a_{n+1} + \Delta^{\mu+1} a_{n+1},$$

et où par conséquent la valeur de $\Delta^\mu a_n$ se trouverait comprise entre

$$3 \Delta^\mu a_{n+1} - 2 \Delta^\mu a_{n+2} \text{ et } 3 \Delta^\mu a_{n+1} + \Delta^{\mu+1} a_{n+1},$$

on serait complètement incertain quelle est celle des deux expressions (*k.*) ou (*m.*) qui est la plus exacte; du moins ne pourrait on rien prononcer sans un examen circonstancié de la loi que présentent les différences des divers ordres de la proposée,

9.

Or, de cette incertitude même, il résulte une conséquence importante, et qui permet d'obtenir, avec un égal nombre de termes de cette série, une valeur de *S* à la fois plus approchée que celles fournies par (*k.*) et par (*m.*). En effet, puisqu'on a

$$b_{n+1} > 2b'_n \text{ quand } \Delta^\mu a_n > 3 \Delta^\mu a_{n+1} + \Delta^{\mu+1} a_{n+1},$$

$$b_{n+1} < 2b'_n \text{ quand } \Delta^\mu a_n < 3 \Delta^\mu a_{n+1} - 2 \Delta^\mu a_{n+2},$$

il faut que $\Delta^\mu a_n$ se trouve compris entre ces deux dernières limites quand la relation $b_{n+1} = 2b'_n$ est rigoureusement satisfaite; et c'est ce qui arrive précisément lorsque μ et n ont été choisis de façon qu'on ait sensiblement $\Delta^\mu a_n = 3 \Delta^\mu a_{n+1}$. La différence entre b_{n+1} et $2b'_n$, n'étant donc alors qu'une fraction assez petite de chacune d'elles, et l'expression $\frac{1}{2^{\mu+2}}(b_{n+1} - 2b'_n)$ de l'erreur relative à la moyenne de (*k.*) et de (*m.*), ne dépendant que de cette différence, il faut que cette moyenne s'approche aussi d'avantage de la vraie valeur de *S* que ne le font séparément (*k.*) et (*m.*).

10.

Du reste, il est facile de voir, attendu que les expressions de b_{n+1} et b'_n constituent des séries convergentes du genre de la proposée, que les quantités

$$\frac{1}{2^{\mu+2}}(\Delta^\mu a_n - 3 \Delta^\mu a_{n+1} + 2 \Delta^\mu a_{n+2}), \quad \frac{1}{2^{\mu+2}}(\Delta^\mu a_n - 3 \Delta^\mu a_{n+1} - \Delta^{\mu+1} a_{n+1})$$

sont précisément (1.) les limites de l'erreur qu'on risque de commettre en adoptant, pour *S*, la moyenne des valeurs données par (*k.*) et par (*m.*); c'est-à-dire qu'on a

$$\begin{aligned} \frac{1}{2^{\mu+2}}(b_n - 3b'_n) &< \frac{1}{2^{\mu+2}}(\Delta^\mu a_n - 3\Delta^\mu a_{n+1} + 2\Delta^\mu a_{n+2}) \\ &< \frac{1}{2^{\mu+2}}(\Delta^\mu a_n - 3\Delta^\mu a_{n+1} - \Delta^{\mu+1} a_{n+1}). \end{aligned}$$

Dans le cas particulier où μ et n sont tels que $\Delta^\mu a_n = 3\Delta^\mu a_{n+1}$ rigoureusement, les limites ci-dessus deviennent respectivement :

$$\frac{1}{2^{\mu+1}} \Delta^\mu a_{n+2}, \quad -\frac{1}{2^{\mu+2}} \Delta^{\mu+1} a_{n+1},$$

dont la plus grande, si on les prend abstraction faite du signe, surpasse évidemment la valeur absolue de l'erreur, et se trouve, en effet, être moindre que les limites supérieures

$$\frac{1}{2^\mu} \Delta^\mu a_{n+1}, \quad \frac{1}{2^{\mu+1}} \Delta^{\mu+1} a_n = \frac{1}{2^{\mu+1}} (\Delta^\mu a_n - \Delta^\mu a_{n+1}) = \frac{1}{2^\mu} \Delta^\mu a_{n+1},$$

des erreurs relatives aux expressions (k.) et (m.).

11.

Quant à l'expression générale et rigoureuse de l'erreur relative à la moyenne de (k.) et de (m.), on peut lui donner successivement les formes suivantes, qui nous paraissent également dignes de remarque, et dont la loi est facile à saisir :

$$\begin{aligned} &\frac{1}{2^{\mu+2}}(b_{n+1} - 2b'_n) \\ &= \frac{1}{2^{\mu+2}}(\Delta^{\mu+1} a_n - 3\Delta^{\mu+1} a_{n+1} + \Delta^{\mu+1} a_{n+2} - 3\Delta^{\mu+1} a_{n+3} + \Delta^{\mu+1} a_{n+4} - 3\Delta^{\mu+1} a_{n+5} + \text{etc.}) \\ &= \frac{1}{2^{\mu+2}}[\Delta^\mu a_n - 3\Delta^\mu a_{n+1} - (\Delta^\mu a_{n+1} - 3\Delta^\mu a_{n+2}) + (\Delta^\mu a_{n+2} - 3\Delta^\mu a_{n+3}) - (\Delta^\mu a_{n+3} - 3\Delta^\mu a_{n+4}) + \text{etc.}] \\ &= \frac{1}{2^{\mu+2}}[\Delta^\mu a_n - 4(\Delta^\mu a_{n+1} - \Delta^\mu a_{n+2} + \Delta^\mu a_{n+3} - \Delta^\mu a_{n+4} + \Delta^\mu a_{n+5} - \text{etc.})]. \end{aligned}$$

On trouverait, au surplus, facilement des limites de cette erreur, beaucoup plus resserrées que celles qui ont été rapportées ci-dessus, en faisant intervenir, dans leur expression, un plus grand nombre de termes des séries qui en représentent la valeur *); mais le calcul de ces limites

*) On a, en effet (8.),

$$2b_{n+1} = 2\Delta^\mu a_{n+1} - (2\Delta^\mu a_{n+2} - 2\Delta^\mu a_{n+3} + 2\Delta^\mu a_{n+4} - \text{etc.}) = 2\Delta^\mu a_{n+1} - \delta,$$

$$b_n - b_{n+1} = \Delta^{\mu+1} a_n - (\Delta^{\mu+1} a_{n+1} - \Delta^{\mu+1} a_{n+2} + \Delta^{\mu+1} a_{n+3} - \text{etc.}) = \Delta^{\mu+1} a_n - \delta';$$

et, attendu que les séries δ et δ' sont censées convergentes (2.),

$$\delta < 2\Delta^\mu a_{n+2} - \Delta^\mu a_{n+3} > 2\Delta^{\mu+1} a_{n+2}, \quad \delta' < \Delta^{\mu+1} a_{n+1} - \frac{1}{2}\Delta^{\mu+1} a_{n+2} > \Delta^{\mu+2} a_{n+1};$$

ce qui donne, en général,

devenant de plus en plus laborieux, il sera préférable, en général, de s'en tenir aux précédentes qui suffiront, dans la plupart des cas, pour donner une idée du degré d'approximation obtenu, si, mieux encore, on ne préfère, dans la vue d'éviter tout à fait ce calcul lors des applications numériques, de déterminer immédiatement les valeurs de $(i.)$ et de $(k.)$, pour en conclure celle de leur moyenne arithmétique $(m.)$, puis enfin celle de la moyenne semblable relative à $(m.)$ et à $(k.)$. En effet, les chiffres décimaux communs à ces derniers nombres, mettront en état d'apprécier, à moins d'une demi-unité du dernier de ces chiffres, le degré d'exactitude obtenu.

12.

Les discussions qui précèdent indiquent la marche à suivre, dans chaque circonstance particulière, pour tirer un parti avantageux du mode de transformation proposé, et notamment pour arriver au plus grand degré d'approximation possible eu égard au nombre des termes employés dans les calculs. Mais on abrégera beaucoup ces discussions au moyen des considérations qui suivent.

On remarquera, en effet, que la série proposée $(a.)$ étant censée donnée par la loi régulière de ses termes, du moins à partir de a_n , qui peut être indifféremment positif ou négatif, puisqu'il n'y a qu'un simple changement de signe à opérer, on connaîtra aussi la loi des différences des divers ordres relatives au terme général a_η , de cette série, dont le rang est marqué par η , ce qui donnera l'expression de $\Delta^\mu a_n$, $\Delta^\mu a_{n+1}$ en fonction de η , de μ et de constantes, et par suite, celle de leur rapport que nous représenterons par $\varphi(\mu, \eta) : \psi(\mu, \eta)$, en le supposant réduit à son expression la plus simple. Posant ensuite

$$\frac{\varphi(\mu, \eta)}{\psi(\mu, \eta)} = \zeta, \text{ ou } \varphi(\mu, \eta) - \zeta \psi(\mu, \eta) = 0,$$

cette équation, qui est à trois variables, fera connaître la loi qui lie en-

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2^{\mu+2}}(b_n - b_{n+1} - 2b_{n+1}) \\ &= \frac{1}{2^{\mu+2}}(\delta - \delta') < \frac{1}{2^{\mu+2}}(2\Delta^\mu a_{n+2} - \Delta^\mu a_{n+3} - \Delta^{\mu+2} a_{n+1}) > \frac{1}{2^{\mu+2}}(2\Delta^{\mu+1} a_{n+2} - \Delta^{\mu+1} a_{n+1} + \frac{1}{2}\Delta^{\mu+1} a_{n+2}) \\ & \text{on, par les transformations relatives aux différences,} \\ & \frac{1}{2^{\mu+2}}(b_n - 3b_{n+1}) < \frac{1}{2^{\mu+2}}(2\Delta^{\mu+1} a_{n+2} - \Delta^{\mu+1} a_{n+1} + \frac{1}{2}\Delta^{\mu+1} a_{n+2}) > \frac{1}{2^{\mu+2}}(2\Delta^{\mu+1} a_{n+2} - \Delta^{\mu+1} a_{n+1} + \frac{1}{2}\Delta^{\mu+1} a_{n+2}). \end{aligned}$$

trèux les nombres ζ , μ et η , et pourra tenir lieu complètement de la série proposée, du moins à compter de a_n , si l'on a soin de n'y attribuer à μ et à η que des valeurs entières et positives.

En premier lieu, elle mettra à même de reconnaître, sur le champ, si la valeur de ζ est constamment décroissante, dans chaque ordre μ de différences, avec le nombre η qui marque le rang des termes, et à partir dequel terme cette circonstance a précisément lieu; ce qui est indispensable pour l'application de la méthode qui nous occupe.

Posant enfin l'équation

$$\varphi(\mu, \eta) - 3\psi(\mu, \eta) = 0,$$

qui peut être censée représenter une courbe plane aux coordonnées rectangulaires μ et η , lorsque la première représente une surface toute entière aux coordonnées ζ , μ et η , elle fera pareillement connaître, pour chaque ordre de différences, le rang η du terme passé lequel l'inégalité $\Delta^\mu a_\eta < 3 \Delta^\mu a_{\eta+1}$ va se changer en l'inégalité inverse $\Delta^\mu a_\eta > 3 \Delta^\mu a_{\eta+1}$ et réciproquement.

13.

Supposant notamment qu'on se donne le rang n du terme de la série proposée qu'on veut soumettre aux transformations dont il sagit, l'équation

$$\varphi(\mu, n) - 3\psi(\mu, n) = 0$$

résolue par rapport à μ fera découvrir l'ordre μ auquel on doit arrêter ces transformations pour être certain qu'on a constamment $\Delta^\mu a_n < 3 \Delta^\mu a_{n+1}$ depuis $\mu = 0$ jusqu'à $\mu = \mu' - 1$, c'est-à-dire dans tous les ordres inférieurs à μ' ; ce qui est indispensable, comme on l'a vu (7.), pour que la formule (i.) soit d'une application avantageuse. Il ne s'agira, en effet, que de prendre pour μ' un nombre entier inférieur ou tout au plus égal à la plus grande des racines positives de l'équation ci-dessus; car la fonction $\varphi(\mu, n) - 3\psi(\mu, n)$ ne pouvant, dès lors, changer de signe pour les valeurs de μ comprises entre μ' et 0, elle sera constamment négative si seulement elle l'est pour $\mu = 0$; ce qui a lieu, par hypothèse, puisqu'autrement on devrait, d'après nos principes, substituer au terme a_n de la proposée, quelqu'un de ceux qui le suivent.

Mais, afin d'être positivement assuré que la valeur donnée par la formule (i.), lorsqu'on y suppose $\mu = \mu'$, est la plus approchée possible, il faudra, en outre, examiner (6.) si, pour toutes les valeurs entières de μ comprises depuis $\mu = 1$ jusqu'à $\mu = \mu'$, on a constamment

$$\zeta \text{ ou } \frac{p(\mu, n)}{\chi(\mu, n)} < 2 \text{ ou tout au plus } = 2:$$

condition facile à vérifier, mais qui n'est point absolue, et qui pourra être supplée avantageusement par les considérations qui ressortent directement de l'équation

$$\varphi(\mu, \eta) - 3\psi(\mu, \eta) = 0.$$

En effet si le nombre n égale ou surpasse la plus grande des racines positives de cette équation, lorsqu'on y donne successivement à μ toutes les valeurs entières comprises depuis $\mu = 0$ jusqu'à $\mu = \mu'$, l'expression qui constitue son premier membre, et par conséquent la différence $\Delta^\mu a_\eta - 3\Delta^\mu a_{\eta+1}$ conserveront un signe invariable dans la même étendue, et cela depuis $x = n$ jusqu'à η infini; ce signe sera d'ailleurs négatif puisque, par hypothèse, on a

$$\Delta^0 a_n < 3\Delta^0 a_{n+1} \text{ ou } a_n < 3a_{n+1}.$$

Donc aussi on pourra affirmer, avec certitude, que, depuis l'ordre $\mu = 0$ jusqu'à l'ordre $\mu = \mu' - 1$, la valeur de $(m.)$ est constamment plus approchée que celle $(k.)$, attendu que, pour tout cet intervalle la quantité

$\Delta^{\mu+1} a_n - 3\Delta^{\mu+1} a_{n+1} + \Delta^{\mu+1} a_{n+2} - 3\Delta^{\mu+1} a_{n+3} + \Delta^{\mu+1} a_{n+4} - 3\Delta^{\mu+1} a_{n+5} + \text{etc.}$, qui représente (6. et 11.) la valeur de $b_{n+1} - 2b'_n$, sera elle même négative, et par conséquent $b_{n+1} < 2b'_n$.

Quant à l'ordre μ' , il est aisé de voir qu'il arrivera généralement, à moins que n ne corresponde précisément à une maximum absolu de x dans l'équation indéterminée

$$\varphi(\mu, \eta) - 3\psi(\mu, \eta) = 0,$$

que l'on aura $\Delta^{\mu+1} a_\eta > 3\Delta^{\mu+1} a_{\eta+1}$ tout au moins pour $x = n$. Car ayant choisi, par l'hypothèse, μ' de façon que $\varphi(\mu', n) - 3\psi(\mu', n)$ soit nul ou très petit, la quantité $\varphi(\mu, n) - 3\psi(\mu', n)$ changera de signe dans le passage de $\mu = \mu' - 1$ à $\mu = \mu' + 1$; on ne pourra donc plus affirmer que b_{n+1} est plus petit que $2b'_n$, ou $(m.)$ plus exact que $(k.)$ pour l'ordre μ' dont il sagit; ce qui fera retomber dans le cas d'indécision mentionné au No. 9., et conduira à prendre, pour la valeur S de la série proposée, la moyenne arithmétique entre ces dernières quantités.

14.

La discussion qui vient de nous occuper, se simplifie beaucoup, dans la plupart des applications, soit parceque les fonctions $\varphi(\mu, \eta)$, $\psi(\mu, \eta)$ ont elles mêmes une forme très simple, soit parcequ'on prétend se

borner aux premiers ordres de différences ou aux premiers termes de la série proposée. Mais, avant de passer aux exemples numériques qui sont indispensables pour en bien saisir l'esprit, il ne sera pas inutile de montrer comment on peut transformer les expressions de (i.) et de (k.) en d'autres qui ne dépendent directement que des termes mêmes de la série proposée.

Il ne s'agit, pour cela, que d'y remplacer les différences qui y entrent, par leurs valeurs en fonction de ces termes; ce qui leur donnera évidemment la forme

$$(i'.) \quad S = s_n + \frac{1}{2^\mu} (\alpha_1 a_n - \alpha_2 a_{n+1} + \alpha_3 a_{n+2} \dots \pm \alpha_{\mu-1} a_{n+\mu-2} \mp \alpha_\mu a_{n+\mu-1}),$$

$$(k'.) \quad S = s_n + \frac{1}{2^\mu} (2^\mu a_n - \alpha_1 a_{n+1} + \alpha_2 a_{n+2} \dots \pm \alpha_{\mu-2} a_{n+\mu-2} \mp \alpha_{\mu-1} a_{n+\mu-1}),$$

en réduisant tous les termes, indépendans de s_n , au même dénominateur 2^μ , et $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_\mu$ étant des coefficients numériques à déterminer.

Or, d'après la nature de ces expressions de S , la seconde doit (7.) être égale à la première augmentée de $\frac{1}{2^\mu} \Delta^\mu a_n$, ou, si l'on veut, on doit avoir identiquement

$$(2^\mu - \alpha_1) a_n - (\alpha_1 - \alpha_2) a_{n+1} + (\alpha_2 - \alpha_3) a_{n+2} \dots$$

$$\dots \pm (\alpha_{\mu-2} - \alpha_{\mu-1}) a_{n+\mu-2} \mp (\alpha_{\mu-1} - \alpha_\mu) a_{n+\mu-1} \pm a_n a_{n+\mu} = \Delta^\mu a_n;$$

et, comme, d'après les principes connus du calcul des différences finies, différences qu'il convient ici de prendre (1.) dans un ordre inverse,

$$\begin{aligned} \Delta^\mu a_n &= a_n - \frac{\mu}{1} a_{n+1} + \frac{\mu(\mu-1)}{1.2} a_{n+2} - \frac{\mu(\mu-1)(\mu-2)}{1.2.3} a_{n+3} \\ &\quad + \frac{\mu(\mu-1)(\mu-2)(\mu-3)}{1.2.3.4} a_{n+4} - \text{etc.}, \end{aligned}$$

il faut qu'on ait séparément

$$2^\mu a_1 = 1, \quad \alpha_1 - \alpha_2 = \frac{\mu}{1}, \quad \alpha_2 - \alpha_3 = \frac{\mu(\mu-1)}{1.2}, \quad \alpha_3 - \alpha_4 = \frac{\mu(\mu-1)(\mu-2)}{1.2.3}, \dots$$

et, en général

$$\alpha_{m-1} - \alpha_m = \frac{\mu(\mu-1)(\mu-2)\dots(\mu-m+2)}{1.2.3\dots(m-1)}.$$

On tire successivement, de ces équations,

$$\alpha_1 = 2^\mu - 1, \quad \alpha_2 = 2^\mu - 1 - \frac{\mu}{1}, \quad \alpha_3 = 2^\mu - 1 - \frac{\mu}{1} - \frac{\mu(\mu-1)}{1.2},$$

$$\alpha_4 = 2^\mu - 1 - \frac{\mu(\mu-1)}{1.2} - \frac{\mu(\mu-1)(\mu-2)}{1.2.3},$$

et ainsi de suite: ce qui donne, pour le coefficient d'un rang quelconque m ,

$$a_m = 2^\mu - 1 - \frac{\mu}{1} - \frac{\mu(\mu-1)}{1.2} - \frac{\mu(\mu-1)(\mu-2)}{1.2.3} \dots - \frac{\mu(\mu-1)(\mu-2)\dots(\mu-m+2)}{1.2.3\dots(m-1)},$$

expression dont la partie négative n'est autre chose que la somme des m premiers termes du développement de $(1+1)^\mu$.

15.

En observant d'ailleurs que, dans ce développement, les termes placés à égale distance des extrêmes, ont la même valeur, on pourra abréger notablement le calcul des coefficients dont il sagit.

Comparant, en effet, l'expression ci-dessus de α_m avec le développement de $(1+1)^\mu = 2^\mu$, on trouvera, sans difficultés,

$$\alpha_m = 1 + \frac{\mu}{1} + \frac{\mu(\mu-1)}{1.2} + \frac{\mu(\mu-1)(\mu-2)}{1.2.3} \dots + \frac{\mu(\mu-1)(\mu-2)\dots[\mu-(\mu-m-1)]}{1.2.3 \dots (\mu-m)},$$

nouvelle expression qui est la somme des $\mu - m + 1$ derniers termes du développement de $(1+1)^\mu$ pris en allant de la droite vers la gauche. Et comme le nombre total des coefficients $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \dots$ à calculer, est précisément μ , on voit que, pour obtenir la valeur de celui $\alpha_{\mu-m}$, qui occupe le m^e rang à partir de α_μ en allant vers la gauche, il ne s'agira que de changer $\mu - m$ en $m - 1$ dans l'expression de α_m trouvée en dernier lieu; ce qui donne

$$\alpha_{\mu-m} = 1 + \frac{\mu}{2} + \frac{\mu(\mu-1)}{1.2} + \frac{\mu(\mu-1)(\mu-2)}{1.2.3} \dots + \frac{\mu(\mu-1)(\mu-2)\dots(\mu-m-2)}{1.2.3 \dots (m-1)},$$

et, par suite,

$$\alpha_m + \alpha_{\mu-m} = 2^\mu.$$

Ainsi donc, ayant une fois calculé la première moitié des coefficients $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_\mu$, l'autre moitié s'en conclura, sur le champ, par une simple soustraction; le terme du milieu, quand μ est impair, ayant précisément pour valeur $\frac{1}{2} 2^\mu = 2^{\mu-1}$.

Soit, pour exemple, $\mu = 6$, on aura d'abord, en partant de α_6 ou $m = 0$,

$$\alpha_6 = 1, \quad \alpha_5 = 1 + \frac{\mu}{1} = 7, \quad \alpha_4 = 1 + \frac{\mu}{1} + \frac{\mu(\mu-1)}{1.2} = 7 + 15 = 22;$$

$$\text{puis } \alpha_3 = 2^6 - \alpha_4 = 64 - 22 = 42, \quad \alpha_2 = 64 - 7 = 57, \quad \alpha_1 = 64 - 1 = 63.$$

16.

Calculant ainsi successivement la valeur des coefficients de la formule (i') ci-dessus lorsque μ devient 0, 1, 2, 3, etc., on trouvera, pour l'ordre

$$(i.) \left\{ \begin{array}{l} \mu=0, S=s_n; \\ \mu=1, S=s_n + \frac{1}{2}a_n, \\ \mu=2, S=s_n + \frac{1}{4}(3a_n - a_{n+1}), \\ \mu=3, S=s_n + \frac{1}{8}(7a_n - 4a_{n+1} + a_{n+2}), \\ \mu=4, S=s_n + \frac{1}{16}(15a_n - 11a_{n+1} + 5a_{n+2} - a_{n+3}), \\ \mu=5, S=s_n + \frac{1}{32}(31a_n - 26a_{n+1} + 16a_{n+2} - 6a_{n+3} + a_{n+4}), \\ \mu=6, S=s_n + \frac{1}{64}(63a_n - 57a_{n+1} + 42a_{n+2} - 22a_{n+3} + 7a_{n+4} - a_{n+5}), \\ \mu=7, S=s_n + \frac{1}{128}(127a_n - 120a_{n+1} + 99a_{n+2} - 64a_{n+3} + 29a_{n+4} - 8a_{n+5} + a_{n+6}), \\ \dots \end{array} \right.$$

relations donc la loi de dérivation est manifeste, et qui pourront être poussés aussi loin qu'on le voudra, en remarquant que le coefficient numérique d'un terme quelconque de l'une d'elles, est la somme du coefficient de même rang dans la précédente et de celui du terme placé immédiatement avant, pris tous deux abstraction faite du signe; le coefficient du premier terme de chaque parenthèse étant d'ailleurs égal à $2^\mu - 1$, et les signes étant réglés d'après ceux des termes correspondans de la série proposée (a.). Ainsi, par exemple, pour $\mu = 7$, on trouve $127 = 2^7 - 1$; $120 = 63 + 57$, $99 = 57 + 42$, $64 = 42 + 22$, $29 = 22 + 7$, $8 = 7 + 1$.

Remplaçant ensuite n par $n + 1$ dans ces formules, et changeant le signe des parenthèses, on obtiendra les valeurs correspondantes de S relatives à la formule (k'), qui d'ailleurs pécheront par excès, celles qui précèdent pèchant par défaut.

17.

Quant aux expressions relatives à la formule (m.), elles seront les mêmes que les précédentes, à cela près que μ se trouvera augmenté d'une unité. Enfin, si l'on prend les moyennes respectives entre ces dernières expressions et celles dont il vient d'être parlé, on obtiendra les formules suivantes que nous désignerons par (l'), et qui se rapportent au cas d'indécision, souvent rappelé, pour lequel n et μ ont été choisis de façon que la condition $\Delta^\mu a_n = 3 \Delta^\mu a_{n+1}$ se trouve satisfait rigoureusement ou approximativement:

$$(l') \left\{ \begin{array}{l} \mu=0, S=s_n+\frac{1}{4} 3a_n, \\ \mu=1, S=s_n+\frac{1}{8} (7a_n-3a_{n+1}), \\ \mu=2, S=s_n+\frac{1}{16} (15a_n-10a_{n+1}+3a_{n+2}), \\ \mu=3, S=s_n+\frac{1}{32} (31a_n-25a_{n+1}+13a_{n+2}-3a_{n+3}), \\ \mu=4, S=s_n+\frac{1}{64} (63a_n-56a_{n+1}+38a_{n+2}-16a_{n+3}+3a_{n+4}), \\ \mu=5, S=s_n+\frac{1}{128} (127a_n-119a_{n+1}+94a_{n+2}-54a_{n+3}+19a_{n+4}-3a_{n+5}), \\ \mu=6, S=s_n+\frac{1}{256} (255a_n-246a_{n+1}+213a_{n+2}-148a_{n+3}+73a_{n+4}-42a_{n+5}+3a_{n+6}), \\ \dots \end{array} \right.$$

On remarquera, en outre, que ces relations sont soumises aux mêmes lois de dérivation que les précédentes; ce qui permet d'en prolonger le tableau indéfiniment; les signes des termes qui y entrent étant toujours ceux des termes correspondans de la série proposée.

Applications numériques aux séries peu convergentes.

18.

Soit, en premier lieu, la série très peu convergente,

$s=1-\frac{1}{3}+\frac{1}{5}-\frac{1}{7}+\frac{1}{9}-\dots\pm\frac{1}{2n+1}\mp\frac{1}{2n+3}\pm\frac{1}{2n+5}\mp\frac{1}{2n+7}\pm\frac{1}{2n+9}\mp$ etc. dont il faudrait calculer près de 50000 termes pour en obtenir, à moins de 0,00001, la valeur qui représente, comme on sait, le nombre $\frac{\pi}{4}$ ou 0,785 398 163 .... égal au quart du rapport de la circonférence au diamètre. On trouvera, sans difficultés, en ne prenant (1.) que les valeurs absolues des différences,

$$\Delta^0 a_n = \frac{1}{2n+1}, \quad \Delta^1 a_n = \frac{1.2}{(2n+1)(2n+3)}, \quad \Delta^2 a_n = \frac{1.2.4}{(2n+1)(2n+3)(2n+5)},$$

$$\Delta^3 a_n = \frac{1.2.4.6}{(2n+1)(2n+3)(2n+5)(2n+7)}, \dots, \quad \Delta^\mu a_n = \frac{1.2.4\dots 2\mu}{(2n+1)(2n+3)(2n+5)\dots(2n+2\mu+1)}.$$

La loi de ces différences est manifeste, et elles vont constamment en décroissant à mesure qu'augmentent, soit le nombre n qui marque le rang du terme auquel elles se rapportent, soit le nombre μ qui marque l'ordre de chaque différence.

Prenant, pour chacun de ces ordres, le rapport de la différence du terme a_n à celle du terme suivant a_{n+1} , qui s'en déduit en y changeant simplement n en $n+1$, on aura évidemment

$$\frac{\Delta^0 a_n}{\Delta^0 a_{n+1}} = \frac{2n+3}{2n+1}, \quad \frac{\Delta a_n}{\Delta a_{n+1}} = \frac{2n+5}{2n+1}, \quad \frac{\Delta^2 a_n}{\Delta^2 a_{n+1}} = \frac{2n+7}{2n+1}, \quad \dots$$

$$\dots \quad \frac{\Delta^\mu a_n}{\Delta^\mu a_{n+1}} = \frac{2n+2\mu+3}{2n+1}.$$

Posant enfin l'équation

$$\zeta = \frac{\Delta^\mu a_n}{\Delta^\mu a_{n+1}} = \frac{2n+2\mu+3}{2n+1} = 3, \quad \text{ou} \quad \mu - 2n = 0,$$

qui représente, sans changement de signe, celle $\phi(\mu, x) - 3\psi(\mu, \eta) = 0$ dont il a été question au No. 12., lorsqu'on y suppose $\eta = n$, elle fera connaître l'ordre μ auquel on doit arrêter les transformations de la série proposée pour qu'ayant $\Delta^\mu a_n < 3\Delta^\mu a_{n+1}$, de $\mu = 0$ à $\mu = 2n-1$, on ait, au contraire, $\Delta^\mu a_n > 3\Delta^\mu a_{n+1}$ quand on passe de l'ordre $\mu = 2n$, à l'ordre $\mu = 2n+1$. Il arrive effectivement ici que la fonction $\mu - 2n$ ou $\Delta^\mu a_n - 3\Delta^\mu a_{n+1}$ reste constamment négative pour toutes les valeurs de μ inférieures à $2n$, et devient positive pour toutes celles qui surpassent cette même quantité.

D'ailleurs, si l'on remplace (13.) n par η dans l'équation $\mu - 2n = 0$, ce qui donne, en général, $\mu - 2\eta = 0$, il paraîtra évident que, pour tous les ordres μ inférieurs à $2n+1$, on a constamment $\Delta^\mu a_\eta < 3\Delta^\mu a_{\eta+1}$ de $\eta = n$ à $\eta = \infty$, tandis que, pour cet ordre lui même, auquel répond l'équation $2n+1 - 2\eta = 0$, l'inégalité dont il s'agit, n'est satisfaite qu'à partir de $\eta = n+1$, la valeur $\eta = n$ donnant, au contraire, $2n+1 - 2 > 0$ ou $\Delta^{2n+1} a_n > 3\Delta^{2n+1} a_{n+1}$. On est donc assuré que, pour tous les ordres μ inférieurs à $2n+1$, les valeurs données par la formule (i.) ou (i') sont les plus approchées possible eu égard au nombre des termes qui y entrent, tandis que l'on ne peut plus rien affirmer relativement à l'ordre $2n+1$ lui même, ainsi qu'à tous les ordres suivans. Ce sera donc le cas de se servir, pour calculer la somme S de la série proposée, de celle des formules (i'') du No. 14. ci-dessus, qui se rapporte à l'ordre $\mu = 2n$.

19.

Supposant, en particulier $n = 0$, ce qui revient à prendre

$$S_n = 0, \quad a_n = 1, \quad a_{n+1} = \frac{1}{2}, \quad a_{n+2} = \frac{1}{3} \text{ etc.},$$

l'équation ci-dessus donnera $\mu = 0$, et la première des formules citées

$$S = s_n + \frac{3}{4}a_n = 0.75;$$

valeur exacte à moins de $\frac{1}{12}$.

Supposant ensuite

$$n = 1 \text{ ou } s_n = 1, \quad a_n = \frac{1}{3}, \quad a_{n+1} = \frac{1}{5}, \quad a_{n+2} = \frac{1}{7},$$

on trouvera $\mu = 2$, et, par la 3^{me} des formules (I'),

$$S = s_n - \frac{1}{12}(15a_n - 10a_{n+1} + 3a_{n+2}) = 0,785714,$$

à moins de 0,00633.

Pour obtenir un pareil degré d'approximation à l'aide du procédé direct, il faudrait calculer au delà des 3000 premiers termes de la série.

Supposant enfin

$$n = 2 \text{ ou } s_n = 1 - \frac{1}{3}, \quad a_n = \frac{1}{5}, \quad a_{n+1} = \frac{1}{7}, \quad a_{n+2} = \frac{1}{9}, \quad a_{n+3} = \frac{1}{11}, \quad a_{n+4} = \frac{1}{13},$$

il viendra

$$\mu = 2n = 4$$

$$\text{et } S = s_n + \frac{1}{64}(63a_n - 56a_{n+1} + 38a_{n+2} - 16a_{n+3} + 3a_{n+4}) = 0,7853924;$$

valeur exacte, jusqu'à la 5^e décimale.

20.

En recherchant directement les limites de l'erreur qui se rapporte à ce dernier nombre, on trouvera (10.)

$$\frac{1}{2^{\mu+2}}(b_{n+1} - 2b'_n) < \frac{1}{2^{\mu+1}}\Delta^{\mu}a_{n+2} = 0,00003667 > - \frac{1}{2^{\mu+2}}\Delta^{\mu+1}a_{n+1} = -0,0000261,$$

attendu qu'on a ici rigoureusement $\Delta^{\mu}a_n = 3\Delta^{\mu}a_{n+1}$, et d'ailleurs

$$\Delta^{\mu}a_{n+2} = \Delta^4a_4 = \frac{1.2.4.6.8}{9.11.13.15.17}, \quad \Delta^{\mu+1}a_{n+1} = \Delta^5a_3 = \frac{1.2.4.6.8.10}{7.9.11.13.15.17}.$$

Ces limites surpassent, comme on voit, de beaucoup l'erreur effective dont la valeur, *positive*, est moindre que 0,0000058; mais, si l'on en prend la demi-somme algébrique, le résultat qu'on peut considérer comme l'expression de l'erreur probable, bien qu'un peu faible, donnera une valeur très approchée de l'erreur effective, ce qui tient ici à ce que la série $\Delta^{\mu}a_n - 3\Delta^{\mu}a_{n+1} - (\Delta^{\mu}a_{n+1} - 3\Delta^{\mu}a_{n+2}) + (\Delta^{\mu}a_{n+2} - 3\Delta^{\mu}a_{n+3}) - (\Delta^{\mu}a_{n+3} - 3\Delta^{\mu}a_{n+4}) + \text{etc.}$ qui entre (11.) dans l'expression de cette erreur, est aussi peu convergente que la proposée, et a, en conséquence (2.), pour valeur très approchée, la quantité

$$\Delta^{\mu}a_n - 3\Delta^{\mu}a_{n+1} - \frac{1}{2}(\Delta^{\mu}a_{n+1} - 3\Delta^{\mu}a_{n+2}),$$

qui est précisément (10.) la moyenne arithmétique des limites ci-dessus de l'erreur.

En substituant d'ailleurs, aux différences des divers ordres qui entrent dans la série dont il s'agit, les valeurs numériques qui leur appar-

tiennent, on obtiendra, pour l'expression rigoureuse de l'erreur ou du complément de la valeur de S qui nous occupe,

$$\frac{1}{2^{\mu+2}}(b_{n+1} - 2b'_n) =$$

$$2^4 \left(\frac{2}{9.11.13.15.17.19} - \frac{3}{11.13.15.17.19.21} + \frac{4}{13.15.17.19.21.23} - \frac{5}{15.17.19.21.23.25} + \text{etc.} \right).$$

série, en effet, très peu convergente, et qu'on pourrait, à son tour, traiter comme la proposée, mais qu'il nous suffit ici d'avoir signalée.

En appliquant sa méthode au cas qui nous occupe, *Euler* *) est parvenu à la transformée indéfinie

$$S = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{3} + \frac{1.2}{3.5} + \frac{1.2.3}{3.5.7} + \frac{1.2.3.4}{3.5.7.9} + \text{etc.} \right),$$

qui est donnée par la formule (i.) appliquée au 1^{er} terme de la série proposée, et dont il faudrait calculer au moins les 14 premiers termes pour obtenir un degré d'approximation égal à celui que comporte la valeur 0,785924 trouvée en dernier lieu.

21.

On arrive à des résultats analogues en considérant la série

$$S = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} \dots \pm \frac{1}{n+1} \mp \frac{1}{n+2} \pm \frac{1}{n+3} \mp \text{etc.}$$

Qui représente le logarithme népérien de 2, et à laquelle *Euler* à également appliqué sa formule de transformation aux endroits cités. On trouve, en effet,

$$\frac{\Delta^\mu a_n}{\Delta^\mu a_{n+1}} = \frac{n+\mu+2}{n+1} = 1 + \frac{\mu-1}{n+1},$$

rapport qui converge sans cesse vers l'unité à mesure que n augmente, et qui devient précisément égal à 3 quand on a

$$\mu = 2n + 1.$$

Prenant, par exemple,

$n = 2$ ou $s_n = 1 - \frac{1}{2}$, $a_n = \frac{1}{3}$, $a_{n+1} = \frac{1}{4}$, $a_{n+2} = \frac{1}{5}$, $a_{n+3} = \frac{1}{6}$, etc., il viendra $\mu = 5$, et par la 6^e des formules (l') du No. 17.,

$$S = s_n + \frac{1}{2^{5/2}} (255 a_n - 246 a_{n+1} + 213 a_{n+2} - 148 a_{n+3} + 73 a_{n+4} - 22 a_{n+5} + 3 a_{n+6}) \\ = 0,69314546$$

valeur exacte à moins de 0,000002, et qu'on n'obtiendrait, par le procédé direct, qu'en calculant au delà des 558000 premiers termes de la série proposée.

---

*) *Institutiones calculi differentialis*, page 237. *Traité de calcul différentiel et intégral* de Mr. Lacroix, Tome III. page 349.

22.

Soit enfin la série

$$S = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1.3}{2.4} - \frac{1.3.5}{2.4.6} + \frac{1.5.5.7}{2.4.6.8} \dots$$

$$\dots \pm \frac{1.3.5 \dots (2n-1)}{2.4.6 \dots 2n} \mp \frac{1.3.5 \dots (2n-1)(2n+1)}{2.4.6 \dots 2n(2n+2)} + \text{etc.}$$

qui représente, comme on sait, le développement de $(1+1)^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{2}\sqrt{2} = 0,7071067$. En posant, pour abrégier,

$$\frac{1.3.5 \dots (2n-1)}{2.4.6 \dots 2n} = k,$$

on trouvera, sans difficultés,

$$\Delta^\mu a_n = k \cdot \frac{1.3.5 \dots (2\mu-1)}{(2n+2)(2n+4)(2n+6) \dots (2n+2\mu)},$$

$$\Delta^\mu a_{n+1} = k \cdot \frac{1.3.5 \dots (2\mu-1)(2\mu+1)}{(2n+2)(2n+4)(2n+6) \dots (2n+2\mu)(2n+2\mu+2)},$$

et, par suite (11.),

$$\zeta = \frac{\Delta^\mu a_n}{\Delta^\mu a_{n+1}} = \frac{2n+2\mu+2}{2n+1}.$$

Ce rapport devient égal à 3 (12.), quand

$$2n+2\mu+2-3(2n+1) = 0 \quad \text{ou} \quad 2\mu-4n-1 = 0;$$

ce qui ne peut avoir lieu rigoureusement pour aucun des termes ni pour aucune des différences concernant la série proposée.

Supposant, par exemple,

$$n = 1 \text{ ou } s_n = 1, \quad a_n = \frac{1}{2}, \quad a_{n+1} = \frac{1.3}{2.4}, \quad a_{n+2} = \frac{1.3.5}{2.4.6}, \dots$$

elle donnera $\mu = 2 + \frac{1}{2}$. Or, en prenant $\mu = 2$, on trouve $2\mu - 4n - 1 < 0$, et par conséquent $\Delta^\mu a_n < 3\Delta^\mu a_{n+1}$ de $n = 1$ à $n = \infty$; tandis que, si l'on fait $\mu = 3$, on obtient $\Delta^\mu a_n > 3\Delta^\mu a_{n+1}$ pour $n = 1$, puis $\Delta^\mu a_n < 3\Delta^\mu a_{n+1}$ depuis $n = 2$ jusqu'à $n = \infty$; ce qui prouve évidemment (13.) qu'on doit s'arrêter aux transformées du 3^{me} ordre, et se servir de celle des formules (1'), qui s'y rapporte.

On trouvera ainsi, en ce rappelant que $s_n = 1$, $a_n = \frac{1}{2}$ etc.,

$$S = s_n - \frac{1}{3^{\frac{1}{2}}} (31a_n - 25a_{n+1} + 13a_{n+2} - 3a_{n+3}) = 0,70728,$$

valeur trop forte, et qui ne diffère pas de 0,0002 de la véritable, comme il serait aisé de le constater, *a priori*, en calculant les limites de l'erreur avec un degré d'approximation convenable.

Ce calcul ne laissant pas que d'être pénible, dans le cas actuel où la relation $\Delta^\mu a_n = 3\Delta^\mu a_{n+1}$ n'est point exactement satisfaite, il sera pré-

férable de calculer, selon la remarque du No. 11., directement deux premières valeurs approchées de S , par les formules (i' .) et (k' .) des No. 15. et 16., lesquelles deviennent ici, en ayant égard aux signes des termes et attendu que $\mu = 2$,

$$S = s_n - \frac{1}{8}(7a_n - 4a_{n+1} + a_{n+2}) = 0,7109375,$$

$$S = s_n - a_n + \frac{1}{8}(7a_{n+1} - 4a_{n+2} + a_{n+3}) = 0,7060547;$$

valeurs dont la 1^e est trop forte et la seconde trop faible, d'après la remarque du No. 16. et si l'on observe qu'ici les signes des termes sont changés.

Prenant la moyenne arithmétique entre ces nombres, laquelle répond à la formule (k .), on obtiendra la nouvelle valeur

$$S = 0,7084961,$$

qui serait immédiatement donnée par la formule (m .) ou son équivalente (m' , No. 17.); cette valeur est donc, à son tour, trop forte, et par conséquent la véritable valeur se trouve comprise entre elle et la plus petite des précédentes 0,7060547, dont elle ne diffère que par la 3^e décimale. Prenant, en conséquence, la moyenne de ces dernières valeurs, on obtiendra finalement le nombre 0,7072754 qui s'accorde avec celui qui a été obtenu directement ci-dessus, au moyen de la 4^e des formules (l' .).

D'ailleurs la marche précédente n'est guère plus laborieuse, et elle apprend que le nombre dont il s'agit ne saurait différer du véritable, d'une quantité qui surpasse la moitié 0,00122 de la différence de ceux 0,7084961, 0,7060547 dont il provient.

Transformation des mêmes séries dans le cas où le rapport numérique de chaque terme au suivant converge vers un nombre plus grand que l'unité.

23.

Les séries qui nous ont jusqu'ici occupés sont censées fort peu convergentes, de sorte que leurs termes consécutifs tendent sans cesse vers l'égalité aussi bien que ceux des suites formées par leurs différences des divers ordres; s'il en était autrement, et notamment si la discussion du No. 13. avait appris que, dans un certain ordre μ de différences, on a

$$\Delta^\mu a_n > 3 \Delta^\mu a_{n+1}, \text{ ou seulement } \Delta^\mu a_n > 2 \Delta^\mu a_{n+1},$$

pour toutes les valeurs de n supérieures au nombre n qui marque le rang

du terme auquel on veut appliquer la transformation, il faudrait s'arrêter à la formule (i.) qui se rapporte à cet ordre, et calculer directement la valeur de la série b_n (8.) qui entre dans l'expression du reste de cette formule, en modifiant le procédé qui précède ainsi qu'il suit.

Sachant, par exemple, que, dans la série

$$S = s_n + a_n - a_{n+1} + a_{n+2} - a_{n+3} + a_{n+4} - \text{etc.}$$

chacun des termes qui suivent a_n , est au moins i fois le précédent, le nombre i étant égal ou supérieur à 2, on la multipliera par i , ce qui donnera l'expression de iS ; ajoutant ensuite cette expression à celle de S , et divisant par $1+i$, on mettra le résultat sous cette forme,

$$S = s_n + \frac{i}{1+i} a_n + \frac{i}{1+i} [(a_n - i a_{n+1}) - (a_{n+1} - i a_{n+2}) + (a_{n+2} - i a_{n+3}) - \text{etc.}].$$

Le nombre i , qui entre dans cette transformée évidemment identique avec la série proposée, doit être choisi le plus grand qu'il est possible sans néanmoins qu'aucune des quantités ou différences $a_n - i a_{n+1}$, $a_{n+1} - i a_{n+2}$, $a_{n+2} - i a_{n+3}$, ... puisse devenir négative; condition à laquelle on satisfera évidemment en prenant, pour ce nombre, la plus petite des valeurs du rapport de chacun des termes de la série proposée au suivant, en allant de a_n vers l'infini.

En représentant encore ici les différences, dont il s'agit, par $\Delta_i a_n$, $\Delta_i a_{n+1}$, $\Delta_i a_{n+2}$, ..., l'indice i affecté à la caractéristique Δ servant à rappeler que ce ne sont pas simplement les différences des termes consécutifs de la suite a_n , a_{n+1} , a_{n+2} , ... qu'il s'agit de prendre, mais bien celles de chaque terme à i fois le suivant, la relation ci-dessus deviendra

$$S = s_n + \frac{i}{1+i} a_n + \frac{i}{1+i} (\Delta_i a_n - \Delta_i a_{n+1} + \Delta_i a_{n+2} - \Delta_i a_{n+3} + \text{etc.}).$$

Si les différences qui entrent dans la parenthèse de cette transformée, sont décroissantes, ce qui exige qu'on ait, depuis $\eta = n$ jusqu'à η infini, $\frac{\Delta_i a_\eta}{\Delta_i a_{\eta+1}}$; c'est-à-dire $\frac{a_\eta - i a_{\eta+1}}{a_{\eta+1} - i a_{\eta+2}} > 1$, et par conséquent

$$i < \frac{a_\eta - a_{\eta+1}}{a_{\eta+1} - a_{\eta+2}} = \frac{\Delta a_\eta}{\Delta a_{\eta+1}},$$

l'erreur qu'on risquera de commettre, en prenant

$$S = s_n + \frac{i}{1+i} a_n, \text{ sera } < \frac{1}{1+i} \Delta_i a_n = \frac{1}{1+i} (a_n - i a_{n+1});$$

mais, pour qu'elle soit moindre que celle qui se rapporte à la valeur $S = s_n + a_n$, il faudra, tout au moins (1.), qu'on ait

$$\frac{1}{1+i} \Delta_i a_n < a_{n+1}, \text{ ou } a_n < (1+2i) a_{n+1}.$$

Cela étant, on pourra procéder à la recherche d'une valeur plus approchée encore de S , en traitant la série entre parenthèses comme nous l'avons fait de la proposée, et ainsi de suite, en débarassant, à chaque fois, s'il y a lieu, cette série des facteurs qui pourraient compliquer inutilement ses termes.

24.

Cet exposé suffit pour montrer la marche à suivre dans le cas qui nous occupe, et, au lieu de continuer à raisonner dans l'hypothèse la plus générale, nous considérerons, en particulier, les séries de la forme

$$S = s_n + a_n z^n - a_{n+1} z^{n+1} + a_{n+2} z^{n+2} - a_{n+3} z^{n+3} + a_{n+4} z^{n+4} - \text{etc.},$$

qui sont celles qui se présentent le plus fréquemment dans les applications, et nous supposerons que, la variable z étant inférieure ou tout au plus égale à l'unité, les coefficients numériques $a_n, a_{n+1}, a_{n+2}, \dots$ et leurs différences des divers ordres forment des suites naturellement décroissantes, mais d'une manière fort peu rapide; cas qui intéresse spécialement les applications.

On pourra d'ailleurs toujours préparer la série proposée et celles qui dependent de ces différences, de manière que cela ait lieu dans chaque ordre de transformées.

Supposant, par exemple, les coefficients $a_n, a_{n+1}, a_{n+2}, \dots$ tels que chacun d'eux soit au moins i fois celui qui le suit immédiatement, on mettrait la série proposée sous cette forme

$$S = s_n + z_n \left(a_n - i a_{n+1} \frac{z}{i} + i^2 a_{n+2} \frac{z^2}{i^2} - i^3 a_{n+3} \frac{z^3}{i^3} + i^4 a_{n+4} \frac{z^4}{i^4} - \text{etc.} \right);$$

ce qui en ramènerait le calcul à celui d'une autre série dont les coefficients des termes consécutifs tendraient vers l'égalité, à mesure qu'on s'éloignerait du premier. Mais, comme l'introduction des facteurs i dans les séries des différences relatives aux transformées successives, compliquerait beaucoup les résultats, et qu'il serait impossible d'en rien conclure de général, nous admettrons qu'ils surpassent, du moins à partir du 1^{er} ordre, assez peu l'unité pour qu'il devienne inutile de les prendre en considération, d'autant plus que, s'ils étaient très grands, les séries qui leur correspondent deviendraient tellement convergentes, qu'on serait dispensé de pousser plus loin les transformations.

25.

Considérant donc la série

$$(A.) \quad S = s_1 + a_1 z - a_2 z^2 + a_3 z^3 - a_4 z^4 + a_5 z^5 - \text{etc.},$$

supposée très peu convergente pour le cas de $z = 1$, on prendra $i = \frac{1}{z}$; ce qui donnera la transformée du 1^{er} ordre

$$(B.) \quad S = s_1 + \frac{z}{1+z} a_1 + \frac{1}{1+z} (\Delta a_1 z - \Delta a_2 z^2 + \Delta a_3 z^3 - \Delta a_4 z^4 + \text{etc.}),$$

attendu (23.) qu'on a, en général, $\Delta_i a_n z^n = a_n z^n - \frac{1}{z} a_{n+1} z^{n+1} = \Delta a_n z^n$.

Faisant passer en dehors de la parenthèse le terme en Δa_1 , multipliant tous les termes par $\frac{1}{z}$, ajoutant la nouvelle équation, membre à membre, à la première, et divisant par $1 + \frac{1}{z}$ (*), on aura pour transformée du second ordre,

$$(C.) \quad S = s_1 + \frac{z}{1+z} a_1 + \frac{z^2}{(1+z)^2} \Delta a_1 + \frac{z^2}{(1+z)^2} (\Delta^2 a_1 z - \Delta^2 a_2 z^2 + \Delta^2 a_3 z^3 - \Delta^2 a_4 z^4 + \text{etc.}).$$

Continuant ainsi, de proche en proche, on obtiendra, en général, pour la transformée de l'ordre μ ,

$$(D.) \quad S = s_1 + \frac{z}{1+z} a_1 + \frac{z^2}{(1+z)^2} \Delta a_1 + \frac{z^3}{(1+z)^3} \Delta^2 a_1 \dots$$

$$\dots + \frac{z^\mu}{(1+z)^\mu} \Delta^{\mu-1} a_1 + \frac{z^\mu}{(1+z)^\mu} (\Delta^\mu a_1 z - \Delta^\mu a_2 z^2 + \Delta^\mu a_3 z^3 - \text{etc.}),$$

dont la loi est manifeste.

Supposant d'ailleurs que la série, entre parenthèses, soit convergente, on aura

$$(E.) \quad S = s_1 + \frac{z}{1+z} a_1 + \frac{z^2}{(1+z)^2} \Delta a_1 + \frac{z^3}{(1+z)^3} \Delta^2 a_1 \dots$$

$$\dots + \frac{z^\mu}{1+z^\mu} \Delta^{\mu+1} a_1 = S' \text{ à moins de } \frac{z^{\mu+1}}{(1+z)^\mu} \Delta^\mu a_1.$$

Cette dernière série S' , poussée à l'infini, est celle qu'*Euler* a obtenue à la p. 7., Tom. I. de ses *Institutiones calculi differentialis*, sans faire connaître, toute fois, l'expression du reste ni la limite de l'erreur commise, quand on l'arrête à un terme quelconque.

26.

Si l'on fait passer en dehors de la parenthèse de la transformée ci-dessus, le terme en $\Delta^\mu a_1$, elle deviendra

*) Ou, ce qui est plus simple et revient au même: multipliant par z , ajoutant, puis divisant le résultat par $1 + z$.

(F.). $S = s_1 + \frac{z}{1+z} a_1 + \frac{z^2}{(1+z)^2} \Delta a_1 \dots$
 $\dots + \frac{z^\mu}{(1+z)^\mu} \Delta^{\mu-1} a_1 + \frac{z^{\mu+1}}{(1+z)^\mu} \Delta^\mu a_1 - \frac{z^\mu}{(1+z)^\mu} (\Delta^\mu a_2 z^2 - \Delta^\mu a_3 z^3 + \Delta^\mu a_4 z^4 - \text{etc.});$
 nouvelle relation qui, d'après ce que nous avons vu (4. et 7.) pour le cas de $z=1$, revient précisément à celle qu'on obtiendrait en faisant commencer la transformation au terme suivant $a_2 z^2$ de la série proposée; ce qui donnerait

$$S = s_1 + a_1 z - \frac{z^2}{1+z} \Delta_2 - \frac{z^2}{(1+z)^2} \Delta a_2 \dots$$

$$- \frac{z^{\mu+1}}{(1+z)^\mu} \Delta^{\mu-1} a_2 - \frac{z^\mu}{(1+z)^\mu} (\Delta^\mu a_2 z^2 - \Delta^\mu a_3 z^3 + \Delta^\mu a_4 z^4 - \text{etc.}),$$

ou

$$s_1 + a_1 z - \frac{z^2}{1+z} a^2 - \frac{z^2}{(1+z)^2} \Delta a_2 \dots - \frac{z^{\mu+1}}{(1+z)^\mu} \Delta^{\mu-1} a_2 = S' + \frac{z^{\mu+1}}{(1+z)^\mu} \Delta^\mu a_1.$$

On aura donc aussi, puisque la série entre parenthèses est supposée convergente,

$$G. \quad S = S' + \frac{z^{\mu+1}}{(1+z)^\mu} \Delta^\mu a_1 = S'', \text{ à moins de } \frac{z^{\mu+2}}{(1+z)^\mu} \Delta^\mu a_2,$$

degré d'approximation qui est supérieur à celui que comporte S' ; mais on voit que, tandis que cette dernière valeur est trop faible, la précédente est trop forte, de sorte, que la véritable limite S de la série proposée est comprise entre elles.

Passant maintenant à l'ordre suivant $\mu+1$, ou, ce qui est la même chose, multipliant la seconde (F.) des transformées ci-dessus, par $\frac{1}{z}$, l'ajoutant, terme à terme, à la précédente (D.), puis divisant le résultat par $1 + \frac{1}{z}$, on aura

$$(H.) \quad S = s_1 + \frac{z}{1+z} a_1 + \frac{z^2}{1+z^2} \Delta a_1 + \dots + \frac{z^\mu}{(1+z)^\mu} \Delta^{\mu-1} a_1 +$$

$$\frac{z^{\mu+1}}{(1+z)^{\mu+1}} \Delta^\mu a_1 + \frac{z^{\mu+1}}{(1+z)^{\mu+1}} (\Delta^{\mu+1} a_1 z - \Delta^{\mu+1} a_2 z^2 + \Delta^{\mu+1} a_3 z^3 - \text{etc.});$$

et par conséquent, en supposant toujours la série, entre parenthèses, convergente,

$$(I.). \quad S = S' + \frac{z^{\mu+1}}{(1+z)^{\mu+1}} \Delta^\mu a_1 = S''', \text{ à moins de } \frac{z^{\mu+2}}{(1+z)^{\mu+1}} \Delta^{\mu+1} a_1.$$

27.

Cette dernière limite sera généralement plus petite que celle qui se rapporte à S' ou (E.); mais, pour qu'elle le soit davantage que la

limite de S'' ou ($G.$), et qu'il y ait par conséquent motif de préférer la valeur de S''' à celle de S'' on devra avoir, tout au moins,

$$\frac{z^{\mu+2}}{(1+z)^{\mu+1}} \Delta^{\mu+1} a_1 < \frac{z^{\mu+2}}{(1+z)^\mu} \Delta^\mu a_2, \quad \text{ou} \quad \Delta^{\mu+1} a_1 < (1+z) \Delta^\mu a_2,$$

c'est-à-dire $\Delta^\mu a_1 < (2+z) \Delta^\mu a_2$, et, tout au plus,

$$\frac{z^{\mu+2}}{(1+z)^{\mu+1}} \Delta^{\mu+1} a_1 < \frac{z^{\mu+2}}{(1+z)^\mu} (\Delta^\mu a_2 - \Delta^\mu a_3 z) \quad \text{ou} \quad \Delta^{\mu+1} a_1 < (1+z) (\Delta^\mu a_2 - \Delta^\mu a_3 z).$$

La même condition devra d'ailleurs être satisfaite dans tous les ordres inférieurs à μ , pour pouvoir affirmer, d'une manière absolue, que le résultat a le degré d'approximation que comporte le nombre des termes de la proposée qui y entrent. On s'arrêtera donc à l'ordre μ pour lequel $\Delta^\mu a_1$ égale ou surpasse, le moins qu'il est possible, la quantité $(2+z) \Delta^\mu a_2$; et, attendu que les compléments ou erreurs relatives à S'' et S''' sont de signes contraires, et ne peuvent elles mêmes alors différer que très peu entre elles, on pourra prendre, pour nouvelle valeur approchée de la série ($A.$), celle que donne la moyenne arithmétique entre S'' et S''' , dont l'erreur, comme nous l'avons vu (9.), pour le cas particulier de $z=1$, devra être aussi très près de zéro.

On aura donc

$$(K.) \quad S = \frac{S'' + S'''}{2} = S' + \Delta^\mu a_1 \frac{(2+z)}{2} \cdot \frac{z^{\mu+1}}{(1+z)^{\mu+1}} = S^{iv};$$

expression à laquelle correspond l'erreur

$$+ \frac{z^{\mu+2}}{2(1+z)^{\mu+1}} [\Delta^{\mu+1} a_1 - \Delta^{\mu+1} a_2 z + \Delta^{\mu+1} a_3 z^2 - \text{etc.} - (1+z) \Delta^\mu a_2 + (1+z) \Delta^\mu a_3 - (1+z) z^2 \Delta^\mu a_4 + \text{etc.}]$$

ou

$$+ \frac{z^{\mu+2}}{2(1+z)^{\mu+1}} \{ \Delta^\mu a_1 - (2+z) \Delta^\mu a_2 - [\Delta^\mu a_2 - (2+z) \Delta^\mu a_3] z + [\Delta^\mu a_3 - (2+z) \Delta^\mu a_4] z^2 - [\Delta^\mu a_4 - (2+z) \Delta^\mu a_5] z^3 + \text{etc.} \}.$$

Par conséquent si, comme on le suppose, les différences qui entrent dans cette erreur, sont décroissantes et $z \leq 1$, cette même erreur sera (9. et 10.)

$$\begin{aligned} &< \frac{z^{\mu+2}}{2(1+z)^{\mu+1}} [\Delta^{\mu+1} a_1 - (1+z) (\Delta^\mu a_2 - \Delta^\mu a_3 z)] \\ &> \frac{z^{\mu+2}}{2(1+z)^{\mu+1}} [\Delta^\mu a_1 - (2+z) \Delta^\mu a_2 - \Delta^{\mu+1} a_2 z]; \end{aligned}$$

c'est-à-dire

$$\begin{aligned}
&< \frac{z^{\mu+2}}{2(1+z)^{\mu+1}} [\Delta^{\mu} a_1 - (2+z) \Delta^{\mu} a_2 + (2+z^2) \Delta^{\mu} a_3] \\
&> \frac{z^{\mu+2}}{2(1+z)^{\mu+1}} [\Delta^{\mu} a_1 - (2+z) \Delta^{\mu} a_2 - \Delta^{\mu+1} a_2 z] *).
\end{aligned}$$

28.

Pour découvrir, *a priori*, l'ordre μ auquel on doit arrêter les transformations, on posera l'équation

$\Delta^{\mu} a_1 = (2+z) \Delta^{\mu} a_2$ ou, plus généralement $\Delta^{\mu} a_n = (2+z) \Delta^{\mu} a_{n+1}$, dans laquelle il n'entrera que μ , z , n et des nombres tout connus, et qu'il faudra discuter, dans chaque cas, de la même manière que nous l'avons indiqué, en général, aux No. 12. et 13. et, en particulier, aux No. 18. et suivans, dans la supposition de $z=1$.

Considérant, par exemple, la série

$$\text{arc tang } x = \frac{x}{1} - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} \dots \pm \frac{x^{2n+1}}{2n+1} \mp \frac{x^{2n+3}}{2n+3} \mp \text{etc.},$$

on la ramenera à la forme de la précédente, en posant

$$\begin{aligned}
&\frac{\text{arc tang } x}{x} = S \\
&= 1 - \frac{1}{3} x^2 + \frac{1}{5} x^4 - \frac{1}{7} x^6 \dots \pm \frac{1}{2n+1} x^{2n} \mp \frac{1}{2n+3} x^{2n+2} \pm \frac{1}{2n+5} x^{2n+4} \mp \text{etc.},
\end{aligned}$$

et, par suite,

$$z = x^2, \quad s_1 = 1, \quad a_1 = \frac{1}{3}, \quad a_2 = \frac{1}{5}, \quad a_3 = \frac{1}{7} \text{ etc.}$$

Attendu d'ailleurs qu'on a ici, en représentant par ζ le rapport de $\Delta^{\mu} a_n$ à $\Delta^{\mu} a_{n+1}$ (18.),

$$\zeta = \frac{2\mu+2n+3}{2n+1}, \text{ il en résulte l'équation } \frac{2\mu+2n+3}{2n+1} = 2+x^2,$$

pour déterminer μ quand x et n sont donnés *a priori*.

Supposant d'abord $n=0$, ce qui revient à opérer la transformation sur le 1^{er} terme 1, de la série S , on obtiendra $\mu = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2} x^2$. Or cette relation prouve que, quel que soit x , pourvu qu'il ne surpasse pas l'unité, on doit se borner à opérer directement sur les termes de la série, sans recourir aux transformées.

*) La moyenne arithmétique de ces erreurs, ou l'erreur probable (19), a, pour expression,

$$\frac{z^{\mu+2}}{2(1-z)^{\mu+1}} \{ \Delta^{\mu} a_1 - (2+z) \Delta^{\mu} a_2 - \frac{1}{2} z [\Delta^{\mu} a_2 - (2+z) \Delta^{\mu} a_3] \} :$$

quantité qui exprime une valeur approchée (10. et 19.) de l'erreur effective lorsque la série $\Delta^{\mu} a_1 - (2+z) \Delta^{\mu} a_2 - [\Delta^{\mu} a_2 - (2+z) \Delta^{\mu} a_3] z + [\Delta^{\mu} a_3 - (2+z) \Delta^{\mu} a_4] z^2 - \text{etc.}$, est, du moins à partir de son second terme, de même nature que la proposée et convergente.

Passant donc au second terme pour lequel $n = 1$, on obtiendra

$$\mu = \frac{1}{2} + \frac{3}{2}x^2;$$

et par conséquent $\mu = 2$ quand $x^2 = 1$, $\mu = 1$ quand $x^2 = \frac{1}{3}$; ce qui annonce qu'on devra pousser les transformations jusqu'au second ordre lorsque x^2 surpassera $\frac{1}{3}$, et jusqu'au premier seulement lorsque x^2 sera plus petit que $\frac{1}{3}$ ou tout au plus égal à $\frac{1}{3}$.

Si l'on suppose, en effet successivement $\mu = 0$, $\mu = 1$, $\mu = 2$, $\mu = 3$, dans l'expression de ζ , puis $n = 1$, on s'assurera aisément que,

1°. quand $x^2 < \frac{1}{3}$, on a $\zeta < 2 + x^2$ pour l'ordre $\mu = 0$, et $\zeta > 2 + x^2$ pour tous les ordres suivans;

2°. quand $x^2 > \frac{1}{3} < 1$, on a $\zeta < 2 + x^2$ pour les ordres $\mu = 0$, $\mu = 1$, et $\zeta > 2 + x^2$ pour tous les suivans.

Et, comme $n = 1$ revient à supposer, abstraction faite des signes,

$$s = 1, \quad a_1 = \frac{1}{3}, \quad a_2 = \frac{1}{5}, \quad a_3 = \frac{1}{7} \text{ etc.},$$

ce qui donne

$$\Delta a_n = \Delta a_1 = \frac{1}{3} - \frac{1}{5} = \frac{2}{3.5}, \quad \Delta a_2 = \frac{1}{5} - \frac{1}{7} = \frac{2}{5.7}, \quad \dots$$

$$\Delta^2 a_1 = \frac{2}{3.5} - \frac{2}{5.7} = \frac{2.4}{3.5.7}, \quad \Delta^2 a_2 = \frac{2.4}{5.7.9}, \quad \dots$$

$$\Delta^3 a_1 = \frac{2.4.6}{3.5.7}, \quad \Delta^3 a_2 = \frac{2.4.6}{5.7.9.11}, \quad \dots$$

on aura (25. et 27.), pour $x^2 < \frac{1}{3}$, en observant que $\mu = 1$, $z = x^2$ et ayant égard au changement des signes de a_1 , a_2 , a_3 etc.,

$$S' = 1 - \frac{1}{3} \cdot \frac{x^2}{1+x^2},$$

$$S^{iv} = S' - \frac{1}{3.5} \cdot \frac{(2+x^2)}{(1+x^2)^2} x^4 = 1 - \frac{1}{3} \cdot \frac{x^2}{1+x^2} = \frac{1}{3.5} \cdot \frac{(2+x^2)}{(1+x^2)^2} x^4;$$

de sorte qu'en prenant $S = S^{iv}$, l'erreur sera (27.)

$$< \frac{(3-4x^2+5x^4)}{(1+x^2)^2} \cdot \frac{x^6}{5.7.9} > \frac{(3-13x^2)}{(1+x^2)^2} \cdot \frac{x^6}{5.7.9}.$$

Pour $x^2 > \frac{1}{3}$, on trouvera pareillement, attendu que $\mu = 2$,

$$S = 1 - \frac{1}{3} \cdot \frac{x^2}{1+x^2} - \frac{2}{3.5} \cdot \frac{x^4}{(1+x^2)^2},$$

$$S^{iv} = S' - \frac{4}{3.5.7} \cdot \frac{(2+x^2)}{(1+x^2)^2} x^6 = 1 - \frac{1}{3} \cdot \frac{x^2}{(1+x^2)} - \frac{1}{3.5} \cdot \frac{x^4}{(1+x^2)^2} - \frac{4}{3.5.7} \cdot \frac{(2+x^2)}{(1+x^2)^2} x^6;$$

l'erreur relative à cette dernière expression étant

$$< \frac{(n-6x^2+5x^4)}{(1+x^2)^2} \cdot \frac{4x^8}{5.7.9.11} > \frac{(11-17x^2)}{(1+x^2)^2} \cdot \frac{4x^8}{5.7.9.11}.$$

La valeur approchée de S_1 étant ainsi trouvée pour l'étendue des valeurs de x à considérer, il ne s'agira plus que de la multiplier par x pour obtenir celle de $\text{arc tang } x$.

29.

En terminant ce qui concerne les séries convergentes dont les termes sont alternativement positifs et négatifs, nous devons présenter quelques remarques essentielles.

1°. Les considérations exposées en dernier lieu, s'appliquent aussi bien aux séries descendantes qu'aux séries ascendantes, et ne supposent pas essentiellement que les puissances de la variable soient rationnelles et entiers, mais seulement que leur rapport, en passant d'un terme quelconque au suivant, soit constant. Or c'est ce qui est évident *a priori* puisqu'on peut toujours supposer que ce rapport ou la variable z soit une fonction quelconque d'une autre variable indépendante.

30.

2°. Les mêmes considérations et toutes celles qui précèdent n'exigent pas essentiellement que les coefficients de la série proposée et leurs différences des divers ordres soient décroissans dans toute l'étendue de cette série, mais seulement que cette même série et celles qui constituent les restes ou complémens des diverses transformées, aient une limite ou soient convergentes; ce qui exige simplement que leurs termes aillent sans cesse (1.) en diminuant, à partir d'un certain d'entre eux; du moins ne doit-on appliquer les conséquences qui se rapportent à la limite des erreurs commises, quand on néglige les restes ou complémens dont il s'agit, qu'à la partie convergente des séries formées par ces restes; ce qui suppose qu'on fasse sortir dans chaque cas, au dehors de parenthèses qui les renferment, tous les termes divergens ou croissans pour les réunir à la partie qui doit donner la valeur approchée de la somme ou de la limite S qu'il s'agit d'obtenir.

Soit, pour exemple, la série

$$(1+x)^{-1} = 1 - \frac{5}{2}x + \frac{5.7}{2.4}x^2 - \frac{5.7.9}{2.4.6}x^3 + \frac{5.7.9.11}{2.4.6.8}x^4 - \frac{5.7.9.11.13}{2.4.6.8.10}x^5 + \text{etc.}$$

dont les coefficients numériques vont constamment en augmentant, et qui est convergente tant que x demeure au dessous de l'unité, mais dont les premiers termes commencent par diverger lorsque x surpasse $\frac{2}{3}$, et ne redeviennent décroissant qu'à partir du terme pour lequel on a $n < \frac{3x}{2(1-x)}$

ou $x < \frac{2n}{2n+3}$, n désignant le rang de ce terme qui en a $n-1$ avant lui, et $\frac{2n}{2n+3}$ exprimant le rapport de ce même terme au suivant; On formera, sans difficultés, ce tableau des différences des coefficients de la série dont il s'agit, pris toujours dans l'ordre inverse,

Ordre	1 ^{er}	2 ^e	3 ^e	4 ^e	5 ^e	6 ^e termes des différences
Δ^0	1,	$\frac{5}{2}$,	$\frac{5.7}{2.4}$,	$\frac{5.7.9}{2.4.6}$,	$\frac{5.7.9.11}{2.4.6.8}$,	$\frac{5.7.9.11.13}{2.4.6.8.10}$, ...
Δ^1	$-\frac{3}{2}$,	$-\frac{3}{2} \cdot \frac{5}{4}$,	$-\frac{3}{2} \cdot \frac{5.7}{4.6}$,	$-\frac{3}{2} \cdot \frac{5.7.9}{4.6.8}$,	$-\frac{3}{2} \cdot \frac{5.7.9.11}{4.6.8.10}$,	....
Δ^2	$\frac{3.1}{2.4}$,	$\frac{3.1}{2.4} \cdot \frac{5}{6}$,	$\frac{3.1}{2.4} \cdot \frac{5.7}{6.8}$,	$\frac{3.1}{2.4} \cdot \frac{5.7.9}{6.8.10}$,	....	
Δ^3	$\frac{3.1.1}{2.4.6}$,	$\frac{3.1.1}{2.4.6} \cdot \frac{5}{8}$,	$\frac{3.1.1}{2.4.6} \cdot \frac{5.7}{8.10}$,	....		
Δ^4	$\frac{3.1.1.3}{2.4.6.8}$,	$\frac{3.1.1.3}{2.4.6.8} \cdot \frac{5}{10}$,	....			
Δ^5	$\frac{3}{2} \cdot \frac{1.1.3.5}{4.6.8.10}$,	....				

La loi de ces différences est facile à saisir, et l'on voit que leurs valeurs absolues sont constamment décroissantes à partir du second ordre, soit qu'il s'agisse des différences des divers ordres, relatives à un même terme ou qui appartiennent à une même colonne verticale, soit que l'on considère celles qui, rangées sur une même ligne horizontale, appartiennent au même ordre et aux coefficients successifs.

D'après cela, si l'on suppose, dans la série (A.) du No. 25.

$$s_1 = 1, \quad a_1 = -\frac{5}{2}, \quad a_2 = -\frac{5.7}{2.4}, \quad a_3 = -\frac{5.7.9}{2.4.6}, \quad \text{etc.}, \quad z = x;$$

on trouvera, pour les transformées simples du 1^{er} et du 2^d ordres, la série proposée,

$$S = 1 - \frac{5}{2} \cdot \frac{x}{1+x} + \frac{x}{1+x} \left(\frac{3}{2}x - \frac{3}{2} \cdot \frac{5}{4}x^2 + \frac{3}{2} \cdot \frac{5.7}{4.6}x^3 - \frac{3}{2} \cdot \frac{5.7.9}{4.6.8}x^4 + \frac{3}{2} \cdot \frac{5.7.9.11}{4.6.8.10}x^5 - \text{etc.} \right),$$

$$S = 1 - \frac{5}{2} \cdot \frac{x}{1+x} + \frac{3}{2} \cdot \frac{x^2}{(1+x)^2} - \frac{x^2}{(1+x)^2} \left(\frac{3.1}{2.4}x - \frac{3.1}{2.4} \cdot \frac{5}{6}x^2 + \frac{3.1}{2.4} \cdot \frac{5.7}{6.8}x^3 - \frac{3.1}{2.4} \cdot \frac{5.7.9}{6.8.10}x^4 + \text{etc.} \right).$$

La série entre parenthèses, contenue dans la dernière de ces transformées, ne devenant divergente que lorsque x surpasse l'unité, et restant convergente dans le cas contraire pour toute l'étendue de ses termes, on aura encore ici (26.)

$$S = 1 - \frac{5}{2} \frac{x}{1+x} + \frac{3}{2} \frac{x^2}{(1+x)^2} \text{ à moins de } \frac{3}{8} \frac{x^3}{(1+x)^3},$$

et sous la seule réserve que x ne surpasse pas l'unité. La même chose ayant lieu pour toutes les transformées des ordres supérieurs au 2^e, on voit que ce qui a été dit aux N^{os} 26. et 27., leur est immédiatement applicable.

Quant à celle du 1^{er} ordre, la série, entre parenthèses, qu'elle renferme étant du même genre que la proposée, c'est-à-dire convergente pour toutes les valeurs de x moindres que l'unité, quoique susceptible de diverger dans ses premiers termes quand x surpasse $\frac{4}{3}$, on devra lui appliquer les remarques qui précèdent relativement à la valeur approchée de S qu'on en peut déduire.

Supposant, par exemple, $x = 0,82$, il arrivera que les termes de cette série iront en croissant jusqu'à celui qui contient x^3 ; on prendra donc approximativement

$$S = 1 - \frac{5}{2} \cdot \frac{x}{(1+x)} + \frac{3}{2} \cdot \frac{x^2}{(1+x)^2} - \frac{3}{2} \cdot \frac{5}{4} \cdot \frac{x^3}{(1+x)^3}, \text{ à moins de } \frac{3}{2} \cdot \frac{5}{4} \cdot \frac{7}{6} \cdot \frac{x^4}{(1+x)^4}$$

et non pas $S = 1 - \frac{5}{2} \cdot \frac{x}{(1+x)}$, censé exact à $\frac{3}{2} \cdot \frac{5}{4} \cdot \frac{x^3}{(1+x)^3}$ près etc.

31.

3°. Enfin lorsque la valeur de la variable, suivant les puissances de laquelle procède la série proposée est donnée *a priori*, soit exactement, soit approximativement ou entre des limites assignées, il n'est point indispensable de recourir à l'expression analytique du terme général des coefficients de cette série et de ses différences comme on l'a fait aux N^{os} 18. à 23. et 28., pour établir la discussion (12. et 13.) à l'aide de laquelle on peut connaître l'ordre auquel on doit arrêter les transformations et le terme dont on doit partir pour obtenir l'approximation la plus avantageuse qu'il est possible, eu égard au nombre des termes qui entrent dans chaque résultat. On peut, tout aussi bien, procéder, de proche en proche, par l'examen de la loi que suivent les premiers coefficients de la série et leurs premières différences jusqu'à l'ordre auquel on doit s'arrêter, pourvu seulement qu'on soit en état de prononcer, par un moyen quelconque et suffisamment général, sur ce que devient ultérieurement cette loi quand on suppose la série prolongée à l'infini, et notamment que les séries, qui constituent les restes de chacune des transformées auxquelles

on s'arrête, sont convergentes ou constamment décroissantes à partir de leur premier terme.

Nous choisirons, pour exemple particulier, la série

$$S = \frac{1-\omega}{\omega} a_0 + \frac{(1-\omega)}{1} a_2 z''^2 + \frac{(1-\omega^3)}{3} a_4 z''^4 + \frac{(1-\omega^5)}{5} a_6 z''^6 + \frac{(1-\omega^7)}{7} a_8 z''^8 + \text{etc.}$$

qui représente la valeur de l'intégrale elliptique

$$-z'' \int_z^{z''} \frac{\sqrt{(1+b'^2 z^2)}}{\sqrt{(1+z^2)}} \cdot \frac{\partial z}{z^3},$$

et dans laquelle on a $\omega = \frac{z'}{z''} < 1$, $b' = \sin b < 1$; la loi des coefficients numériques $a_0, a_2, a_4, \dots$ étant d'ailleurs exprimée par la formule

$$\begin{aligned} a_{2n} = & -\frac{p(p-1)\dots(p-n+1)}{1.2\dots n} (1-b'^{2n}) + \frac{p(p-1)\dots(p-n+2)}{1.2\dots(n-1)} \frac{p}{1} (1-b'^{2n-2}) \\ & -\frac{p(p-1)\dots(p-n+3)}{1.2\dots(n-3)} \cdot \frac{p}{1} \cdot \frac{p-1}{2} \cdot (1-b'^{2n-4}) + \dots \\ & \dots \mp \frac{p(p-1)}{1.2} \cdot \frac{p(p+1)\dots(p+n-3)}{1.2\dots(n-2)} (1-b'^4) \pm \frac{p}{1} \cdot \frac{(p+1)\dots(p+n-2)}{1.2\dots(n-1)} (1-b'^2), \end{aligned}$$

dans laquelle on a remplacé, pour plus de généralité, l'exposant $\frac{1}{2}$ des fonctions radicales ci-dessus par la lettre p , ce qui fait que la série proposée peut servir à calculer, par approximation, des intégrales qui appartiennent à un ordre plus élevé que les transcendentes elliptiques, dans tous les cas où z'' et b' sont au dessous de l'unité, z' représentant d'ailleurs la limite supérieure de l'intégrale.

Cette même série est une de celles que nous avons eu à considérer dans des recherches relatives au calcul du frottement dans la vis à filets triangulaires (*Litographie du cours de mécanique appliquée aux machines, de l'Ecole d'Artillerie et du Génie, 3^e Section, Note II^e*). Or on peut démontrer généralement, par des considérations qui ne seraient pas ici à leur place, que, pourvu qu'on ait $p < 1$, $b' < 1$. 1°. Les coefficients $a_0, a_2, a_4, \dots$ forment une suite dont les termes sont alternativement positifs et négatifs, à partir du 1^{er} dont la valeur est $+1$, et qui, pris abstraction faite du signe, vont constamment en diminuant à mesure que n augmente; 2°. la même chose a lieu à l'égard des suites formées par les différences des divers ordres de ces mêmes coefficients.

Il en résulte donc que la série dont il s'agit est constamment convergente tant que z'' ne surpasse pas l'unité; mais, comme les coefficients $a_0, a_2, a_4, \dots$ décroissent d'une manière extrêmement lente toutes les

fois que p n'est pas très petit, il arrive aussi que cette même série doit, quand z'' est très voisin de l'unité, devenir alors tellement peu convergente, qu'on soit obligé d'en calculer un grand nombre de termes pour obtenir la valeur qu'elle représente avec le degré d'approximation désiré.

Ce cas est précisément celui sur lequel nous sommes tombés, dans la *Note* précitée, en supposant $p = \frac{1}{2}$, $b'^2 = \frac{1}{2}$, $\omega = \frac{1}{2}$ et $z'' = 1$, valeurs qui donnent

$$a_0 = 1, \quad a_2 = -0,25, \quad a_4 = 0,21875, \quad a_6 = -0,19531, \quad a_8 = 0,17725, \\ a_{10} = 0,162964, \quad a_{12} = 0,151565 \text{ etc.},$$

et, par suite,

$$S = 2 - 0,166667 z''^{1/2} + 0,070216 z''^{3/2} - 0,038901 z''^{5/2} \\ + 0,025810 z''^{7/2} - 0,0181071 z''^{9/2} + 0,0137786 z''^{11/2} - \text{etc.};$$

série dans laquelle il faudrait, en outre, faire $z'' = 1$, mais que nous considérerons dans le cas où z'' aurait une valeur quelconque voisine de l'unité.

32.

Cela posé, on remarquera que le 1^{er} terme de cette série, surpassant le triple du coefficient 0,166667, il n'y a pas lieu de faire commencer la transformation à ce terme; et, comme on a, au contraire,

$$0,166667 < (2 + z''^{1/2}) 0,070216,$$

pour les second et troisième termes, dès que $z''^{1/2}$ surpassasse 0,374 ou z'' , 0,61, il y a avantage à opérer sur le terme en $z''^{1/2}$. Considérant donc les différences des divers ordres de ce terme et des suivans, on dressera ce tableau qu'il serait inutile de pousser plus loin pour l'objet qui nous occupe,

	2 ^e	3 ^e	4 ^e	5 ^e	6 ^e	7 ^e termes
Δ^0	0,166667,	0,070216,	0,038901,	0,025310,	0,018107,	0,013779; ....
Δ^1	0,070216	0,038901,	0,025310	0,018107	0,013779	....
	0,096451'	0,031315'	0,013591'	0,007103'	0,004328'	....
Δ^2	0,031315	0,013591	0,007203	0,004328	....	
	0,065136'	0,017724'	0,006388'	0,002875'	....	
Δ^3	0,017724	0,006388	0,002875	....		
	0,047412'	0,011336'	0,003513'	....		

En consultant la ligne horizontale qui contient la suite des différences premières des coefficients de la série proposée, on voit qu'on y a $0,096451 > 3 \times 0,031315$; ce qui prouve (27.) que l'on doit arrêter au 1^{er} ordre les transformations relatives au second terme $0,166667 z''^{1/2}$ de la série, si mieux, on ne préfère passer au terme suivant.

On supposera donc, dans les formules de N^{os} 26. et 27.,

$$\mu = 1, \quad s_1 = 2, \quad a_1 = -0,16667, \quad \Delta a_1 = -0,096451, \\ \Delta a_2 = -0,031315, \dots$$

et remplaçant, en même tems, z par z'' , il viendra

$$S = S'' = s_1 + a_1 \frac{z}{1+z} + \Delta a_1 \frac{(2+z)}{2} \cdot \frac{z^2}{(1+z)^2} \\ = 2 - 0,166667 \frac{z''}{1+z''} - 0,096451 \frac{(2+z'')}{2} \cdot \frac{z''^2}{(1+z'')^2}$$

l'erreur absolue qu'on risque de commettre étant

$$< \frac{z''^3}{2(1+z'')^2} [0,096451 - 0,031315(2+z'') + 0,013591(z'' + z'')] \\ > \frac{z''^3}{2(1+z'')^2} [0,096451 - 0,031315(2+z'') - 0,017724z'']$$

Supposant, en particulier, $z'' = 1$, on trouvera $S = 1,8805$, avec une erreur absolue

$$< 0,003711 > - 0,003152$$

c'est-à-dire moindre que 0,003711 si l'erreur vraie est positive, et moindre que 0,003152 si elle est négative; ce qui a lieu dans le cas actuel; mais, en réalité, l'erreur absolue est au dessous de 0,001.

33.

Si l'on veut obtenir une valeur plus approchée encore de S , il faudra passer à la seconde colonne verticale du tableau, qui contient les différences du coefficient 0,070216 du 3^e terme de la série proposée, et descendre, dans cette colonne, jusqu'à ce qu'on arrive à une différence qui cesse d'être inférieure à $2 + z''$ fois celle du même ordre, de la colonne suivante ou du 4^e terme de la série proposée, et cela pour toute l'étendue des valeurs particulières de z'' que l'on veut considérer. Par exemple, on trouvera que cela a lieu, pour la différence première, dès qu'on a $0,031315 \geq 0,013591(2 + z'')$, ou $z'' \geq 0,3041$; pour la différence 2^{de}, dès qu'on a $0,017724 \geq 0,006388$, ou $z'' \geq 0,7746$; pour la différence 3^e, dès que z'' est plus petit que 1,12686, ce qui arrive toujours par hypothèse.

D'après cela, on voit qu'en particulier, si z'' doit demeurer compris entre 0,7746 et 1, ou z'' entre 0,88 et l'unité, on devra arrêter au 3^e ordre, les transformations relatives au terme $+ 0,070216 z''^3$ qui nous occupe. On fera donc (26. et 27.)

$$\mu = 3, \quad s_1 = 2 - 0,166667 z'', \quad a_1 = 0,070216 z'', \quad \Delta a_1 = 0,031315 z'', \\ \Delta^2 a_1 = 0,017724 z'', \dots,$$

5 *

et enfin $z = z''^2$; ce qui donne

$$S' = 2 - 0,16667 z''^2 + 0,070216 z''^2 \frac{z''^2}{1+z''^2} + 0,031315 z''^2 \frac{z''^4}{(1+z''^2)^2} \\ + 0,017724 z''^2 \frac{z''^6}{(1+z''^2)^3},$$

$$S = S'' = S' + 0,011336 z''^2 \frac{(2+z''^2)}{2} \cdot \frac{z''^6}{(1+z''^2)^4}.$$

Quant aux limites de l'erreur, comme elles dépendent (27.) des différences qui ne se trouvent pas inscrites au tableau, on pourra se dispenser (11.) de les apprécier directement en calculant séparément les valeurs de

$$S'' = S' + 0,011336 z''^2 \frac{z''^6}{(1+z''^2)^4}, \quad S''' = S' + 0,011336 z''^2 \frac{z''^8}{(1+z''^2)^5},$$

dont la demi-somme constitue la valeur de S'' , et dont la demi-différence absolue

$$\pm \frac{S'' - S'''}{2} = 0,011336 \frac{z''^2}{(1+z''^2)^4},$$

est la limite supérieure de l'erreur commise, prise abstraction faite du signe.

Supposant, pour exemple, $z'' = 1$, on trouvera

$$S = S'' = 1,879551 \text{ à moins de } \frac{1}{2} 0,011336 = 0,000708;$$

mais, dans la réalité, cette valeur de S est exacte jusqu'au 4^e chiffre décimal.

Transformation des séries dont les termes sont affectés du même signe; recherche des limites de leurs restes.

34.

Les considérations qui précèdent peuvent s'appliquer, avec les modifications convenables, au calcul numérique et à la transformation générale des séries dont tous les termes, à partir d'un certain d'entre eux, ont le même signe et décroissent indéfiniment (1.) *) en allant vers l'infini, pourvu que le rapport de chaque terme au suivant, dans cette partie décroissante de la série n'ait pas pour limite précisément l'unité, ou converge vers un nombre > 1 . Il ne s'agit, en effet, que de changer le signe du nombre i (23. et suiv.) ou des quantités $\frac{1}{z}$, $\frac{1}{x}$ qui le remplacent dans les

*) L'indétermination relative au signe du dernier terme a_∞ de la série n'ayant plus lieu, il serait facile d'en tenir compte dans les transformées successives; mais, comme il ne peut avoir une valeur finie sans qu'un nombre infini de ceux qui le précèdent n'aient, dans nos hypothèses, des valeurs encore plus grandes, il en résulte qu'alors la limite cherchée de la série proposée serait elle-même infinie, ce qui dispense de toute espèce de calculs.

différentes transformées, de même que ceux des termes ou des différences absolues, qui précédemment étaient affectés du signe —.

Ainsi, par exemple, ces conditions étant satisfaites dans la série

$$(A.) \quad S = s_1 + a_1 z + a_2 z^2 + a_3 z^3 + a_4 z^4 + a_5 z^5 + \text{etc.}$$

elle donnera lieu à la transformée de l'ordre μ ,

$$(B.) \quad S = s_1 + \frac{z}{1-z} a_1 - \frac{z^2}{(1-z)^2} \Delta a_1 + \frac{z^3}{(1-z)^3} \Delta^2 a_1 \dots \\ \dots \pm \frac{z^\mu}{(1-z)^\mu} \Delta^{\mu-1} a_1 \mp \frac{z^\mu}{(1-z)^\mu} (\Delta^\mu a_1 z + \Delta^\mu a_2 z^2 + \Delta^\mu a_3 z^3 + \text{etc.}),$$

qui, étant poussée à l'infini en négligeant la partie comprise entre parenthèses, conduit à cette nouvelle série:

$$(C.) \quad S = a_1 + a_1 \frac{z}{1-z} - \Delta a_1 \frac{z^2}{(1-z)^2} + \Delta^2 a_1 \frac{z^3}{(1-z)^3} - \Delta^3 a_1 \frac{z^4}{(1-z)^4} + \text{etc.},$$

conforme à celle qui a été proposée par *Euler* à la p. 228. de ses *Institutions du calcul différentiel*, à cela près que les différences des coefficients sont ici censées prises dans l'ordre inverse. Mais, ainsi que l'a fait observer le savant auteur du *Traité de calcul différentiel et intégral* déjà cité (voy. T. III. p. 345 et 346), cette série n'est convergente, par elle-même, que dans un très petit nombre de cas, lorsque les différences Δa_1 , $\Delta^2 a_1$, $\Delta^3 a_1$ etc., ne décroissent pas très rapidement, et par conséquent elle ne peut que rarement être substituée avec avantage à la proposée.

35.

Pour montrer la marche par laquelle on peut arriver directement à ces résultats, et en même tems pour apprécier les limites des erreurs auxquelles ils donnent lieu quand on s'arrête à un ordre de différences quelconque, ce qui fera connaître, en même tems, les conditions sous lesquelles il est avantageux de substituer la transformée à la série proposée, nous considérerons en général la série indéfiniment décroissante

$$S = s_n + a_n + a_{n+1} + a_{n+2} + a_{n+3} + a_{n+4} + \text{etc.}$$

et, nommant i un nombre plus grand que l'unité, tel que chaque terme soit au moins i fois le suivant pour toute l'étendue de la série qu'on se propose de soumettre à la transformation, on donnera à cette série la forme

$$S = s_n + \left(a'_n + \frac{1}{i} a'_{n+1} + \frac{1}{i^2} a'_{n+2} + \frac{1}{i^3} a'_{n+3} + \frac{1}{i^4} a'_{n+4} + \text{etc.} \right),$$

pour laquelle

$$a'_n = a_n, \quad a'_{n+1} = i a_{n+1}, \quad a'_{n+2} = i^2 a_{n+2}, \text{ etc.};$$

multipliant ensuite tous ses termes par i , on aura

$$Si = is_n + ia_n + \left(a'_{n+1} + \frac{1}{i} a'_{n+2} + \frac{1}{i^2} a'_{n+3} + \frac{1}{i^3} a'_{n+4} + \text{etc.} \right);$$

retranchant enfin de la précédente et divisant par $1-i = -(i-1)$, il viendra la transformée du 1^{er} ordre

$$S = s_n + \frac{i}{i-1} a'_n - \frac{1}{i-1} \left(\Delta a'_n + \frac{1}{i} \Delta a'_{n+1} + \frac{1}{i^2} \Delta a'_{n+2} + \frac{1}{i^3} \Delta a'_{n+3} + \text{etc.} \right).$$

Passant en dehors de la parenthèse le terme $\Delta a'_n$, multipliant par i , retranchant ensuite le résultat de la précédente, puis divisant de nouveau par $1-i$, on obtiendra la transformée du second ordre

$$S = s_n + \frac{i}{i-1} a'_n - \frac{i}{(i-1)^2} \Delta a'_n + \frac{1}{(i-1)^2} \left(\Delta^2 a'_n + \frac{1}{i} \Delta^2 a'_{n+1} + \frac{1}{i^2} \Delta^2 a'_{n+2} + \text{etc.} \right).$$

Continuant le même procédé, on arrivera successivement aux transformées des 3^e, 4^eme ordres, et finalement à la transformée de l'ordre général μ ,

$$S = s_n + i a'_n \frac{1}{i-1} - i \Delta a'_n \frac{1}{(i-1)^2} + i \Delta^2 a'_n \frac{1}{(i-1)^3} \dots$$

$$\dots \pm i \Delta^{\mu-1} a'_n \frac{1}{(i-1)^{\mu}} \mp \frac{1}{(i-1)^{\mu}} \left(\Delta^{\mu} a'_n + \frac{1}{i} \Delta^{\mu} a'_{n+1} + \frac{1}{i^2} \Delta^{\mu} a'_{n+2} + \text{etc.} \right);$$

laquelle conduit évidemment au résultat énoncé plus haut, relativement à la série en z , pour laquelle on prendrait

$$i = \frac{1}{z}, \quad s_n = s_1, \quad a'_n = a_1 z, \quad a'_{n+1} = a_2 z, \quad a'_{n+2} = a_3 z, \dots$$

36.

Mais, ce qu'il importe de remarquer c'est qu'en mettant la transformée du 1^{er} ordre ci-dessus sous la forme

$$S = s_n + \frac{1}{i-1} a'_n - \frac{1}{i-1} \left(a'_n - a'_{n+1} + \frac{1}{i} a'_{n+1} - \frac{1}{i} a'_{n+2} + \frac{1}{i^2} a'_{n+2} - \frac{1}{i^2} a'_{n+3} + \text{etc.} \right),$$

la série comprise dans la parenthèse, ou son équivalente

$$a_n - i a_{n+1} + a_{n+1} - i a_{n+2} + a_{n+2} - i a_{n+3} + a_{n+3} - \text{etc.},$$

est nécessairement convergente (1.), puisque, par hypothèse, $i > 1$ est un nombre qui ne surpasse aucun des rapports $\frac{a_n}{a_{n+1}}, \frac{a_{n+1}}{a_{n+2}}, \frac{a_{n+2}}{a_{n+3}}, \dots$ censés eux mêmes décroissans. Il en résulte, en effet, que la somme de cette série se trouve comprise (1.) entre a_n et $a_n - i a_{n+1}$, ou a'_n et $a'_n - a'_{n+1} = \Delta a'_n$, de sorte qu'en prenant

$$S = s_n + \frac{i}{i-1} a'_n, \text{ l'erreur absolue est } < \frac{1}{i-1} a'_n > \frac{1}{i-1} \Delta a'_n.$$

Et comme, en faisant passer en dehors de la parenthèse le terme a'_n , la transformée qui nous occupe devient

$$S = s_n + a'_n + \frac{1}{i-1} \left(a'_{n+1} - \frac{1}{i} a'_{n+1} + \frac{1}{i} a'_{n+1} - \frac{1}{i^2} a'_{n+2} + \frac{1}{i^2} a'_{n+2} - \text{etc.} \right),$$

on voit également qu'en prenant

$$S = s_n + a'_n, \text{ l'erreur absolue est } < \frac{1}{i-1} a'_{n+1} > \frac{1}{i-1} \left(a'_{n+1} - \frac{1}{i} a'_{n+1} \right) = \frac{1}{i} a'_{n+1};$$

résultat qui démontre, en général, que, dans une série décroissante

$$S = s_n + a_n + a_{n+1} + a_{n+2} + a_{n+3} + \text{etc.},$$

et dont i serait la plus petite des valeurs du rapport de chaque terme au suivant, considéré depuis a_n jusqu'à a_∞ , on a

$$S = s_n + a_n, \text{ avec une erreur absolue } < \frac{i}{i-1} a_{n+1} > a_{n+1};$$

ce qui démontre qu'une pareille série aura toujours une somme finie si, ses termes allant constamment en diminuant de façon à devenir nuls pour $n = \infty$, le nombre i surpasse l'unité d'une quantité qui soit elle même finie.

37.

En particulier, si la série proposée est de la forme

$$S = s_1 + a_1 z + a_2 z^2 + a_3 z^3 \dots + a_\mu z^\mu + a_{\mu+1} z^{\mu+1} + \text{etc.}$$

l'erreur commise, lorsqu'on s'arrête, dans le calcul, à un terme quelconque $a_\mu z^\mu$, est

$$< a_{\mu+1} \frac{k z^{\mu+1}}{k - z} > a_{\mu+1} z^{\mu+1},$$

en prenant ici $i = \frac{k}{2}$ et k étant la limite inférieure du rapport du coefficient a_x d'un terme quelconque de rang x , au coefficient a_{x+1} du terme suivant, considéré depuis $x = \mu$ jusqu'à $x = \infty$.

Nous reviendrons bientôt sur cette expression des limites du reste des séries à termes décroissans et positifs; contentons nous ici d'en conclure l'indice à l'aide duquel on peut reconnaître si la transformée (B.) ou (C.) (No. 34.), supposée arrêtée à un terme quelconque, est susceptible de donner un plus grand degré d'approximation que la proposée (A.) supposée elle même arrêtée au terme correspondant ou de même rang.

38.

Recherchons, à cette effet, les limites du reste compris entre les grandes parenthèses de la transformée (B.), afin de les comparer à celles qui viennent d'être trouvées, en dernier lieu, pour le reste de la série (A.).

La série entre parenthèses, dont il s'agit, équivalant à la suivante

$$\Delta^{\mu-1} a_1 z - \Delta^{\mu-1} a_2 z + \Delta^{\mu-1} a_2 z^2 - \Delta^{\mu-1} a_3 z^2 + \Delta^{\mu-1} a_3 z^3 - \Delta^{\mu-1} a_4 z^3 + \text{etc.},$$

dont les termes sont nécessairement décroissans dès que les différences qui les multiplient le sont elles mêmes, ce qui est l'hypothèse admise, z étant d'ailleurs plus petit que l'unité ou tout au plus égal à l'unité, la somme de cette série se trouvera, dès lors, comprise entre les quantités $\Delta^{\mu-1} a_1 z$ et $\Delta^{\mu-1} a_1 z - \Delta^{\mu-1} a_2 z$; l'erreur absolue relative à la valeur

$$(D.) \quad S = s_1 + \frac{z}{1-z} a_1 - \frac{z^2}{(1-z)^2} \Delta a_1 + \frac{z^3}{(1-z)^3} \Delta^2 a_1 \dots \pm \frac{z^\mu}{(1-z)^\mu} \Delta^{\mu-1} a_1$$

sera en conséquence

$$< \frac{z^{\mu+1}}{(1-z)^\mu} \Delta^{\mu-1} a_1 > \frac{z^{\mu+1}}{(1-z)^\mu} \Delta^\mu a_2;$$

Comparant ces limites à celles qui ont été trouvées ci-dessus (37.) dans l'hypothèse ou l'on prend

$$(E.) \quad S = s_1 + a_1 z + a_2 z^2 + a_3 z^3 \dots + a_\mu z^\mu,$$

on voit que, si l'on a

$$\frac{z^{\mu+1}}{(1-z)^\mu} \Delta^{\mu-1} a_1 > a_{\mu+1} \frac{k z^{\mu+1}}{k-z}, \quad \text{ou} \quad \Delta^{\mu-1} a_1 > a_{\mu+1} \frac{k(1-z)^\mu}{k-z}$$

il n'y aura aucun motif de préférer, dans les calculs, à cette dernière expression de S , la précédente (D.), qui contient d'ailleurs le même nombre de termes; mais qu'au contraire, si l'on a

$$\frac{z^{\mu+1}}{(1-z)^\mu} \Delta^{\mu-1} a_1 < a_{\mu+1} \frac{k z^{\mu+1}}{k-z} \quad \text{ou, à fortiori,} < a_{\mu+1} z^{\mu+1},$$

c'est-à-dire

$$\Delta^{\mu-1} a_1 < a_{\mu+1} (1-z)^\mu,$$

il sera avantageux de substituer la première (D.) à la seconde (E.): toutefois, à moins que la valeur de $a_{\mu+1} (1-z)^\mu$ ne surpasse notablement celle de la différence $\Delta^{\mu-1} a_1$, on fera bien de s'en tenir à la série proposée dont le calcul et la forme sont plus simples.

39.

Supposant maintenant qu'on ne fasse commencer la transformation relative à cette série, qu'au terme dont le rang ou l'indice μ est n , on trouvera, sans difficultés,

$$\begin{aligned} S &= s_1 + a_1 z + a_2 z^2 \dots + a_{n-1} z^{n-1} + a_n z^n \frac{1}{1-z} - \Delta a_n z^{n+1} \frac{1}{(1-z)^2} \\ &\quad + \Delta^2 a_n z^{n+2} \frac{1}{(1-z)^3} - \dots \pm \Delta^{\mu-n} a_n z^\mu \frac{1}{(1-z)^{\mu-n+1}} \\ &\quad \mp \frac{z^\mu}{(1-z)^{\mu-n+1}} (\Delta^{\mu-n+1} a_n z + \Delta^{\mu-n+1} a_{n+1} z^2 + \Delta^{\mu-n+1} a_{n+2} z^3 + \text{etc.}); \end{aligned}$$

de sorte que, si l'on prend

$$(F.) \quad S = s_1 + a_1 z + a_2 z^2 + \dots + a_{n-1} z^{n-1} + a_n z^n \frac{1}{1-z} - \Delta a_n z^{n+1} \frac{1}{(1-z)^2} \\ + \Delta^2 a_n z^{n+2} \frac{1}{(1-z)^3} - \dots \pm \Delta^{\mu-n} a_n z^\mu \frac{1}{(1-z)^{\mu-n+1}},$$

l'erreur absolu sera, dans les mêmes hypothèses,

$$< \frac{z^{\mu+1}}{(1-z)^{\mu-n+1}} \Delta^{\mu-n} a_n > \frac{z^{\mu+1}}{(1-z)^{\mu-n+1}} \Delta^{\mu-n+1} a_n,$$

et par conséquent, pour qu'il fût certain que cette valeur (F.) est plus approchée que celle (E.), on devrait avoir

$$\frac{z^{\mu+1}}{(1-z)^{\mu-n+1}} \Delta^{\mu-n} a_n < a_{\mu+1} z^{\mu+1}, \text{ c'est-à-dire } \Delta^{\mu-n} a_n < a_{\mu+1} (1-z)^{\mu-n+1}.$$

40.

En général, on pourra à l'aide de considérations analogues à celles qui ont été mises en usage aux N^{os} 7. et suivant, régler la marche à suivre, dans les opérations, de manière à obtenir la plus grande approximation possible de l'emploi des transformées relatives aux divers ordres de différences. Mais, attendu que la transformation qui nous occupe, ne sera généralement avantageuse que lorsque les différences des coefficients de la série proposée, seront rapidement décroissantes, ou du moins décroîtront plus rapidement que ne croissent elles mêmes les puissances, de même ordre, de la fonction $1-z$, nous n'insisterons pas davantage, et nous nous bornerons à un seul exemple relatif à la série

$$-\log(1-z) = \frac{z}{1} + \frac{z^2}{2} + \frac{z^3}{3} + \frac{z^4}{4} + \dots + \frac{z^n}{n} + \frac{z^{n+1}}{n+1} + \text{etc.}$$

qui est peu convergente lorsque z approche de l'unité.

Fesant $s_1 = 0$, $a_1 = 1$, $a_2 = \frac{1}{2}$, $a_3 = \frac{1}{3}$, ... $a_n = \frac{1}{n}$, on trouvera

$$\Delta^\mu a_n = \frac{1.1.2 \dots \mu}{n(n+1)(n+2) \dots (n+\mu)}, \quad \Delta^{\mu-n} a_n = \frac{1.1.2 \dots (\mu-n)}{n(n+1)(n+2) \dots [n+(\mu-n)]}.$$

La condition pour que (F.) soit plus approché que (E.), deviendra donc ici

$$\Delta^{\mu-n} a_n = \frac{1.1.2 \dots (\mu-n)}{n(n+1)(n+2) \dots [n+(\mu-n)]} < a_{\mu+1} (1-z)^{\mu-n+1} = \frac{(1-z)^{\mu-n+1}}{\mu+1},$$

c'est-à-dire

$$z < 1 - \sqrt[\mu-n+1]{\left((\mu+1) \frac{1.1.2 \dots (\mu-n)}{n(n+1)(n+2) \dots [n+(\mu-1)]} \right)} \\ = 1 - \sqrt[m]{\left((m+n) \frac{1.1.2 \dots m-1}{n(n+1)(n+2) \dots (n+m-1)} \right)}$$

m représentant l'ordre $\mu - m + 1$ de la transformée relative au terme $a_n = \frac{1}{n}$ de la série proposée.

Supposons, en particulier,

$$n=4, m=4, \text{ on aura } z < 1 - \sqrt[4]{\left(\frac{2}{5.7}\right)} = 1 - 0,489 = 0,511,$$

$$n=9, m=2, \text{ on aura } z < 1 - \sqrt[2]{\left(\frac{11}{9.10}\right)} = 1 - 0,346 = 0,654.$$

Ces résultats suffisent pour montrer qu'il y aura, en général, peu d'avantages à appliquer la transformation qui nous occupe à la série proposée; ce à quoi d'ailleurs on devait bien s'attendre d'après la manière peu rapide dont décroissent les différences de ses coefficients.

En effet, pour le premier des exemples dont il s'agit, où $n=4$ et $m=4$, on aurait (38.)

$$S = \frac{z}{1} + \frac{z^2}{2} + \frac{z^3}{3} + \frac{z^4}{4} \cdot \frac{1}{1-z} - \frac{z^5}{4.5} \cdot \frac{1}{(1-z)^2} + \frac{2 \cdot z^6}{5.6.4(1-z)^3} - \frac{2.3}{4.5.6.7} \cdot \frac{z^7}{(1-z)^4},$$

à moins de $\frac{2.3.4}{4.5.6.7.8} \cdot \frac{z^8}{(1-z)^4}$;

et, par la série proposée (37.),

$$S = \frac{z}{1} + \frac{z^2}{2} + \frac{z^3}{3} + \frac{z^4}{4} + \frac{z^5}{5} + \frac{z^6}{6} + \frac{z^7}{7}, \text{ à moins de } a_{\mu+1} \frac{k z^{\mu+1}}{k-z} = \frac{1}{8} \cdot \frac{z^8}{1-z};$$

μ étant ici égal à $m-n+1$ ou 7, et k , limite inférieure du rapport $\frac{a_\eta}{a_{\eta+1}} = \frac{\eta+1}{\eta}$ considéré depuis $\eta = \mu = 7$ jusqu'à $\eta = \infty$, ayant pour valeur l'unité. Or en prenant précisément $z = \frac{1}{2}$, la limite de l'erreur relative à la première de ces expressions de S , devient $\frac{1}{5.7.8} \cdot \frac{1}{2^4}$, et celle de l'erreur qui se rapporte à la seconde $\frac{1}{8} \cdot \frac{1}{2^7}$, nombre qui n'est pas le quintuple du précédent.

41.

Néanmoins comme la transformée procède par des signes alternativement positifs et négatifs toutes les fois que les différences des divers ordres de la proposée sont décroissantes, il est évident qu'il pourra y avoir de l'avantage à la substituer à celle-ci quelque peu convergente qu'elle soit, puisqu'on pourra lui appliquer les méthodes d'approximation rapportées dans la 1^{ère} partie de ce mémoire.

Or la condition unique pour qu'elle soit convergente, c'est que ses termes diminuent indéfiniment et finissent par se réduire à 0, circonstance qui exige 1°. que l'on ait

$$\frac{z^{\mu+1}}{(1-z)^{\mu+1}} \Delta^\mu a_\mu : \frac{z^\mu}{(1-z)^\mu} \Delta^{\mu-1} a_\mu = \frac{z}{(1-z)} \cdot \frac{\Delta^\mu a_\mu}{\Delta^{\mu-1} a_\mu} < 1, \text{ ou } \frac{z}{1-z} < \frac{\Delta^{\mu-1} a_n}{\Delta^\mu a_n},$$

a_n représentant le terme de la série proposée auquel on veut appliquer la transformation; 2°. que l'expression

$$\frac{z^\mu}{(1-z)^\mu} \Delta^{\mu-1} a_n < \left(\frac{\Delta^{\mu-1} a_n}{\Delta^\mu a_n} \right)^\mu \Delta^{\mu-1} a_n$$

soit susceptible de devenir nulle quand on y suppose $\mu = \infty$; ce qui ne se présente que dans quelques cas particuliers et assez rares, comme nous l'avons déjà fait remarquer ci-dessus.

42.

D'après cela, il serait inutile de s'étendre davantage sur les formules de transformation qui ont été exposées en dernier lieu, et je ferai seulement observer que les considérations qui nous y ont conduit, fournissent quelques autres résultats généraux relatifs aux limites des séries, et qui, s'ils ne sont pas entièrement neufs, n'ont pas, ce nous semble, attiré l'attention des géomètres autant que le mérite leur importance et leur utilité.

Soit, par exemple, la série à termes positifs

$$S = s_n + a_n + a_{n+1} + a_{n+2} + a_{n+3} + a_{n+4} + \text{etc.}$$

Nommons M la plus grande et m la plus petite des valeurs numériques du rapport $\frac{a_\eta}{a_{\eta+1}}$ considéré depuis $\eta = n$ jusqu'à $\eta = \infty$. Multipliant, tour à tour, la série proposée par chacun de ces nombres; retranchant cette même série du résultat et divisant par $M-1$ et $m-1$ respectivement, il viendra les transformées

$$S = s_n + \frac{m}{m-1} a_n - \frac{1}{m-1} (a_n - m a_{n+1} + a_{n+1} - m a_{n+2} + a_{n+2} - m a_{n+3} + \text{etc.}),$$

$$S = s_n + \frac{M}{M-1} a_n - \frac{1}{M-1} (a_n - M a_{n+1} + a_{n+1} - M a_{n+2} + a_{n+2} - M a_{n+3} + \text{etc.}),$$

qui sont identiques avec la proposée si l'on peut négliger les termes qui répondent à η infini.

Or la quantité comprise entre les parenthèses de chacun de ces nouvelles expressions de S , est essentiellement positive pour la première et négative pour la seconde; donc on aura

$$S < s_n + \frac{m}{m-1} a_n \quad \text{et} \quad S > s_n + \frac{M}{M-1} a_n,$$

de sorte que si ces limites, de S , sont très rapprochées l'une de l'autre, ou, ce qui revient au même, si M et m sont très peu différens, on pourra prendre

$$S = s_n + \frac{1}{2} \left(\frac{m}{m-1} + \frac{M}{M-1} \right) a_n,$$

à moins de $\frac{1}{2} \left(\frac{m}{m-1} - \frac{M}{M-1} \right) a_n = \frac{1}{2} \cdot \frac{(M-m)}{(m-1)(M-1)} a_n.$

43.

Ces résultats supposent essentiellement, d'une part, que $a_\infty = 0$, d'une autre que m et M surpassent l'unité ou que $m-1$, $M-1$ soient positifs. Mais il est aisé de déterminer des limites de S où l'on ait égard à l'influence du terme a_∞ et du changement de signe de $m-1$ et de $M-1$.

En effet, pour tenir compte de ce terme quand il a une valeur finie, il ne s'agira que d'observer qu'étant placé à la limite de la série, il doit entrer positivement et sans multiplicateur dans les parenthèses des transformées. D'après cela, on trouvera, sans difficultés et en raisonnant comme on le ferait sur une suite finie quelconque, 1°. en vertu de la première transformée,

$$S < s_n + \frac{m}{m-1} a_n - \frac{a_\infty}{m-1}, \text{ si } m > 1, \text{ et } S > s_n - \frac{m}{1-m} a_n + \frac{a_\infty}{1-m}, \text{ si } m < 1;$$

2°. par la 2^{de} transformée,

$$S > s_n + \frac{M}{M-1} a_n - \frac{M a_\infty}{M-1}, \text{ si } M > 1, \text{ et } S < s_n - \frac{M}{1-M} a_n + \frac{a_\infty}{1-M}, \text{ si } M < 1.$$

En examinant attentivement ces nouvelles expressions des limites, on s'apercevra qu'en dehors du cas où m et M surpassent à la fois l'unité, et $a_\infty = 0$, elles deviennent, en général, illusoires et n'apprennent plus rien de positif sur la convergence de la série proposée ou l'existence de la valeur numérique de la fonction génératrice qu'elle représente. Ainsi, par exemple, dans le cas des séries à termes alternativement croissans et décroissans, dont nous nous occuperons plus loin, on aura, à la fois, $m < 1$ et $M > 1$; valeurs auxquelles ne correspondent que des limites inférieures de la somme S de la série.

44.

La somme numérique d'une série *indéfiniment décroissante* et affectée de signes différens, étant nécessairement moindre que celle de la série qui aurait les mêmes termes pris positivement, il est clair, d'après ce qui précède, qu'il sera souvent possible d'en assigner une limite supérieure quelconque. Mais, pour éviter l'infini qui se présenterait dans certains cas ou pour obtenir des limites plus approchées, il conviendra de partager la somme R des termes qui suivent s_n dans la proposée, ou le

reste relatif à s_n , en deux parties dont l'une $+R_1$ essentiellement positive, et l'autre $-R_2$ essentiellement négative, puis de chercher séparément les limites qui se rapportent à leurs valeurs absolues, afin d'en conclure ensuite les limites mêmes de R . Ayant trouvé, par exemple,

$$R_1 < L' > L'', \quad R_2 < L'_1 > L''_1,$$

on aura, *a fortiori*,

$R = R_1 - R_2 < L' - L'' > L'' - L'_1, \quad R_2 - R_1 > L''_1 - L' < L'_1 - L''$
selon que $L' - L'_1, L'' - L'_1$ seront, en même tems, positifs ou négatifs.

Dans le cas particulier des séries de la forme

$S = s_n \pm a_n \mp a_{n+1} \pm a_{n+2} \mp a_{n+3} \pm \text{etc.} = s_n \pm \Delta a_n \pm \Delta a_{n+2} \pm \Delta a_{n+4} \pm \text{etc.}$,
on se servira des résultats qui se concluent du No. 23. ou bien on procédera, comme dans le No. 41. ci-dessus, en remplaçant les soustractions par les additions, et prenant pour m et M la plus petite et la plus grande des valeurs de $\frac{\Delta a_\eta}{\Delta a_{\eta+1}}$ depuis $\eta = n$ jusqu'à $\eta = \infty$. On obtiendra, en effet, dans l'hypothèse de $\pm a_\infty = 0, \Delta a_\infty = 0$,

$$S \begin{matrix} > \\ < \end{matrix} s_n \pm \frac{m}{m+1} a_n \begin{matrix} < \\ > \end{matrix} s_n \pm \frac{M}{M+1} a_n, \quad S = s_n \pm \frac{1}{2} \left(\frac{m}{m+1} - \frac{M}{M+1} \right),$$

à moins de $\frac{1}{2} \frac{(M-m)a_n}{(M+1)(m+1)}$.

Les signes supérieurs et inférieurs se correspondant respectivement.

45.

On trouvera pareillement des limites de S , en opérant directement sur la somme de différences qui suit s_n , lorsqu'il arrivera que ces différences sont toutes positives, et, en général, on pourra traiter de cette manière beaucoup de séries dont les signes changent périodiquement suivant une loi connue.

Quant aux séries composées de suites alternativement convergentes ou divergentes, c'est-à-dire croissantes ou décroissantes, il conviendra de les partager en diverses suites distinctes, dont l'une infinie et les autres finies, de manière qu'on puisse, sans difficultés, déterminer séparément leurs limites pour en conclure celles de la série proposée.

Nommant, en effet, a_n l'un des termes de la série dont la valeur absolue est un maximum par rapport à ceux qui le précèdent ou le suivent immédiatement, de sorte que, pour ce terme, on ait sensiblement

$$\frac{a_{n-1}}{a_n} = \frac{a_n}{a_{n+1}} = 1; \text{ on prendra, en deçà et au de là de } a_n, \text{ un certain nom-}$$

bre de termes de la série proposée pour en composer une suite particulière, ascendante jusqu'à a_n puis descendante à partir de a_n , et qui soit telle que le premier $a_{n-\mu}$ de ses termes et le dernier a_{n+1} ; soient sensiblement égaux entre eux et fournissent des rapports $\frac{a_{n-\mu-1}}{a_{n-\mu}}$, $\frac{a_{n+\eta-1}}{a_{n+\eta}}$ qui diffèrent sensiblement de l'unité. Cela posé si $a_{n-\mu}$ est moindre que $a_{n+\eta}$, la somme des termes de la suite finie dont il s'agit, et que nous supposons positifs, sera moindre que $(\mu + \eta) a_n$ et plus grande que $(\mu + \eta) a_{n+\mu}$. Si, au contraire, a_n était un minimum, cette même somme serait

$$> (\mu + \eta) a_n < (\mu + \eta) a_{n+\eta}.$$

Enfin les autres portions finies ou infinies de la série, limitées aux précédentes, étant constamment croissantes ou décroissantes, m et M y seront à la fois plus petits ou plus grands que l'unité, et il deviendra facile de déterminer les limites finies de leurs sommes par le procédé du No. 42., sauf dans le seul cas où le rapport $\frac{a_n}{a_{n+1}}$ deviendrait rigoureusement l'unité pour n infini.

Nous n'entrerons pas dans de plus grands développemens relativement aux limites des séries; mais avant de clore ce mémoire, qui a acquis une extension considérable par suite des applications numériques dont nous l'avons accompagné, nous croyons devoir rapporter quelques considérations particulières relatives à la représentation des séries au moyen de figures géométriques, et qui mettent en évidence plusieurs de leurs propriétés générales.

Considérations géométriques sur les séries et principalement sur les limites de leurs restes.

46.

La manière que peut sembler la plus naturelle de représenter le cours d'une série, consiste à considérer comme l'ordonnée du sommet d'un certain polygone, la valeur de la somme de ses premiers termes jusqu'à celui dont le rang ou l'indice serait pris pour la valeur correspondante de l'abscisse. Ainsi l'on aurait, d'après cette définition géométrique, x et y étant les coordonnées rectangulaires d'un sommet quelconque d'un polygone limité ou illimité, l'équation

$$y = s_0 + a_0 + a_1 + a_2 \dots + a_x = s_1 + \sum_0^x a_x, \text{ ou } \Delta y = a_x \Delta x,$$

dans laquelle on peut, pour plus de généralité et lorsqu'il s'agit de représenter analytiquement un polygone de figure quelconque, supposer à Δx des valeurs variables quand on passe du sommet dont l'abscisse est x , au sommet consécutif dont l'abscisse est $x + \Delta x$, mais que, dans le cas le plus ordinaire des séries, on doit regarder comme constante et égale à l'unité. Il est évident en effet, que l'une ou l'autre des équations qui précèdent sont aptes à redonner tous les sommets, ou, ce qui revient au même, à représenter tout le cours d'un polygone quelconque, dès l'instant où α_x est donné en fonction de x et de constantes, et cela de la même manière que l'on représente le cours entier d'une courbe plane, par l'équation $y = f(x)$ ou son équivalente $dy = f'(x)dx$.

Nous ne nous étendrons pas sur les conséquences que l'on pourrait déduire de cet aperçu, attendu que la définition qui précède fait dépendre les propriétés des séries de celles de polygones dont le tracé dépend lui-même de la sommation des suites au moyen du calcul des différences finies; nous passeront, en conséquence, à un autre mode de représentation géométrique des séries, qui n'a pas cet inconvénient, du moins à certains égards.

47.

Supposons, en effet, que l'on considère (Fig. 1. Tab. I.) les valeurs des termes successifs de la série quelconque

$$x = a_0 + a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_y + a_{y+1} + a_{y+2} + \text{etc.},$$

prolongée indéfiniment, comme les ordonnées des différens sommets d'un polygone $\alpha'_0 \alpha'_1 \alpha'_2 \dots \alpha'_\infty$, ayant respectivement pour abscisses, les sommes des termes de la série supposée arrêtée aux termes dont s'agit, en convenant, pour la simplicité des considérations géométriques, d'attribuer le même signe ou la même direction, au dessus de l'axe des abscisses, aux ordonnées qui peuvent résulter de termes quelconques positifs ou négatifs. On voit qu'il deviendra très facile de suivre, sur la figure, la marche de la série ou la loi de progression de ses termes successifs et des sommes qui leur correspondent; on sera même en état, dans beaucoup de cas, de prévoir, à l'avance, si la somme de la série entière est susceptible d'une limite finie ou infinie: car, par exemple, si le polygone qui représente cette série, finit par conserver une forme toujours *concave* par rapport à l'axe des abscisses, comme cela a lieu notamment dans la figure à partir du sommet α'_2 ou du côté $\alpha'_2 \alpha'_3$, il est certain que la somme, x , de la

série, aura une valeur finie qui sera toujours surpassée par la valeur de l'abscisse du point d'intersection de l'axe des abscisses avec le prolongement de l'un quelconque des côtés $\alpha'_2, \alpha'_3, \alpha'_4, \dots$ appartenant à la partie dont il s'agit. Or rien de plus facile que de s'assurer directement qu'une portion donnée de polygone est constamment concave vers l'axe des x .

En effet, il ne s'agit que de prouver que l'angle d'inclinaison de ses côtés consécutifs, en marchant de la gauche vers la droite, sur l'axe dont il s'agit, va constamment en croissant de manière à conserver une valeur finie pour le côté le plus avancé vers l'infini; bien entendu d'ailleurs que les accroissemens correspondans des abscisses seront positifs et décroissans.

48.

La tangente de cet angle, pour le côté quelconque $\alpha'_n \alpha'_{n+1}$ (Fig. 2.), est évidemment mesurée par l'expression

$$\text{tang } \omega = \frac{a_n - a_{n+1}}{a_{n+1}} = \frac{a_n}{a_{n+1}} - 1,$$

en représentant cet angle par ω , et considérant comme positifs les angles aigus formés par le prolongement de chaque côté avec la gauche de l'axe des abscisses. Si donc cette fonction conserve constamment le même signe de a_n à a_∞ , en ne considérant que les valeurs absolues de a_n et a_{n+1} ; si, de plus, elle croît indéfiniment avec n , il est clair que la portion de polygone qui lui correspond sera concave vers l'axe des abscisses, et que la série proposée sera susceptible d'une limite finie qui sera comprise entre l'abscisse $0\alpha_n$ qui répond à l'ordonnée $\alpha'_n \alpha_n$, et celle du point k intersection de l'axe Ox avec le prolongement du côté $\alpha'_n \alpha'_{n+1}$.

Cela posé on remarquera que le triangle $\alpha'_n k \alpha_n$ donne

$$\alpha_n k = \frac{a_n}{\text{tang } \omega} = \frac{a_n \cdot a_{n+1}}{a_n - a_{n+1}};$$

de sorte que si l'on fait

$$s_{n+1} = a_0 + a_1 + a_2 + \dots + a_n, \quad R = a_{n+1} + a_{n+2} + a_{n+3} + \text{etc.}$$

et qu'on représente, en outre, comme dans tout le cours de ce Mémoire, par S la limite vers laquelle converge la somme entière de la série proposée, on aura, pour le cas particulier qui nous occupe,

$$S < s_{n+1} + \frac{a_n \cdot a_{n+1}}{a_n - a_{n+1}} > s_{n+1} + a_{n+1} \quad \text{ou} \quad R < \frac{a_n \cdot a_{n+1}}{a_n - a_{n+1}} > a_{n+1}.$$

Mais il est facile d'obtenir une limite inférieure plus approchée de S , en considérant qu'attendu que la portion de polygone, qui répond à R , est

supposée constamment concave vers l'axe des abscisses ou convexe en dehors, la parallèle $\alpha'_{n+1} k'$, menée par le sommet α'_{n+1} au dernier côté qui répond à α_∞ ou à n infini, doit nécessairement rencontrer l'axe Ok en un point k' situé en deçà de α_∞ , et dont la position est déterminée par la relation

$$\alpha_{n+1} k' = \frac{\alpha_{n+1}}{\tan \omega'},$$

ω' représentant l'angle aigu formé par l'axe des abscisses avec le dernier des côtés du polygone, ou $\tan \omega'$ la valeur de $\tan \omega$ quand on y suppose n infini.

On aura donc, pour déterminer les limites du reste R de la série,

$$R < \frac{\alpha_n}{\tan \omega} > \frac{\alpha_{n+1}}{\tan \omega'} + \alpha_{n+1},$$

avec la seule condition que, dans l'étendue de R , tous les termes soient positifs et indéfiniment décroissans en même tems que le rapport de chacun d'eux au précédent.

49.

Prenant, pour exemple, la série

$$\alpha^x = 1 + la \frac{x}{1} + la^2 \frac{x^2}{1.2} + la^3 \frac{x^3}{1.2.3} \dots + la^n \frac{x^n}{1.2 \dots n} + la^{n+1} \frac{x^{n+1}}{1.2 \dots (n+1)} \\ + la^{n+2} \frac{x^{n+2}}{1.2 \dots (n+2)} + \text{etc.}$$

qui satisfait évidemment aux conditions ci-dessus dès que $n+1 > xla$, on trouvera

$$\tan \omega = \frac{n+1}{xla} - 1, \quad \tan \omega' = \infty, \quad R < \frac{la^{n+1} x^{n+1}}{2.3 \dots n(n+1 - xla)} > \frac{la^{n+1} x^{n+1}}{2.3 \dots n(n+1)}.$$

En appliquant, à ce même exemple, le théorème de *Lagrange*, concernant le reste de la série de *Maclaurin*, on trouve

$$R < la^{n+1} \frac{\alpha^x x^{n+1}}{2.3 \dots n(n+1)} > \frac{la^{n+1} x^{n+1}}{2.3 \dots n(n+1)},$$

et il est évident que ces limites, qui ont l'inconvénient de dépendre de la fonction dont il s'agit de calculer le développement, seront, en général, moins approchées que les précédentes, pour des valeurs de n surpassant notablement $xla - 1$. C'est d'ailleurs ce qu'on peut vérifier pour le cas particulier de $x = 1$, $a = e = 2,71828$ ou $la = 1$.

50.

Considérons maintenant le cas où le polygone $\alpha'_n \alpha'_{n+1} \dots \alpha_\infty$ (Fig. 3.), appartenant à la portion de la série proposée comprise depuis α_n jusqu'à

a_∞ est constamment convexe du côté de l'axe des abscisses, on aura encore

$$\tan \omega = \frac{a_n - a_{n+1}}{a_{n+1}} = \frac{a_n}{a_{n+1}} - 1$$

avec la condition que, de a_n à a_∞ , ou de $n = n$ à $n = \infty$, 1°. la valeur absolue de $\frac{a_n}{a_{n+1}}$ reste constamment au dessus de l'unité; 2°. qu'elle aille sans cesse en décroissant au lieu de croître comme dans le cas précédent. Or il est facile de voir que, pour ce cas, les limites ci-dessus du reste R de la série, supposée arrêtée au terme a_n , devront être renversées, c'est-à-dire qu'on aura

$$a_n a_\infty > a_n k < a_n k'; \text{ c'est-à-dire } R > \frac{a_n}{\tan \omega} < \frac{a_{n+1}}{\tan \omega} + a_{n+1},$$

$\tan \omega'$ représentant toujours la valeur de $\tan \omega$ relative à $n = \infty$, et a_∞ étant supposé nul, comme dans le cas précédent. Quant au cas où la dernière ordonnée a_∞ du polygone aurait une valeur finie quelconque que surpasseraient toutes les autres, il paraît évident, à priori, que $0 a_\infty = S$ serait infini, $\tan \omega' = 0$, et $\frac{a_{n+1}}{\tan \omega'} = \frac{1}{0}$.

51.

Considérons enfin le cas où le polygone $a'_n a'_{n+1} \dots a_\infty$ (Fig. 4.) se rapprochant continuellement de l'axe des x , contiendrait néanmoins une ou plusieurs inflexions telle que celle qui a lieu au sommet a'_{n+3} par exemple, lequel partage ici le polygone en deux parties dont l'une est convexe du côté de l'axe des abscisses et l'autre concave du même côté, dans toutes ses parties; ce qui signifie simplement que le rapport $\frac{a_x}{a_{x+1}}$, toujours > 1 , ayant commencé par décroître depuis $x = n$ jusqu'à $x = n + 3$, a fini par recroître, et cela continuellement, à partir de cette dernière valeur; si nous considérons, dis-je, les choses dans cette hypothèse, il faudra supposer le reste R de la série proposée, ou le polygone $a'_n a'_{n+1} \dots a_\infty$ qui lui correspond, partagé en autant de portions distinctes qu'il y a de termes pour lesquels le rapport $\frac{a_x}{a_{x+1}}$ atteint une valeur numérique maximum ou minimum, puis rechercher séparément les limites des sommes comprises entre les termes dont il s'agit, et ajouter enfin entre elles les limites de même espèce, pour en composer les limites totales.

Dans le cas de la Fig. 4., par exemple, qui n'a qu'un seul point d'inflexion en a'_{n+3} , répondant au côté $a'_{n+2} a'_{n+3}$, qui forme le plus petit

angle avec l'axe Ox , on supposera menée la parallèle $b a'_{n+3}$ à cet axe, et l'on rapportera la portion de polygone $a'_n a'_{n+1} \dots a'_{n+3}$ à cette parallèle comme nouvel axe des abscisses; ce qui revient à diminuer de $a_{n+3} a'_{n+3}$ ou de a_{n+3} toutes les ordonnées correspondantes. On aura donc, d'après ce qui précède, en nommant R_1 la valeur de $b a'_{n+3} = a_n a_{n+3}$, et R_2 celle de $a_{n+3} a_\infty$,

$$R_1 < \frac{a_{n+1} - a_{n+3}}{\tan \omega'_1} + a_{n+1} > \frac{a_n - a_{n+3}}{\tan \omega_1}, \quad R_2 + a_{n+3} < \frac{a_{n+3}}{\tan \omega'_1} > \frac{a_{n+3}}{\tan \omega'} + a_{n+3},$$

dans lesquelles $\tan \omega'_1$, $\tan \omega_1$, $\tan \omega'$ sont les valeurs respectives de

$$\tan \omega = \frac{a_x}{a_{x+1}} - 1$$

correspondantes respectivement à $x = n + 2$, $x = n$ et $x = \infty$.

On aura donc aussi

$$R = R_1 + R_2 < \frac{a_{n+1}}{\tan \omega'_1} + a_{n+1} - a_{n+3} > \frac{a_n - a_{n+3}}{\tan \omega_1} + \frac{a_{n+3}}{\tan \omega'}.$$

52.

Mais on peut obtenir des expressions plus simples, quoique moins approchées, des limites du reste R , en considérant que, puisque le côté $a'_{n+2} a'_{n+3}$ est, par hypothèse, celui qui fait le plus petit angle l'axe des x , la parallèle qui lui est menée du sommet a'_n , laissera nécessairement en dessous tout le polygone qui représente R ; de sorte qu'on aura nécessairement aussi

$$R < \frac{a_n}{\tan \omega'_1}.$$

Et si d'ailleurs le dernier côté, qui répond à n infini, est celui qui forme le plus grand angle avec le même axe, il est clair que la parallèle qui lui est menée par le sommet a_n , laissera en dehors ce même polygone; de sorte qu'on aura

$$R > \frac{a_n}{\tan \omega'}.$$

En général, on voit que, quel que soit le nombre des inflexions du polygone, pourvu que ses ordonnées a_x aillent sans cesse en diminuant, on aura

$$R < \frac{a_n}{k-1} > \frac{a_n}{l-1};$$

l étant la plus grande et k la plus petite des valeurs que peut prendre le rapport $\frac{a_x}{a_{x+1}}$ depuis $x = n$ jusqu'à $x = \infty$.

7 *

53.

Il est aisé d'apercevoir d'ailleurs l'analogie de cette règle avec celles qui ont été obtenues par la considération des moyennes, au No. 42., et l'on arriverait à des rapprochemens semblables (45.) pour le cas des séries, à termes positifs, composées de suites alternativement croissantes et décroissantes, qui seraient ici représentées par des polygones ondulés s'écartant et s'approchant alternativement de l'axe des abscisses.

Quant au cas où les termes de la série proposée sont en partie positifs et en partie négatifs, nous n'ajouterons rien de plus à ce qui a été dit, en général, au No. 44., et nous ferons seulement remarquer que les séries dont il s'agit donneraient lieu, d'après nos conventions, à des polygones en *zigs-zags* ayant la forme représentée dans la (Fig. 5.), et dont il serait facile d'établir plusieurs des propriétés générales au moyen de considérations purement géométriques.

54.

En terminant ici ce que nous nous proposons de dire touchant le calcul numérique des séries, nous devons insister sur la difficulté, qu'offre la détermination d'une limite finie et approchée de leur somme, toutes les fois que leurs derniers termes, vers la droite, se trouvant dans le cas (50.) représenté par la (Fig. 3.), il arrive que l'élément ou côté du polygone $\alpha'_n \alpha'_{n+1} \dots \alpha_\infty$, qui répond à n infini, se confond avec l'axe des abscisses, de sorte qu'on a rigoureusement $\tan \omega' = 0$, et partant, $\alpha'_n k' \text{ ou } \frac{\alpha_{n+1}}{\tan \omega'} = \infty$.

En effet, ce cas est complètement douteux, attendu qu'il peut aussi bien arriver que la valeur représentée par la série proposée soit finie qu'infinie, selon que la portion de polygone considéré osculera l'axe des abscisses en un point α_∞ , plus ou moins éloigné de l'origine, ou lui sera, en quelque sorte, *asymptote* à distance finie ou infinie.

55.

Pour donner un exemple d'une série dont la limite supérieure du reste se présente sous la forme $\frac{1}{0}$, sans que, pour cela, la valeur qu'elle représente soit elle même infinie, nous considérerons le développement

$$(1-z)^m = 1 - \frac{mz}{1} + \frac{m(m-1)}{1.2} z^2 - \frac{m(m-1)(m-2)}{1.2.3} z^3 \dots$$

$$\dots \pm \frac{m(m-1)\dots(m-n+1)}{1.2\dots n} z^n + \text{etc.},$$

dans la supposition de m fractionnaire et positif.

Il est évident que les termes de ce développement seront alternativement positifs et négatifs tant que l'on aura $m > n - 1$ ou $n < m + 1$, et que, passé le terme pour lequel cette circonstance arrive, ils redeviendront tous de même signe. Supposant donc que le terme en z^n , appartenne à la suite de ceux qui conservent le même signe, on aura, en faisant abstraction de ce signe,

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} = \frac{n+1}{(n-m)z}, \quad \text{tang } \omega = \frac{n+1}{(n-m)z} - 1 = \frac{1}{z} + \frac{1+m}{(n-m)z} - 1;$$

ce qui montre que le rapport de a_n à a_{n+1} sera toujours plus grand que l'unité et par conséquent la série décroissante depuis $n > m$ jusqu'à $n = \infty$, si seulement z est lui même au dessous de $\frac{n+1}{n-m}$. On voit, de plus, que ce rapport, et par conséquent $\text{tang } \omega$, iront sans cesse en décroissant jusqu'à la valeur de $n = \infty$, pour laquelle ils se réduiront respectivement aux quantités $\frac{1}{z}$ et $\frac{1}{z} - 1$.

On aura donc ici (50.) pour le terme de rang quelconque $n > m$, et en nommant R la somme de tous ceux qui le suivent,

$$R < \frac{a_{n+1}}{1-z} > \frac{a_n z (n-m)}{n+1-z(n-m)},$$

pourvu qu'on ne prenne que les valeurs absolues de a_n et a_{n+1} .

Lorsque la valeur de z s'approche beaucoup de l'unité, en lui demeurant néanmoins inférieure, la première de ces limites devient très grande, et elle peut s'écarter considérablement de la véritable valeur de R , à moins que sa différence avec la seconde limite ne soit elle même une petite fraction de chacune d'elles. Mais dans le cas particulier de $z = 1$, ces limites devenant

$$R < \infty > \frac{(n-m)a_n}{m+1},$$

elles n'apprennent absolument rien sur la convergence ou la non-convergence de la série, bien qu'alors même le reste de cette série, à quelque terme qu'on l'arrête, soit nullement susceptible d'une limite finie.

Cet inconvénient, au surplus, a lieu pareillement dans l'application du théorème de *Lagrange* aux hypothèses actuelles.

56.

Comme exemple d'une série décroissante dont la valeur devient infinie en même tems que sa limite supérieure, nous considérerons la série

$$\log(1-z) = \frac{z}{1} + \frac{z^2}{2} + \frac{z^3}{3} + \frac{z^4}{4} + \frac{z^5}{5} + \text{etc.} + \frac{z^n}{n} + \text{etc.}$$

qui, par l'application des règles du No. 50., conduit aux limites suivantes du reste R , relatif au cas où l'on s'arrêterait au terme $a_n = \frac{z^n}{n}$,

$$R < \frac{z^{n+1}}{(n+1)(1-z)} > \frac{z^{n+1}}{n(n-z)+1},$$

attendu qu'on a ici $\tan \omega' = \frac{1}{z} - 1$ et $\tan \omega = \frac{n+1}{nz} - 1$. Or ces deux limites deviennent par la supposition de $z = 1$,

$$R < \frac{1}{0} > 1, \text{ tandis que } \log(1-z) = \frac{1}{0}.$$

Il est sans doute inutile de dire que, dans ce dernier exemple comme dans celui qui précède, la limite supérieure de R devenant négative pour toute valeur de z plus grande que l'unité, c'est un signe certain que la série cesse d'être convergente et de représenter par conséquent les valeurs de la fonction dont elle tire son origine.

Dans l'un et l'autre des cas qui nous occupent, les valeurs sont imaginaires en effet; mais il est bien des cas où les mêmes circonstances peuvent se présenter sans que la fonction génératrice cesse d'avoir une valeur réelle et finie, algébriquement parlant: tel est, par exemple, le développement si connu

$$1 + z + z^2 + z^3 + z^4 + \text{etc. de la fraction } \frac{1}{1-z},$$

laquelle devient infinie pour $z = 1$, et change simplement de signe pour $z > 1$; de sorte que la seule chose qu'on puisse affirmer, dans le cas où la limite supérieure du reste des séries se présente sous la forme $\frac{1}{0}$, c'est que les fonctions génératrices correspondantes éprouvent un changement d'état algébrique quelconque, et qu'elles cessent d'être représentées, même sous le point de vue analytique, par leur développement toutes le fois que la limite dont il s'agit devient négative. On conçoit, en effet, qu'une série à termes positifs ne pouvant changer de signe, ni acquérir explicitement des valeurs imaginaires pour des valeurs réelles et positives des variables qui y entrent, il faut bien que l'absurdité, ou la contradiction se manifeste par quelque signe particulier, tel que la valeur infinie ou négative de la limite supérieure de ces restes.

Paris le 25. Juillet 1833.