gegebenen Zeichnung für eine Reihe von Querschnitten den Schwerpunkt bestimmte und dann von 10° zu 10° in δ fortschreitend, die α Schnittpunkte der zusammenhängenden Linie ermittelte. Für 1925.0 ergab sich dabei der folgende beobachtete Verlauf des galaktischen Äquators:

δ	α	δ	α
-30°	$7^h 55^m = 118.8$	$+60^\circ$	$22^h 55^m = 343.8$
-20	$7 \ 35 \quad 113.8$	$+50$	$21 \ 15 \quad 318.8$
-10	$7 \ 10 \quad 107.5$	$+40$	$20 \ 25 \quad 306.2$
0	$6 \ 50 \quad 102.5$	$+30$	$20 \ 0 \quad 300.0$
$+10$	$6 \ 30 \quad 97.5$	$+20$	$19 \ 35 \quad 293.8$
$+20$	$6 \ 5 \quad 91.2$	$+10$	$19 \ 10 \quad 287.5$
$+30$	$5 \ 40 \quad 85.0$	0	$18 \ 50 \quad 282.5$
$+40$	$5 \ 15 \quad 78.8$	-10	$18 \ 30 \quad 277.5$
$+50$	$4 \ 25 \quad 66.2$	-20	$18 \ 10 \quad 272.5$
$+60$	$2 \ 45 \quad 41.2$	-30	$17 \ 45 \quad 266.2$

Bezeichnet man mit Ω den aufsteigenden Knoten des galaktischen Äquators auf dem Himmelsäquator, mit i die Neigung der beiden Ebenen, so ist

$$\operatorname{tg} \delta = \sin \alpha \cos \Omega \operatorname{tg} i - \cos \alpha \sin \Omega \operatorname{tg} i.$$

Setzt man $\sin \alpha = a \quad \cos \alpha = b \quad \operatorname{tg} \delta = l$
 $\cos \Omega \operatorname{tg} i = x \quad \sin \Omega \operatorname{tg} i = y$

so kann man die Gleichung in der Form
 $ax + by + l = 0$

schreiben und erhält aus den beobachteten 20 Daten ebenso viele Bedingungsgleichungen von dieser Form. Ihre gleichwertige Auflösung nach der Methode der kleinsten Quadrate führt auf die Normalgleichungen

$$16.262x + 2.945y = 1.331 \quad 2.945x + 3.736y = -5.985.$$

Hieraus folgt

$$x = \cos \Omega \operatorname{tg} i = [0.63736] \quad \Omega = 282^\circ 34'9''$$

$$y = \sin \Omega \operatorname{tg} i = [0.28869] \quad i = 63^\circ 20'5''$$

somit für die Lage des nördlichen Milchstraßenpols 1925.0:

$$A = 192^\circ 58', \text{ jährl. Änd. } +0^\circ 0' 12''$$

$$D = +26^\circ 66', \text{ » » } -0^\circ 0' 54''.$$

¹⁾ vergl. Kobold, Bau des Fixsternhimmels, S. 173.

Versucht man mit den abgeleiteten Konstanten Ω und i nach $\sin(\alpha - \Omega) = \operatorname{tg} \delta / \operatorname{tg} i$

eine Darstellung der vorhin benutzten Tabelle, so erhält man:

δ	α	B-R	δ	α	B-R
-30°	119.4	-0.6	$+60^\circ$	343.0	$+0.8$
-20	113.1	$+0.7$	$+50$	319.3	-0.5
-10	107.7	-0.2	$+40$	307.5	-1.3
0	102.6	-0.1	$+30$	299.4	$+0.6$
$+10$	97.5	-0.0	$+20$	293.1	$+0.7$
$+20$	92.0	-0.8	$+10$	287.7	-0.2
$+30$	85.7	-0.7	0	282.6	-0.1
$+40$	77.7	$+1.1$	-10	277.5	-0.0
$+50$	65.8	$+0.4$	-20	272.0	$+0.5$
$+60$	42.2	-1.0	-30	265.7	$+0.5$

Das Ergebnis zeigt, daß der untersuchte Bogen der Milchstraße sich ohne jeden Gang auffallend genau einem größten Kreise anschmiegt, daß somit bei den schwachen Sternen, Sternhaufen und Nebeln, die den äußeren Anblick der Milchstraße hervorrufen, eine Abweichung der Sonne von der galaktischen Ebene nicht feststellbar ist. Daß dies auch für den südlichen Teil der Milchstraße gilt, überzeugt man sich leicht, wenn man die Fortsetzung der Tabelle:

δ	α	δ	α
-30°	119.4	-60°	222.2
-40	127.5	-50	245.8
-50	139.3	-40	257.7
-60	163.0	-30	265.7

etwa mit der Milchstraßendarstellung in der Uranometria Argentina vergleicht.

Der Unterschied gegenüber dem aus den schwächsten BD-Sternen durch *Ristenpart* gewonnenen Resultat, der für die Maximalanhäufung der Sterne 8^m-9^m5 (photometrisch 8^m bis 10^m5) noch 2° Abweichung vom größten Kreise fand ¹⁾, ist so beträchtlich, daß damit der zahlenmäßige Beweis erbracht ist, daß das visuelle Bild der Milchstraße tatsächlich wesentlich schwächeren Objekten zu verdanken ist, die kaum oberhalb 12^m-13^m liegen dürften.

Bergedorf, 1920 Sept. 28.

K. Graff.

Saturnring.

Die mit ihrer Schattenseite der Erde zugekehrten Ringteile des Saturn waren im 60 cm-Refraktor Febr. 10 bereits lichtschwach, aber selbst bei starker Blendung des Objektivs (bis auf 22 cm) noch gut erkennbar. Febr. 14 blitzten die Ansen nur in günstigsten Momenten auf, und Febr. 18 und 21 konnten weder Prof. Schorr noch ich bei bester Luft eine Spur des Ringes entdecken. Die letzte Beobachtung der Unsichtbarkeit fällt auf Febr. 21 $12^h 8$ m. Z. Gr.

Febr. 22 $8^h 0$ m. Z. Gr. traten die Ansen bereits als eine sehr auffällige ungleich helle, aber bis an den Planetenrand reichende Lichtlinie auf, ein Zeichen, daß der Übergang der

Bergedorf, 1921 Febr. 24.

Erde auf die Sonnenseite des Ringes bereits erfolgt war. Der betr. Augenblick ist zweifellos bis auf wenige Bruchteile einer Stunde feststellbar gewesen: Aus den hiesigen Beobachtungen ist nur zu ersehen, daß er zwischen die Morgen- und Abendbeobachtung des 22. Februar fällt.

Ein Versuch, die Helligkeit der hellsten Ansenanteile photometrisch zu ermitteln, führte zu folgendem Ergebnis (Titan = 8^m5):

Febr. 8.5	12^m0	Febr. 18.5	$< 13^m5$ (Schätzg.)
10.5	12.5	21.5	< 14 »
14.4	13.5 (Schätzg.)	22.5	10.5

K. Graff.

Ein neuer Außenring des Saturn?

Am 22. Februar beobachtete ich Saturn von etwa $11^h 1/2^h$ M. E. Z. an am großen Heliometer. Um $12^h 20^m$ sah ich den Ring als äußerst feine Linie, die sich als heller Strich auch über den Saturn hinzog. Da die Erde erst 4 Stunden vorher sich in der Ebene des Ringes befand und ich am Tage vorher

bei allerdings nicht so ruhiger Luft nichts vom Ringe habe wahrnehmen können, glaubte ich zunächst an eine Täuschung, die etwa hervorgerufen sein könnte durch einige Monde, Nebellicht im Instrumente u. s. w. Ich habe die beiden Saturnbilder im Heliometer daher in den verschiedensten Stellungen zu-