		M. Kgb. Zt.	AR. app.	Decl. app.	z.	p.	Scheinb. Ort des Vergl.-Sterns.	
Janr.	27	8 ^h 55' 20"	63° 44' 39" 9	+18° 18' 9" 6	38° 4	+14° 9	64° 1' 46" 7	18° 41' 6" 7
	29	8 28 28	64 3 56,1	18 30 26,6	37,2	+10,8		
Febr.	2	8 18 39	64 48 20,6	18 55 18,3	37,0	+11,3	64 56 28,4	18 50 11,4 sTauri
	6	9 16 0	65 40 34,7	19 20 24,1	41,5	+25,0		
	8	8 40 14	66 8 39,7	19 32 37,8	39,0	+20,1	66 7 37,5	19 29 5,9
	15	11 17 25	68 2 20,8	20 15 55,1	60,3	+37,6	67 48 16,6	20 14 35,5
März	13	10 18 2	77 37 39,0	22 38 6,6	59,7	+38,7	77 5 38,4	22 39 15,2
	25	9 51 30	82 47 34,2	23 24 9,7	59,1	+38,9	82 30 24,5	23 13 41,5

Die Oerter der Vergleichsterne von Febr. 2 (sTauri) und März 25 (124Tauri) sind aus den Angaben des Britt. Assoc.-Catalog abgeleitet, die übrigen aus den in Nr. 629 mitgetheilten Bestimmungen von Herrn Dr. Busch.

In meiner Abhandlung über die Libration habe ich noch folgende Verbesserungen aufgefunden:

Nr. 619 p. 293 Zeile 15	lies	$\sin(l-N) = -\sin(l-n)$
„ — „ 297 „ 18	„	$(\eta^2 - \xi^2) \frac{1}{2} \sin 2\varphi$
„ — „ 300 „ 3 v. u.	„	$u = \frac{-3m'^2\gamma H \sin h}{\left(\frac{dh}{dt}\right)^2 - 3m'^2\gamma}$
„ 621 „ 322 „ 5 v. u.	„	$-a \sin \alpha,$
„ — „ 323 „ 6 v. u.	„	$1 + \tau = \left(\frac{d\alpha}{dm}\right)^2$
„ — „ 329 „ 16	„	$3\beta \frac{\epsilon i}{k} = 146'' 3$
„ 628 „ 57 „ 14 v. u.	„	$-(9,9993293) \cos(\lambda + m - n)$
„ — „ 60 „ 10 v. u.	„	$\dots + 0,0005 \sin(\pi - n)] F$
„ 631 „ 107 „ 11 v. u.	„	„Wurzel ihrer Quadratsumme“

Außerdem sind noch folgende zwei Verwechslungen entstanden:

Nr. 619 p. 299 Zeile 25, 26, 28, 29

„ — „ 300 „ 17, 24

„ — „ 301 „ 1, 10

„ 621 „ 329 „ 23

„ — „ 331 „ 5, 21

„ 628 „ 57 „ 2 v. u.

„ — „ 59 „ 8, 11, 39

„ — „ 61 „ 4, 5, 9, 18.

Ist überall das r in ein griechisches ν zu verwandeln, wo es von der Einführung der Variablen $a_0 \sin \nu t$ und $a_0 \cos \nu t$ herührt; es soll gelesen werden:

$a_0 \sin \nu t, a_0 \cos \nu t, (A_0 + \nu t)$ u. s. w.

Nr. 621 p. 327 Zeile 15, 22, 24, 30, 37

„ — „ 329 „ 16, 17.

Ist in den Ausdrücken: $\frac{1}{2} k \sin(\pi - n), \mathfrak{J} + i(1 + k)$, und $(\mathfrak{J} + i + ik)$ statt des k ein griechisches κ zu setzen.

Moritz Wichmann.

Auszug aus einem Schreiben des Herrn Observators Schweizer an den Herausgeber.

Moskau October 23²³/₁₀ 1847.

Ich bin so frei Ihnen in Gegenwärtigem die hiesigen Beobachtungen der Sonnenfinsternis vom 8ten und 9ten October n. st. zu beliebigem Gebrauche mitzutheilen, indem sie unter den günstigsten Umständen gemacht wurden. Der Himmel war von Anfang bis zu Ende klar, nur hie und da, aber nie in der Nähe der Sonne mit leichten Streifwolken bedeckt; — die Sonne mit einer großen Anzahl von Flecken besät, deren Bedeckungen vom Mondrande sich vortrefflich beobachten liessen. Jedem ich vermuthe, dafs auch an andern Orten dies

geschah, sende ich Ihnen alle Beobachtungen, weil es wohl nicht ohne Nutzen ist, correspondirende zu haben.

Herr Professor Perewoschtschikow und Alexander Druschusoff erlaubten mir ihre Beobachtungen zu benutzen, was ich hiemit mit Freuden thue. Sie sind beziehungsweise mit P oder D bezeichnet.

Bei der Reduction wurden die Hunderttheile der Secunden berücksichtigt; in den gegenwärtigen definitiven Zahlen aber als illusorisch weggelassen.

Mittlere Moskauer Zeit. 1847 October 8.

Schweizer.

P 21^h 15' 44" 8

21^h 15' 34" 8

Anfang der Finsternis.

Fleckengruppe I. (am Westrande auf der nördl. Hälfte der Sonne)

21 24 11,9

Mitte des schwarzen Punktes (1)

24 44,8

————— (2)

Fleckengruppe II. (auf der süd. Hälfte der Sonne die westlichste Fleckengruppe.)

D	21 ^h 30'41"8	21 ^h 30'41"8	Anfang des größern schwarzen Punktes	(1)
		31 0,7	Ende	(2)
		33 8,4	Mitte des schwarzen Punktes	(3)
		33 24,4		(4)
		33 55,3		(5)

Fleckengruppe III. — Eintritt. (etwas nördlich von I.)

		21 ^h 39'35"4	Anfang des Halbschattens	(1)
D	21 ^h 41'23"8	41 24,1	Anfang des ersten schwarzen Fleckens	(2)
D	42 24,3	42 24,9	zweiten	(3)
D	44 22,3	44 22,1	Ende	(4)
		46 43,2	Ende des Halbschattens	(5)

Fleckengruppe IV. (etwas südlicher und östlicher als II.)

21^h47'24"6 Ende des schwarzen Fleckens.

Fleckengruppe III. — Austritt.

22 ^h 8'20"7	vide Eintritt :	(3)
9 32,5		(2)
11 7,2::		(1)

Fleckengruppe V. (süd. auf der östlichen Sonnenhälfte.)

		22 ^h 34'31"4	Mitte des schwarzen Punktes	(1)
		34 42,4		(2)
P	22 ^h 35'27"3	35 29,3	Anfang des Halbschattens	(3)
		35 43,2	Anfang des untern schwarzen Fleckens	(4)
		36 9,7	Ende	(5)

Fleckengruppe VI. (östlich von V.)

22 ^h 38'28"3	Anfang des ersten schwarzen Fleckens	(1)
39 14,2	Ende des zweiten	(2)
40 46,4	Mitte des ersten schwarzen Punktes	(3)
41 9,8	Mitte des zweiten schwarzen Punktes	(4)

Fleckengruppe VII. — Eintritt. (am östlichen Sonnenrande und etwas nördlicher als V und VI)

		23 ^h 3'3"8	Anfang der beiden schwarzen Punkte	(1)
		3 42,2	Ende	(2)
		7 1,1	Anfang des ersten schwarzen Fleckens	(3)
P	23 ^h 8'21"8	8 21,9	Ende	(4)
P	12 27,9	12 34,2	Anfang des zweiten schwarzen Fleckens	(5)
P	15 27,9	15 29,8	Ende	(6)

Fleckengruppe VII. — Austritt.

23 ^h 36'33"3	vide Eintritt :	(5)
41 5,6		(1)
41 36,5		(4)

1847. October 9.

P 0^h4'9"9 0^h3'57"9 Ende der Finsternis.

Ich erlaube mir ferner noch folgende Bemerkungen hinzuzufügen.

- 1) Sowohl Freitag als Sonnabend Abend wurden absolute Zeitbestimmungen gemacht, an einem kleinen transportablen *Ertel'schen* Passageninstrumente, welches dieselben Dimensionen hat, und genau so construirt ist, wie das in der „Description de l'Observatoire central de Poulkova“ pag. 216 unter Nr. 11 beschriebene.
- 2) Während der Finsternis benutzten wir die Box-Chronometer *Kessels* 1403 und *Dent* 1732, die am Anfang, der Mitte und am Ende derselben mit unserer vortheil-

lichen *Kesselschen* Normaluhr verglichen wurden, auf welche auch die Zeitbestimmungen bezogen sind.

- 3) Die Herren *Peremoschtschikow* und *Draschusoff* beobachteten an einem *Fraunhofer'schen* Achromaten von 3,3 Zoll Oeffnung und etwa 4 Fuß 5 Zoll engl. Brennweite.

Mein Fernrohr war ein *Plössl'scher* Dialyt von 3,2 Zoll Oeffnung und 3 Fuß Brennweite.

- 4) Von der Pulkowa-Moskau-Warschauer Chronometer-Expedition ist mir bis jetzt nur das vorläufige Resultat

bekannt, nach welchem die Meridian-Differenz zwischen der Greenwicher und Moskauer Sternwarte wird:

$$2^h 30' 16'' 96$$

Die definitive Zahl wird wohl nur sehr wenig von dieser abweichen.

Die Polhöhe der Moskauer Sternwarte ergab sich aus einer Reihe Beobachtungen im ersten Vertical, welche ich mit dem oben erwähnten kleinen Passagen-Instrumente anstellte zu:

$$55^{\circ} 45' 19'' 8$$

von welchem Resultate ich zweifle, daß es über eine halbe Secunde falsch sei. Ich werde Ihnen übrigens, sobald mir neuere Declinationsbeobachtungen der benutzten Sterne bekannt geworden sind, indem die ältern nicht ganz nach Wunsch stimmen, über diese Beobachtungsreihe etwas Näheres mittheilen, so wie ich dann hoffe, eine Bestätigung der obigen Angabe aus Beobachtungen mit unserm Verticalkreise liefern zu können.

Morgens 8 Uhr: Thermom. im Schatten $+1^{\circ} 0$ R.
Mittags 2 „ „ „ „ $+4,5$ „

nen, welche mir bis jetzt, des Baues der Sternwarte wegen, anzustellen unmöglich waren.

5) Die so eben gegebene geographische Länge und Breite bezieht sich auf den Mittelpunkt zwischen den Pfeilern des neuen Meridiankreises; — die Beobachtungen der Sonnentinsternißs wurden etwa 50 Fufs östlich davon auf der Ost-Terrasse der Sternwarte gemacht.

6) Ein den Sonnenstrahlen ausgesetztes Thermometer zeigte im Anfang der Finsternißs: $+5^{\circ} 5$ R.

in der Mitte „ „ : $+4,0$ „

am Ende „ „ : $+6,7$ „

während zur Zeit der Mitte der Finsternißs ein Thermometer im Schatten auf $+3^{\circ} 3$ R. stand.

Aus den meteorologischen Beobachtungen des Herrn Professors *Perewoschtschikow* füge ich noch folgende Angaben bei:

Barom. 753,0 Millim. auf 0° reducirt.
„ 751,4 „ „ „

G. Schweizer.

Ueber die Störungen des Neptun's.

The following formulae are expressions of a first approximation to a theory of the perturbations of Neptune by the other planets. All the terms, as high as the first power of the eccentricities of the disturbing planets, are retained, which can affect the longitude to one hundredth of a second of arc; but the terms dependent upon the squares of the eccentricities are neglected, and also those which depend upon the eccentricity of Neptune. The relative inclinations of the orbit are neglected, as well as the secular changes in the elements of the disturbing planets, and the great inequality in the motions of Jupiter and Saturn. Mr. *Sears C. Walker's* elements VII of Neptune are adopted, with the exception of the neglect of the eccentricity and the assumption (for convenience of computation) of a mean motion which is just half that of Uranus. The elements of the principal disturbing planets are those of *Bouvard's* tables, and their masses are the following.

$$\text{The Mass of Jupiter} = \frac{1}{1048}$$

$$\text{Saturn} = \frac{1}{3501}$$

$$\text{Uranus} = \frac{1}{24605} \text{ from Lamont.}$$

The neglected terms are so small or of so long a period that they cannot materially interfere with the principal design of this first approximation, which is to enable astronomers to free the observations of Neptune from the effect of perturbation and thence obtain the true elliptic elements, which will

serve for a final and complete theory of Neptune. The mean longitude of each planet, in these formulae, is denoted by the planet's usual symbol, and the longitude of the perihelion is denoted by these ϖ with the planet's symbol subjacent, and t is the number of years after Jan. 1. 1850.

The perturbations of Neptune's true longitude $= \delta v$

$$= (-1''87 + 0''0688t) \sin (\odot - \mathbb{N})$$

$$+ (6,55 - 0''2903t) \cos. (\odot - \mathbb{N})$$

$$- 7,40 \sin. 2 (\odot - \mathbb{N}) - 0''87 \cos. 2 (\odot - \mathbb{N})$$

$$- 1,56 \sin. 3 (\odot - \mathbb{N}) - 0,10 \cos. 3 (\odot - \mathbb{N})$$

$$- 0,47 \sin. 4 (\odot - \mathbb{N}) - 0,10 \cos. 4 (\odot - \mathbb{N})$$

$$- 0,19 \sin. 5 (\odot - \mathbb{N}) - 0,06 \cos. 5 (\odot - \mathbb{N})$$

$$- 0,08 \sin. 6 (\odot - \mathbb{N}) - 0,03 \cos. 6 (\odot - \mathbb{N})$$

$$- 0,04 \sin. 7 (\odot - \mathbb{N}) - 0,02 \cos. 7 (\odot - \mathbb{N})$$

$$- 0,02 \sin. 8 (\odot - \mathbb{N}) - 0,01 \sin. 9 (\odot - \mathbb{N})$$

$$+ 0''0404t - 0''001851t^2 + 0''0168t \cos. (\mathbb{N} - \varpi_{\odot})$$

$$+ 18''35 \sin. (\mathfrak{h} - \mathbb{N}) - 0,28 \sin. 2 (\mathfrak{h} - \mathbb{N})$$

$$- 0,02 \sin. 3 (\mathfrak{h} - \mathbb{N}) + 0,25 \sin. (\mathfrak{h} - 2 \mathbb{N} + \varpi_{\mathfrak{h}})$$

$$+ 0,01 \sin. (\mathfrak{h} - \varpi_{\mathfrak{h}}) + 0,36 \sin. (2 \mathfrak{h} - 3 \mathbb{N} + \varpi_{\mathfrak{h}})$$

$$+ 0,52 \sin. (2 \mathfrak{h} - \mathbb{N} - \varpi_{\mathfrak{h}}) + 0,01 \sin. (3 \mathfrak{h} - 2 \mathbb{N} - \varpi_{\mathfrak{h}})$$

$$+ 0''0085t \cos. (\mathbb{N} - \varpi_{\mathfrak{h}})$$

$$+ 33''59 \sin. (2 \mathfrak{z} - \mathbb{N}) - 0,01 \sin. 2 (2 \mathfrak{z} - \mathbb{N})$$