ASTRONOMISCHE NACHRICHTEN.

Nº 2881.

Die Seeliger'sche Theorie des Saturnrings und der Beleuchtung der grossen Planeten überhaupt.

Von Dr. E. Anding.

Der Umschwung, welcher sich auf dem Gebiete der theoretischen Photometrie infolge der Arbeiten des Herrn Prof. Seeliger im Laufe der letzten Jahre vollzogen hat, scheint in dessen vor nunmehr einem Jahre erschienener Schrift »Zur Theorie der Beleuchtung der grossen Planeten, insbesondere des Saturn« (Abhandlungen der k. bayer. Akademie der Wiss. II. Cl. 16. Bd. 2. Abth.) einen gewissen Abschluss gefunden zu haben, insofern diese Abhandlung zunächst das, was sich vom heutigen Standpunkt über die principiellen Grundlagen der Photometrie sagen lässt, in gedrängtem Ueberblick vorführt, sodann von diesem Gesichtspunkt aus dem photometrischen Calcül diejenige Vollendung giebt, welche bei Untersuchungen über die Planeten erforderlich ist, indem ferner angedeutet wird, auf welche Grundlagen allein eine rationelle Photometrie aufgebaut werden kann, endlich, indem hierfür ein erstes an sich höchst bedeutsames Beispiel geliefert wird.

Da es den Anschein hat, dass der Inhalt der Abhandlung nicht allgemein bekannt geworden ist, so dürfte eine kurze Darlegung der Methoden und Resultate an dieser Stelle angezeigt sein.

Wenn es sich darum handelt, das Gesetz festzustellen, nach welchem nicht-selbstleuchtende Substanzen das Licht zurückwerfen, so wird dasselbe sich verschieden ergeben, je nachdem man andere Voraussetzungen über die Constitution der Substanz zu Grunde legt und je nachdem man den ein- und austretenden Lichtstrahl diesen oder jenen optischen Vorgängen unterworfen annimmt. Unter der Voraussetzung, dass das Licht lediglich, sowohl beim Ein- wie beim Austritt aus dem Körper, eine Absorption erleide, sind sowohl Herr Prof. Lommel wie Herr Prof. Seeliger zu einem Gesetz gelangt, dessen erste Näherung sich ausdrückt durch

$$(1) \quad dQ = I' ds \frac{\cos i \cos \varepsilon}{\cos i + \lambda \cos \varepsilon}.$$

Wird andererseits angenommen, dass das Licht bloss durch rein oberflächliche Spiegelungen zurückgeworfen wird, so leitet Herr Prof. Seeliger in seinen Vorlesungen ein Gesetz ab, das ausser i und ε im Allgemeinen als drittes Argument das Azimuth des einfallenden und austretenden Strahls enthält, in speciellen Fällen aber übergeht in

$$(2) \quad dQ = I' ds f\left[\frac{1}{2}(i + \varepsilon)\right] \varphi\left[\frac{1}{2}(i - \varepsilon)\right].$$

Wird sowohl auf Reflexion wie auf Absorption Rücksicht genommen, so folgt unter gewissen ganz speciellen Voraussetzungen die Lambert'sche Formel

Bd. 121.

$$(3) \quad dQ = I' ds \cos \varepsilon \cos i.$$

Bei der grossen Mannigfaltigkeit der zu Gebote stehenden Voraussetzungen ist übrigens im Voraus klar, dass man durch entsprechende Wahl derselben sowohl der Lambert'schen, wie jeder anderen beliebig gewählten Formel wird genügen können. Am durchsichtigsten ist die Sachlage bezüglich der Voraussetzungen des Gesetzes (1), betreffs deren auf einen Aufsatz des Herrn Prof. Seeliger in der Vierteljahrschrift der Astronomischen Gesellschaft, 21. Jahrg. (»Bemerkungen zu Zöllner's photometrischen Untersuchungen«) verwiesen werden mag.

Was die Anwendung dieser Formeln auf die Planeten betrifft, so bieten die kleineren Planeten deshalb Schwierigkeiten, weil ein Anhalt über die vorauszusetzende Constitution der Oberflächen fehlt und weil die Wahl des Grundgesetzes einen wesentlichen Einfluss auf die Ergebnisse dadurch ausübt, dass dem Phasenwinkel ein unbeschränkter oder doch grosser Spielraum zusteht. Andererseits dürfte, sobald man einmal eine bestimmte Annahme gemacht hat, die Entwicklung des Gesetzes, nach welchem die ganze Oberfläche das Licht zurückwirft, in den meisten Fällen keine Schwierigkeiten bieten, weil man diese Körper als Kugeln betrachten darf oder allenfalls nach Potenzen der Abplattung entwickeln kann. Gerade umgekehrt ist die Sachlage bei den grossen Planeten. Hier scheinen in der That die dem Gesetz (1) zu Grunde liegenden Voraussetzungen erfüllt zu sein, und wenn dies nicht der Fall sein sollte, so ist leicht ersichtlich, dass wegen der stets klein bleibenden Phasenwinkel eine Unsicherheit in dieser Beziehung sich nur in sehr verkleinertem Maassstabe in den Vergleichen zwischen Beobachtung und Theorie aussprechen wird. Dagegen veranlasst hier die beträchtliche Abplattung eine wesentliche Complication des mathematischen Apparats.

Die Abhandlung stellt sich demgemäss zuerst die Aufgabe, die von einem Rotationsellipsoid, über dessen Abplattung keine beschränkende Voraussetzung gemacht wird, zurückgeworfene Lichtmenge zu ermitteln, und zwar sowohl auf Grundlage der Formel (1), als der für die grossen Planeten wahrscheinlicheren, als auch der Formel (3), letzteres einmal, um mit älteren Arbeiten in Contact zu bleiben, sodann auch, weil, wie erwähnt, eine Unsicherheit ohne grossen Einfluss ist. Es mag nur bemerkt werden, dass durch die Beobachtungen, sofern man ein blosses Ansehen des Planeten so nennen will, dem Gesetze (1), welches bei der Opposition eine gleiche scheinbare Helligkeit der

ganzen Scheibe fordert, nur scheinbar widersprochen wird, und dass Herr Prof. Seeliger die Abschattung am Rande zum Theil für ein unter Einfluss des Objectivrandes des Fernrohrs zu Stande kommendes Beugungsphänomen erklärt.

Der wichtigste und für die Entwicklung nicht nur der astronomischen, sondern der Photometrie überhaupt fruchtbarste Gesichtspunkt scheint mir in dem Gedanken ausgesprochen zu sein, dass es möglich sein muss, die Erscheinungen, welche ein Körpersystem, wie es auch immer geartet sein mag, in photometrischer Hinsicht darbietet, unter Berücksichtigung der bekannten optischen Thatsachen zu erklären, und umgekehrt, dass dann, wenn über die Constitution sich nur Hypothesen aufstellen lassen, die aus solchen Hypothesen gefolgerten Erscheinungen, wenn sie mit den Beobachtungen verglichen werden, einen Maassstab für die Richtigkeit der gemachten Voraussetzungen abgeben, also Schlüsse auf die unbekannte Constitution gestatten. Der zweite Theil der Abhandlung wendet dieses Princip auf ein erstes Beispiel an, auf die Ermittlung der Constitution des Saturnringes. Hier waren es namentlich zwei Thatsachen, welche der Erklärung bedurften. Zuerst hatte bereits Zöllner darauf aufmerksam gemacht, dass der Ring, obwohl die Elevationen der Sonne und der Erde über der Ringebene, unter sich nicht wesentlich verschieden, zwischen 0° und 30° variiren, dennoch eine damit in Zusammenhang stehende wesentliche Veränderung der scheinbaren Helligkeit nicht aufweist. Zweitens hatte Herr Dr. Müller in Potsdam (A. N. Nr. 2631) aus seinen Beobachtungen eine Abhängigkeit der scheinbaren Helligkeit vom Phasenwinkel dargethan, so zwar, dass dieselbe bei der Opposition nach raschem Ansteigen ein Maximum erreicht. Diese Thatsachen können, wenn man den Ring als gasförmig oder flüssig annimmt, gar nicht, wenn als fest, wohl nur gezwungen erklärt werden. Herr Prof. Seeliger legt nun die auch anderweitig gestützte Annahme zu Grunde, der Ring bestehe aus einem Schwarm discreter undurchsichtiger Körper und zeigt, dass dann die Theorie die beiden genannten Anomalien gerade fordert.

Die Beleuchtung des Rotationsellipsoids, mit welcher sich der erste Theil beschäftigt, wird in folgender Weise ermittelt. Das von der Sonne erleuchtete und von der Erde aus gleichzeitig sichtbare Stück der Oberfläche wird begrenzt durch die beiden Polarebenen der Richtungen nach Sonne und Erde. Die Ebene der Normalen dieser beiden Polarebenen werde als Fundamentalebene eines Systems der Polarcoordinaten gewählt und in ihr der Winkel ω von der Normalen der Polarebene der Erde aus nach

derjenigen der Sonne hin positiv gezählt. Von der Senkrechten zu dieser Ebene zählt man den Winkel ϑ . Der lineare Abstand eines Oberflächenpunktes vom Centrum sei ρ . Bezeichnet man noch den Winkel zwischen beiden Normalen mit α , so hat man, ähnlich wie bei der gewöhnlichen Ableitung der Lambert'schen Beleuchtungsformel für Kugeln, die Integrationsintervalle: für ϑ : 0 bis π , für ω : $\alpha - \frac{1}{2}\pi$ bis $+\frac{1}{2}\pi$. Das Oberflächenelement $d\omega d\vartheta \sin \vartheta$ einer mit dem Ellipsoid concentrischen Kugel vom Radius 1 muss, um dasjenige des Ellipsoids zu erhalten, mit $\frac{\rho^3}{M}$ multiplicirt werden, wobei

$$M = \frac{1}{\sqrt{\frac{x^2+y^2}{a^4} + \frac{z^2}{b^4}}}$$

und wo als Ebene der x und y die Aequatorebene des Ellipsoids gewählt ist. Hiernach ist die gesammte Lichtmenge, welche das Ellipsoid dem Beobachter zusendet,

$$Q = \Gamma \int_{\alpha - \frac{1}{2}\pi}^{+\frac{1}{2}\pi} d\omega \int_0^\pi \sin \vartheta d\vartheta \cdot f(i, \epsilon) \cdot \frac{\rho^3}{M}$$

wo die Natur der Function f entweder durch Formel (1) oder durch Formel (3) bestimmt ist. Hier sind nun noch die Grössen i, ϵ, ρ, M durch die Variablen ω und ϑ auszudrücken. Bezeichnet man die Elevation der Normalen der Polarebene der Erde über der Aequatorebene mit μ , das Azimuth des Schnittpunktes der Normalen der Polarebene der Sonne mit einer dem Ellipsoid concentrischen Kugel, gemessen am entsprechenden Schnittpunkt der Normalen der Polarebene der Erde, und zwar von der Nordrichtung des Meridians aus gezählt, mit δ , und erinnert sich, dass α den Winkel zwischen beiden Normalen bedeutet, so sieht man, dass Q eine Function der drei genannten Argumente μ, α, δ sein muss. Wird nun bei Bestimmung der i und ϵ die Elevation der Erde selbst $= A$ und diejenige der Sonne $= 90^\circ - C$ eingeführt und der Kürze wegen

$$\frac{1}{\gamma} = \sqrt{\frac{\cos^2 A}{a^4} + \frac{\sin^2 A}{b^4}}, \quad \frac{1}{\gamma'} = \sqrt{\frac{\sin^2 C}{a^4} + \frac{\cos^2 C}{b^4}}$$

gesetzt, werden im Uebrigen aber alle variablen Grössen auf ω und ϑ , alle Constanten auf μ, α, δ zurückgeführt, so sprechen sich die dem Lambert'schen Gesetze und die dem Lommel-Seeliger'schen Gesetze correspondirenden Lichtmengen Q_L und Q_N aus durch

$$(4) \quad Q_L = \Gamma \frac{a^6}{\gamma \gamma'} \int_{\alpha - \frac{1}{2}\pi}^{+\frac{1}{2}\pi} \cos \omega \cos (\omega - \alpha) d\omega \int_0^\pi \frac{\sin^3 \vartheta d\vartheta}{\left(1 + \frac{z^2}{\rho^2} \frac{a^2 - b^2}{b^2}\right)^2 \sqrt{1 + \frac{z^2}{\rho^2} \frac{a^4 - b^4}{b^4}}}$$

$$(5) \quad Q_N = \Gamma a^4 \int_{\alpha - \frac{1}{2}\pi}^{+\frac{1}{2}\pi} \frac{\cos \omega \cos (\omega - \alpha) d\omega}{\gamma' \cos \omega + \gamma \lambda \cos (\omega - \alpha)} \int_0^\pi \frac{\sin^3 \vartheta d\vartheta}{\left(1 + \frac{z^2}{\rho^2} \frac{a^2 - b^2}{b^2}\right)^2}$$

wobei man sich unter den Integralen

$$\frac{z}{\rho} = p \sin \vartheta + q \cos \vartheta$$

und hier wieder

$$\begin{aligned} p &= \sin \mu \cos \omega + \cos \mu \sin \omega \cos \delta \\ q &= \cos \mu \sin \delta \end{aligned}$$

gesetzt zu denken hat. Diese Integrale werden nun ausgewerthet. In (4) wird zunächst $\alpha = 0$ gesetzt und mittelst Durchganges durch eine Reihenentwicklung der Beweis erbracht, dass für diesen Fall Q_L sich aus den zwei Integralen

$$(6) \quad \begin{cases} M = \int_0^1 \frac{dx}{(1+k^2 x^2)^2 \sqrt{1+k_1^2 x^2}} & k^2 = \frac{a^2 - b^2}{b^2} \\ N = \int_0^1 \frac{x^2 dx}{(1+k^2 x^2)^2 \sqrt{1+k_1^2 x^2}} & k_1^2 = \frac{a^4 - b^4}{b^4} \end{cases}$$

in folgender Weise zusammensetzt:

$$Q_L = 2\pi a^2 \Gamma \left[\frac{1}{2} (M-N) \cos^2 A + \frac{a^4}{b^4} N \sin^2 A \right]$$

$$Q_L = 2\pi a^2 \Gamma [(P \cos^2 A + R \sin^2 A) \cos \alpha_0 + (R-P) \sin A \cos A \sin \alpha_0 \cos \sigma].$$

Wegen der Kleinheit der Differenz $R-P$ lässt sich jedoch das zweite Glied unterdrücken und es folgt der von σ unabhängige Ausdruck

$$Q_L = 2\pi a^2 \Gamma \cos \alpha_0 (P \cos^2 A + R \sin^2 A).$$

Wird also festgesetzt, dass der obere Index o sich auf den Phasenwinkel $\alpha_0 = 0$, das Zeichen (o) sich auf die Elevation $A = 0$ beziehe, so schreiben sich unter Einführung der Bezeichnung

$$(7) \quad \begin{cases} Z = P \cos^2 A + R \sin^2 A \\ Z(A) = \cos^2 A + \frac{R}{P} \sin^2 A \end{cases}$$

die gefundenen Ergebnisse so:

$$(8) \quad \begin{cases} Q^0_L(o) = 2\pi a^2 \Gamma P \\ Q^0_L = 2\pi a^2 \Gamma Z = Q^0_L(o) Z(A) \\ Q_L = \cos \alpha_0 Q^0_L = 2\pi a^2 \Gamma \cos \alpha_0 Z \\ \quad \quad \quad = Q^0_L(o) \cos \alpha_0 Z(A) \end{cases}$$

Die Rechnung nach diesen Formeln ist durch eine Tafel der P und R für eine Reihe der in Betracht kommenden Abplattungen, ferner speciell für Saturn durch eine Tafel der $\log Z$ und der $\log Z(A)$ auf ein Minimum von Arbeit zurückgeführt (Tab. I).

Das Doppelintegral (5) wird, da hier eine sich aus der Kleinheit der α ergebende Vernachlässigung nicht die Vortheile des vorigen Falles zu bieten scheint, streng und allgemein ausgeführt. Nachdem nach ϑ integrirt ist und nachdem die variablen Glieder des Nenners durch eine Substitution in ein einziges zusammengezogen sind, wird

oder wenn man

$$\frac{1}{2} (M-N) = P, \quad \frac{a^4}{b^4} N = R$$

bezeichnet,

$$Q_L = 2\pi a^2 \Gamma (P \cos^2 A + R \sin^2 A).$$

Die Grössen M und N , also auch P und R , sind nur von der Abplattung abhängig, mithin für denselben Planeten constant und können, da die Integrale (6) sich in geschlossener Form darstellen lassen, leicht ein für allemal berechnet werden.

Auf den speciellen Fall $\alpha = 0$ lässt sich der bei den grossen Planeten hinreichend allgemeine, dass α von o verschieden, aber bereits in der dritten Potenz zu vernachlässigen ist, zurückführen. In der Lösung treten als constante Grössen wieder die P und R auf und als Variable die früher erwähnten drei Argumente μ , α , δ , welche sich auf die Normalen der Polarebenen der Erde und Sonne beziehen. Werden aber statt ihrer die entsprechenden Grössen eingeführt, welche sich auf die wirklichen Richtungen nach Erde und Sonne beziehen, also die Elevation der Erde $= A$, das Azimuth der Sonne $= \sigma$ und der Phasenwinkel $= \alpha_0$, so ist der gesuchte Ausdruck

das übrig bleibende Integral in die Summe zweier neuen K und L zerlegt, so dass sich unter Benutzung der früheren Bezeichnungen und der folgenden

$$\begin{aligned} \sigma &= \lambda \frac{\gamma}{\gamma'}, \quad n \cos \varphi = 1 + \sigma \cos \alpha, \quad n \sin \varphi = \sigma \sin \alpha, \\ \rho \sin \nu &= \sin \mu, \quad \rho \cos \nu = \cos \mu \cos \delta, \quad \varepsilon^2 = \frac{k^2 \rho^2}{1+k^2 \rho^2}, \end{aligned}$$

die gesuchte Lichtmenge darstellt durch

$$\begin{aligned} Q_N &= \frac{1}{2} \pi \Gamma \frac{a^4}{n \gamma' \sqrt{1+k^2 \rho^2}} [K + \sin \varphi \sin (\varphi - \alpha) L] \\ &\quad + \frac{1}{4} \pi + \nu \\ K &= \int_{-\frac{1}{2}\pi + \nu + \alpha}^{+\frac{1}{2}\pi + \nu} \frac{\cos (x - \nu + \varphi - \alpha)}{(1 + \varepsilon^2 \sin^2 x)^{3/2}} dx \\ L &= \int_{-\frac{1}{2}\pi + \nu + \alpha}^{+\frac{1}{2}\pi + \nu} \frac{1}{\cos (x - \nu - \varphi) (1 + \varepsilon^2 \sin^2 x)^{3/2}} dx \end{aligned}$$

und für die Integrale K und L werden sodann die expliciten Ausdrücke gegeben.

Auf diese Ausdrücke braucht man jedoch dann nicht einzugehen, wenn man von der Annahme Gebrauch machen will, dass die Correctionen, welche an das Q^0_N der Kugel angebracht werden müssen, um das Q_N der Kugel und das Q^0_N des Ellipsoids darzustellen, kleine Grössen sind, und dass man deswegen, um das Q_N des Ellipsoids zu

erhalten, ihre höheren Potenzen und Producte unterdrücken darf. Wird nun also $\varepsilon^2 = 0$ gesetzt, so findet sich auf

$$Q_N = \frac{1}{2} \pi a^2 \Gamma \left[\frac{2 \cos \left(\frac{1}{2} \alpha - \varphi \right) \cos \frac{1}{2} \alpha}{n} - \frac{\sin \varphi \sin (\alpha - \varphi)}{n} \log \cotg \frac{1}{2} (\alpha - \varphi) \cotg \frac{1}{2} \varphi \right]$$

also z. B. $Q_N^0 = \pi \frac{\Gamma a^2}{1 + \lambda}$.

Für den speciellen, aus physikalischen Gründen berechtigten Fall $\lambda = 1$ hat man also die folgenden Formeln

$$Q_N^0 = \frac{1}{2} \pi \Gamma a^2,$$

$$Q_N = Q_N^0 D,$$

$$D = 1 - \frac{\sin^2 \frac{1}{2} \alpha}{\cos \frac{1}{2} \alpha} \log \cotg \frac{1}{4} \alpha.$$

$$(9) \quad Q_N = Q_N^0(o) D \sqrt{1 + \frac{a^2 - b^2}{b^2} \sin^2 A} = \pi \frac{a b \Gamma}{1 + \lambda} D \sqrt{1 + \frac{a^2 - b^2}{b^2} \sin^2 A}.$$

Die gemachten Voraussetzungen treffen nun bei Saturn thatsächlich zu, und bei Uranus und Neptun kann man sogar noch weiter gehen und die Phase überhaupt vernachlässigen, d. h. $\alpha = 0$ oder $D = 1$ setzen. Sie treffen aber nicht zu bei Jupiter; da aber hier A stets klein bleibt, so zeigt eine Betrachtung der strengen Lösung, dass nichts erhebliches vernachlässigt wird, wenn man einfach setzt

$$Q_N = Q_N^0(o) \cdot D.$$

Den Schluss des ersten Theiles bildet ein Hinweis darauf, dass es möglich sein muss, die noch immer unlöste Frage der Abplattung des Uranus photometrisch zu entscheiden, indem man, wenn die Rotationsaxe in der Ekliptik liegt, für die beiden extremen Fälle $A = 0^\circ$ und $A = 90^\circ$ hat

$$Q_{L(90)} = Q_{L(0)} 1.183$$

$$Q_{N(90)} = Q_{N(0)} 1.111,$$

vorausgesetzt, dass die Abplattung nahezu 0.1 ist.

Es wird ferner ausgeführt, dass der Begriff der Albedo bei jedem anderen photometrischen Grundgesetze als dem Lambert'schen hinfällig wird, da dieselbe sich als eine Function des Incidenzwinkels herausstellt, und sodann die Festsetzung getroffen, den Namen beizubehalten, jedoch den Mittelwerth für alle möglichen Incidenzwinkel als Albedo zu definiren. Da die Albedo demnach eng verknüpft ist mit dem im besonderen Fall geltenden photometrischen Grundgesetz, so ergibt sich, dass die früher, z. B. von Zöllner, gegebenen Vergleichen der Albedowerthe der Planeten unter einander oder mit denjenigen irdischer Substanzen ebenso hinfällig sind, wie das dabei zu Grunde gelegte Lambert'sche Gesetz.

Der zweite Theil der Abhandlung beschäftigt sich speciell mit den Verhältnissen, welche das Saturnsystem darbietet. Da die gegenwärtigen photometrischen Beobachtungen nur die Helligkeit des Systems in seiner Gesamtheit zu messen erlauben, so wird es nöthig sein, neben 1) der Beleuchtung des Saturnkörpers, 2) derjenigen des

directem Wege die bereits in dem citirten Aufsatz der Vierteljahrsschrift abgeleitete Formel für die Kugel

Die Grösse D kann man, wenn, wie hier, $\lambda = 1$, für jedes beliebige α der Tab. II entnehmen.

Wird andererseits $\alpha = 0$ gesetzt, so findet sich gleichfalls auf directem Wege für das Ellipsoid

$$Q_N^0 = \pi a b \frac{\Gamma}{1 + \lambda} \sqrt{1 + \frac{a^2 - b^2}{b^2} \sin^2 A}.$$

Durch Combination beider Resultate ergibt sich die unter der angegebenen Voraussetzung für das Ellipsoid geltende allgemeine Formel

auf folgende Umstände: 3) die Verdeckung des Ringes durch den Saturn, 4) die Verdeckung des Saturn durch den Ring, 5) den Schattenwurf des Saturn auf den Ring, 6) den Schattenwurf des Ringes auf den Saturn.

Die erste Aufgabe ist im ersten Theil erledigt, die zweite bildet den Hauptgegenstand des zweiten. Zuvor werden aber die Punkte 3) bis 6) erörtert. Sei

Q_S die Lichtmenge, welche die frei gedachte Saturnscheibe, Q_F die Lichtmenge, welche der vom Ring verdeckte Theil uns zusenden würde,

R der scheinbare Flächeninhalt des frei gedachten Ringes, F der scheinbare Flächeninhalt des verdeckten Theiles des Ringes,

Φ die scheinbare Helligkeit des Ringes,

so hat man für die Gesamthelligkeit Q_B , wenn vorerst auf die Punkte 5) und 6) keine Rücksicht genommen wird,

$$Q_B = (R - F) \Phi + Q_S - Q_F.$$

Die Berechnung von $R - F$ lässt sich in einfacher Weise erledigen. Bei $Q_S - Q_F$ aber kommt die Wahl des photometrischen Grundgesetzes in Betracht, und als solches wird zunächst das Lommel-Seeliger'sche, sodann das Lambert'sche herangezogen und speciell bei Q_F werden, da diese Grösse nur einen kleinen Bruchtheil der gesamten Lichtmenge beträgt, gewisse vereinfachende Annahmen gemacht, um die praktische Anwendung nicht überflüssig zu belasten. Sieht man also im ersten Fall die Planetenscheibe auch dann noch als gleichförmig erleuchtet an, wenn der Phasenwinkel, der von jetzt an mit α bezeichnet wird, nicht verschwindet, so ist

$$Q_F = \frac{F}{a b' \pi} Q_S$$

wo b' die kleine Axe der scheinbaren Saturnellipse ist, so dass also

$$b' = b \sqrt{1 + \frac{a^2 - b^2}{b^2} \sin^2 A}$$

mithin ist nach (9)

$$Q_F = \frac{\Gamma}{1+\lambda} FD$$

also im Ganzen

$$Q_B = (R-F) \Phi + \frac{\Gamma D}{1+\lambda} \left(ab\pi \sqrt{1 + \frac{a^2-b^2}{b^2} \sin^2 A} - F \right)$$

und wenn die Grösse

$$Q^0(o) = \pi \frac{ab\Gamma}{1+\lambda}$$

die von jetzt ab nur noch mit $Q(o)$ bezeichnet wird, abgetrennt wird und die Bezeichnungen

$$(10) \quad \begin{cases} X = \frac{R-F}{ab\pi}, \\ Y = \sqrt{1 + \frac{a^2-b^2}{b^2} \sin^2 A} - \frac{F}{ab\pi}, \\ B = \frac{1+\lambda}{\Gamma} \Phi \end{cases}$$

eingeführt werden, so ist schliesslich

$$(11) \quad Q_B = Q(o) (BX + DY).$$

Die Grössen X und Y sind nur von A abhängig und deshalb für die in Betracht kommenden Werthe des A von 0° bis 30° in Tab. III zusammengestellt.

Die Anwendung des Lambert'schen Gesetzes, welche sich weit complicirter gestaltet, führt schliesslich zu der analogen Formel

$$Q_B = Q(o) (B_L X_L + Y_L \cos \alpha).$$

Die X_L und Y_L findet man in Tab. IV, welche mit einer in Nr. 2639 der A. N. gegebenen übereinstimmt, obwohl die in Frage kommenden elliptischen Integrale nach verschiedenen Methoden berechnet sind.

Obleich die Abhandlung zeigt, dass der beiderseitige Schattenwurf in eleganter Weise behandelt werden kann, soll hier darauf doch nicht eingegangen werden, weil der Einfluss desselben bei dem gegenwärtigen Genauigkeitsgrad der photometrischen Beobachtungen nicht in Betracht kommen dürfte. Es werden zufolge des Schattenwurfes den X und Y gewisse Correctionen $-\Delta X$ und $-\Delta Y$ zuzufügen sein, deren Berechnung sich durch die Formeln 6) bis 9a) des Art. 8, durch die Gleichungen 5), 9), 12) und die zwei Formeln vor 7) in Art. 9), und mit Hülfe der Tabellen Va, Vb und Vc erledigt.

Es handelt sich jetzt um die Bestimmung der Function Φ . Sobald man die Vorstellung eines Schwarms undurchsichtiger Körper, der auch in seiner Gesamtheit für nicht zu grosse Elevationen dem Auge undurchsichtig erscheint, einmal angenommen hat, kann die Thatsache der starken Variation der Helligkeit mit dem Phasenwinkel und des Maximums derselben bei der Opposition nicht mehr überraschen zufolge der einfachen Ueberlegung, dass hier die Wirksamkeit der von den einzelnen Körpern ausgehenden verdunkelnden Schattencylinder verschwindet. Um eine greifbare Unterlage für eine genauere Betrachtung zu ge-

winnen, wird angenommen, dass alle Kugeln den gleichen Radius $= \rho$ haben und dass sie in gleichmässiger Dichte in einem cylindrischen, beiderseits durch Ebenen begrenzten Raume vertheilt sind, kurz also, dass ihre Anzahl gross genug ist, um Wahrscheinlichkeitsbetrachtungen anzustellen.

Ein beliebiges Oberflächenelement einer Kugel sendet, wenn es isolirt wäre, der Erde die Lichtmenge dq' zu, dagegen die Lichtmenge 0, wenn es entweder gegen die Sonne beschattet oder gegen die Erde verdeckt ist. Dies tritt aber ein, wenn der Mittelpunkt einer oder mehrerer anderer Kugeln in einem Raume V liegt, welcher begrenzt ist 1) durch die obere Ringebene, 2) durch einen Kreiscylinder vom Radius ρ , dessen Axe nach der Sonne, 3) durch einen ebensolchen, dessen Axe nach der Erde gerichtet ist, 4) durch ein sphärisches Zweieck. Der letztere, überdies unbedeutende Raum, kommt nicht zur Geltung, da das betrachtete Element einer materiellen Kugel angehört. Es heisse nun w die Wahrscheinlichkeit dafür, dass alle Kugeln ausserhalb des Raumes V liegen. Dann gilt für die Lichtmenge dq , die ein solches Element im Durchschnitt der Erde zuzenden wird, die Beziehung

$$(12) \quad dq = w dq'$$

Nun heisse die Entfernung des Elementes von der oberen Ringebene h , die Dicke des Ringes H , der Rauminhalt desselben R , die Anzahl aller Kugeln N .

Mag nun zunächst ρ sehr klein sein gegen H , so wird w für Elemente derselben Kugelfläche nahezu constant sein, folglich für eine solche Kugelfläche, entsprechend der Gleichung (12), gelten

$$q = w q' = w \Gamma f(\alpha)$$

wenn q' die Lichtmenge ist, welche eine Kugel aussenden würde, wenn sie ganz frei läge.

Ferner sei H sehr klein gegen die radiale Ausdehnung des mit Kugeln erfüllten Raumes, dann wird w nur von h abhängig sein, und sämtliche Kugeln einer Parallelschicht werden, da ihre Anzahl gleich

$$N \frac{dh}{H}$$

ist, die Lichtmenge zuzenden

$$dQ = \Gamma f(\alpha) w N \frac{dh}{H}$$

mithin der ganze Ring die Lichtmenge:

$$(13) \quad Q = \Gamma f(\alpha) \frac{N}{H} \int_0^H w dh.$$

Hier ist nun w als Function von h darzustellen. w bedeutet die Wahrscheinlichkeit, mit der $N-1$ Kugeln, d. h. alle, ausser der betrachteten, im Raume $R-V$ liegen.

Die Wahrscheinlichkeit w_1 , dass eine erste Kugel diese Bedingung erfüllt, ist nun

$$w_1 = \frac{R-V}{R},$$

die Wahrscheinlichkeit w_m , dass eine beliebige, z. B. die m te Kugel dasselbe leistet, würde

$$w_m = \frac{R-V}{R}$$

sein, wenn der Gesamttinhalt aller Kugeln gegen den Raum R sehr klein wäre. Soll diese willkürliche und, wie sich zeigen wird, nicht zutreffende Hypothese nicht verfolgt werden, so muss man schrittweise vorgehen. Es sei

$$k = \frac{4}{3}(2\rho)^3\pi.$$

Für alle möglichen Lagen des Centrums einer zweiten Kugel ist dann der Raum $R-k$, für alle ungünstigen Lagen der Raum $V-\varepsilon_1'k$ verfügbar. Hier bedeutet $\varepsilon_1'k$ denjenigen Raum, welchen die erste Kugel, falls sie den Radius 2ρ hätte, vom Raume V der Wahrscheinlichkeit nach wegnehmen würde, wenn ihr durch Zufall im Gesamt-raum R eine Stelle angewiesen wäre. Demnach ist

$$w = \left(1 - \frac{V}{R}\right) \left(1 - \frac{V-\varepsilon_1'k}{R-k}\right) \left(1 - \frac{V-2\varepsilon_2'k}{R-2\varepsilon_2'k}\right) \cdots \left(1 - \frac{V-(N-2)\varepsilon_{N-2}'k}{R-(N-2)\varepsilon_{N-2}'k}\right).$$

Man macht sich nun leicht klar, dass bei veränderlichem α ε_1' nahezu proportional sein wird der Grösse $\frac{V}{R}$ und dass es von der Ordnung dieser Grösse ist, sowie dass $\varepsilon_m' - \varepsilon_1'$ von derselben Ordnung ist wie $m \frac{k}{R} \frac{V}{R}$; ferner, dass $1-\varepsilon_2$ von dem Range ist wie $\frac{k}{R}$. Beschränkt man sich also auf Mitnahme der Glieder von der Ordnung wie $\frac{k}{R} \frac{V}{R}$ und setzt, wenn a eine endliche Grösse bedeutet, der Kürze wegen

$$x = a \frac{k}{R} \frac{V}{R},$$

$$\text{so ist } w = \left(1 - \frac{V}{R}\right) \left(1 - \frac{V}{R} + x\right) \left(1 - \frac{V}{R} + 2x\right) \cdots \left(1 - \frac{V}{R} + (N-2)x\right)$$

$$\begin{aligned} \text{also } \log w &= \log \left(1 - \frac{V}{R}\right) + \log \left(1 - \frac{V}{R} + x\right) + \cdots + \log \left(1 - \frac{V}{R} + (N-2)x\right) \\ &= -\frac{V}{R} - \frac{1}{2} \frac{V^2}{R^2} - \cdots \\ &\quad - \frac{V}{R} + x - \frac{1}{2} \frac{V^2}{R^2} + \frac{V}{R} x - \frac{1}{2} x^2 - \cdots \\ &\quad - \frac{V}{R} + 2x - \frac{1}{2} \frac{V^2}{R^2} + \frac{V}{R} 2x - \frac{2^2}{2} x^2 - \cdots \\ &\quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots \\ &\quad - \frac{V}{R} + (N-2)x - \frac{1}{2} \frac{V^2}{R^2} + \frac{V}{R} (N-2)x - \frac{1}{2} (N-2)^2 x^2 - \cdots \\ &= -(N-1) \frac{V}{R} + \frac{1}{2} (N-2)(N-1)x - \frac{1}{2} (N-1) \frac{V^2}{R^2} \\ &\quad + \frac{1}{2} (N-2)(N-1) \frac{V}{R} x - \frac{1}{2} x^2 \frac{1}{3} (N-2)^3 - \cdots \\ &= -(N-1) \frac{V}{R} \left(1 - \frac{1}{2} a (N-2) \frac{k}{R} + \frac{1}{2} \frac{V}{R} - \frac{1}{2} a (N-2) \frac{k}{R} \frac{V}{R} + \frac{1}{6} a^2 (N-2)^2 \frac{k^2}{R^2} \frac{V}{R} - \cdots\right). \end{aligned}$$

Schreibt man also kurz

$$w = e^{-Nn \frac{V}{R}}$$

so kann sich n nicht weit von der Einheit entfernen.

Hiermit sind die allgemeinen Betrachtungen erledigt

$$w_2 = \frac{R-k-(V-\varepsilon_1'k)}{R-k}.$$

Kommt nun eine dritte Kugel hinzu, so wird für das Centrum derselben der Raum $R-2k$ verfügbar sein, der aber vergrössert wird dadurch, dass die k der beiden ersten Kugeln sich zum Theil decken können. Bezeichnet also ε_2 einen echten Bruch, so ist

$$w_3 = \frac{R-2\varepsilon_2k-(V-2\varepsilon_2'k)}{R-2\varepsilon_2k}.$$

Bei Hinzunahme von weiteren Kugeln treten neue Complicationen nicht auf. Da nun $w = w_1 w_2 \cdots w_{N-1}$, so ergibt sich schliesslich

und es bleibt nur noch V als Function von h darzustellen. Wenn man mit V_0 den Inhalt des nach der Erde, mit V_1 den des nach der Sonne gerichteten Cylinders, mit G den des gemeinsamen Stückes beider bezeichnet, ferner die Elevationswinkel der Erde und Sonne A und A' nennt, so findet sich sofort

$$(15) \quad \begin{cases} V_0 = \rho^2 \pi h \frac{1}{\sin A}, \\ V_1 = \rho^2 \pi h \frac{1}{\sin A'}, \\ G = \frac{4}{3} \rho^3 \frac{1 + \cos \alpha}{\sin \alpha} \end{cases}$$

und es gilt, so lange der Raum G von der oberen Ringebene nicht geschnitten wird, die Gleichung

$$V = V' = V_0 + V_1 - G,$$

dagegen, wenn er geschnitten wird und man den ausserhalb liegenden Raumtheil des G mit Σ bezeichnet,

$$V = V'' = V_0 + V_1 - G + \Sigma.$$

Eine Vernachlässigung des Σ würde Resultate geben, die bei kleinen α der Wahrheit auch nicht einmal als rohe Annäherungen entsprechen; dagegen wird es gestattet sein, bezüglich der Begrenzung des Σ eine Vereinfachung eintreten zu lassen. Die obere Ringebene schneidet die Ebene Element-Sonne-Erde längs einer Geraden im Allgemeinen unter einem schiefen Winkel. Man nehme nun als Begrenzung des Σ statt der Ringebene diejenige Ebene, welche

die Ebene Element-Sonne-Erde senkrecht, und zwar längs derselben Geraden schneidet. Hieraus folgt z. B., dass der Raum Σ für solche Elemente $= 0$ wird, für welche der Scheitel der elliptischen Kante des Raumes G in der oberen Ringebene liegt, dass Σ für höher liegende Elemente reell, für tiefer liegende imaginär ist. Da nun die Halbirungslinie des Phasenwinkels eine Elevation U hat, für welche

$$\sin U = \frac{\sin A + \sin A'}{2 \cos \frac{1}{2} \alpha}$$

ist, da ferner eine vom Element einerseits, von der Ringebene andererseits begrenzte Strecke mit der Elevation U eine Länge hat

$$m = \frac{\rho}{\sin \frac{1}{2} \alpha}$$

so folgt, dass Σ gerade dann verschwindet, wenn

$$h = h_1 = m \sin U = \rho \frac{\sin A + \sin A'}{\sin \alpha}.$$

Wird nun, was hiernach, so lange Σ reell ist, gestattet sein muss

$$\frac{h \sin \alpha}{\sin A + \sin A'} = \rho \sin \varphi$$

gesetzt, so folgt durch Substitution in Gleichung (13), dass

$$(16) \quad Q = \Gamma f(\alpha) \frac{N}{H} \left(\rho \frac{\sin A + \sin A'}{\sin \alpha} \int_0^{\frac{1}{2}\pi} e^{-\frac{N}{R} V''} \cos \varphi d\varphi + \int_{h_1}^H e^{-\frac{N}{R} V'} dh \right).$$

Nunmehr ist Σ zu ermitteln und V' und V'' in die vorige Gleichung einzuführen. Es findet sich, wenn man

$$\frac{k}{R} = \delta$$

setzt und für zulässig erachtet, anzunehmen

$$(17) \quad 1 + \cos \alpha = 2 \quad \frac{(\sin A + \sin A')^2}{\sin A \sin A'} = 4$$

mit Hülfe der Abkürzung $\Phi = \frac{3}{8\pi} [\cos \varphi - \frac{1}{3} \cos^3 \varphi + (\frac{1}{2}\pi + \varphi) \sin \varphi - \frac{2}{3}]$

dass schliesslich

$$(18) \quad Q = \Gamma f(\alpha) \frac{\sin A + \sin A'}{\sin \alpha} \left(\int_0^{\frac{1}{2}\pi} e^{-\frac{N}{\sin \alpha} \Phi} \cos \varphi d\varphi + \frac{2}{3} \frac{\sin \alpha}{N \delta} e^{-\frac{3\pi - 2}{8\pi} \frac{N \delta}{\sin \alpha}} \right).$$

Zufolge der wichtigen Bemerkung, dass bei dem kleinen Spielraum des α von 0° bis $6\frac{1}{2}^\circ$ $f(\alpha)$ sehr nahe constant sein muss, darf dieser Factor weggelassen werden, und es folgt dann ein Ergebniss, welches von der Hypothese des für die einzelnen Kugeln geltenden Beleuchtungsgesetzes ganz unabhängig ist.

Fasst man den von α abhängigen Factor unter der Bezeichnung $\mathfrak{E}$ zusammen, so ist schliesslich

$$(19) \quad Q = \Gamma' (\sin A + \sin A') \mathfrak{E}$$

und hier kann man für jedes α das zugehörige $\mathfrak{E}$ aus den Tafeln VI oder VII entnehmen.

Bei der Ableitung dieser Formel ist auf die radiale Ausdehnung des Ringes keine Rücksicht genommen; man

muss also noch mit einer Grösse multipliciren, welche dieser Ausdehnung proportional ist, also nach der früheren

Bezeichnung mit $\frac{X}{\sin A} Q(0)$. Durch Vergleichung mit (11) hat man also

$$Q(0) B X = \Gamma' \frac{\sin A + \sin A'}{\sin A} \mathfrak{E} X Q(0)$$

also $B = \Gamma' \frac{\sin A + \sin A'}{\sin A} \mathfrak{E}$

mithin endlich

$$(20) \quad Q_B = Q(0) \Gamma' \frac{\sin A + \sin A'}{\sin A} \mathfrak{E} X + Q(0) D Y.$$

Berechnet man demnach aus den für die Zeit der Beobachtung geltenden Constanten α , A , A' mit Hülfe der Tafeln die Grössen

$$a = \frac{\sin A + \sin A'}{\sin A} \mathfrak{C} X, \quad b = D Y$$

so kann man für jede Beobachtung eine Gleichung

$$Q_B = ax + by$$

ansetzen und aus den gefundenen x und y vermöge der Gleichungen

$$\begin{aligned} x &= \Gamma' Q(o) \\ y &= Q(o) \end{aligned}$$

sowohl Γ' wie $Q(o)$ berechnen, d. h. die Beobachtung auf »verschwundenen Ring« in höchst einfacher Weise reduciren. Die Uebereinstimmung der gefundenen Werthe bildet den Prüfstein für die Theorie. Eine vorläufige Reduction von Beobachtungen, die Herr Dr. Müller in den Jahren 1878 bis 1887 angestellt hat, ergiebt Resultate, die mit Rücksicht auf die Beobachtungsfehler die Theorie vollständig befriedigen, was um so mehr von Gewicht ist, als die von den Beobachtungen dargebotenen und der Theorie entsprechenden Helligkeitsschwankungen sehr bedeutende sind.

Als dritte Constante hätte eigentlich noch $nN\delta$ bestimmt werden müssen, doch zeigt sich, dass der Werth derselben innerhalb gewisser Grenzen ziemlich gleichgültig ist. Herr Prof. Seeliger setzt bei seiner Reduction $nN\delta = 0.3$; daraus würde, da n nahe $= 1$ ist, für die Dichtigkeit D der Vertheilung der Kugeln im Ringe nahezu folgen

$$D = \frac{1}{8} N \frac{k}{R} = \frac{1}{8} \delta N = 0.04.$$

Für kleine A und A' werden die Formeln ungültig. Denn wenn, wie angenommen, der Ring ein durch Ebenen begrenzter Cylinder ist, darf jetzt die Begrenzung durch den Cylindermantel nicht mehr ausser Acht gelassen werden. Andererseits ist diese Annahme wenig wahrscheinlich, wenn auch für das besprochene Problem im Allgemeinen zulässig; es werden sich aber Abweichungen davon bei kleinen A und A' deutlicher aussprechen. Diese Umstände rechtfertigen die Vernachlässigungen (17).

Es lässt sich noch eine Bemerkung machen, welche ich einer privaten Mittheilung des Herrn Prof. Seeliger verdanke, nämlich dass zu Gunsten der über den Saturnring gemachten Hypothese ein weiteres Argument durch die Sichtbarkeit des sog. dunklen Ringes beigebracht wird. Man braucht nur anzunehmen, dass hier die einzelnen Körper viel weniger dicht vertheilt sind, so dass die Saturnscheibe durch die Zwischenräume hindurch sichtbar bleibt; dann erklärt sich die Verdunkelung ohne Weiteres durch den blossen Schattenwurf der Körper auf die Saturnkugel. Eine Hypothese, nach welcher die Ringe als aus compacte Masse bestehend vorgestellt werden, dürfte nur auf gezwungene Weise die wesentlich geringere Helligkeit des dunklen Ringes erklären können.

Man kann demnach Alles dahin zusammenfassen, dass durch die Abhandlung des Herrn Prof. Seeliger der Beweis erbracht ist, dass das Räthselhafte am Phänomen des Saturnringes als solches nicht mehr existirt, und dass die Hypothese, nach welcher man es hier mit einem Schwarm undurchsichtiger Körper zu thun hat, durch die photometrische Theorie in einer Weise gestützt wird, dass dieselbe, soweit dies überhaupt möglich ist, der Gewissheit nahe kommt.

Bogenhausen 1888 December.

Note on the Spectrum of the Rings of Saturn.

(Communicated to the Royal Society on February 7, 1889.)

The acknowledged meteoritic constitution of the rings of Saturn rendered it important to obtain a photograph of their spectrum, in order that it might be determined whether collisions there were of sufficient intensity to produce incandescent vapours. It has long been known that the rings appear much more luminous than the planet, and the magnificent photographs obtained by the Brothers Henry show that this is truer for the blue light than for the visual rays.

The weather has been so bad here that only one long exposure photograph has been taken. Although the instrument was not in perfect adjustment, owing to a recent accident, I submit it to the Society because there appears

London 1889 Febr. 14.

to be evidence of bright lines in the photograph. It is altogether too early to announce this as an established fact, but I think it well to send in this note, in order that other observers with more powerful optical appliances and a better climate than that of London may investigate the question.

The photograph exhibited was taken on the 2nd instant by Mr. Porter, Computer to the Solar Physics Committee. The instrument employed was the 10 inch equatorial of the Science Schools, and a spectroscope of two prisms of 60°.

Other considerations point to the possibility that bright lines or bands may be found in the spectrum of Uranus.

Norman Lockyer.

Planet (254) Augusta. Die Correction der Ephemeride in A. N. 2876 beträgt nach einer Mittheilung von Dr. J. Palisa vom 25. Februar $+3^m 35^s.4$ in AR., $-27'.4$ in Decl. Grösse 13^m5.

Inhalt:

Zu Nr. 2881. E. Anding. Die Seeliger'sche Theorie des Saturnringes und der Beleuchtung der grossen Planeten überhaupt. 1. — N. Lockyer. Note on the Spectrum of the Rings of Saturn. 15. — Planet (254) Augusta. 15.

Geschlossen 1889 März 1. Herausgeber: A. Krueger. Druck von C. Schaidt, C. F. Mohr Nachf. Expedition: Sternwarte in Kiel.