Mischungsverhältniss ist auf 1 cc Untersuchungsflüssigkeit 2,5 cc Reagens. Zinn und Zinnchlorür lassen sich nur dann neben einander verwenden, wenn Antimon und Wismuth nicht zugegen sind. Schwefelsäure, Salzsäure, Phosphorsäure, Magnesiumsulfat, Natriumphosphat wirken weder auf die Schärfe der Reaction, noch auf die Zeit des Eintretens derselben irgendwie störend.

III. Chemische Analyse organischer Körper.

Von

P. Dobriner.

Quantitative Bestimmung organischer Körper.

Bestimmung näherer Bestandtheile.

Hinsichtlich der Bestimmung des Chinins durch Titration mit Normal-säure macht A. H. Allen¹⁾ darauf aufmerksam, dass die sauren und neutralen Salze des Chinins sich gegenüber den verschiedenen Indicatoren abweichend verhalten, dass also z. B. bei Methylorange schon der Bildung des sauren Salzes, dagegen z. B. bei Cochenille der Bildung des neutralen Salzes der Endpunkt der Titration entspricht. Ich begnüge mich im Uebrigen mit dem Hinweis auf diese Arbeit.

Zu der Bestimmung des Anthracens nach dem Anthrachinonverfahren der Firma Meister, Lucius und Brüning²⁾ vom October 1876 hatte H. Bassett³⁾ vor Kurzem einige Notizen gemacht. Der Verfasser⁴⁾ hat sich nun bemüht, die Methode dahin zu verbessern, dass man auch bei niedrig procentigen Anthracenen einwandsfreie Resultate erhält, und dass insbesondere die zur Wägung gebrachten Chinone ihrem äusseren Aussehen und ihrer Qualität nach reine Producte darstellen.

¹⁾ The Analyst **21**, 85.

²⁾ Diese Zeitschrift **16**, 61 (vergl. auch **12**, 347).

³⁾ Vergl. diese Zeitschrift **35**, 97.

⁴⁾ Chem. News **73**, 178.

Bassett hat dieses Ziel durch die Anwendung von Salpetersäure erreicht.

Man oxydirt das Anthracen in der üblichen Weise unter Anwendung von 15 g reiner, schwefelsäurefreier Chromsäure von mindestens 98 %. Am nächsten Morgen verdünnt man mit 400 cc Wasser, lässt drei Stunden lang stehen, filtrirt und wäscht mit kaltem Wasser aus. Das Chinon wird alsdann auf dem Filter bei 100° C. im Wassertrockenkasten getrocknet. Das getrocknete Chinon bringt man quantitativ vom Filter in einen Kolben von üblicher Grösse; die letzten Antheile werden mittelst 45 cc Eisessig vom Filter abgespritzt.

Hierauf fügt man 2,5 cc Chromsäurelösung, enthaltend 1,5 g Chromsäure und 10 cc reine Salpetersäure von 1,42 specifischem Gewicht hinzu. Man erhält unter Benutzung eines Rückflusskühlers eine Stunde lang im Kochen. Am nächsten Morgen wird wiederum mit 400 cc Wasser verdünnt. Man lässt 3 Stunden stehen, filtrirt, wäscht zunächst mit kaltem Wasser aus, alsdann mit heisser einprocentiger Lauge und zuletzt mit heissem Wasser und zwar ganz nach der üblichen Vorschrift.

Hierauf spritzt man das Antrachinon in eine flache Schale, trocknet bei 100° C., übergiesst mit dem 10 fachen Gewichte reiner concentrirter Schwefelsäure (nicht rauchender) und erhitzt während 10 Minuten bei 100° C.¹⁾ Man lässt nun über Nacht Wasser anziehen und verfährt im Uebrigen ganz nach der bisher üblichen Methode.

Der Verfasser bemerkt ausserdem, dass der Zusatz der geringen Menge Chromsäure zur Salpetersäure deshalb nöthig ist, um einerseits die letzten Antheile an Verunreinigungen vollständig zu entfernen und andererseits ein schnelleres Filtriren zu ermöglichen. Geringe Abweichungen in der Menge der Salpetersäure, sowie der Zeitdauer des Kochens, haben keinen Einfluss auf die Endresultate. Die erhaltenen reinen Anthrachinone sind frei von Nitroverbindungen.

Folgende Beleganalysen zeigen den Werth der empfohlenen Modification im Vergleich zu der üblichen Methode. A und B sind in England im Handel übliche Qualitätsbezeichnungen.

¹⁾ Das Trocknen und Erhitzen geschieht stets im Wassertrockenkasten, dessen Wasser in vollem Sieden zu erhalten ist.

		Bisher ange- wandte Methode	Neue Methode	Abnahme durch die Behandlung mit Salpetersäure	
				absolut	in Procenten
1.	Handels-Product B	34,92	33,26	1,66	4,7
2.	" B	32,78	31,20	1,58	4,8
3.	" A	19,60	19,35	0,25	1,3
4.	" A	51,19	50,68	0,51	1,0
5.	" B	39,29	38,65	0,64	1,6
6.	Rückstand-Anthracen	18,28	16,31	1,97	10,8
7.	" 	9,24	7,06	2,18	23,6
8.	Wiedergewonnenes Anthracen .	12,41	11,60	0,81	6,5
9.	" " 	43,74	42,50	1,24	2,8
10.	Handels-Product A	13,87	13,57	0,30	2,2
11.	" B	35,82	34,63	1,19	3,3
12.	" A	32,23	31,84	0,39	1,2
13.	Reines Anthracen	95,27	95,02	0,25	0,26
14.	" " 	61,76	61,72	0,04	0,06
15.	" " 	81,75	81,15	0,60	0,73
16.	Handels-Product A	82,00	81,75	0,25	0,30
17.	" B	36,38	35,78	0,60	1,6
18.	" B	31,37	30,52	0,85	2,7
19.	" A	32,31	31,42	0,89	2,7
20.	" A	41,64	40,83	0,81	1,9

Zur quantitativen Analyse von alkalischen Benzoaten verdampft G. Rebière¹⁾ eine gewogene kleine Menge p mit überschüssiger Salzsäure zur Trockne. Die überschüssige Salzsäure und die Benzoëssäure verflüchtigen sich; in dem verbleibenden Rückstand bestimmt man das Chlor mittelst $\frac{1}{10}$ Normal-Silberlösung. Es seien n cc verbraucht. Für die Bestimmung der Benzoëssäure versetzt man dieselbe Menge p, in 50 bis 60 cc Wasser gelöst, mit n cc $\frac{1}{10}$ Normal-Schwefelsäure. Die Base wird hierdurch neutralisirt und die freigewordene Benzoëssäure kann mit $\frac{1}{10}$ Normallauge unter Benutzung von Phenolphthaleïn als Indicator titrirt werden. Werden n cc $\frac{1}{10}$ Normallauge gebraucht, so ist keine freie Benzoëssäure und kein Ueberschuss von Alkali vorhanden.

Diese Methode lässt sich bei den meisten benzoësauren Salzen anwenden. Bei dem Lithiumsalze darf nur ein geringer Ueberschuss an

¹⁾ Journ. Pharm. et Chimie 1896, S. 113—116; durch The Analyst 21, 102.