in Sonderproben, aus mehreren Litern gewonnen, bestimmt worden.

Die Analysen vom November 1865 bis Mai 1866 sind von mir, die übrigen von meinem Assistenten Herrn Zschiesche nach derselben Methode ausgeführt.

LXVIII.

Notizen.

1) Ueber die Hydrate des Silberoxyduls und des Silberoxyds.

Von

C. Weltzien.

(Compt. rend. t. 63, p. 1140.)

Wenn man eine gut gereinigte Silberplatte in eine vollständig neutrale Lösung von Wasserstoffsuperoxyd eintaucht, so sieht man, wie sie sich mit Bläschen von Sauerstoff überzieht. Gleichzeitig löst sich ein Theil des Silbers mit einem Substitutionswerth $\text{Ag}_2 = 216 = \text{H}$ auf. Auf der Silberplatte bildet sich ein graulichweisser Ueberzug; auch setzt sich eine sehr kleine Menge eines graublauen Niederschlags zu Boden.

Die Lösung färbt sich an der Luft rothbraun und scheidet sehr fein zertheiltes Silber ab.

Dampft man die Lösung des Silberoxydulhydrats ab, so erhält man eine ungefärbte Substanz, die sich unter dem Mikroskop krystallinisch zeigt. Sie zersetzt sich beim Behandeln mit Wasser unter Abscheidung von Silber. Letzteres scheidet sich in Krystallen, die unter dem Mikroskop roth und durchsichtig erscheinen, aus.

Die filtrirte Flüssigkeit enthält Silberoxydhydrat ($\text{Ag} = 108 = \text{H}$), reagirt schwach alkalisch und giebt mit Salzsäure eine Fällung von Chlorsilber.

Das Silberoxydulhydrat in Lösung giebt mit Kalihydrat einen braunschwarzen Niederschlag (Silberoxydul?). Mit Salzsäure bildet es nach einer gewissen Zeit einen Niederschlag von Chlorsilber und metallischem Silber, das ungelöst bleibt, wenn man Ammoniak zu dem Gemenge fügt.

Diese Reactionen lassen sich durch folgende Gleichungen ausdrücken :

Die Lösung des Silberoxydulhydrats wird durch Schwefelwasserstoff nicht gefärbt; beim Verdampfen scheidet sich daraus metallisches Silber aus.

Wenn man zu Wasserstoffsuperoxyd Silberoxyd fügt, so reducirt sich bekanntlich das Oxyd unter Sauerstoffentwicklung; gleichzeitig bildet sich durch die Einwirkung des Wasserstoffsuperoxyds auf das sehr fein zertheilte Silber Silberoxydulhydrat.

Der Verfasser ist mit der weiteren Bearbeitung dieses Gegenstandes beschäftigt.

2) Ueber ein bromhaltiges Derivat der phosphorigen Säure giebt O. Ordinaire (Compt. rend. t. 64, p. 363) folgende Notiz

Nach Lieben soll man der phosphorigen Säure, in der von den 3 Atomen Wasserstoff bis jetzt nur 2 durch metallische Radicale ersetzt worden sind, die Formel $\left. \begin{matrix} \text{POH} \\ \text{H}_2 \end{matrix} \right\} \Theta_2$ geben. Zwar ist es Raillon gelungen, für die 3 Atome Wasserstoff 3 Atome Aethyl zu substituiren, aber es lässt sich vermuthen, dass der Körper, den man so erhält, die Formel $\left. \begin{matrix} \text{P}(\text{C}_2\text{H}_5)\Theta \\ (\text{C}_2\text{H}_5) \end{matrix} \right\} \Theta_2$ besitzt. Um diese Frage aufzuklären, habe ich folgende Versuche angestellt.

Ich liess in zugeschmolzenen Röhren, die im Wasserbade erhitzt wurden, 2 Mol. Brom auf 1 Mol. phosphorige Säure einwirken. Schon nach zehn Minuten war in der Röhre ein starker Druck vorhanden; beim Oeffnen entwich eine beträchtliche Menge von Bromwasserstoffsäure. Ich schmolz sie von Neuem zu und legte sie wieder in das Bad. Indem ich diese Operation von Viertelstunde zu Viertelstunde wiederholte, bis der Druck verschwunden war, fand ich, dass in dem Maasse als der Druck sich vermindert, ein neuer in

Nadeln krystallisirender Körper sich bildet. Derselbe ist sehr zerfliesslich und in Aether unlöslich. Ich glaube, dass er die monobromphosphorige Säure ist.

Eine analoge Reaction findet statt, wenn man einen trocknen Chlorstrom in phosphorige Säure, die im Wasserbade erhitzt wird, leitet. In diesem Falle habe ich eine Entwicklung von Salzsäure beobachtet.

Der neue Körper zersetzt sich durch kochendes Wasser in eine neue gallertartige Säure, die weder die Eigenschaften der Phosphorsäure, noch die der phosphorigen Säure besitzt.

3) Ueber die Selenüre der Mineralien von Cacheuta in Südamerika (11 Meilen südwestlich von Mendoza)

giebt Domeyko (Compt. rend. t. 63, p. 1064) interessante Aufschlüsse. Er theilt die dort gefundenen selenhaltigen Mineralien, die sämmtlich von bläulich bleigrauem Ansehen sind, in folgende ein:

A. Polyselenüre von Silber, Kupfer, Blei, Eisen und Kobalt, die 20—22 p.C. Silber enthalten;

B. Polyselenüre analog den ersteren, in denen sich das Silber in dem Maasse als das Kupfer zunimmt, vermindert;

C. Selenür des Bleis, das weder Kupfer noch Silber enthält.

Die Analyse der verschiedenen Mineralien ergibt Folgendes:

	A.		B.		C.
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Silber	21,0	20,85	9,8	3,73	—
Kupfer	1,8	12,91	10,2	13,80	—
Eisen	2,2	3,10	1,2	3,35	0,80
Kobalt	0,7	1,26	2,8	1,97	—
Blei	43,5	6,80	37,1	21,30	59,80
Selen	30,0	22,40	30,8	—	23,60
Kohlensaures Bleioxyd	—	32,68	6,5	15,25	10,90
Thonartige Gangart .	—			7,40	3,50
	99,2	100,00	98,4		98,60

- 4) Ueber die Eigenschaft des Jodsilbers sich in der Wärme zusammenzuziehen und sich beim Erkalten auszudehnen.

H. Fizeau (Compt. rend. t. 64, p. 314) hat bei der Untersuchung der Einwirkung der Wärme auf feste Körper in Bezug auf deren Ausdehnung, die höchst auffallende Beobachtung gemacht, dass sowohl geschmolzenes als auch krystallisirtes Jodsilber die Eigenschaft haben, sich beim Erwärmen zusammenzuziehen und beim Erkalten wieder auszudehnen, während ganz analoge Verbindungen, wie das Chlorsilber und Bromsilber sich in ihrem Verhalten den übrigen Körpern anschliessen. Es ist diese Beobachtung um so merkwürdiger, da sie bei Temperaturen, die weit unter dem Schmelzpunkte des Jodsilbers liegen, gemacht worden ist, so dass man diese Abweichung nicht etwa den Unregelmässigkeiten, die sich, in Bezug auf Ausdehnung, in der Nähe des Schmelzpunktes zeigen, zuschreiben kann.

5) Eine stärkeähnliche Substanz in dem Eigelb

hat C. Dareste entdeckt (Compt. rend. t. 63, p. 1142). Nach ihm existirt in dem Eigelb eine bedeutende Menge von mikroskopischen Körnchen, die in Form und Structur den Stärkekörnchen sehr ähnlich und die ebenfalls durch Jod blau gefärbt werden. Sie sind nierenförmig, sehr dünn, zeigen eine concave und convexe Fläche und sind von sehr wechselndem Volumen; die grösseren von ihnen erreichen etwa das Volumen eines grossen Getreidestärkekörnchens. Der Entdecker ist damit beschäftigt, die chemischen Eigenschaften dieser Körperchen weiter zu untersuchen.

6) Verhalten von Zink und Zinkoxyd gegen Kochsalz.

Von

A. Siersch.

Bei den meisten Sudsalinen in Deutschland, wo man durch einen langsamen Sud, Grobsalz erzeugt, pflegt man die aus Eisenblech gefertigten Sudpfannen gegen Oxydation dadurch zu schützen, dass man in die blank gescheuerten Ecken der Pfanne, Zink eingiesst, oder dasselbe als Streifen

in die Nietfugen der Pfannbleche einlegt, um das letztere mit dem Zink in metallische Verbindung zu bringen. Durch den hierdurch bewirkten Contact, suchte man auf Kosten der beschleunigten Bildung von Zinkoxyd, das Rosten der Pfanne zu verhüten. Da aber alle löslichen Zinkverbindungen dem menschlichen Organismus schädlich sind, ja sogar das unlösliche Zinkoxyd in Beziehung auf Schädlichkeit für den Menschen sehr in Frage steht, so hat A. Siersch (Sitzungsber. d. Wien. Akad. Jan. 1867) Versuche zur Entscheidung der Frage angestellt, ob durch das angegebene Verfahren Zink in das Kochsalz gelangen kann.

Diese Versuche haben zu dem Resultate geführt, dass sich bei der Einwirkung von Zink auf Kochsalzlösung Chlorzinknatrium bildet und dass beim Kochen der klaren zinkhaltigen Lösung sich mit Zink verunreinigtes Kochsalz ausscheidet. Der Zinkschutz der Sudpfannen ist demnach zu verwerfen.

Berichtigungen.

In der Abhandlung „Chemische Untersuchung einiger Ost-Indischen Fettarten von Dr. A. C. Oudemans jun.“ v. J. Bd. 99, 407 sind folgende Druckfehler zu berichtigen:

- S. 412 Z. 6 lies 51 p.C. statt 5 p.C.
- „ 412 u. 413 lies Tangkallak statt Fangkallak.
- „ 413 Z. 6 „ Tetranthera „ Fethrantera.
- „ 415 lies vegetable Tallow statt v. Fallow.
- „ 415 u. 416 lies Tinkawans statt Finkawans.
- „ 416 Z. 1 „ Korthals statt Korthalo.

Bd. 99 S. 338 Z. 11 v. u. durch statt auf.

- „ 339 „ 2 v. o. wurde statt wurden.
- „ 341 „ 1 v. u. bereichert statt berührt.
- „ 344 „ 7 v. u. zu streichen: entweder . . . bis oder auf der folgenden Zeile.
- „ 345 „ 16 v. u. einer statt seiner.
- „ 355 „ 2 v. u. den Meteorologen.
- „ 360 „ 5 v. o. VI statt IV.
- „ 9 v. o. }
- „ Anmerkung Z. 3 1: 43,3 statt 2: 43,3
- „ 361 Z. 15 v. u. ergeben statt ergaben.
- „ 363 „ 5 v. o. nahe statt nicht.