die Beobachtungen von *o. s.* sprechen nicht gerade dagegen und zwar deshalb, weil nach den Bemerkungen von *o. s.* auf pag. (106) der Einleitung seines Werkes anzunehmen ist, dass die Anwendung der Formel für die systematischen Correctionen den *m. F.* einer Beobachtung nicht merklich verkleinern wird. *o. s.* hat nämlich (was bei Mädler anscheinend durchaus nicht der Fall war) denselben Doppelstern nur sehr selten in beträchtlich verschiedenen Stundenwinkeln beobachtet und auch waren diejenigen Beobachtungen, bei welchen dieser Ausnahmefall eintrat, bei der Bildung des *m. F.* ausgeschlossen. Es ist selbstverständlich nicht zu leugnen, dass eine Vergrößerung des *m. F.* bei *o. s.*

durch dieses Verfahren eingetreten ist. Es kommt also darauf an, ob man zugeben will, dass die von mir *a. a. O.* angeführten Gründe, welche verursachen, dass die Tabelle (*A''*) zu kleine Werthe giebt, nicht überwogen werden durch den Einfluss der ebengenannten Art. — Dies, sowie die Voraussetzung, auf welcher meine Auseinandersetzung auf pag. 117 beruht, dass nämlich Mädler an sich, nicht genauer beobachtet hat als W. und O. Struve, kann natürlich durch die beigebrachten Zahlen überhaupt nicht bewiesen werden. Es handelte sich vielmehr nur darum die geäusserte Auffassung der Sachlage plausibel zu machen.

Leipzig, den 22. April 1880.

H. Seeliger.

Baxendell's Stern im kleinen Hunde.

Seit Dec. 1879 habe ich mit Hülfe einer Mittheilung des Herrn Copeland, den Ort des Sterns *x* ermittelt, und den nicht erheblichen Lichtwechsel bis jetzt am Sucher beobachtet. Den Ort bestimmte ich wie folgt:

$$1880 \text{ März } 2. \quad 9^m 2^s x = 9^m 2^s b + 31^s 887 - 52' 58'' \dots 4 B.$$

$$x = 8 \quad a - 4.186 - 179.92 \dots 4 B.$$

Es sind die in Monthly Not. XL Nr. 2. angegebenen Vergleichsterne *B. Weiss* 1029 u. 1014. Dasselbst findet man die Messungen von Lord Lindsay u. Herrn Knott, die mit den meinigen sehr nahe übereinstimmen.

Athen 1880, März 19.

J. F. Julius Schmidt

Notice of a Large Comet.

The tail of a very fine comet has been visible in the southwest throughout the Australian Colonies during the past fortnight. I first saw it on the evening of the 3rd instant when it extended about 25° above the horizon, the head being either behind a bench of clouds on the horizon or really below the horizon. I have kept a sharp lookout every evening since that date in order to obtain an observation of the nucleus but without success owing to the extraordinarily cloudy state of the horizon. The head was glimpsed for a few moments between clouds on the evening of the 14th, but there was not sufficient time to get a comparison observation. According to my judgment the comet's head would appear to have travelled from Capricornus to Apparatus Sculptoris from the 3rd to the 14th instant. I do not remember having before experienced such a long continuance of southerly winds and cloudy weather. When I saw the comet's head in the telescope on the 14th there was no sign of a nucleus or other condensation.

Observatory, Windsor. N. S. Wales, February 16th 1880.

John Tebbutt.

Elemente des Cometen α 1880.

Den in den A. N. 2307 veröffentlichten Beobachtungen dieses Cometen zu Cordoba Februar 6, 9, 15 habe ich folgende Bahn angeschlossen.

Das Olbers'sche *M* wurde, da die beobachteten Zwischenzeiten sehr ungleich waren, nach der Klinkerfues'schen Methode verbessert. Die Elemente sind:

$$\left. \begin{aligned} T &= 1880 \text{ Januar } 27.6112 \text{ mittl. Zt Berlin.} \\ \pi &= 82^\circ 17' 35'' \\ \Omega &= 359 \ 57 \ 44 \\ \pi - \Omega &= 82 \ 19 \ 51 \\ i &= 143 \ 34 \ 5 \end{aligned} \right\} \text{ w. A.}$$

$$\log q = 7.82236$$

Die Darstellung der mittlern Beobachtung wird: $d\lambda = -2' 8''$, $d\beta = +52''$

Berlin 1880, April 13.

Dr. H. Oppenheim.