1884	—0°030 (I Rd., 37 B.)
	—0.105 (II » , 28 »)
	—0.067
1885	+0.021 (I Rd., 43 B.)
	—0.070 (II » , 28 »)
	—0.024

Für den Tafelhalbmesser erfordern die hiesigen Beobachtungen folgende Correctionen:

a) für Tagbeobachtungen	$\Delta r = -1.5$	$\begin{pmatrix} \text{I Rd., 14 B.} \\ \text{II » , 8 »} \end{pmatrix}$
b) für Nachtbeobachtungen	$\Delta r = -0.5$	$\begin{pmatrix} \text{I Rd., 73 B.} \\ \text{II » , 55 »} \end{pmatrix}$

Aus den gleichzeitigen Beobachtungen beider Ränder ergibt sich, jedenfalls weniger sicher, $\Delta r = -0.9$.

Gotha 1886 Oct. 15.

E. Becker.

Ephemeride des Cometen 1886... (Barnard-Hartwig).

Ich habe die Ephemeride des Cometen 1886... (Barnard-Hartwig) nicht weiter als bis 1887 Jan. 10 berechnet, da der Comet der Sonne so nahe stehen wird, dass er nicht viel länger zu beobachten sein wird. Dagegen erlaube ich mir eine Ephemeride für den spätern Lauf nach meinen in A. N. 2761 mitgetheilten Elementen zu übersenden, die für die südlichen Sternwarten von Nutzen sein könnte. Dieselbe gilt für Berliner Mitternacht.

1887	α	δ	$\log r$	$\log \Delta$	H	1887	α	δ	$\log r$	$\log \Delta$	H
März 14	22 ^h 15 ^m 40 ^s	—18° 9.8	0.2433	0.4140	0.5	März 28	22 ^h 33 ^m 26 ^s	—20° 43.6			
15	17 0	18 20.6				29	34 38	20 54.9	0.2936	0.4242	0.4
16	18 19	18 31.4				30	35 48	21 6.3			
17	19 39	18 42.2	0.2539	0.4168	0.5	31	36 58	21 17.8			
18	20 57	18 53.1				April 1	38 8	21 29.4	0.3028	0.4252	0.4
19	22 15	19 4.0				2	39 16	21 41.0			
20	23 33	19 14.9	0.2643	0.4192	0.5	3	40 24	21 52.7			
21	24 49	19 25.8				4	41 32	22 4.6	0.3118	0.4259	0.4
22	26 5	19 36.8				5	42 38	22 16.5			
23	27 21	19 47.8	0.2743	0.4212	0.5	6	43 44	22 28.6			
24	28 35	19 58.8				7	44 49	22 40.8	0.3206	0.4263	0.4
25	29 49	20 9.9				8	45 54	22 53.1			
26	31 2	20 21.1	0.2841	0.4228	0.4	9	46 58	23 5.5			
27	22 32 15	—20 32.3				10	22 48 1	—23 18.1	0.3292	0.4264	0.3

Kopenhagen 1886 Dec. 2.

Aug. Svedstrup.

Neue Elemente des Cometen 1886... (Finlay).

Nachdem Dr. Lamp am hiesigen Refractor die folgende Beobachtung erhalten hatte:

1886 Dec. 23 6^h 23^m 18^s M. Z. Kiel:
 $\alpha = 23^{\text{h}} 7^{\text{m}} 17^{\text{s}} 80$ $\delta = -6^{\circ} 12' 12'' 7$,

die auf 2 gut stimmenden Vergleichsternen beruht, leitete ich aus Rom Sept. 29, Oct. 23, Dresden und Kiel Nov. 27 und der obigen, Kiel Dec. 23, nachstehende Elemente ab:

$T = 1886 \text{ Nov. } 22.43584 \text{ M. Z. Berlin}$
 $\omega = 315^{\circ} 3' 30.3$
 $\Omega = 52 33 40.0$
 $i = 3 1 41.4$
 $\varphi = 45 49 29.0$
 $\mu = 535.7675$
 $\log a = 0.547354$

Kiel 1886 Dec. 27.

Darstellung der Beobachtungen (R—B):

	$\Delta \lambda$	$\Delta \beta$		$\Delta \lambda$	$\Delta \beta$
Sept. 29	0.0	0.0	Nov. 27	+0.6	—14.7
Oct. 23	+0.3	—9.2	Dec. 23	0.0	0.0

Die Beobachtung Rom Nov. 13 wird ebenfalls gut dargestellt. Durch Aenderungen von Ω und i lassen sich die Breitenfehler sehr vermindern; einstweilen kann es genügen, i um etwa 7" kleiner zu wählen.

Die obigen Elemente weichen noch wesentlich von den in Nr. 2763 von Dr. Holetschek mitgetheilten ab; die Verminderung der mittleren Bewegung um 26" wird durch eine Vergrößerung des Excentricitätswinkels um 40' aufgewogen. Aus obigen Elementen hat Hr. Stud. Astr. Kloock in Kiel die nachstehende genaue Ephemeride berechnet, bei welcher die Bahnneigung um 7" kleiner angenommen wurde.

A. Krueger.