(Aus der medizinischen Klinik in Kiel.)

Über die Ödemkrankheit.

5. Mitteilung.

Die Pathogenese der Ödemkrankheit.

Von

Prof. A. Schittenhelm und Prof. H. Schlecht.

Da die ersten Fälle von Ödemkrankheit vielfach zusammen mit Infektionskrankheiten, wie Fleckfieber, Ruhr, Recurrens beobachtet worden sind, so wurden sie vor allem von Rumpel u. Knack (l. c.) zunächst in ätiologischen Zusammenhang mit diesen gebracht. Jürgens (l. c.), der Ödemkrankheit bei Fleckfieberkranken sah, hat im Gegensatz dazu sofort darauf hingewiesen, daß es sich hier sicherlich um zwei verschiedene Ursachen handle, indem er der mangelhaften Ernährung, nicht dem Fleckfieber die Hauptschuld am Auftreten der Ödemkrankheit beimaß. Es zeigte sich dann im Laufe der Zeit, daß die Ödemkrankheit sicherlich nicht an Infektionen gebunden ist, wenn sie auch zweifellos zusammen mit diesen auftreten kann. Rumpel u. Knack haben ihre Ansichten seitdem entsprechend modifiziert.

Wir selbst haben sehr viel Fleckfieberkranke gesehen. Wir konnten beobachten, daß die Kombination von Fleckfieber und Ödemkrankheit da auftrat, wo die Ernährung keine zweckmäßige Krankenernährung war, sondern ungenügend zusammengesetzte Massenkost in dem unten angeführten Sinne. Da, wo eine zweckmäßige Krankenkost gereicht wurde, traten nie Ödeme auf. Dasselbe gilt im großen und ganzen für die Ruhr. F. Meyer beobachtete bei einer Ruhrepidemie, daß bei den schlechtgenährten Zivilisten in 20% der Fälle Ödem auftrat, während die gutgenährten Militärpersonen nur 2% Ödeme aufwiesen. Daß das Fleckfieber zu Ödemkrankheit disponiert, ist ohne weiteres verständlich, seitdem man erkannt hat, daß die pathologisch-anatomische Grundlage des Fleckfiebers eine Systemerkrankung der kleineren Gefäße darstellt. Hier findet sich auch regelmäßig Hypotonie, im Anfang oft mit Bradykardie kombiniert. Das Ruhrgift wirkt sicherlich zentral gefäßlähmend, und auch hier dürften also die Gefäße beim Auftreten von Ödemen eine Rolle spielen, vielleicht liegt bei den anderen Infektionskrankheiten (Recurrens u. a.) ähnliches vor.

Es ist wohl heute allgemein angenommen, daß die Ödemkrankheit im Zusammenhang steht mit den eigenartigen Ernährungsverhältnissen des Krieges. Die Nahrung ist gegenüber dem Frieden völlig anders zusammengesetzt, sie ist eiweißarm, fettarm und besteht zum größten Teil aus Kohlenhydraten. Durch das Überwiegen der Gemüse und Kartoffel in der Nahrung, die meist zur Verbesserung des Geschmacks einen erheblichen Salzzusatz bekommen, ist sie gleichzeitig sehr wasser- und salzreich, so daß Mengen von 3—4 l Flüssigkeits- und 50—40 g Salzzufuhr pro Tag mit der Kost etwas durchaus Gewöhnliches sind.

Die Ödemkrankheit ist schon früher öfter beobachtet worden, zu Zeiten von Hungersnot, in Gefängnissen und in Konzentrationslagern. Am ausführlichsten beschreiben unter dem Namen *Epidemic Dropsy* Mac Leod, Lovall u. Davidson und ebenso Manson¹⁾ eine in Kalkutta und Mauritius beobachtete Ödemkrankheit. Greig²⁾ gibt hierüber einen weiteren Bericht. Es bestehen Ödeme, zuweilen mit Temperaturen und gastrointestinalen Erscheinungen. Das Nervensystem ist in der Regel intakt, nur in einzelnen Fällen bestehen neuritische Symptome. Die Dauer der Erkrankungen beträgt meist mehrere Monate. Wheeler³⁾ erwähnt das Vorkommen von Ödemkrankheiten in den englischen Konzentrationslagern während des Burenkrieges. Nach Weld⁴⁾ und nach Kiskalt⁵⁾ ist früher Wassersucht als Todesursache in Gefängnissen außerordentlich häufig gewesen. Uns berichtete ein russischer Arzt, daß Ödemkranke auch im Frieden in Rußland namentlich in Gefängnissen, aber auch gelegentlich bei den armen Bauern beobachtet werden können. Hierher gehören schließlich noch die schon in der ersten Mitteilung erwähnten Ödemzustände, die in den napoleonischen Heeren auf dem Zug nach Rußland gesehen wurden, sowie die Beobachtungen von Strauß⁶⁾ und von Budezynski u. Chelchowski⁷⁾ bei der polnischen Bevölkerung.

Daß in diesem Kriege unter den mangelhaften Ernährungsverhältnissen Ödemkrankheit wieder in größerem Umfang beobachtet wurde, ist danach nicht verwunderlich. Am häufigsten trat sie im Winter 16/17 ein, wo die Ernährungsverhältnisse den schlechtesten Stand er-

¹⁾ Bei Belz u. Minura in Menser, Handbuch der Tropenkrankheiten 1905. Bd. II, S. 158.

²⁾ Greig, Scientific Memoirs by officers of the Medical and Sanitary Departments of the Government of India. Calcutta 1912.

³⁾ Wheeler, Brit. med. Journ. 1902, Nr. 2.

⁴⁾ Weld, Vierteljahrsschr. f. gerichtl. Med. u. öffentl. Sanitätswesen 9. 1857.

⁵⁾ Kiskalt, Handbuch der Hygiene von Gruber, Rubner u. Fischer 4, 1912.

⁶⁾ Strauß, Med. Klin. 1915, Nr. 39.

⁷⁾ Budezynski u. Chelchowski, Przegląd lekarski 54. 1915 (s. bei Knack, Über Hungerödeme, Zentralbl. f. inn. Med. 1916, Nr. 43).

reichten (Kohlrübenernährung). Sie wurde dann nicht nur in Gefangenenlagern beobachtet, sondern auch in zahlreichen Fällen bei der Zivilbevölkerung. Maase u. Zondeck (l. c.) beschreiben Fälle aus Berlin, Gerhartz (l. c.) aus der Bonner Gegend. Sehr eingehend beschäftigte sich Schiff (l. c.) mit der Epidemiologie der Ödemkrankheit in den österreichischen Kronländern. Demnach hat die Ödemkrankheit in einzelnen Bezirken Steiermarks und Böhmens eine ganz enorme Ausbreitung erlangt. Die statistischen Erhebungen, welche Schiff ausführlich wiedergibt, zeigen, daß gerade jene Kronländer, die dank ihres Reichtums an agrarischen Produkten hinsichtlich der Ernährung am günstigsten gestellt waren, von der Ödemkrankheit verschont blieben. Andererseits geben die Berichte aus Steiermark und Böhmen den Hinweis auf die außerordentlich großen Schwierigkeiten der Ernährung durch das Fehlen von Kartoffeln, frischen Gemüsen, Milch und durch die große Knappheit an Mehl. In allen Bezirken findet sich die größte Häufung der Erkrankung zur Zeit vor der Einbringung der neuen Ernte, und andererseits wird darauf hingewiesen, daß die Entspannung der Ernährungsschwierigkeit, die durch Kartoffelzufuhr, durch Einbringung der neuen Ernte und vielfach durch eine Reihe von behördlichen Maßnahmen erzielt wurde, zum Rückgang der Erkrankungen führte. Ganz allgemein war vom August ab ein rasches Absinken der Krankheitsfälle zu verzeichnen.

Auch wir haben immer wieder die Beobachtung machen können, daß Ödemkranke in rascher Häufung da zu Beobachtung kamen, wo die Ernährungsverhältnisse mangelhaft waren. Gleichzeitig kam es auch zu einem Ansteigen anderer Krankheitszustände, vor allem von Hautaffektionen (Furunculose), von Magendarmerkrankungen und von Tuberkulose. Folgende kurze Tabelle gibt einen Überblick über diese Verhältnisse.

Zugang einer Krankenanstalt, die ihre Kranken immer aus einer und derselben Bevölkerungsgruppe erhielt:

	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Jan.	Febr.
Gesamtzugang sämtlicher Kranker	207	231	259	326	626	541
Darunter:						
1. Tuberkulose	6	5	14	8	45	39
2. Magendarmerkrankungen	27	21	50	53	73	46
3. Hautkrankheiten	16	20	58	63	69	82
4. Ödemkrankheit u. Präödem . .	1	2	8	19	85	105

Sobald die Ernährungsverhältnisse eine Besserung erfuhren, sank auch der Zugang an Ödemkranken rasch ab. Von begünstigendem Einfluß für das Auftreten der Ödemkrankheit war zweifellos die große Kälte.

Daß die Unterernährung die Widerstandsfähigkeit gegen andere Krankheiten herabsetzt, ist durch mehrfache Untersuchungen festgestellt, speziell für Tuberkulose fanden Hornemann u. Thomas, daß eiweißreich ernährte Tiere bei weitem weniger empfänglich für sie sind, wie eiweißarm ernährte. Auch die Giftempfindlichkeit ganz allgemein scheint von der Ernährung abhängig zu sein (Reid Hunt u. Reach). Endlich wissen wir aus der Immunitätslehre, daß die Antikörperbildung bei Hunger und Unterernährung weniger intensiv vor sich geht. Die großen Statistiken der Morbidität in Deutschland während des Krieges zeigen gleichfalls den Zusammenhang zwischen Ernährung und Anstieg der Infektionen, speziell der Tuberkulose.

Bei der Ödemkrankheit liegen zweifellos besondere Verhältnisse vor. Die einfache Unterernährung führt im allgemeinen nicht zum ausgesprochenen Bild der Ödemkrankheit. Wohl gibt es bei Inanitionszuständen (Endstadien der Phthise, Krebskachexie, Malaria-Kachexie u. a.) Ödeme. Sie sind aber stets geringen Grads und betreffen fast ausschließlich die Knöchel- und Unterschenkelgegend. Das kardiale Moment spielt bei ihnen sicherlich eine größere Rolle, wenn auch zweifellos oft (wie bei Kachektischen) die Gefäße mitbeteiligt sein werden. Bei der Ödemkrankheit kommt es zu mehr oder weniger allgemeinen Ödemen mit Schwellung des Gesichts und der Lider, mit Ödem der Haut, das an den abhängigen Partien wie bei anderen Ödemen stärker in Erscheinung tritt, und zu Höhlenhydrops. Zudem gibt es zuweilen Ödemkranke, die keineswegs so unterernährt sind, wie z. B. ein kachektischer Phthisiker oder Carcinomkranke in einem Stadium, wo er Ödeme bekommt. Auf die Tatsache, daß doch mitunter relativ gut genährte Personen ödemkrank werden, hat auch Schiff (l. c.) mehrfach hingewiesen. Wenn darum auch die Unterernährung bei der Mehrzahl der Ödemkranken zweifellos vorliegt, so reicht sie wohl nicht zur Erklärung des gesamten Krankheitsbildes völlig aus.

Es lag nahe, die Ödemkrankheit mit bekannten Ernährungskrankheiten in Parallele zu setzen. Vor allem kommen zwei Krankheiten in Betracht: die Beriberi und der Mehlnährschaden der Kinder, welche beide mit Ödemen einhergehen können. Bei der Beriberi liegt nach den Untersuchungen von Eijkmann¹⁾ und Schaumann²⁾ vor allem nach den Funkschen³⁾ Versuchen eine Avitaminose vor; deren Ursache also ein Mangel von akzessorischen Nährstoffen in

---

¹⁾ Eijkmann, Virchows Archiv **148**, 523. 1897; **149**, 187.

²⁾ Schaumann, Archiv f. Schiffs- u. Tropenhygiene **14**, Beiheft 8. 1910; **18**, Beiheft 6. 1914; **19**, 393. 1915.

³⁾ Funk, Die Vitamine. Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1914; Zeitschr. f. physiol. Chemie **89**, 373. 1914.

der Nahrung ist. Es finden sich bei der Beriberi unter ausgesprochen neuritischen Symptomen und charakteristischen Muskelveränderungen Herzstörungen, die mit Tachykardie und ausgesprochener Herzvergrößerung einhergehen. Bei der Ödemkrankheit findet sich dagegen die Bradykardie und es fehlen Veränderungen der Herzgröße und der Muskulatur sowie ausgesprochene Störungen des Nervensystems. Wir müssen hiernach ebenso wie Falta, Schiff, Knack u. Neumann u. a. die Annahme ablehnen, als ob zwischen Ödemkrankheit und Beriberi engere Beziehungen bestehen würden.

In die Gruppe der Avitaminosen gehört der Skorbut. Wir wollen hier erwähnen, daß wir mehrfach bei Ödemkranken Stomatitis und leicht blutendes Zahnfleisch festgestellt haben. Es handelte sich aber immer nur um einzelne Fälle. Ein echtes skorbutähnliches Krankheitsbild konnten wir nie mit Ödemkrankheit vereint finden.

Im Gegensatz zu den angeführten Krankheiten bestehen sehr enge Beziehungen der Ödemkrankheit zum Mehl Nährschaden der Säuglinge¹⁾. Es handelt sich bei ihm um eine chronisch verlaufende Ernährungsstörung bei Säuglingen, die über lange Zeit ausschließlich oder überwiegend mit Mehlabkochungen gefüttert wurden. Die wichtigsten Symptome sind hochgradige Abmagerung, die unter Umständen verdeckt sein kann durch Ödeme, resp. durch Wasseransammlung in den Geweben. Durch letztere kommt es bei vielen Fällen zu den sog. pastösen Typen des Mehl Nährschadens. Die einseitige Mehlkost führt zur starken Wasserretention, wodurch die Kinder scheinbar dick und rund, bei näherem Zusehen aber blaß, gedunsen und pastös aussehen. Zuweilen finden sich auch Ödeme an den Augenlidern, an Hand- und Fußrücken. Allmählich geht dieser Zustand unter Wasserverlust in den atrophischen über. Diese Kinder neigen zu Untertemperaturen und zu Bradykardien. Es stellen sich leicht Komplikationen ein, weil die Immunität des Körpers durch den Mehl Nährschaden stark geschädigt wird. Häufig treten akute Komplikationen von seiten des Digestionstractus auf. Die Erklärung ist gegeben durch kalorische Unterernährung, die einseitige Mehlkost hat einen Überschuß an Kohlenhydraten, während der Gehalt an Eiweiß, Fett und Salzen abnorm niedrig ist. Darum ist es nicht möglich, mit einseitiger Mehlkost ein Kind zu ernähren. Etwaige Gewichtszunahmen beruhen stets auf Wasserretentionen, die nach den Weigertschen Untersuchungen in engster Beziehung zu der relativen Unterernährung mit Kohlenhydratüberschuß stehen²⁾.

¹⁾ Auf die Ähnlichkeit der Ödemkrankheit mit dem Mehl Nährschaden haben wir schon in unserer ersten Bearbeitung (April 1917) besonders hingewiesen. Sie wird jetzt vor allem von seiten der Kinderärzte hervorgehoben (Rietschel, L. F. Meyer).

²⁾ Zit. nach Birk, Leitfaden der Säuglingskrankheiten. Bonn 1914. S. 100.

Die Kriegsernährung ist nicht nur eine quantitativ minderwertige, sondern auch eine einseitige, und überall, wo die Ödemkrankheit ausbrach, war die Nahrung charakterisiert dadurch, daß sie in der Hauptsache aus Kohlenhydrat, Wasser und Salzen bestand, während der Eiweiß- und Fettgehalt ein sehr niedriger war.

Was zunächst das Fett anbelangt, so zeigte sich eine außerordentliche Verarmung des ödemkranken Organismus an Fett und Lipoiden. Dafür erbrachten die autoptischen und histologischen Untersuchungen und die chemischen Untersuchungen des Blutes die Beweise. Durch die Untersuchungen von Stepp¹⁾, Mac Arthur u. Luckett²⁾, Osborne u. Mendel³⁾, Mc Collum u. Devis⁴⁾ ist die Frage, ob Fette oder fettähnliche Substanzen einen wesentlichen Nahrungsstoff darstellen, eingehend bearbeitet worden. Vor allem die Steppschen Untersuchungen zeigten, daß gewisse Lipoiden und deren Bausteine dem Säugetierorganismus unbedingt zugeführt werden müssen, wenn das Leben aufrechterhalten werden soll. Die Frage, ob Fette zum Wachstum oder zur Erhaltung unbedingt notwendig sind, ist durch die Versuche von Osborne u. Mendel, Mc Collum u. Devis bejaht worden, von Stepp jedoch nicht als sicher bewiesen angenommen. Aron⁵⁾ vertritt neuerdings auf Grund eigener Versuche die Auffassung, daß das Nahrungsfett gewisse Bestandteile enthält, die als solche für den Organismus unentbehrlich sind. Es muß daher ähnlich wie ein Eiweißminimum auch ein Fettminimum gefordert werden, dessen Höhe von der Natur des Nahrungsfettes (wahrscheinlich vom Lipidgehalt) abhängig ist.

Es dürfte also wohl die Frage in Betracht kommen, ob nicht die große Fettarmut der Kriegsernährung für die Entstehung der Ödemkrankheit von Bedeutung ist. Die Erfahrungen, welche wir heute über den Einfluß fettfreier Nahrung haben, beschränken sich völlig auf Tierexperimente. Die Tiere sind in ihrem Wachstum geschädigt und gehen schließlich zugrunde. Besonders hervorstechende Krankheitserscheinungen scheinen dabei nicht aufzutreten. Wie sich die Wirkung andauernder fettfreier Ernährung beim Menschen äußern würde, müßte erst erwiesen werden. Man kann aber wohl annehmen, daß die Lipoidverarmung des Körpers zu Störungen Veranlassung geben kann, wenn man die lebenswichtige Funktion in Betracht zieht, welche

---

¹⁾ Stepp, Ergebnisse d. inn. Med. u. Kinderheilk. **15**, 256. 1917. Hier Zusammenfassung der Literatur.

²⁾ Mac Arthur u. Luckett, Journ. of biological Chemist. **20**, 161. 1915.

³⁾ Osborne u. Mendel, Zeitschr. f. physiol. Chemie **80**, 307. 1912.

⁴⁾ Mc Collum u. Devis, Journ. of biol. Chemist. **15**, 167. 1913; **20**, 641; **21**, 179. 1915; Proc. soc. exp. and med. **11**, 101. 1914.

⁵⁾ Aron, Biochem. Zeitschr. **92**, 211. 1918.

den Lipoiden als mutmaßlichem Bestandteil der Plasmahaut für die Aufnahme der Stoffe in die Zelle zukommt¹⁾.

Sehr auffallend ist bei den Ödemkranken die außerordentliche Eiweißverarmung, wie sie durch den großen Eiweißhunger, der in den angeführten Stoffwechselversuchen zutage trat, den sichtbaren Ausdruck findet, und vor allem durch die Untersuchungen des Eiweißgehaltes des Blutes, welche eine Verminderung auf mehr als die Hälfte des normalen Serumeiweißgehaltes ergaben. Die Ursache hierfür ist die Eiweißarmut der Nahrung. Wir wissen ja allerdings durch die Versuche von Chittenden, Flügge u. a., daß auch arbeitende Menschen mit einer täglichen Eiweißration von 50—60 g Eiweiß vollkommen auskommen können, und vor allem haben Hindhede²⁾ und neuerdings auch Ragnar Berg gezeigt, daß sogar 20—25 g verdaulichen Eiweißes bei entsprechend calorienreicher Ernährung ausreichen können, wobei Ragnar Berg noch einen besonderen Wert auf ein Überwiegen der Basen legt. Es gehört aber dazu natürlich eine Nahrung, welche die unbedingt notwendige Calorienmenge besitzt. Ein Anhaltspunkt dafür ist durch die neuesten Untersuchungen von Jansen (l. c.) erbracht. Es muß ferner das Eiweiß ein unbedingt vollwertiges sein (Abderhalden u. a.). Sobald die Calorienmenge zu niedrig ist, verarmt der Körper notwendigerweise an Eiweiß. Diese Folge mangelhafter Ernährung finden wir bei unseren Ödemkranken in ausgesprochenem Maße und es hat sich bei ihnen gezeigt, daß die durchschnittliche Eiweißzufuhr von 20—55 g pro Tag infolge der kalorisch unzureichenden Ernährung keineswegs ausreichte, um den Körper vor Eiweißverarmung zu schützen. Unter einer so außerordentlichen Eiweißverarmung, wie wir sie bei den schwereren Ödemkranken finden, muß die Funktion des Organismus leiden, eine Anschauung, die z. B. auch von Falta stark hervorgehoben wurde. Als einen Ausdruck der Hypofunktion der Zirkulationsorgane infolge ihrer Verarmung an lebenswichtigem Material können wir wohl die Bradykardie und die Hypotonie der Ödemkranken ansehen. (Ausführliches siehe in I. Mitteilung.) Hierher gehört ferner unsere Beobachtung, daß nicht selten bei den Ödemkranken eine ausgesprochene Hemeralopie angetroffen wird. Man kennt schon lange das Vorkommen von sog. Ernährungshemeralopien. Auch Budczynski u. Chelchowski (l. c.) führen an, daß neben den Ödemen, die oft so hochgradig waren, daß auch das passive Öffnen der Augenlider kaum möglich

---

¹⁾ Siehe bei Höber, *Physikalische Chemie der Zelle und der Gewebe*. Berlin-Leipzig 1914.

²⁾ Siehe bei Schittenhelm, *Münchn. med. Wochenschr.* Nr. 29. S. 1631. 1914.

war, wiederholt Augenveränderungen in Erscheinung traten: Hemeralopie, Xerosis conjunctivae, Ulcera corneae. Jess¹⁾ führt bei der Besprechung der Hemeralopie diese Beziehungen zur Ödemkrankheit gleichfalls an und meint, es stehe dem nichts im Wege, als lokale Ursache auch der sog. essentiellen Hemeralopie ein ernährungstoxisches Ödem der Retina anzunehmen, durch welches die Funktion der Stäbchen und Zapfen ebenso wie die des Pigmentepithels geschädigt wird. Das Ödem der Ödemkranken und die ausgesprochene Ödembereitschaft der im präödematösen Stadium befindlichen Kranken ist sicherlich gleichfalls als eine Folge der durch die mangelhafte Zusammensetzung der Nahrung bedingten Funktionsstörung der Organe anzusehen.

Um einen weiteren Einblick in die Frage der Ödementstehung bei den Ödemkrankheiten zu erhalten, haben wir bei den früher mitgeteilten Stundenversuchen bei Verabreichung von Wasser, Kochsalz, der Kombination von Wasser + Kochsalz mit und ohne Thyreoidin gleichzeitig den Serumindex bestimmt. Kurve 1 zeigt einen einfachen Wasserversuch. Dabei findet sich in der ersten Stunde ein starkes Absinken des Serumeiweißes, gleichzeitig mit dem Anstieg der Diurese, dann steigt die Serumeiweißkurve trotz weitergehender Diurese zur alten Höhe wieder an, auf der sie verbleibt, um erst in der 5. Stunde gleichzeitig mit dem Absinken der Diurese wieder abzufallen. Es kommt also beim Einsetzen der Diurese zu einer vorübergehenden Verdünnung des Blutes, die sich aber bald wieder ausgleicht.

Nach Veil²⁾ kommt es beim Wasserversuch nach vorausgehender kochsalzarmer Ernährung zu einer Blutverdünnung (Heruntergehen des Index), nach vorausgehender salzreicher Ernährung zu einer Eindickung (Hinaufgehen des Index). Nach Reiss³⁾ besteht beim Normalen keine besondere Beeinflussung. Zufuhr größerer Kochsalzmengen führt nach Reiss³⁾ und Benzur⁴⁾ zu einer Blutverdünnung. Normalerweise verschwindet diese Verdünnung bald wieder und auch bei Störungen der Wasserbilanz braucht sie nicht längere Zeit anzuhalten. Erst wenn die Ausscheidungsfähigkeit für NaCl fast ganz oder ganz aufgehört hat, wird die Hydrämie eine dauernde und nimmt hohe Grade an, entsprechend dem Auftreten von Gewebsödemen. Die Wasserzufuhr spielt hierfür nur eine untergeordnete Rolle.

In unseren Kochsalztrockenversuchen (Kurve 2 u. 3) sinkt der Index während des ganzen Versuches sukzessive ab, so daß mit

¹⁾ Jess, Deutsche med. Wochenschr. 1917, Nr. 22.

²⁾ Veil, Deutsches Archiv f. klin. Med. **119**, 376. 1916.

³⁾ Reiss, Ergebnisse d. inn. Med. u. Kinderheilk. 1913, S. 531.

⁴⁾ Benzur, Zeitschr. f. klin. Med. **67**, 164. 1909.

einer erheblichen und langdauernden Blutverdünnung gerechnet werden muß, die also wesentlich länger anhält als in den Benzurschen Fällen. Kurve 4 und 5 zeigen ein dem Normalen sich annäherndes Verhalten, wenn auch namentlich in Kurve 51 die Tendenz zu Abfall nach kurzem Wiederaufstieg doch relativ lange anhält.

Bei den kombinierten Wasser-Kochsalzversuchen kommt es in Kurve 6, 7 und 8 zu einem Anstieg des Serumeiweißes (Blut-

Kurve 1¹⁾. Wasserversuch (Ce.).

Kurve 2. Kochsalztrockenversuch (Fe.).

Kurve 3. Kochsalztrockenversuch (Ce.).

Kurve 4. Kochsalztrockenversuch (Pi.).

eindickung) bei gleichzeitiger verzögerter Wasser- und Kochsalzausfuhr, um dann zur Norm abzusinken, auf der der Eiweißgehalt sich dauernd hält. Dieses eigentümliche Verhalten entspricht den Beobachtungen Veils, daß nach vorhergehender kochsalzreicher Ernährung der Wasserversuch zu einer sukzessiven Steigerung des Serumindex führt. Man muß wohl annehmen, daß hier Wasser in die Gewebe abgeführt wird. Es verhalten sich also die Ödemkranken bei

¹⁾ In den Kurven 1—11 bedeutet: — absolute NaCl-Ausscheidung, ... % Serumeiweiß, ---- Wasserausscheidung.

einmaliger Zufuhr von Wasser + Salz und vorausgehender kochsalzarmer Ernährung wie Normale bei dauernder kochsalzreicher Ernährung und einmaliger Wasserzufuhr.

Bei dem kombinierten Wasser- und Kochsalzversuch mit Thyreoidin sind die Ausschläge lange nicht so instruktiv; bei 9 und 10 kommt es bald zu einem geringen Anstieg der Serumeiweißkurve, und dann schon in der nächsten Stunde zu raschem Abfall zur Norm.

Kurve 5. Kochsalztrockenversuch (Si.).

Kurve 6. Kombiniertes Wasser-Kochsalzversuch (Ce.).

Kurve 7. Kombiniertes Wasser-Kochsalzversuch (Fe.).

Bei Kurve 11 erfolgt erst ganz spät ein Anstieg. Es zeigen sich also hier trotz besserer Ausscheidungsverhältnisse für Wasser und Kochsalz gegenüber dem kombinierten Wasser- und Kochsalzversuch ohne Thyreoidin viel weniger ausgeprägte Schwankungen der Blutkonzentration. Es kommt eben unter der Einwirkung des Thyreoidins zu einer geringeren Wasserabgabe an die Gewebe resp. zu einer Herabsetzung ihrer Wasseraffinität.

Überblicken wir die Resultate der letzten Versuche, so bestätigen sie unsere früheren Ausführungen (III. Mitteilung), daß die Störungen der Ödemkranken im Wasser- und Kochsalzstoffwechsel besonders beim kombinierten Wasser- Kochsalzversuch zum

Kurve 8.
Kombinierter Wasser-Kochsalzversuch (Pi.).

Kurve 9. Kombiniertes
Wasser-Kochsalzversuch mit Thyreoidin (Si.).

Ausdruck kommen, wo eine Retention vor allem von Wasser, aber auch von NaCl statthat, die weitaus erheblicher ist als beim Normalen. Durch Thyreoidinverabreichung läßt sich diese Störung teilweise beheben. In unseren Resultaten kommen wir somit zu einer Übereinstimmung mit Falta (l.c.), der das Kriegsödem auf einer durch ungenügende Eiweiß- und Gesamtcalsorienzufuhr bedingten chronischen Unterernährung beruhen läßt, bei welchem die auch sonst bei chronischer Unterernährung bestehende Ödemereitschaft durch den Genuß einer außergewöhnlich salz- und wasserreichen Ernährung manifest wird. Man wird wohl annehmen müssen, daß die Unterernährung, vor allem die Eiweiß- und Lipoidverarmung des Gewebes, zu einer abnormen Durchlässigkeit der Gefäße führt, wie sie auch Schiff annimmt, und gleichzeitig zu einer erhöhten Affinität der Gewebe für Wasser und Kochsalz.

Wir haben schon früher (l.c.) über Versuche berichtet, die Ödeme künstlich zu erzeugen, und mitgeteilt, daß dies bei der aus-

giebigen eiweiß- und fettreichen Krankenkost trotz Zufuhr großer Mengen von Wasser und Kochsalz im postödematösen Stadium nicht gelang. Da-

gegen war der Versuch positiv, als die Wasser- und Salzzulagen bei einem Ödemkranken verabreicht wurden, der während des Versuches wieder auf die Massenkost gesetzt wurde.

Die beiden Versuchspersonen wurden mit frischen Ödemen aufgenommen. Sie bekamen die gewöhnliche Kost, unter deren Einfluß ihre Ödeme entstanden waren, weiter, wurden aber ins Bett gelegt. Flüssigkeitszufuhr von ungefähr 4 l.

Pat. Sap.: Bei der Aufnahme starke Ödeme. 100% Hgl., 6 170 000 E., 6100 L. Nach 10 Tagen 90% Hgl., 5 290 000 E. In den ersten 3 Wochen große Urinmengen bis 6 l. Große Kochsalzmengen bis 60 g bei einer Zufuhr von ca. 18 g Neubauer-scher Ilunprobe, bei der 1,5 g Ilun (= Kreatininum pur. Bayer) per os verabreicht wurde, ergab gleich nach der Aufnahme eine sehr verschleppte und niedrige Ausscheidung. 14 Tage später war sie wesentlich gebessert, aber erst nach etwa 5 Wochen im erneuten Versuch normal. Die Ödeme waren bei Bettruhe bald verschwunden. Nach dreiwöchiger Krankenhausbeobachtung bekam der Pat. täglich 50 g Kochsalz zugelegt. Er schied in dieser Zeit zwischen 4—5 l Urin aus und zwischen 45 und 55 g Kochsalz. Nach 10 Tagen traten wieder leichte Ödeme der Knöchel und Unterschenkel (Tibiakante) auf, die sich trotz Weglassen der Kochsalzzulage noch etwa 5—6 Tage hielten und dann wieder verschwanden.

Pat. Burd. Starke Ödeme. Hgl. 95%, E. = 5310 000, 8300 L.

Urinmengen bis zu 5000 bei Flüssigkeitszufuhr von 4 l. Kochsalzausscheidung bis zu 41 g pro Tag bei 18 g Zufuhr. Kreatininausscheidung wie bei Pat. Sap., zunächst stark verzögert und herabgesetzt, im zweiten Versuch besser, aber erst im dritten nach 5 Wochen normal. Nach 3 Wochen Aufenthalt im Krankenhaus 50 g Salzzulage pro die. Wiederauftreten von Ödemen nach 10 Tagen. Die Salzausscheidung hielt sich zwischen 36 und 48 g; Wasser um 4 l.

Ähnliche Resultate berichten Knack u. Neumann (l. c.). Sie konnten bei Ödemkranken im ödemfreien Stadium durch einseitige Ernährung (Steckrüben) bei gleichzeitiger übermäßiger Flüssigkeitszufuhr ein Wiederauftreten von Ödemen erreichen. Damit stimmen auch

Kurve 10. Kombiniertes Wasser-Kochsalzversuch mit Thyreoidin (Pi.).

Kurve 11. Kombiniertes Wasser-Kochsalzversuch mit Thyreoidin (Fe.).

Maase u. Zondeck überein. Es gelingt nicht, durch Gemüse und Brot allein das Ödem zu erzeugen, das aber sofort auftritt, wenn man diese Kost in flüssiger Form verabreicht. Falta führt ferner an, daß die Verabreichung von Natrium bicarbonicum ebenso erneute Ödembildung veranlaßt und zieht daraus die Parallele zum Ödem der Diabetiker. Denn auch der schwere Diabetiker steht wegen seiner mangelnden Assimilationskraft trotz evtl. reichlicher Nahrungszufuhr in hochgradiger Unterernährung.

Daß die Besserung der Ernährungsverhältnisse einen raschen Umschwung in dem Zustand der Ödemkranken herbeiführt, haben wir schon erwähnt. In den zwei angeführten Stoffwechselversuchen haben wir in einem Falle erhöhte Eiweiß-, im anderen Fall erhöhte Fett- und Lipoidzufuhr durchgeführt, ohne daß wesentliche Unterschiede zwischen beiden zutage traten. In einem anderen Versuch verabreichten wir das Vitamin La Roche (Orypan), ohne einen besonderen Einfluß zu ersehen.

Wir wollen zum Schluß nochmals auf die engen Beziehungen, welche zwischen der Ödemkrankheit und dem Mehl Nährschaden der Kinder bestehen, hinweisen. Schon im Krankheitsbild sind einige Ähnlichkeiten vorhanden: Beide zeigen auf der einen Seite hochgradige Abmagerung, auf der anderen Seite Neigung zu Wasserretention, die sich in Gewichtszunahme geltend macht. Das Kind mit Mehl Nährschaden sieht gedunsen pastös aus und ein gleiches Aussehen zeigen zahlreiche Ödemkranke. Bei ihnen fällt besonders im Gesicht das aufgeschwemmte pastöse Aussehen auf. Mit Ablaufen des retinierten Wassers verliert sich auch das pastöse Aussehen und es tritt dafür die Abmagerung hervor. Das Kind mit Mehl Nährschaden, ebenso wie der Ödemkranke neigen zu Ödembildungen, die sich hier wie dort im Gesicht, an den Unterschenkeln, an den Händen und Füßen und an dem übrigen Körper lokalisieren können. Bei beiden wird Bradykardie beobachtet. Beide neigen zu Komplikationen und verhalten sich widerstandslos gegenüber interkurrenten Erkrankungen, auch wenn sie relativ geringfügig sind. Beide Krankheitszustände haben oft Untertemperaturen und Störungen des Magendarmkanals. Die Durchfälle sind bei den Kindern mit Nährmehlschaden oftmals hervorgerufen durch abnorme Gärungen im Darm und hierdurch veranlaßte besonders schädliche Säurebildungen der Faeces. Die Gärungsprozesse und Säurebildung im Darm, die verhältnismäßig leicht eintretenden Durchfälle und die dadurch hervorgerufenen Alkaliverluste bilden eine Gruppe von Erscheinungen, welche zusammen mit der an der erhöhten Ammoniakausscheidung erkennbaren Acidose eine wichtige Rolle in der Pathogenese des Mehl Nährschadens bilden [Czerny u. Keller¹⁾]. Es ist auch nicht uninteressant, daß Bürger (l. c.) durch seine Unter-

¹⁾ Czerny u. Keller, Der Kinder Ernährung, Ernährungsstörungen und Ernährungstherapie II, 9. Abt., S. 602. Leipzig u. Wien 1917.

suchungen nachgewiesen hat, daß auch bei Ödemkranken die Durchfälle häufig durch abnorme Säurebildungen im Darm infolge von Gärungsvorgängen bedingt sind.

Die einseitige Mehlnahrung führt durch die eigenartige Zusammensetzung des Mehles zu einer Überernährung mit Kohlenhydraten und gleichzeitig zu einer Unterernährung mit Eiweiß und Fett, aber auch mit Salzen. Es ist namentlich durch Untersuchungen von Keller und Rubner u. Heubner nachgewiesen worden, daß die Mehlerernährung unzulänglich ist, und daß es zu einer dauernden negativen Stickstoffbilanz kommt. Benjamin¹⁾ zeigte in einem Versuch bei einem Kinde mit Mehlnährschaden das starke Bedürfnis des Organismus, die durch einseitige Ernährung verursachten Stickstoffverluste zu ersetzen, indem er nach Zufuhr von Eiweißmilch die Stickstoffretention rapid auf 50% der Zufuhr ansteigen und dann allmählich auf 15—20% wiederabsinken sah. Dieser Versuch von Benjamin gibt eine schöne Parallele zu unseren zwei angeführten Stoffwechselversuchen an Ödemkranken, bei denen es gleichfalls zu einer ganz ungewöhnlichen Höhe der positiven Stickstoffbilanz gekommen ist.

Die Zusammensetzung der Nahrung, welche schließlich zu Ödemkrankheit führte, ist in weitem Maße der Zusammensetzung der Nahrung ähnlich, die beim Kinde zum Mehlnährschaden führt. Ihr Hauptbestandteil sind Kohlenhydrate, während Eiweiß und Fett in abnorm geringen Mengen darin enthalten sind. Nur im Salzgehalt unterscheiden sich die beiden Ernährungsverhältnisse, indem beim Mehlnährschaden die Nahrung salzarm, bei der Ödemkrankheit dagegen salzreich ist, besonders da die Ödemkranken infolge eines beständigen Salzhungers stets reichlich Salz (bis zu 40—50 g pro Tag) ihrer Nahrung zufügten. Es besteht aber insofern ein weiterer Parallelismus als sowohl beim Mehlnährschaden wie bei der Ödemkrankheit Salzzulagen Ödeme erzeugen können.

In einer eben im Erscheinen begriffenen zusammenfassenden Darstellung über die idiopathischen Ödeme im Säuglingsalter bespricht L. F. Meyer²⁾ ausführlich deren Genese. Es zeigt sich dabei die außerordentliche Übereinstimmung unserer auf Grund der Untersuchungen an Ödemkranken gewonnenen Ansichten mit den von L. F. Meyer beim Studium an Säuglingen gefundenen Resultaten. Wie wir beim Ödemkranken eine besonders hervorstechende Retention von Salz + Wasser sahen, während Wasser allein glatt ausgeschieden und Salz allein auch nur geringe Ausschläge ergab, so zeigt L. F. Meyer an der Hand einer Kurve, daß die Retention von Wasser nach Kochsalzgaben be-

¹⁾ Benjamin, Zeitschr. f. Kinderheilk. **10**, 216. 1914.

²⁾ L. F. Meyer, Idiopathische Ödeme im Säuglingsalter. Ergebnisse der inneren Medizin und Kinderheilkunde. Bd. XVII.

sonders deutlich in Erscheinung tritt, wenn man die 4stündige Wasserausscheidung eines Säuglings nach Zufuhr physiologischer Kochsalzlösung mit der nach Zufuhr von destilliertem Wasser vergleicht. Der Strauß-Volhardsche Wasserversuch ergab im ersten Falle während der 4stündigen Versuchsdauer äußerst spärliche Ausscheidung von Urin, im zweiten fast restlose Ausscheidung des eingeführten Wassers. Besonders wichtig erscheinen uns ferner die Ausführungen Meyers über die hydropigenen Eigenschaften der Kohlenhydrate. Sie ist bei dem Säugling mehrfach bewiesen, ist aber auch durch Experimente belegt [Rietschel¹⁾, Tachau²⁾ u. a.]. Von Interesse ist ferner, daß von mancher Seite dem Fett eine anhydropische Wirkung zugeschrieben wird, ohne daß freilich die Beweise vollgültige sind. Über die Rolle des Eiweißes scheinen die Meinungen noch etwas auseinanderzugehen.

Es dürfte also kaum zweifelhaft sein, daß wir es bei der Ödemkrankheit und dem Mehl Nährschaden der Kinder mit außerordentlich nahe verwandten Krankheitszuständen zu tun haben. Es fragt sich nur, ob die endgültige Ursache, abgesehen von der quantitativen Minderwertigkeit der Nahrung, auch noch in ihrer Einseitigkeit zu suchen ist. Wir haben bereits erwähnt, daß wir den Mangel an Eiweiß und an Fett resp. Lipoiden, der sich auch bei der Untersuchung der Organe im histologischen Bild und chemisch identisch offenbarte, eine große Bedeutung beimessen. Es ist aber noch zu überlegen, ob nicht vielleicht ein Mangel an akzessorischen Nährstoffen eine Rolle mitspielt. Funk (l. c.) hat den Mehl Nährschaden unter die Avitaminosen gerechnet. Hofmeister³⁾ spricht von „Insuffizienzkrankheiten“, als deren Haupttypen er Beriberi einerseits und Skorbut andererseits ansieht. Die Tierversuche beweisen nach ihm die Tatsache, daß bei derselben Tierart je nach der Art der Ernährung entweder die nervösen Veränderungen oder die Gefäß- und Knochenveränderungen auftreten können, daß bei dem Zustandekommen der Insuffizienzsymptome mindestens zwei ursächliche Bedingungen beteiligt sind, das „Antineurit“ und ein der hämorrhagischen Diathese entgegenwirkender Stoff, den er vorläufig „Antiskorbutin“ nennt. Es scheint auch ihm naheliegend, eine Anzahl anderer Ernährungskrankheiten, so die Mehl- und den Milchnährschaden, die Rachitis, die Schiffsberiberi auf den Mangel eines oder beider genannten Stoffe zurückzuführen. Doch läßt er es vorläufig noch dahingestellt, ob nicht in diesen Fällen noch der Mangel anderer akzessorischer Stoffe beteiligt ist. Was die Ödembildung anbelangt, so läßt er die Frage offen, ob es sich dabei um

1) Rietschel, Münchn. med. Wochenschr. 1918. Nr. 19 und 26.

2) Tachau, Biochem. Zeitschr. 1915. Nr. 65, S. 253 und Nr. 67, S. 338.

3) Hofmeister, Über qualitativ unzureichende Ernährung II. Ergebnisse der Physiologie 16, 565. Wiesbaden 1918.

die Folge einer Zirkulationsstörung handelt, oder um eine Störung in der Ernährung der Capillärwand, oder in der Fortbewegung der Gewebslymphe.

Wir haben oben betont, daß auch wir der Ansicht sind, daß die mangelhafte und einseitige Ernährung zu fehlerhafter Zusammensetzung der Gewebe und damit auch der Gefäße speziell der Capillaren führt, worin wir die anatomische Ursache der Ödeme sehen möchten. Was die Frage anbelangt, ob das Fehlen akzessorischer Nährstoffe eine Rolle spielt, so möchten wir es, wie wir nochmals hervorheben, für nicht sehr wahrscheinlich halten. Es genügt ja schon der Zusatz minimaler Mengen derselben, um etwaige Insuffizienzerscheinungen (Avitaminosen) zu beheben; die Kost der Leute, die Ödemkrankheit bekommen, war aber doch im ganzen so mannigfaltig zusammengesetzt, daß ein Mangel an akzessorischen Nährstoffen kaum entstehen konnte. Wenn aber die Ödemkrankheit nicht unter die Avitaminosen zu rechnen ist, dann dürfte wohl dasselbe auch für den Mehlnährschaden der Kinder zutreffen.

Anhang.

Tabelle I.

Übersicht über 114 noch arbeitende Personen ohne Ödeme aus einer Gruppe, aus der Ödemkranke in großer Zahl ins Krankenhaus kamen. Sie ist angeordnet nach Körpergewichtsdefizit. Eine größere Anzahl des ersten bis zweiten Drittels kam später mit Ödem zur Aufnahme.

Nr.	Größe m	Gewicht kg	Ge- wichts- defizit kg	Hämo- globin ge- messen %	Hämo- globin be- rechnet korr. %	Blutdruck	Index	Alter
1	1,95	47,7	47,3	80	100	85/96	7,51	21
2	1,69	38,2	30,8	79	98	50/70	5,95	19
3	1,74	44,3	29,7	76	95	110/115	6,08	22
4	1,68	41,8	26,2	80	100	80/100	6,25	22
5	1,80	54,3	25,7	90	100	60/75	6,23	28
6	1,71	45,4	25,6	95	100	60/80	8,28	26
7	1,58	33,5	24,5	85	100	100/115	6,81	19
8	1,65	40,5	24,5	85	100	80/100	6,27	20
9	1,69	44,5	24,5	82	100	150/165	7,53	19
10	1,60	36,3	23,7	80	100	75/90	6,19	22
11	1,65	41,4	23,6	78	97	65/80	6,88	19
12	1,64	40,5	23,5	84	100	70/90	7,04	19
13	1,65	41,5	23,5	98	100			39
14	1,54	31,3	22,7					
15	1,66	43,5	22,5	80	100	100/115	6,83	21
16	1,63	41,1	21,9	85	100	90/105	6,04	20
17	1,64	42,2	21,8	70	87	66/90	6,49	20
18	1,67	45,7	21,3	75	93		5,36	
19	1,61	39,8	21,2	80	100	80/100	7,07	19
20	1,73	51,8	21,2	97	100	50/70	6,49	34
21	1,68	47,3	20,7	85	100			

Tabelle I (Fortsetzung).

Nr.	Größe m	Gewicht kg	Ge- wichts- defizit kg	Hämo- globin ge- messen %	Hämo- globin be- rechnet korr. %	Blutdruck	Index	Alter
22	1,69	49	20,0	67	83	90/107	6,68	31
23	1,70	50,0	20,0	80	100	55/70	5,95	22
24	1,70	50,2	19,8	75	93		6,66	
25	1,66	46,7	19,3	65	81	71/93	5,72	20
26	1,67	49,1	17,9	78	97	70/90	5,47	22
27	1,69	52,4	16,6	75	93	86/107	8,71	36
28	1,70	53,4	16,6	90	100	70/90	5,47	23
29	1,62	45,5	16,5	65	81	71/93	7,39	19
30	1,60	43,5	16,5	83	100	100/120	6,49	34
31	1,75	59,0	16,0	87	100	80/100	7,63	24
32	1,64	48,2	15,8	70	87	107/118	8,28	22
33	1,62	46,2	15,8	78	97	60/80	7,91	27
34	1,80	64,5	15,5	96	100	70/105	8,28	20
35	1,68	52,5	15,5	78	97	80/107	8,28	22
36	1,60	44,6	15,4	88	100	85/100	7,17	19
37	1,67	51,6	15,4	100	100	100/120	7,20	19
38	1,70	55,0	15,0	75	93	90/111	7,26	22
39	1,64	49,0	15,0	78	97	70/90	8,28	21
40	1,61	46,0	15,0	75	93	103/115	7,42	22
41	1,73	58,5	14,5	77	96	60/75	7,63	32
42	1,61	46,8	14,2	80	100	93/115	7,20	20
43	1,70	55,8	14,2	74	92	93/115	8,49	19
44	1,62	48,0	14,0	65	81	91/118	6,66	21
45	1,62	48,5	13,5	60	75	89/100	8,49	21
46	1,62	48,5	13,5	78	97	90/105	6,79	30
47	1,63	49,5	13,5	65	81	100/120	7,63	25
48	1,60	47,0	13,0	70	87	70/90	7,20	27
49	1,70	57,3	12,7	68	85	111/122	6,54	21
50	1,74	61,3	12,7	83	100	130/150	6,77	41
51	1,73	60,5	12,5	60	75	80/103	7,59	33
52	1,74	61,5	12,5	80	100	50/70	7,37	39
53	1,66	53,9	12,1					22
54	1,70	57,9	12,1	86	100	80/100	7,20	38
55	1,66	54,0	12,0	80	100	50/65	7,42	37
56	1,77	65,0	12,0	75	93	90/110	7,04	32
57	1,65	53,0	12,0	80	100	86/107	7,63	33
58	1,68	56,2	11,8	84	100	70/95	7,22	20
59	1,72	60,7	11,7	74	92	86/107	7,33	20
60	1,72	60,5	11,5	100	100	60/80	5,60	
61	1,60	48,5	11,5	72	90	83/107	6,45	22
62	1,62	50,5	11,5	70	87	100/120	6,81	44
63	1,61	49,5	11,5	75	93	80/95	7,20	26
64	1,70	58,5	11,5	60	75	89/103	8,37	23
65	1,70	58,5	11,5	73	91	115/137	7,74	19
66	1,64	52,6	11,4	84	100	70/90	6,45	39
67	1,66	54,9	11,1	75	93	93/115	8,14	21
68	1,71	60,1	10,9	65	81	86/103	7,04	23

Tabelle I (Schluß).

Nr.	Größe m	Gewicht kg	Ge- wichts- defizit kg	Hämo- globin ge- messen %	Hämo- globin be- rechnet korr.%	Blutdruck	Index	Alter
69	1,71	60,3	10,7	65	81	102/111	7,35	24
70	1,54	43,3	10,7	80	100	70/85	6,68	22
71	1,72	61,4	10,6	67	83	86/107	7,76	22
72	1,64	53,4	10,6	60	75	89/100	7,35	20
73	1,68	57,5	10,5	70	87	89/103	7,76	21
74	1,63	52,5	10,5	65	81	100/120	6,64	19
75	1,63	52,5	10,5	70	87	100/115	7,29	34
76	1,70	59,5	10,5	75	93	108/129	8,64	22
77	1,68	57,5	10,5	75	93	108/129		32
78	1,64	55,0	9,0	70	87	89/100	7,74	22
79	1,68	59,1	8,9	75	93	103/115	7,42	24
80	1,63	54,2	8,8	70	87	75/96	7,57	24
81	1,72	63,5	8,5	60	75	50/70	6,34	33
82	1,64	55,5	8,5	73	91	81/96	7,39	19
83	1,63	54,7	8,3	74	92	70/95	5,18	26
84	1,80	71,7	8,3	70	87	81/96	7,42	21
85	1,79	70,8	8,2	80	100	111/118	8,06	30
86	1,68	60,0	8,0	75	93	108/129	8,08	20
87	1,69	61,1	7,9	78	97	93/111	7,76	28
88	1,73	65,1	7,9	68	84	90/111	7,82	
89	1,71	63,1	7,9	96	100	89/100	7,85	20
90	1,82	74,3	7,7	76	95	101/122	8,04	25
91	1,71	63,6	7,4	75	93	96/107	8,32	22
92	1,63	55,6	7,4	65	81	89/100	7,80	23
93	1,68	60,9	7,1	74	92	90/111	7,74	22
94	1,69	63,0	6,0	85	100	79/96	8,37	26
95	1,66	60,0	6,0	70	87	107/115	7,42	20
96	1,63	57,3	5,7	58	84	86/107	8,08	20
97	1,70	64,5	5,5	85	100	90/105	6,81	33
98	1,58	52,6	5,4	65	81	107/111	7,96	22
99	1,58	52,7	5,3	67	83	96/107	7,53	23
100	1,72	66,9	5,1	90	100	107/118	7,26	27
101	1,62	57,1	4,9	90	100	89/100	7,61	26
102	1,69	64,3	4,7	70	87	83/103	7,67	22
103	1,61	57,4	3,6	65	81	71/93	7,63	23
104	1,70	67,5	2,5	78	97	90/130	7,20	38
105	1,70	68,0	2,0	70	87	101/122	8,02	25
106	1,67	65,7	1,3	67	83	93/115	6,88	34
107	1,70	68,8	1,2	72	90	90/111	7,51	22
108	1,63	62,0	1,0	98	100	80/100	7,53	26
109	1,61	60,1	0,9	68	84	90/111	7,91	30
110	1,60	59,2	0,8	75	93	91/122	7,67	30
111	1,63	62,5	0,5	85	100	80/100	7,35	30
112	1,63	63,3	+0,3	65	81	93/100	6,45	23
113	1,61	63,7	+2,7	90	100	107/118	8,28	20
114	1,70	73,5	+3,5	100	100	90/110	8,04	33

Tabelle

Übersicht über Ödemkranke aus dem Winter 1917/18,
US. = Ödem am Unterschenkel. Der Grad der

Nr.	Alter	Abmag. Körper- gewicht	Kör- per- länge	Thorax- umfang	Bauch- maß	L. jug. pub.	Hämogl. unkorr. %	Erythro- cyten	Leukocyten
1	20	+++ 52	1,69	78	72	51	Anämie 78	4250000	5600
2	34	+++ 43	1,57	81	68	47	93	5750000	8050
3	32	++ 63	1,67	91	71	50	80	4280000	4350
4	30	60	1,69	83	74	54	88	4200000	5800
5	38	++ 52	1,65	81	67	50	85	5090000	4600
6	36	++ 55	1,68	83	72	50	70	5010000	5200
7	35	+ 56	1,66	90	65	51	78	5450000	5750
8	41	+ 65	1,72	84	69	47	90	3970000	6000
9	40	++ 58	1,71	85	64	54	100	5240000	3900
10	33	+ 55	1,65	81	71	53	75	6240000	4000
11	30	61	1,73	88	66	64	88	5220000	4500
12	23	+++ 52	1,58	79	69	52	65	4220000	L = 42,2 %; N = 42,2 %; Eos = 9 % 6050
13	42	+ 60	1,67	78,5	61	52	100	4050000	7200
14	29	+ 61	1,74	89	70	49	85	4300000	4600
15	30	— 64	1,71	83	68	49	80	4550000	7700
16	36	+ 63	1,69	87	80	55	68	3770000	7500
17	38	50,5	1,59	82	68	44	75	4220000	7400
18	30	61,5	1,76	87	64	55	90	6760000	4200

II.

die in der ersten Mitteilung nicht bearbeitet sind.

Ödeme und der Abmagerung ist mit + bezeichnet.

Ödeme	Hydrothorax	Ascites	Herzgröße Puls	Durchfall	Bronchitis	Reflexe	Nervendruckpunkt	Bemerkungen
US. ++ Gesicht ± Ascites +	0	+	3 : 7 56	+	0	schwach	0	leichte Cyanose starke Abmagerung +
US. +	0	0	2 : 6,5 anfangs 36 jetzt 60	zeitweise wässrige Diarrhöen	+	+	+	Retentio urinae +
US. +++ frisch	0	0	4 : 6,5 48 acc.II.A.T.	0	0	+	++	
US. ++	0	0	2 : 6 44	0	0	+	0	Retentio urinae
Knöchel ++ US. +	0	0	2 : 6 48	Vorher 1× —	0	+	±	
Spuren	0	0	2 : 6½ 54	0	0	+	0	
Spur	0	0	3 : 7 60	0	0	+	0	
0	0	0	2½ : 7½ 54	0	+	+	+	
US. ++	0	0	2½ : 7 46	0	+	+	+	
US. ++	0	0	2 : 7,5 54	0	0	+	±	
Spur	0	0	2½ : 7½ 58	0	0	+	+	
US. +++	0+?	±	2½ : 8½ klein 60	Anam. Durchfall —	+	+	+ femoralis	Drüsentumoren axillar, Hals inguinal, mediastinal
US. +	0	0	3 : 6 58	0	0	+	+	
Spuren	0	0	3 : 8½ 45	0	+	+	0	
+ Spur	0	0	2 : 7 60	0	0	+	+	
gering	0	±	2½ : 7 40	0	0	+	0	
0	0	0	2½ : 8 44	0	0	+	+	
US. ++	0	0	2½ : 8 40	0	0	±	0	

Tabelle II

Nr.	Alter	Abm a g. Körper- gewicht	Kör- per- länge	Thorax- umfang	Bauch- maß	L. jug. pub.	Hämogl. unkorr. %	Erythro- cyten	Leukocyten
19	31	55	1,64	81	65	50	75	4470000	4900
20	20	55	1,70	85	71	53	88	5980000	7050
21	30	63	1,72	88	72	51	72	4310000	4650
22	25	58	1,71	87	74	54	85	3950000	8000
23	29	59	1,65	91	64	47	65	3640000	9500
24	28	48,5	1,66	78	55	46	86	4360000	8400
25	26	57,5	1,63	86	69	50	60	4000000	4000
26	22	53	1,59	83	70	46	74	5710000	6300
27	30	45,5	1,63	76	60	49	76	3540000	7300
28	22	+++ 43	1,60	78	61	48	58	5670000	6900
29	28	60	1,80	84	83	91	57	4850000	4800
30	35	72,5	1,85	87	76	53	75	3910000	10300

(Fortsetzung).

Ödeme	Hydro- thorax	Ascites	Herzgröße Puls	Durchfall	Bron- chitis	Re- flexe	Nerven- druck- punkt	Bemerkungen
US. +	0	0	1 1/2 : 7 48	0	0	+	+	
Spur	0	0	2 : 7 42	0	±	+	+	
Spur	0	0	2 : 8,5 48	0	±	+	0	
0	0	0	2 : 8 44	0	0	+	0	
Spur	0	0	2 : 8,3 54	0	0	+	0	Seit 3 Wochen Harndrang, Schmerzen beim Urinieren
0	0	0	1,6 : 8 58	0	±	+	0	Schmerzen in den Gelenken
Spur	0	0	2,2 : 8,5 70	0	0	+	± R.	
0 abgelaufen	0	0	1,4 : 8,5 48 prov.	0	±	+	0	Schmerzen in den Gelenken
0	0	0	1,5 : 7,9 58		0	+	0	Lungenspitzen- katarrh?
++	0	±	2,2 : 6,8 70	++	0	+	0	Äußerst debil.
0	0	0	2,3 : 7,2 72	0	0	+	0	Kauk. Fieber. Milztumor
+++ bis Oberschenkel	0	0	1,5 : 7,8 48	0	0	+	+	