Steht der *S. erythrorrhiza* Ridley zweifellos nahe und ist vielleicht später als Varietät derselben zu betrachten, ist aber ausser durch die braunen Wurzeln, durch die kurzen meist nicht den Grund des Blütenstandes erreichenden kahleren schmalen Blätter, die Zahl der Ährchen und die kahlen nicht wolligen unteren Spelzen verschieden.

VI. *Cyperus articulatus* var. *erythrostachys* aus Deutsch-Ostafrika.

Von P. Graebner.

Cyperus articulatus L. var. *erythrostachys* Graebn. nov. var.

Differt a typo: caulibus obscurius articulatis. Inflorescentia subumbellata hemisphaerica. Spiculis elongatis ferrugineis.

Deutsch-Ostafrika: Kwera-See, Tanganjika-Nyassa-See (Fromm — Münzner no. 140). Blüht Februar.

Eine sehr schöne durch den dichten doldig-büscheligen Blütenstand und die verlängerten lebhaft rotbraunen Ährchen sehr ausgezeichnete Pflanze.

VII. Ex herbario Hassleriano: Novitates paraguarienses. XXII.

(Originaldiagnosen.)

Compositae. IV.

Addenda et Corrigenda ad Compositae I—III.

Eupatorieae Corrig.

400. *Eupatorium pseudo-prasilifolium* Hassler nov. nom. = *E. Fiebrigii* Hassler in Fedde Rep. X. 171 (1912) nomen mutandum ob *E. Fiebrigii* Hier. in Engl. Jahrb. XL p. 371 (1910).

Inuleae.

401. *Tessaria straminea* (Chod.) Hassler nov. nom. = *Conyza straminea* Chod. Pl. Hassl. I p. 154 (Bull. Herb. Boiss. 1902 p. 383). — Styli ramis subulatis usque ad basin papillosis, antheris manifeste caudatis primo visu ex *Astereis* excludenda, est *Tessaridae* typica species.

A *T. absinthioidi* DC. cui accedit floribus hermaphroditis pluribus (vulgo 4) imprimis glabritie omnium partium diversa, a *T. integrifolia* R. et P. praeter florum hermaphroditorum numero foliis distincte et argute serrato-dentatis diversa, indumento viscoso, in sicco vernicoso, vivo ex collectore sapore saccharino, totius plantae valde peculiaris.

Paraguay: Chacoformation. Lambare. Balansa no. 748! in Hb. DC. Typus *C. stramineae* Chod. — Gran Chaco: Loma Clavel in campis palmis obsitis (Palmares) florescens flor. et fruct. mens Nov. Hassler no. 2472; in campis altis arenosis ed ad ripas fluminis Pilcomayo flor. mens Jun. et Jul. Rojas no. 215 et 215a.