wart von Eiweiss oder reichlichen Mengen von Phosphaten kann die Reaction durch Bildung von Niederschlägen stören, Anwesenheit von viel Salzsäure das Auftreten der durch die Milchsäure bedingten Gelbfärbung hindern. Der Nachweis der Milchsäure kann dann noch mit dem Aether-extract nach Einengen desselben auf ein kleines Volum und Zusatz von sehr wenig Eisenchloridphenolmischung geführt werden. Essigsäure und Buttersäure geben keine ähnliche Gelbfärbung; sind sie jedoch neben milchsauren Salzen zugegen, so tritt die Färbung auf. Ihr deutliches Erscheinen zeigt somit die Anwesenheit von Milchsäure an, das Ausbleiben beweist jedoch nicht deren Abwesenheit.

Von den quantitativen Methoden ist für den Fall, dass man nicht einer vollständigen Analyse mit Bestimmung von sämmtlichen Säuren und Basen den Vorzug gibt, nur die von Cahn und v. Mering angegebene zulässig. 50 cc filtrirten Magensaftes werden 1. über freiem Feuer destillirt bis drei Viertel übergegangen sind, wieder auf 50 cc aufgefüllt und nochmals zu drei Viertheilen abdestillirt. Das Destillat enthält, da Salzsäure aus sehr verdünnten Lösungen nicht übergeht, die flüchtigen Fettsäuren (Essigsäure, Buttersäure), deren Säurewerth man durch Titration mit $\frac{1}{10}$ -Normallauge feststellt.

2. Der Rückstand wird in demselben Gefässe mindestens sechsmal mit je 500 cc Aether gut ausgeschüttelt. Dabei geht alle Milchsäure in den Aether und wird im Rückstand der vereinigten abdestillirten Aetherportionen ebenfalls durch Titration bestimmt.

3. Die nach der Erschöpfung mit Aether zurückbleibende saure Flüssigkeit ergibt bei der Titrirung den Salzsäuregehalt, da die sauren Phosphate ihrer Menge nach kaum in Betracht kommen.

Sämmtliche Säurewerthe zusammen müssen der bei Titrirung des ursprünglichen Magensaftes gefundenen Gesamttacidität entsprechen.

3. Auf gerichtliche Chemie bezügliche Methoden.

Von

W. Lenz.

Ueber den toxiologischen Nachweis von Brom und Jod hat Vitali*) einige Versuche angestellt. Wurde 1 g Brom, beziehungsweise Jod, in Wasser gelöst, respective suspendirt, mit 300 g möglichst

*) L'Orosi 1887, p. 400.

fein zerhacktem Fleisch in Berührung gebracht, so war schon nach wenigen Minuten jeder Geruch der Halogene verschwunden und keine Spur derselben mehr in freiem Zustande vorhanden. Der Hauptsache nach hatte sich Halogenwasserstoffsäure gebildet, welche theils frei, theils in Verbindung mit Eiweisskörpern sich befand. Letztere Verbindungen waren zum Theil in Alkohol, zum Theil auch nur in Wasser löslich. Der Halogengehalt konnte durch Behandlung des Rückstandes der betreffenden Fleischauszüge mit Aetzalkali an dieses gebunden und dann weiterhin in bekannter Weise nachgewiesen werden.

Zum gerichtlichen Nachweis von Blutflecken hat Ferry de la Bellonne*) ein eigenartiges Verfahren angegeben. Gewebe, auf welchen Blut vermuthet wird, sollen zerzupft und dann auf der Oberfläche einer wässrigen Chlornatriumlösung (1 : 1000) schwimmen gelassen werden.

Bei Gegenwart von Blut nimmt die Flüssigkeit eine braunrosa Färbung an, welche mit Hülfe des Spectroskopes noch näher untersucht werden kann. Ist hierbei Hämoglobin erkannt, so fügt man einen oder zwei Tropfen concentrirter Chlorallösung zum Inhalt des Röhrchens. Es bildet sich ein rosafarbener Niederschlag, von welchen man nach dem Absetzen die überstehende Flüssigkeit mit Hülfe einer Pipette absaugt. Ein Tropfen des rückständigen Breies wird nun auf einem Objectglase ausgebreitet und letzteres einigemal über einem Alkoholfämmchen hin- und herbewegt. Von dem hierbei entstandenen röthlichen Coagulum trennt man die dasselbe umgebende hellere Flüssigkeit durch Absaugen mittelst Filtrirpapiers, färbt das Coagulum mit Fuchsin, entfernt den Farbüberschuss mit Wasser, gibt einen Tropfen Essigsäure zu und legt das Deckglas auf. Unter dem Mikroskop erkennt man jetzt die mit Fuchsin gefärbten Kügelchen an ihrer charakteristischen Form.

Befindet sich der blutverdächtige Fleck auf Instrumenten, Holz oder Papier, so schabt man ihn ab und hängt das Abgeschabte in einem Beutelchen in die Chlornatriumlösung. Bei blutgetränkter Erde soll man zunächst unter dem Mikroskop bei schwacher Vergrößerung diejenigen Theilchen auslesen, welche mit Blut umhüllt erscheinen, worauf man mit denselben wie angegeben verfährt.

(Bei der Wichtigkeit des Blutnachweises für die gerichtliche Chemie würde eine Bestätigung der Angaben des Verfassers sehr erwünscht sein. W. L.)

*) Arch. de Pharm. 1888, p. 115; Chemiker-Ztg. 12, 82.