XC. Friedrich Fedde, *Corydalis Eugeniae* Fedde, nov. spec. aus Sze-chuan.¹⁾

(Originaldiagnose.)

Herba perennis (?), circiter 25—35 cm alta, gracilis, radice?, caulibus ad basim in filum attenuatis, supra medium bifoliatis. Folia basalia?, caulina subsessilia vel breviter petiolata, quinata, segmentis lateralibus subsessilibus, integris, lineari-lanceolatis, ad apicem paulatim vel subitius acutatis, usque ad oblongo-lanceolatis, ad apicem acutis, forma, ut videtur, variantibus, 3—5 nervis subparallelis distinctis instructis 3—5 cm longis, 0,3—1,25 cm latis, terminali integro vel rursus trilobo, latiore, ceterum formam lateralium aemulante, sed in oblongo-lanceolato statu ad apicem minus acuto quam late cuneato-subrotundato. Flores (colore ignoto) subhorizontales in racemum subdensi- et pluriflorum, post anthesim laxiflorum, usque ad 8 cm longum, dispositi; bracteae herbaceae, inferiores palmatilobatae, superiores integrae lineari-lanceolatae, omnes pedicellos graciles plerumque patentes vel demissos superantes. Sepala squamaeformia, minutissima, fimbriata; petalum superius calcari incluso 12—15 mm longum subapiculatum, ad dorsum carinatum et cristatum, crista non ita humili ab apice usque ad medium calcar et ultra paulatim decrescente, marginibus non ita expansis, repando-undulatis, calcari non ita gracili, sed infundibuliformi-curvato, ad apicem rotundatum cylindrice constricto; petalum inferius subungiculatum, in toto magis carinaeforme, ad basin levissime curvatum, crista altiore, sed multo brevior; petala interiora ad apicem cohaerentia, unguiculata ungue quam lamina longiore, obcuneato-lanceolato, lamina subpanduraeformi-spathulata, basim versus emarginata lobis lateralibus acutis, ad dorsum subtricristata, crista superiore basim laminae versus in auriculum elevata, intermedia ab apice usque ad laminae basim perveniente et summo in ungue oblique finito; staminum superiorum appendix nectariferus satis longus, $\frac{2}{3}$ calcaris percurrentis, in toto levissime supra curvatus, tenuis. Capsulam non vidi.

Zentral-Asiatisches Gebiet; Provinz von Sze-chuan (Ost-Tibet): Ta tsienlu (J. A. Soulié, fl. VII, 1896, no. 2036!).

Nota. Valde affinis *C. oxypetalae*, quam primum quidem putavi; differt autem foliis quinatis, non trisectis, bracteis palmatilobatis, petalo superiore minus elegante, altius et longius cristato, calcari brevior.

¹⁾ In honorem Eugeniae Feodorownae Strobinder, Gatschinensis, scientiae amabilis studiosissimae, quam e Turkestaniam occidentali redeuntem in nave Wolgensi anno 1912 ex Caucaso evadens cognovi.