nachweisen. Eine genaue quantitative Bestimmung gelang jedoch dem Verf. auf diesem Wege nicht. Die Methode ist für eine grosse Anzahl von Substanzen anwendbar, besonders für flüchtige organische Verbindungen. Starke Säuren und Substanzen, welche Kupfersalze niederschlagen, wie Schwefelwasserstoff, verhindern die Reaktion.

Bei der Bestimmung grösserer Mengen Azetylen durch Füllen mit Kupferchlorür und nachfolgender Bestimmung des Kupfers erhält man nur dann richtige Werte, wenn man Filtrieren und Auswaschen des Niederschlages in Abwesenheit von Luft ausführt. Oswald.

Zur Bestimmung des Glycerins beschreibt W. Steinfels¹⁾ zusammenhängend die von ihm ausgearbeitete Modifikation der Hehnerschen Bichromatmethode²⁾ in ihrer heutigen Gestaltung.

Unter Hinweis auf meinen Bericht über die frühere Publikation von Steinfels³⁾ hebe ich daraus folgendes hervor.

Der Verf. bestimmt die zur Oxydation des Glycerins erforderliche Bichromatmenge durch Zurücktitrierung des Bichromatüberschusses auf jodometrischem Wege und stellt dabei seine Thiosulfatlösung nicht auf abgewogenes Jod, sondern auf die auch zur Glycerinoxidation dienende vorrätige Lösung von Kaliumbichromat in H_2SO_4 von bekanntem Gehalt.

Man verfährt dabei genau wie bei der Band 51, 515 beschriebenen eigentlichen Bestimmung, setzt aber nur statt der 25 *ccm* Seifenlösung (l. c. Z. 6 v. u.) 25 *ccm* Wasser zu. Die Thiosulfatlösung verdünnt Steinfels auf Grund der ersten Stellung so, dass 50 *ccm* genau 25 *ccm* Bichromatlösung (bzw. 1 *ccm* genau 0,0005 *g* Glycerin) entsprechen.

J. Davidsohn⁴⁾ empfiehlt, um die genaue Einstellung der Bichromatlösung auf die Thiosulfatlösung nach der Methode Steinfels zu vermeiden, 75 *g* reines Kaliumbichromat auf der Handwage abzuwägen und in 1000 *ccm* Wasser zu lösen, desgleichen 25 *g* reines Natriumthiosulfat. Der Titer der Thiosulfatlösung soll mit Jod festgestellt werden, der Titer der Bichromatlösung mit der Thiosulfatlösung. Die Bereitung beider Lösungen ist einfach, und die Berechnung braucht nur einmal vorgenommen zu werden.

Hierin kann Steinfels⁵⁾ jedoch keine Vereinfachung erblicken, sondern er hält vielmehr an seinem Vorschlage der Einstellung der Bichromatlösung auf die Thiosulfatlösung fest, da die bei dieser Arbeitsweise benötigten Operationen und Berechnungen ebenso einfach sind, wie die von Davidsohn vorgeschlagenen und gleichfalls nur einmal gemacht werden müssen.

Hinsichtlich der Vorbehandlung der auf Glycerin zu untersuchenden Substanzen erweitert Steinfels seine früher mitgeteilte Vorschrift.

¹⁾ Seifensieder Ztg. 42, 721 (1915). — ²⁾ Vergl. diese Ztschrft. 27, 518 (1888). — ³⁾ Vergl. diese Ztschrft. 51, 515 (1912). — ⁴⁾ Seifensieder Ztg. 41, 1194 (1914); durch Chem. Ztg. 39, R. 351 (1915). — ⁵⁾ Seifensieder Ztg. 42, 29 (1915); durch Chem. Ztg. 39, R. 351 (1915).

Es sind zwei Gruppen von Substanzen, relativ glyzerinarmer (Seifen, Seifenunterlaugen, Glycerinwasser von Fettsäurespaltung) und glyzerinreicher (Rohglycerin und raffiniertes Glycerin) zu unterscheiden. Bei ersteren kann die Reinigung entweder nach dem früher besprochenen Zinksulfatverfahren oder besser, wenn auch etwas umständlicher, mit Bleiazetat erfolgen. In beiden Fällen neutralisiert man oder Unterlaugen 10 *ccm* mit verdünnter Schwefelsäure oder (für Bleiazetatlösung) Essigsäure, fügt einige Tropfen Kalilauge und dann im 250 *ccm* Messkolben 25 *ccm* 10% ige Zinksulfat-, bzw. bei Glycerinwasser, so viel 10% ige Bleiazetatlösung zu, bis ein Tropfen keine weitere Fällung gibt. Bei Unterlaugen setzt man, weil der Endpunkt schwer zu erkennen ist, 20 *ccm* Bleiazetatlösung zu. Man füllt zur Marke auf und fügt bei der Anwendung von Bleiazetatlösung für je 10 *ccm* derselben noch weitere 0,15 *ccm* Wasser zu. Man schüttelt um, filtriert nach 10 Minuten durch ein trockenes Filter, verwirft die ersten trüben Anteile und pipettiert dann 25 *ccm* zur Bestimmung ab. Hat man mit Bleiazetat geklärt, so fällt man vor Zusatz der Bichromatlösung mit einigen Tropfen H_2SO_4 den Bleiüberschuss aus. Bei Seifen, die nur wenig Glycerin enthalten, löst man 25–50 *g* in möglichst wenig heissem Wasser, scheidet mit einer eben ausreichenden Menge Schwefelsäure, bzw. Essigsäure, die Fettsäuren ab, setzt Paraffin oder Zeresin zu, lässt erkalten, entfernt den Fettsäurekuchen, wäscht ihn noch mehrmals mit wenig heissem Wasser aus, macht die Lösung samt Waschwasser eben mit Kalilauge alkalisch, bringt in den 250 *ccm* Kolben, setzt das Klärungsmittel zu und verfährt weiter wie oben angegeben.

Bei den hochprozentigen Materialien ist eine tadellose Vorbehandlung unerlässlich, bei Rohglycerin kann man noch mit der Zinksulfatklärung auskommen, besser ist hier Bleiazetat. Der in der internationalen Methode¹⁾ allgemein vorgeschriebene Zusatz von Silberkarbonat kann bei Rohglycerin wie bei den glyzerinarmen Substanzen meist unterlassen werden, bei reinen Glycerinen ist er unerlässlich, weil sie infolge der hohen Destillationstemperaturen aldehydartige Zersetzungsprodukte zu enthalten pflegen. Bei Rohglycerin empfiehlt sich vor der Silberkarbonatbehandlung 25 *g*, mit 100 Wasser verdünnt, neutralisiert und mit 2 *ccm* 10% ige Kalilauge versetzt, einige Zeit am Rückflusskühler zu kochen. Nach dem Absitzen filtriert man, bringt auf 250 *ccm*, entnimmt 25 *ccm* und fügt in einem 250 *ccm* Kolben etwas Wasser, dann Silberkarbonat und nach 10 Minuten Bleiazetat in möglichst geringem Überschuss zu, worauf man wie oben verfährt.

Die Bichromatlösung muss genau bei 15° abgemessen werden. Steinfels empfiehlt deshalb, um nicht jedesmal die Vorratsflasche genau temperieren zu müssen, von Zeit zu Zeit eine Anzahl kleiner Messkölbchen von 25 *ccm* mit genau temperierter Bichromatlösung zu beschicken und verstopft bis zur Verwendung aufzubewahren. Oswald.

1) Vergl. diese Ztschrft. 51, 516 (1912).