Additions à la florule de Saint-Tropez (Var) (2^o Note)

M. Georges Hibon

To cite this article: M. Georges Hibon (1921) Additions à la florule de Saint-Tropez (Var) (2^o Note), Bulletin de la Société Botanique de France, 68:2, 153-156, DOI: [10.1080/00378941.1921.10836756](https://doi.org/10.1080/00378941.1921.10836756)

To link to this article: <http://dx.doi.org/10.1080/00378941.1921.10836756>

Published online: 08 Jul 2014.

Submit your article to this journal [↗](#)

Article views: 6

View related articles [↗](#)

SÉANCE DU 11 MARS 1921

PRÉSIDENCE DE M. BOIS, ANCIEN VICE-PRÉSIDENT.

Lecture est donnée du procès-verbal de la séance précédente, dont la rédaction est adoptée.

M. le Président a le regret d'annoncer le décès de M. Louis Anfray, attaché au Muséum d'Histoire naturelle.

Par suite de la présentation faite à la dernière séance, il proclame membre de la Société :

M. GUILLAUME (André), docteur en droit, avocat, rue de Montchapet, 3 *bis*, à Dijon, présenté par MM. Queva et Genty.

Il annonce ensuite une nouvelle présentation.

M. J. Maheu communique une liste des Lichens récoltés aux environs de Casablanca. D'accord avec l'auteur l'insertion de cette communication est réservée pour les Comptes rendus de la Session du Maroc.

Les deux Notes ci-après sont ensuite présentées par leurs auteurs :

Additions à la florule de Saint-Tropez (Var)

(2^e Note)

PAR M. GEORGES HIBON.

Dans le Bulletin de l'année 1916 (p. 207) j'ai déjà publié une première Note relative à des plantes nouvelles pour la région de Saint-Tropez ou à des stations nouvelles de plantes déjà signalées.

Depuis cette époque j'ai fait dans cette même région plusieurs

séjours qui me permettent aujourd'hui de signaler les additions suivantes :

I. PLANTES NOUVELLES.

Tetragonolobus siliquosus Roth. — Prairie saumâtre des Canoubiers.

Epilobium hirsutum L. — Environs du Cap Lardier.

Torilis Anthriscus Gmel. — Ravins ombragés aux environs de La Garde-Freinet.

Bupleurum tenuissimum L. — Bertaud, bords de la rivière.

Sison Amomum L. — Lieux ombragés humides près de la gare de La Foux.

Xanthium spinosum L. — Sables maritimes aux Canoubiers et à Pampelonne.

X. italicum Moret. — Plaine de Grimaud.

Cicendia pusilla Griesb. — Bords de la rivière de Bertaud.

Linaria striata DC. — Val Saint-Antoine près Saint-Tropez et environs de La Garde-Freinet. Cette plante se présente sous une forme très remarquable, caractérisée par ses fleurs d'un jaune pâle striées d'orangé, avec palais également orangé au lieu d'être comme dans le type, blanches ou plus ou moins lilacées et striées de violet.

Odontites serotina Reich. — Champ de courses de La Foux.

Chenopodium leptophyllum Nutt. — Bords de la route entre La Garde-Freinet et le col de Vignon.

Potamogeton fluitans Roth. — Sablière de La Foux.

Zostera nana Roth. — Forme de vastes prairies sous-marines entre Bertaud et Saint-Tropez, ainsi qu'à Granier et aux Canoubiers.

Digitaria dilatata Coste. — Prairies entre les Canoubiers et les Salins, en bas de la propriété Borelli. Cette graminée sud-américaine y est naturalisée depuis plusieurs années et paraît vouloir s'étendre ainsi qu'elle l'a fait dans la plaine d'Hyères qu'elle a envahie.

Gaudinia fragilis P. B. var. *nardoides* Albert. — Assez commun dans les terrains incultes de la zone littorale.

II. STATIONS NOUVELLES.

Sisymbrium Alliaria Scop. — Entre La Garde-Freinet et le col de Vignon.

Cistus albidus L. — Cap Lardier. C'est à ma connaissance la seule station dans les limites strictes de la presque île tropézienne.

Silene inaperta L. — Environs de La Garde-Freinet.

Anthyllis Barba-Jovis L. — Cap Lardier.

Lotus conimbricensis Willd. — Saint-Tropez, environs du Château-David.

Isnardia palustris L. — Rivière de Bertaud.

Crucianella angustifolia L. — Bois, sur vieux chemin de Ramatuelle.

Senecio Cineraria DC. — Cap Lardier.

Artemisia gallica Willd. — Le Pinet.

Inula Conyza DC. — Grimaud.

Tyrimnus leucographus Cass. — La Garde-Freinet.

Cnicus benedictus L. — Saint-Tropez à Saint-Joseph.

Carlina vulguris L. — Entre La Garde-Freinet et le Col de Vignon.

Chlora perfoliata L. — Bords du ruisseau du val Saint-Antoine.

Satureia montana L. — J'avais déjà découvert cette plante en 1916 au vieux fort de La Garde-Freinet. Je l'ai retrouvée sur le versant Sud du col de Vignon et, à une altitude beaucoup plus basse, à Grimaud, à la base du Roux.

Sideritis romana L. — Champ de courses de La Foux.

Vitex Agnus-castus L. — Très abondant le long d'un ruisseau dans la plaine de Camarat.

Polycnemum minus Jord. — Ramatuelle.

Euphorbia Chamæsyce L. — Jardins et vignes au bas de la butte du Moulin-Blanc, côté de la mer.

Euphorbia dendroides L. — Cap Lardier.

Castanea sativa Scop. — J'ai déjà signalé la présence de cet arbre, si commun dans les Maures, mais si rare dans la pres-

qu'île à cause de sa faible altitude, sur la colline de Bestagne. Je l'ai retrouvé à une altitude encore beaucoup plus basse dans une prairie non loin de La Foux, le long du chemin de fer, en allant vers Gassin, ainsi qu'au lieu dit Cavalière (région du Cap Lardier), mais je dois dire que toutes ces stations me semblent d'un indigénat très douteux.

Corylus Avellana L. — Saunier et bords des ruisseaux près de La Foux; très rare dans la région.

Tamus communis L. — Cap Camarat, La Messardière.

Crypsis aculeata Aiton. — Lieux inondés l'hiver près de la plage de Pampelonne, au milieu des Tamaris.

Erratum. Dans ma première Note j'ai signalé la présence à Cavalaire de l'*Ambrosia artemisiæfolia* L. C'est *A. tenuifolia* Spreng., qu'il faut lire.

Mosaïque et Sexualité

PAR M. L. BLARINGHEM.

Suivant l'exemple donné par Ch. Naudin (1859-63), j'ai étudié et signalé de nombreux cas d'hybrides interspécifiques qui présentent, au cours de leur vie, la disjonction des caractères des parents par plages, épurés, mais entremêlés à la façon des pièces d'une mosaïque¹. Les disjonctions sont fréquentes à certains stades de l'évolution des individus; souvent elles précèdent la différenciation des fleurs ou même des grappes florales (*Cytisus Adami*, certains hybrides d'*Hordeum*); parfois on ne la reconnaît que sur les valves des fruits (*Datura Stramonio-lævis* de Naudin); enfin les génétistes admettent la généralité de la disjonction au cours de la maturation des éléments sexuels, tant chez les animaux que chez les végétaux. Naudin (1863), puis Mendel (1865) ont édifié sur cette notion

1. *Sur l'hérédité en mosaïque.* Quatrième conférence int. de Génétique, Paris, 1911, 30 p. et 19 fig. *A propos de l'hérédité en mosaïque.* Bull. Soc. bot., 1913, LX, p. 283, et surtout *Les Problèmes de l'hérédité expérimentale*, Paris, 1919, p. 114-142.