Notiz zur Kenntniss der Purginsäure.

Von N. Kromer.

(Eingegangen den 15. VI. 1901.)

Durch Behandeln des Convolvulins mit Basen werden nach der Untersuchung von M. Hoehnel¹⁾ neben Convolvulinsäure und Methyläthylelessigsäure eine in Aether lösliche Säure gebildet, welcher Glykosidnatur zukommt und vom genannten Forscher als Purginsäure bezeichnet worden ist. Die Purginsäure liefert nach den Beobachtungen von Hoehnel bei der hydrolytischen Spaltung eine nicht krystallisierende Hexose und zwei Säuren von denen der einen flüssigen die Zusammensetzung der Decylensäure $C^{10}H^{18}O^2$, und der anderen die der Oxylaurinsäure $C^{11}H^{22}(OH)COOH$ zukommt.

Gelegentlich einer vergleichenden Untersuchung der Convolvulaceenharze²⁾ wurde von mir die in Aether lösliche amorphe Substanz, welche neben Convolvulinsäure im Destillationsrückstande bei dem Abscheiden der Methyläthylelessigsäure durch Wasserdampf verblieb und durch Barythydrat auf Convolvulin gebildet war, erhalten. Die nähere Untersuchung dieser Säure wurde damals eingestellt, weil von anderer Seite³⁾ die Untersuchung derselben in Aussicht gestellt worden war.

Die bei dem Jalapin erhaltenen Resultate liessen es wünschenswert erscheinen, die Purginsäure einer Untersuchung zu unterziehen, da mutmaßlich diese Säure nach Analogie der bisher in den Spaltungsprodukten der Convolvulaceenglykoside beobachteten, in Aether löslichen Körper zu einander in naher Beziehung stehen könnten. Diese Voraussetzung hat sich in der Folge bestätigt, indem, wie es vorausgeschickt sein möge, die Purginsäure sich als ein Gemenge einer Oxyvaleriansäure mit ihrem Esteranhydrid erwiesen hat. Zu den vorstehenden Versuchen dienten 12 g einer „Purginsäure“ die 6 Jahre lang im Stöpselglase aufbewahrt worden waren.

Nach mehrmaligem Lösen der Substanz in neutralem Aether wurde beim Verdunsten des Lösungsmittels eine sirupförmige Säure erhalten, die nach mehrmonatlichem Aufbewahren im Exsiccator kein Anzeichen einer Krystallisation erkennen liess und zähflüssig wurde. Da die Versuche die Einheitlichkeit der Substanz durch Lösen in den

¹⁾ Arch. d. Pharm. Bd. 234, H. 9, 1896.

²⁾ Zeitschrift des Oesterreichischen Apotheker-Vereins 1895, No. 18—25.

³⁾ Berichte der Schlesischen Gesellschaft für vaterländische Kultur 12, XII, 1894.

verschiedenen Lösungsmitteln darzuthun keine Aussicht auf Erfolg hatten, wurde die gesamte Menge des zur Verfügung stehenden Objektes mit Natriumkarbonat neutralisiert und auf dem Wasserbade zur Trockene verdampft. Der Rückstand mit heissem 95° Alkohol ausgezogen, schied nach dem Abdestillieren des grössten Teiles des angewandten Alkohols weisse, glänzende, blättchenförmige Krystalle einer Natriumverbindung aus, die einigemal aus absolutem Alkohol umkrystallisiert wurden.

Die bei der Krystallisation verbliebenen Mutterlauge lieferten beim Eindampfen und Behandeln des Rückstandes mit Alkohol neue Mengen des Natriumsalzes. Nicht krystallisiert hinterblieb ein amorphes gelb gefärbtes Natriumsalz, aus welchem durch Aether, nach vorherigem Ansäuern mit Schwefelsäure, die freie Säure aufgenommen wurde.

Es wurde somit die in Aether lösliche amorphe Säure in zwei Substanzen zerlegt, von denen die eine ein krystallisiertes Natriumsalz lieferte, während die andere eine amorphe Verbindung gab. Um aus dem krystallisierten Natriumsalze die freie Säure darzustellen, wurde es in wenig Wasser gelöst, mit Schwefelsäure bis zum Vorwalten derselben versetzt und mit Aether einigemal ausgeschüttelt. Der Aether hinterliess einen hellgelb gefärbten sirupförmigen Rückstand, der im Exsiccator aufbewahrt nicht krystallisierte, dabei aber dickflüssig wurde, stark sauer reagierte und nicht ohne Zersetzung flüchtig war.

Ein Teil der in Freiheit gesetzten Säure wurde zur Ueberführung in das Natriumsalz mit Natriumkarbonat gesättigt und nach dem Eindampfen der Lösung durch Umkrystallisation aus absoluten Alkohol gereinigt.

Die Natriumverbindung stellte weisse Blättchen dar, die bei 200° nicht schmolzen und zur Analyse bei 110° getrocknet wurden. Eine konzentrierte wässrige Lösung des Salzes wurde durch eine Lösung von Zinksulfat in der Kälte nicht gefällt. Beim Erhitzen trat Trübung ein, die beim Erkalten verschwand. Silbernitrat fällte weiss, der Niederschlag war in heissem Wasser löslich. Kupfersulfat rief in der Kälte keinen Niederschlag hervor, beim Kochen der Mischung schied sich ein blauer Niederschlag eines basischen Salzes aus. Mit Salzsäure gekocht trat keine Abscheidung von Kupferoxydul, als die Mischung mit Fehling'scher Lösung erhitzt wurde, auf.

0,2827 g des Natriumsalzes gaben mit Schwefelsäure abgeraucht 0,1402 g $\text{Na}_2\text{SO}_4 = 16,08\% \text{ Na}$.

0,2715 g derselben Verbindung lieferten 0,162 g H_2O und 0,3882 g CO_2
 6,68% H — 42,68% C.

In Prozenten:

Gefunden:	Berechnet für $C^5H^{10}NaO^8$:
C = 42,68	42,86
H = 6,68	6,43
Na = 16,08	16,43.

Die im Exsiccator aufbewahrte freie Säure, welche dickflüssig war, wurde zur Ermittlung etwa gebildeten Esteranhydrides in alkoholischer Lösung mit Natronlauge zuerst in der Kälte, darauf in der Siedehitze titriert.

0,3274 g der Substanz erforderte zur Neutralisation der Säuerung 6,7 ccm NaOH; nach dem Kochen der Mischung mit überschüssiger Natronlauge wurden 0,4 ccm derselben Lauge gebunden.

Demnach waren, falls die Anwesenheit des primären Esteranhydrids $C^{10}H^{18}O^5$ der Berechnung zu Grunde gelegt wird, 5,9 ccm NaOH zur Neutralisation vorhandener Oxyvaleriansäure $C^5H^{10}O^8$ verbraucht worden. Da 1 ccm Natronhydrat = 0,015717 g NaOH enthalten, so kommen diese 0,046365 g $C^5H^{10}O^8$ und 0,085657 g $C^{10}H^{18}O^5$ gleich.

Mithin enthielt die obengenannte Substanzmenge 0,273535535 g $C^5H^{10}O^8$ = 83,55 % freie Säure und 0,0842628 g $C^{10}H^{18}O^5$ = 10,46 % Esteranhydrid.

Den gefundenen Daten nach konnte vorausgesetzt werden, dass die ein amorphes Natriumsalz liefernde Säure das Esteranhydrid vorstehender Oxyvaleriansäure sei. Demgemäß wurden die Rückstände von der Krystallisation des Natronsalzes, aus denen die freie Säure durch Aether nach dem Zerlegen mit verdünnter Schwefelsäure ausgeschüttelt und der Aether abgedampft war, mit überschüssiger Natronlauge in alkoholischer Lösung 1 Stunde lang auf dem Drahtnetze am Rückflusskühler gekocht und der beim Eindampfen erhaltene Rückstand mit Alkohol behandelt. Der auf ein kleines Volumen verdampfte Alkohol schied jetzt ein krystallisiertes Natriumsalz aus, das aus Alkohol umkrystallisiert und bei 100° getrocknet, nach dem Abrauchen mit Schwefelsäure 16,21 % Na hinterliess und alle Eigenschaften, wie Löslichkeit und Verhalten zu Metallsalzen des vorher beschriebenen Natriumsalzes aufwies. Hier sei erwähnt, dass ein Versuch, die Säure von den Nebenprodukten durch Ueberführung in die Baryumsalze zu trennen, von keinem Erfolge begleitet war. Dieser wurde in der Weise angestellt, dass die aus dem amorphen Natriumsalze freigemachte und durch Aether aufgenommene Säure mit Baryumkarbonat in der Siedehitze gesättigt wurde. Beim Eindampfen hinterblieb ein amorphes Baryumsalz, das bei längerem Aufbewahren nicht krystallisierte. Mit Fehling'scher Lösung, nach vorherigem Erhitzen mit Salzsäure gekocht, konnte keine Abscheidung von Kupferoxydul beobachtet werden. Zur

Ueberführung der Oxyssäure in die entsprechende ungesättigte Verbindung wurden 4 g der Natriumverbindung mit rauchender Jodwasserstoffsäure vom Siedepunkte 127—130° im Einschlussrohre 6 Stunden lang auf 130° erhitzt. Die Mischung wurde von freiem Jod und überschüssiger Jodwasserstoffsäure durch gefälltes metallisches Silber befreit und das Gemenge, nach dem Ansäuern mit verdünnter Schwefelsäure, mit Wasserdämpfen solange destilliert, bis das Destillat keine saure Reaktion mehr aufwies. Nach dem Neutralisieren des Destillates mit Natriumkarbonat, Eindampfen und Ausziehen der Rückstände mit Alkohol wurde das Lösungsmittel verdampft, aus den verbliebenen Natriumsalzen die Säure durch verdünnte Schwefelsäure in Freiheit gesetzt und mit Aether aufgenommen. Nach dem Verdunsten des Aethers hinterblieb eine hellgelb gefärbte, stark sauer reagierende, minzartig riechende Flüssigkeit, die beim Aufbewahren im Exsiccator zu tafelförmigen Krystallen erstarrte. Dieselben waren flüchtig und krystallisierten aus einer gesättigten Lösung in heissem Wasser in Nadeln. Die Krystalle schmolzen bei 63—64° und erstarrten bei 61,5—61°. Das Silbersalz durch Doppelzersetzung dargestellt, war ziemlich lichtbeständig und gab im Exsiccator getrocknet folgendes Resultat:

0,121 g der Ag-Verbindung hinterliessen 0,063 g Ag = 52,06 %.	
Gefunden:	Berechnet für $C^8H^7AgO^3$:
Ag = 52,06 %	52,17 %.

Diesen Daten nach ist die Anwesenheit der Tiglinsäure unter den Reduktionsprodukten der in Aether löslichen Säure dargethan und diese ist als α -Methyl- β -Oxybuttersäure anzusehen.

Die Purginsäure Hoehnels wäre demnach als ein Gemenge, welches der Hauptsache nach aus α -Methyl- β -Oxybuttersäure — $CH^8 \cdot CH(OH)CH \cdot (CH^8)COOH$ — gemengt mit dessen Anhydrid besteht, aufzufassen.

Ob diese Säure als primäres oder sekundäres Spaltungsprodukt des Convolvulins entsteht, möge zur Zeit dahingestellt sein. Ich neige eher zur Ansicht hin, dieselbe als sekundäres Produkt, das durch die Einwirkung von überschüssigem Barythydrat auf den d-Methyläthyl-essigsäurerest¹⁾ entstanden ist, aufzufassen.

¹⁾ Marckwald, Ber. d. d. chem. Ges. Bd. 32, pag. 1089, Jahrg. 1899; Taverne, Recueil des travaux chimiques des Pays Bas Bd. 19, pag. 107; auch Votoček über Rhodeose, Böhm. Ztschr. f. Zuckerindustrie 1901, 25, pag. 297.