Aus den chirurgischen Kliniken Heidelberg und Zürich.

Über Spätrachitis und Osteomalacie. Klinische, röntgenologische und pathologisch- anatomische Untersuchungen.

Von Privatdozent Dr. E. Looser,
Leiter der chirurg. Universitätspoliklinik Zürich.

(Mit 44 Abbildungen im Text und 87 Abbildungen auf 31 Tafeln.)

Trotzdem die Lehre von der Rachitis und Osteomalacie in den letzten Jahren mehrfach Gegenstand eingehender Bearbeitung und Diskussion gewesen ist, die unsere Kenntnis über diese Krankheiten, namentlich in pathologisch-anatomischer Beziehung wesentlich gefördert haben, bedürfen doch noch eine Reihe diese Krankheiten betreffende Fragen der weiteren Klärung. Im Vordergrund des Interesses stand von alters her die Frage der engeren Beziehungen zwischen Rachitis und Osteomalacie, die Frage, ob es sich dabei um verwandte oder gar identische oder um gegensätzliche Affektionen handle, welche Frage ich in meiner Arbeit: „Über Spätrachitis und die Beziehungen zwischen Rachitis und Osteomalacie“¹⁾ eingehend besprochen habe. Nachdem Schmorl³⁾ und ich 1905²⁾ die in Pommers⁴⁾ grundlegendem Werke von 1885 festgestellte anatomische Identität des rachitischen und osteomalacischen Prozesses vertreten haben, haben

1) Looser, Über Spätrachitis und die Beziehungen zwischen Rachitis und Osteomalacie. Mitteilungen aus den Grenzgebieten der Medizin und Chirurgie 1908, Bd. 18.

2) Looser, Über Spätrachitis. Verhandlungen der Deutschen Pathologischen Gesellschaft 1905, 9. Tagung.

3) Schmorl, Über Rachitis tarda. Deutsches Arch. f. klin. Med. 1905, Bd. 85.

4) Pommer, Untersuchungen über Osteomalacie und Rachitis, Leipzig 1885.

auch die früheren Gegner dieser Lehre die anatomische Identität der beiden Prozesse anerkannt, so M. B. Schmidt¹⁾ in seinem Referat von 1909, Ribbert in der Diskussion dazu und v. Recklinghausen²⁾ 1910 in seinem großen Werk über Rachitis und Osteomalacie. Auch Stöltzner³⁾ hat sich in seinem klinischen Referat 1909 unumwunden zu dieser Auffassung bekannt.

Während also die pathologisch-anatomische Identität der beiden Affektionen von allen Untersuchern, die sich mit der Frage der Rachitis und Osteomalacie eingehend beschäftigt haben, übereinstimmend festgestellt ist, sind die Kliniker noch weit davon entfernt, eine Identität, oder auch nur eine Verwandtschaft der beiden Affektionen anzunehmen. Pathologische Anatomie und klinische Forschung haben also noch nicht vermocht, ihre Erfahrungen über diese beiden Affektionen zu einer einheitlichen und befriedigenden Auffassung zu vereinigen.

Die Gründe, die mich bewogen, Rachitis und Osteomalacie nicht nur pathologisch-anatomisch, sondern überhaupt als identisch zu erklären, waren nicht nur die vollkommene histologische Übereinstimmung der beiden Prozesse, die nur sekundäre, durch das Alter der befallenen Individuen bedingte Unterschiede aufweisen, sondern auch der von mir geführte Nachweis, daß im Adoleszentenalter eine Erkrankung vorkommt, die bezüglich der histologischen Veränderungen am Knochen, wie auch an den Epiphysenknorpeln als echte Rachitis angesprochen werden muß und die in ihren klinischen und histologischen Eigentümlichkeiten unmerklich und allmählich zum Bilde der Osteomalacie der Erwachsenen hinüberleitet. Es war also hier das Bindeglied der scheinbar so weit voneinander abliegenden Krankheitsformen gefunden. Ich hatte auch den Nachweis geführt, daß alles, was bisher als juvenile Osteomalacie beschrieben worden ist, in diese Gruppe der Spätrachitis gehört, bei welcher die leichteren Fälle sich mehr dem klinischen Bilde der Rachitis, die schwereren

1) M. B. Schmidt, Referat und

2) v. Recklinghausen, Untersuchungen über Rachitis und Osteomalacie. Jena 1910 (Gustav Fischer).

3) Stöltzner, Korreferat über Rachitis und Osteomalacie. Verhandlungen der Deutschen Pathologischen Gesellschaft 1909, 13. Tagung, Diskussion.

mehr demjenigen der Osteomalacie nähern, daß darin ganz fließende Übergänge bestehen und daß das gemeinsame anatomische Merkmal der ganzen Gruppe ist: Das Kalklosbleiben des neugebildeten Knochens, die Atrophie der Knochen und die charakteristische rachitische Knorpelstörung, die in keinem Falle zu vermissen ist.

Aus der bisherigen Literatur über die Spätrachitis läßt sich nicht ermesen, welche Rolle die Spätrachitis bezüglich der Häufigkeit ihres Auftretens im Gesamtbild der Rachitis einnimmt. Mikulicz hat zwar in seiner bekannten Arbeit über die seitlichen Verkrümmungen am Knie die Ansicht ausgesprochen und zu beweisen versucht, daß die Deformitäten des Adoleszentenalters, die ja keineswegs selten sind, rachitischen Ursprungs sind. So einleuchtend auch seine Darlegungen sind, so blieb seine Beweisführung doch eine lückenhafte, da die anatomische Ausbeute in seinen Fällen eine sehr geringe war. Er fand wohl in seinen untersuchten Fällen Unregelmäßigkeiten und Verbreiterungen der Epiphysenknorpel, bedeutendere jedoch nur in einem Falle. Genauere mikroskopische Untersuchungen des Knochens wurden nicht ausgeführt. Die Mitteilungen über einwandfreie, als Spätrachitis deutlich gekennzeichnete Fälle sind noch nicht allzu zahlreich und betreffen meist nur einen, seltener zwei von einem Autor beobachtete Fälle. Man könnte aus dieser Tatsache auf die Seltenheit der Affektion schließen. Wieland weist am Schlusse seines Sammelreferates vom Jahre 1914 auf die Spärlichkeit der bisherigen Mitteilungen hin und bemerkt, daß es möglich, sogar wahrscheinlich sei, daß bei intensiver Aufmerksamkeit in Zukunft immer mehr derartige Fälle bekannt und beschrieben werden, „sehr reichhaltig dürfte die Ausbeute aber kaum sein“.

Es ist mir in einem relativ kurzen Zeitabschnitt (1909—1911 und 1917—1918) gelungen, eine größere Anzahl von Spätrachitisfällen zu sammeln, die beweisen, daß diese Affektion keineswegs selten ist. Diese Fälle scheinen mir sehr geeignet, die Frage der Spätrachitis, namentlich vom röntgenologischen Standpunkt aus zu beleuchten. 4 von diesen Fällen (Fall 6, 8, 10, 11) konnten an Keilexcisionen, die bei korrigierenden Operationen der Extremitäten gewonnen wurden, auch anatomisch untersucht werden.

Daß ich in den Kreis der Betrachtung auch Osteomalaciefälle gezogen habe, hat sich im Laufe der Untersuchung als notwendig gezeigt, da über das röntgenologische Verhalten der osteomalacischen Knochen fast nichts bekannt ist und es mir notwendig schien, auch das röntgenologische Verhalten der Knochen bei der Osteomalacie mit demjenigen bei der Rachitis und der Spätrachitis zu vergleichen. Da die röntgenologische Untersuchung in jedem Falle möglich ist und, außer sehr lehrreichen Strukturbildern, eine gute Übersicht über den Grad und die Ausbreitung des krankhaften Prozesses im Skelett gibt, eignet sich gerade die Röntgenuntersuchung in besonderer Weise zum Vergleich entsprechender Krankheitsstadien der einzelnen Krankheitsgruppen. Die anatomische Untersuchung, die natürlich weit vollständigeren Aufschluß über die Natur der Knochenveränderungen gibt als die Röntgenuntersuchung, ist immer nur in einzelnen Fällen möglich und, wie in den hier untersuchten Fällen, oft nur an kleineren Knochenstücken. Gerade in diesen Fällen sind die anatomische und die Röntgen-Untersuchung sehr geeignet, sich gegenseitig zu ergänzen.

Die im folgenden beschriebenen 23 Fälle, von welchen 15 auf die Spätrachitis, 2 auf Übergangsfälle, 6 auf die Osteomalacie entfallen, habe ich alle selber untersucht. Sie entstammen verschiedenen Anstalten, der chirurgischen Klinik Heidelberg (Dir. Geh. Rat Prof. Dr. Narath, Prof. Dr. Wilms): Fall 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, der medizinischen Klinik Heidelberg (Dir.: Geh. Rat Prof. Dr. Krehl): Fall 7, der schweizerischen orthopädischen Anstalt (Balgrist) in Zürich (Dir.: Priv.-Doz. Dr. Hössli): Fall 15, 16, 19, 21, der medizinischen Klinik Zürich (Dir.: Prof. Dr. Eichhorst): Fall 23, der chirurgischen Poliklinik Zürich (Dir.: Prof. Dr. Sauerbruch): Fall 1, 2, 3, 12, 17, 18, 20, 22. Ich bin den Direktoren dieser Anstalten für ihr freundliches Entgegenkommen beim Sammeln und Untersuchen des mich interessierenden Materials zu großem Dank verpflichtet. Als Fall 14 ist der früher von mir beschriebene Fall von Spätrachitis kurz angeführt, da seine anatomischen Befunde die in dieser Arbeit gewonnenen Befunde bestens ergänzen und da er selbst in einigen Punkten, die früher noch nicht geklärt waren,

durch die neuen Untersuchungsergebnisse eine vollständige Erklärung findet.

Bevor ich zu der Mitteilung der Krankengeschichten der untersuchten Fälle übergehe, scheint es mir notwendig, zunächst den pathologisch-anatomischen Vorgang bei der Rachitis und Osteomalacie zu besprechen, da eine richtige Beurteilung der zahlreichen Röntgenbilder nur auf Grund einer genauen Kenntnis des pathologisch-anatomischen Bildes und des pathologisch-anatomischen Vorganges möglich ist. Das pathologisch-anatomische Bild der Rachitis und Osteomalacie ist in seiner Kompliziertheit und Vielgestaltigkeit durch zahlreiche Beschreibungen hinlänglich bekannt und der morphologischen Detailbeschreibung ist wohl kaum mehr viel Neues hinzuzufügen. S c h m o r l¹⁾ hat deshalb in seinem Sammelreferat über die Rachitis die Meinung ausgesprochen, daß von der pathologischen Anatomie keine weitere Aufklärung über das Wesen und die Ursache der Rachitis mehr zu erwarten sei, daß vielmehr nur noch experimentelle und physiologisch-chemische Untersuchungen weitere Fortschritte bringen dürften. Ich kann mich dieser Ansicht nicht anschließen und halte die pathologisch-anatomische Erforschung des rachitisch-osteomalacischen Knochenprozesses mit S c h m o r l s sehr guter, vorwiegend morphologischer Darstellung noch nicht für abgeschlossen, denn das morphologische Bild ist erst der Schlüssel zur Erkenntnis des pathologischen Vorganges, dessen Klarlegung letzten Endes doch das Ziel der pathologisch-anatomischen Forschung sein muß.

Der pathologische Vorgang der rachitisch-osteomalacischen Knochenerkrankung ist aber m. E. noch nicht genügend klargelegt. Bei keinem Organe scheint es mir so notwendig, wie beim Knochen, die pathologischen Veränderungen nicht nur als morphologisches Bild, sondern in ihrer Entstehung und fortschreitenden Veränderung, also von physiologischen Gesichtspunkten aus zu studieren, da wir es beim Knochen, im Gegensatz zu den meisten anderen Organen, um ein schon unter normalen Verhältnissen sehr wandlungsfähiges und veränderliches Gewebe zu

1) S c h m o r l, Die pathologische Anatomie der rachitischen Knochenerkrankung. Beitr. d. inn. Med. u. Kinderheilkunde 1909, Bd. 4.

tun haben, dessen pathologische Veränderungen zudem durch äußere mechanische Einflüsse in hohem Grade beeinflusst und modifiziert werden. Die einfache morphologische Beschreibung ist daher nicht imstande, diesem in stetem Flusse befindlichen Prozeß gerecht zu werden, wir können diesen Vorgang zweckmäßig nur als Vorgang schildern. Nur dadurch werden uns die sehr vielgestaltigen Bilder und ihr bunter Wechsel verständlich, nur dadurch wird es möglich, das Prinzipielle und Wichtige vom Zufälligen und Unwichtigen der morphologischen Erscheinungen zu unterscheiden. Es muß sich also darum handeln, die einzelnen morphologischen Veränderungen in ihrer physiologischen Bedeutung zu erfassen, ihre gegenseitige Bedingtheit und Abhängigkeit und ihre Abhängigkeit von der Krankheitsursache und von zufälligen äußeren Faktoren klarzulegen. Wir müssen uns bestreben, die pathologische Physiologie des Krankheitsprozesses zu ergründen.

Ich möchte im folgenden den rachitisch-osteomalacischen Prozeß nach diesen Gesichtspunkten besprechen, wobei eine kurze historische Darlegung die Punkte, die mir die maßgebenden scheinen, noch besonders deutlich machen wird.

Die Auffassung der Pathogenese der rachitischen und osteomalacischen Knochenveränderungen hat vielfache Wandlungen durchgemacht. Überblicken wir die sehr große, darauf bezügliche Literatur, so treten uns einige wenige Arbeiten als die Marksteine der Entwicklung entgegen. Es sind diejenigen, die unser Verständnis der rachitischen und osteomalacischen Knochenstörung gefördert haben auf Grund einer Bereicherung und Vertiefung unserer Kenntnisse der normalen und pathologischen Physiologie des Knochens.

Vor Virchow waren die Vorstellungen von der Entstehung der rachitischen und osteomalacischen Knochenveränderungen noch grob mechanische. Man stellte sich den Knochen jeglichen Alters als ein festes, unter normalen Verhältnissen in seinem feineren Gefüge unveränderliches Gebilde vor und glaubte seine Veränderungen bei der Rachitis und Osteomalacie nur durch einen Entkalkungs- und Erweichungsprozeß erklären zu können. Die meisten der alten Autoren sahen Rachitis und Osteomalacie trotzdem für verschiedene Affektionen an, namentlich wegen des

sehr verschiedenen Lebensalters, in dem diese Affektionen beobachtet werden; es ist aber bemerkenswert, daß die französischen Kliniker Trousseau und Lasègue 1850 schon mit bewundernswerter Klarheit die Identität der beiden Affektionen aussprachen: die akute Rachitis der Kinder sei in ihren Erscheinungen von der Osteomalacie der Erwachsenen verschieden, aber eben deshalb, weil die Knochen des Kindes sich noch in der Entwicklung befänden, während dieselben beim Erwachsenen bereits ausgebildet seien. Je mehr aber der von Rachitis befallene Kranke sich vermöge seines Alters den Verhältnissen näherte, in welchen sich die Erwachsenen befinden, desto mehr Ähnlichkeit hätten die pathologischen Veränderungen, denen er unterworfen ist, mit denjenigen der Osteomalacie.

Von den pathologischen Anatomen war es Virchow, der die Rachitis- und Osteomalacielehre auf eine physiologische Basis stellte. Indem er die feinere Mechanik der physiologischen Wachstumsvorgänge am kindlichen Knochen in Berücksichtigung zog, die sich aus seiner Erkenntnis der zellularen Natur der physiologischen und pathologischen Vorgänge im Körper ergab, erkannte er in dem kalklosen Knochengewebe bei der Rachitis nicht entkalktes Knochengewebe, sondern das beim Knochenwachstum neugebildete Knochengewebe, das infolge des Krankheitsprozesses unverkalkt bleibt. Für den kalklosen Knochen am ausgewachsenen, fertigen Knochen, für die Osteomalacie, mußte er aber nach wie vor einen Entkalkungsprozeß annehmen. Damit ergab sich für ihn die prinzipielle Verschiedenheit von Rachitis und Osteomalacie, welche Auffassung bis heute die vorherrschende geblieben ist.

Wir verdanken Pommer einen Hauptfortschritt im physiologischen Verständnis der Rachitis und Osteomalacie. Er stellte durch anatomische Untersuchungen zwei Tatsachen fest, die wir heute als die zwei Fundamentalsätze der normalen und pathologischen Physiologie des Knochens ansehen müssen und die für die folgende Entwicklung der Rachitislehre von grundlegender Bedeutung sind. Der erste Satz heißt: Apposition und Resorption dauern das ganze Leben hindurch am Knochen fort, sie bedingen auch beim Erwachsenen einen langsamen, aber ständigen Umbau des Knochens. Diese erste, von Pommer festgestellte Tat-

sache, die von den Anatomen schon längst gewürdigt und anerkannt ist, von den Pathologen aber erst in neuerer Zeit Beachtung gefunden hat, wird uns ohne weiteres verständlich, wenn wir bedenken, daß, entgegen einer oberflächlichen Betrachtung, der Knochen auch beim Erwachsenen das labilste, wandlungsfähigste und regenerationsfähigste aller Körpergewebe ist. Es sei nur daran erinnert, daß die Knochen nach Veränderung ihrer statischen Verhältnisse, z. B. Femur und Tibia nach einer Knierektion, in ihrer Architektur vollkommen umgebaut werden, ferner daran, daß ganze Knochen nach Abstoßung durch Nekrose wieder ersetzt werden können, oder daran, daß der Knochen das einzige Körpergewebe ist, das sich nach Verletzungen vollständig und ohne Narbenbildung wieder herstellt. Dies alles ist nicht denkbar ohne das Vorhandensein von Appositions- und Resorptionsvorgängen auch beim erwachsenen Knochen.

Der zweite, von Pommer festgestellte Fundamentalsatz heißt: Das Wesen der einfachen Knochenatrophie besteht nicht in einer vermehrten Resorption des Knochens, sondern in einer Verminderung, einer Hemmung der physiologischen Apposition, bei fortdauernder physiologischer Resorption. Zur Illustration dieses Satzes sei nur ein praktisches Beispiel angeführt: die senile Knochenatrophie. Wir finden bei dieser, trotz des Knochenschwundes, anatomisch keine Zeichen vermehrter lakunärer Resorption, was die mit Pommers Arbeiten nicht vertrauten Untersucher immer wieder überrascht und in Erklärungsverlegenheiten gebracht hat. Der zweite Pommersche Grundsatz gibt uns eine ungezwungene Erklärung dieses Verhaltens, ja erst durch ihn wird uns die senile Osteoporose allgemein und in ihrem histologischen Bilde verständlich; sie ist nichts als eine Teilerscheinung der allgemeinen Senilität, bei der ja alle aktiven Lebensprozesse langsam erlahmen: Die im Alter erlahmende physiologische Apposition gleicht die Tätigkeit der physiologischen Resorption nicht mehr aus, wodurch der Knochen der Atrophie verfällt.

Die Anwendung dieser zwei Fundamentalsätze auf die Rachitis und Osteomalacie machten es für Pommer nicht mehr notwendig, für die kalklosen Säume und den Schwund des Knochens

bei der Osteomalacie einen Entkalkungs- und Abschmelzungsprozeß anzunehmen, sondern für ihn erschien die Osteomalacie anatomisch identisch mit der Rachitis, als ein Prozeß, bei dem der durch die physiologische Apposition neugebildete Knochen kalklos bleibt. Die bei der Osteomalacie zu beobachtende Atrophie des Knochens erklärte P o m m e r aus sekundären Momenten, wie Inaktivität, allgemeine Ernährungsstörungen usw. Auch die Knorpelveränderungen bei der Rachitis führte P o m m e r auf das Ausbleiben der Knorpelverkalkung und auf mechanisch irritative Momente durch die Belastung der weichen Epiphysengegenden zurück. P o m m e r s Auffassung, die auch S c h m o r l in allen wesentlichen Punkten vertritt, ist aber noch nicht imstande, die Erscheinungen der Rachitis und Osteomalacie in befriedigender Weise zu erklären, so sehr sie auch alle früheren Auffassungen an Stichhaltigkeit übertrifft.

Ich war bei meinen eigenen Untersuchungen bei der jugendlichen Rachitis, der Rachitis des Adoleszentenalters und der Osteomalacie bestrebt, dem pathologisch-physiologischen Geschehen am Knochen noch weiter nachzugehen.

Betrachten wir den rachitischen und osteomalacischen Knochen genauer auf seine Struktur und Entstehung, so erkennen wir, daß in demselben zwei histologisch und genetisch verschiedene Knochenarten vorkommen, der lamellöse und der geflechtartige Knochen. Der lamellöse Knochen baut im postembryonalen Leben den ganzen Knochen in seiner Corticalis und Spongiosa auf (mit Ausnahme bestimmter, ganz beschränkter Stellen, wie Sehnenansätze usw.); er wird durch epithelartige Osteoblasten abgelagert und zeigt eine sehr regelmäßige feinere Struktur, indem die ihn aufbauenden Knochenfibrillen schichtweise zueinander senkrechten Verlauf nehmen. Der geflechtartige Knochen kommt im postembryonalen Leben in größerer Menge nur unter pathologischen Verhältnissen vor; er entsteht in fibrillärem Bindegewebe im Periost und im Knochenmark und unterscheidet sich vom lamellösen dadurch, daß seine Fibrillen sich regellos durcheinander verfilzen. Wir treffen ihn bei allen möglichen Knochenerkrankungen und namentlich in sehr typischer Weise im Callus an. Bei der Rachitis bildet der geflechtartige

Knochen die mehr oder weniger mächtigen Lager periostaler Auflagerungen und die Markosteophyten, die namentlich in der Gegend der verdickten und oft verbogenen Epiphysengegenden der langen Röhrenknochen den Markraum ausfüllen. Bei der Osteomalacie dagegen kommt der geflechtartige Knochen nur in relativ spärlicher Menge vor und ist hier beschränkt auf die Stellen starker mechanischer Deformierungen, wie an den verbogenen Schenkelhälsen oder den stark komprimierten Wirbeln bei schwerer Osteomalacie.

Die Untersuchung gewisser, langsam, aber unverkennbar traumatisch entstandener Biegungsstellen des Knochens bei der Rachitis und Osteomalacie ließ mich erkennen, daß der lamellöse und der geflechtartige Knochen sich physiologisch sehr verschieden verhalten. An diesen Stellen zeigte sich nämlich¹⁾, daß im Bereiche der Biegungsstelle der alte, lamellöse Knochen auf eine gewisse Strecke durch lokal vermehrte lakunäre Resorption verschwindet, während gleichzeitig an diesen Stellen geflechtartiger Knochen neu gebildet wird. Während also hier der mechanische Reiz den alten Knochen zum Verschwinden bringt, bildet er gleichzeitig den Anreiz zur Bildung des geflechtartigen Knochens. Es handelt sich an diesen Stellen um einen lokalen Umbau des Knochens, um eine Art von langsamer, schleichender Callusbildung ohne eigentliche Fraktur. Daß der alte Knochen an diesen Biegungsstellen durch den mechanischen Insult verschwindet, kann vielleicht damit erklärt werden, daß der lamellöse Knochen erfahrungsgemäß auf lange dauernde mechanische Insulte sehr empfindlich ist. Wir wissen ja, daß der Knochen dem dauernden Druck von Aneurysmen oder dem Druck von Tumoren viel weniger standhält, als irgendein anderes Körpergewebe und an den Druckstellen abgebaut wird. Wir können uns demnach vorstellen, daß an den erwähnten Biegungsstellen der mechanische Druck und die fortgesetzte mechanische Irritation einer lokalen Verbiegung oder Infraktion den alten Knochen, wie bei einer Usur, langsam zum Schwund bringt, daß hier aber gleichzeitig eine Art von schleichender Callusbildung einsetzt, die die Stelle mechanisch zusammenhält.

1) L o o s e r, l. c., S. 724—26.

Fig. 1.

Vorderarm eines 5jährigen schwer rachitischen Knaben. Leichte Knickung der Ulna, die langsam und ohne nachweisbares Trauma entstanden ist und keine nennenswerten klinischen Erscheinungen gemacht hat. Die Ulna zeigt auf dem Röntgenbild eine scheinbare Unterbrechung der Kontinuität, die bei der klinischen Untersuchung aber nicht vorhanden ist (Umbauzone).

Fig. 2.

Fig. 2—6 Knochen von einem 5 monatlichen schwer rachitischen Knaben.¹⁾ Das Femur zeigt in seiner Mitte eine ziemlich scharfe Biegung (alte Infraktion?). Die Corticalis ist im Bereiche der Biegung auf eine Strecke von $1-1\frac{1}{2}$ cm vollständig verschwunden. Die Biegungsstelle nimmt ein stellenweise schattengebender Callus ein.

¹⁾ Ich verdanke dieses Material der Liebenswürdigkeit von Herrn Prof. Dr. J. Ibrahim, jetzt Direktor der Kinderklinik in Jena.

Fig. 3.

Der Radius zeigt im oberen Drittel eine leichte Knickung. Dort, wo die Corticalis geknickt erscheint, ist sie auf eine Strecke weit unterbrochen, wie unvollständig ausradiert. Diese Stellen zeigen mikroskopisch den im Text erwähnten Umbau.

Fig. 4.

Die abnorm stark gebogene Clavicula zeigt an der stärksten Biegungsstelle, sowie auf der konkaven Seite ihres acromialen Endes einen Schwund der Corticalis. Auch hier ließ sich mikroskopisch der Umbau nachweisen.

Fig. 5a.

Fig. 5b.

An der geknickten Rippe a ist die bei der nicht geknickten Rippe b noch vorhandene alte Struktur vollständig verschwunden und durch einen ganz diffusen Schatten ersetzt.

Ich möchte diese anatomisch wie auch röntgenologisch bei schwerer Rachitis und Osteomalacie häufig nachzuweisenden Stellen, dem anatomischen Vorgang entsprechend, als *Umbauzonen* bezeichnen (s. Fig. 1—6).

Betrachten wir die topographische Verteilung des geflechtartigen Knochens bei der Rachitis auf Längsschnitten durch den Knochen, so erkennen wir, daß zwischen der Callusbildung ausgesprochener Frakturen und den periostalen und myelogenen Osteophyten, die beide aus geflechtartigem Knochen bestehen, topographisch keine Grenze zu ziehen ist (s. Fig. 7—12). Callus und Osteophyten sind auch morphologisch und in ihren Ent-

Fig. 6.

„Geheilte Infraktion einer osteomalacischen Rippe“ aus Ziegler, Pathologisch Anatomie 9. Aufl. 1898. Die im Bilde deutlich erkennbare, z. Tl. kalkhaltigen Rippenfragmente werden durch den „osteoiden Callus“ von einander getrennt. Im Bereiche des Callus ist die Corticalis vollständig verschwunden und durch kalklosen (geflechtartigen) Knochen ersetzt.

stehungs- und Wachstumsbedingungen einander gleich, sie sind beide von mechanischen Reizwirkungen in hohem Maße abhängig und entstehen auf der konkaven Seite des Knochens in stärkerem Maß als auf der konvexen; beide bilden sich im jugendlichen Knochen besonders leicht und besonders reichlich und sind sich auch in ihrem weiteren Schicksal gleich, indem sie beide, wenn die mechanischen Reizwirkungen zur Ruhe kommen, allmählich durch lamellosen Knochen ersetzt werden. Ich glaube nicht fehl-

zugehen, wenn ich nach diesen Beobachtungen die Osteophytenbildung bei der Rachitis und Osteomalacie als einen reparatorischen Vorgang, als eine Art von Callusbildung betrachte, die überall dort zustande kommt, wo der alte lamellöse Knochen infolge der rachitischen

Fig. 7.

Femur, 4jähr. Knabe.

Fig. 8.

Femur, 4jähr. Knabe.

Fig. 9.

Humerus, 3 $\frac{1}{6}$ jähr.
Mädchen.

Fig. 7—12 stellen Beispiele der Verteilung der geflechtartigen Knochensubstanz (schräg schraffiert) im rachitischen Knochen dar. Schematisiert nach v. Recklinghausen. Die alte, lamellöse Corticalis und die lamellosen spongiösen Bälkchen sind hochgradig atrophisch. Die geflechtartige Knochensubstanz, die vielfach eine effektive Verdickung des Knochens erzeugt, ist im Periost namentlich auf der konkaven Seite der Verbiegungen der Knochen entwickelt. Wo eine Fraktur besteht, ist eine Abgrenzung zwischen periostalem Callus und Osteophyten nicht möglich. Im Mark ist die geflechtartige Knochensubstanz namentlich in der Gegend der abgebogenen Diaphysenenden entwickelt und an den Stellen von Infraktionen und Frakturen (myelogener Callus).

Erkrankung widerstandsunfähig, biegsam und brüchig wird und beginnt, der Belastung nachzugeben, ohne daß dabei gröbere Frakturen oder Infraktionen vorhanden zu sein brauchen. Für diese Auffassung scheint mir auch die von v. Recklinghausen gemachte Beobachtung zu sprechen, daß die Osteophytenbildung in ihrem höheren Grade erst bei Kindern auftritt, die gehen, d. h. die ihre Knochen einer Belastung aussetzen.

Fig. 10.

Humerus, 4½jähriges
Mädchen.

Fig. 11.

Humerus, 2jähriges
Mädchen.

Fig. 12.

Femur, 2jähriges
Mädchen.

Die bei der Betrachtung des lamellösen und geflechtartigen Knochens bei der Rachitis und Osteomalacie gemachten Beobachtungen und die daraus sich ergebende Erkenntnis der verschiedenen physiologischen Bedeutung des lamellösen und des geflechtartigen Knochens führen notwendig zu der Auffassung, daß die eigentliche rachitische und osteomalacische Knochenveränderung die Veränderung am lamellösen Knochen ist, während es sich bei der Bildung des geflechtartigen Knochens um einen reparatorischen Prozeß handelt

und es ergibt sich von selbst die Notwendigkeit, bei der Vergleichung von Rachitis und Osteomalacie nicht, wie es bisher getan wurde, von „Knochen“ gemeinhin zu sprechen, sondern die beiden Knochenarten, den lamellösen und den geflechtartigen, als gesonderte Teile für sich zu vergleichen. Vergleichen wir Rachitis und Osteomalacie nach diesen Gesichtspunkten, so erkennen wir, daß sie einander vollkommen gleich sind in bezug auf die Veränderungen am alten, lamellösen Knochen, welche bestehen in dem Auftreten von kalklosen (lamellos gebauten!) Säumen an demselben und in einer ausgesprochenen Atrophie desselben, und daß Unterschiede nur bestehen in bezug auf die Menge und Verteilung des geflechtartigen Knochens, der bei der jugendlichen Rachitis sehr reichlich auftritt und die Atrophie des alten, lamellösen Knochens zu verdecken geeignet ist, während bei der Osteomalacie der geflechtartige Knochen viel spärlicher, und zwar nur an den Stellen stärkerer mechanischer Deformierungen auftritt, weshalb die Atrophie des alten Knochens bei der Osteomalacie ungleich viel deutlicher hervortritt. Wir erkennen ferner, daß die von Pommer und Schmorl vertretene Ansicht, daß das Wesen der rachitischen und osteomalacischen Knochenveränderung in einer mangelhaften Kalkablagerung im Knochen beruhe, von der alle anderen Erscheinungen abzuleiten seien, nicht richtig sein kann, daß vielmehr die mangelhafte Kalkablagerung im Knochen nur eine Teilerscheinung des rachitischen und osteomalacischen Prozesses ist.

Berücksichtigen wir die Gesamterscheinungen der Rachitis und Osteomalacie nach ihrer physiologischen Entstehungsweise, so erkennen wir, daß das Wesen der rachitischen und osteomalacischen Knochenveränderung besteht in einer Hemmung aller aktiven Prozesse der Knochenbildung und des Knochenwachstums, in einer Hemmung der Kalkablagerung in den Knochen, die zur Bildung von kalklosen Säumen am alten, lamellösen Knochen und zu einem Schwund der präparatorischen Verkalkungszone an den Epiphysenknorpeln führt, in einer Hemmung der physiologischen Apposition von Knochen, die zu einer Atrophie des alten, lamellösen Knochens führt, in einer Hemmung des Wachs-

tums der Epiphysenscheiben, die sich in einer Verminderung des Körperwachstums äußert, in einer Hemmung der Resorption und Verarbeitung der wuchernden Epiphysenknorpel, infolge welcher der gewucherte Knorpel unverarbeitet liegen bleibt und in einer Hemmung der Entwicklung der Epiphysenkerne und der Zahnbildung. Demgegenüber ist ein reparatorischer Prozeß in der Bildung der geflechtartigen Knochens tätig, der im frühen kindlichen Alter intensiv ist, mit zunehmendem Alter aber immer schwächer wird.

Die Berücksichtigung der besprochenen physiologischen und pathologisch-physiologischen Momente, die die Entstehung der rachitischen und osteomalacischen Veränderungen beherrschen, namentlich der Tatsache, daß die physiologischen Appositions- und Resorptionsvorgänge am Skelett im jugendlichen Alter sehr intensive sind, beim Erwachsenen aber mit bedeutend verminderter Intensität das ganze Leben hindurch fort dauern, sowie der Tatsache, daß die Bildung des geflechtartigen Knochens, die bei der Heilung der Rachitis eine große Rolle spielt, ebenfalls in der Jugend intensiv, im späteren Alter aber schwächer ist, macht es ohne weiteres verständlich, daß das jugendliche Skelett zur Zeit seines intensivsten Wachstums im ersten und zweiten Lebensjahr am leichtesten und am häufigsten rachitisch erkrankt, daß in diesem Alter die Erkrankung aber relativ leicht wieder ausheilt, daß dagegen aber beim Erwachsenen die Neigung zur Erkrankung eine ganz bedeutend geringere ist, und daß bei ihm die einmal aufgetretenen Veränderungen auch vielschwerer und langsamer ausheilen als im kindlichen Alter.

Krankengeschichten.

I. Spätrachitis.

Fall I. (Fig. 13 u. Tafel I.)

W., Walter, 15½ Jahre.

Anamnese (29. X. 1917): Beide Eltern leben, sind gesund. Patient ist das älteste von 3 Geschwistern, seine 2 Schwestern sind zurzeit 13½ und 14½ Jahre alt, die jüngere ist so groß wie Patient,

die ältere ist um ca. einen halben Kopf größer als er. Patient weiß nicht, wann er laufen lernte, er soll als kleines Kind die englische Krankheit gehabt haben und elend gewesen sein. In der Schule war er immer der kleinste, er machte auch das Turnen und die Spiele der Kameraden mit, in den höheren Klassen konnte er aber nur wenig mitmachen, da er beim Springen rasch in den Knien ermüdete; Schmerzen hatte Patient keine, er konnte immer gut und weit laufen. Seit $1\frac{1}{2}$ Jahren ist er als Handlanger tätig, er versuchte es zuerst als Pflasterjunge, war aber zu schwach dazu und mußte die Arbeit wegen Atembeschwerden aufgeben. Jetzt ist Patient in einer Küche tätig. Seit 3 Jahren hat er einen Kropf, er sucht wegen Atembeschwerden die chirurgische Poliklinik auf.

Status: Für sein Alter auffallend kleiner Patient, von kindlichem Aussehen, er macht den Eindruck eines 11—12 Jahre alten Knaben, Körperlänge 141 cm. Penis und Testikel sehr klein, vollkommen infantil, keine Behaarung des Mons veneris, keine Achselhaare, kein Schnurrbart. Die Tubera frontalia und parietalia stehen etwas stärker vor als normal, Gaumen o. B., Zähne regelmäßig, mit zackigem Rand (rachitischer Typus). Thorax breit, nicht deformiert, sehr deutliche Verdickung der Knorpelknochengrenzen der Rippen (rachitischer Rosenkranz). Die Wirbelsäule zeigt eine leichte Rechtsskoliose im Brustteil mit leichter kompensatorischer im Lendenabschnitt. Becken o. B., Arme o. B., leichte Verdickung der Handgelenksepiphysen. Die Beine zeigen einen ganz leichten Grad von Genu valgum, die inneren Kondylen der Knie stehen etwas stärker vor als normal, leichter Plattfuß, namentlich links. Mäßige Struma.

Röntgenbilder (rechte Hand mit Handgelenk, rechtes Knie, rechte Knöchelgegend, Tafel I, Fig. 1, 2, 3): Deutliche Atrophie der Knochen leichten Grades, namentlich am Handskelett zu erkennen. Die Epiphysenfuge am unteren Femurende, die obere und untere Epiphysenfuge der Tibia deutlich verbreitert, sie zeigen eine stark verbreiterte Verkalkungszone (Heilungsvorgänge), auch am unteren Tibiaende ist die Epiphysenfuge verbreitert und unregelmäßig, ebenso am distalen Ulnaende. Distale Radiusepiphysenfuge etwas unregelmäßig, zeigt eine verbreiterte Verkalkungszone, daran schließt sich diaphysenwärts eine 2—3 mm breite, ziemlich helle, strukturlose Zone an. Auf der lateralen Seite des oberen

Fig. 13.

Fall 1, $15\frac{1}{2}$ Jahre.
Körperlänge 141 cm.

Tibiaendes eine deutlich schattengebende, ca. 4 mm breite Osteophytenlage.

Diagnose: Spätrachitis in Heilung. Struma.

Fall 2. (Fig. 14 u. Tafel II.)

St., Hermann, 17 Jahre.

Anamnese (8. VIII. 1917): Eltern und 7 Geschwister sind gesund, Patient ist das 6. Kind. Die 7 Geschwister sind alle wesentlich größer als Patient. Patient weiß nicht, wann er laufen lernte.

Fig. 14.

Fall 2, 17 Jahre.

Körperlänge 150 cm.

Als Kind und in der Schule konnte er alles mitmachen, turnen, spielen usw. In der Schule war er immer einer der kleinsten. Außer der Kleinheit hatte er über nichts zu klagen. Seit $1\frac{1}{2}$ Jahren ist er bei einem Schlosser in der Lehre, seit 7 Monaten hat er Beschwerden, er kann nicht mehr so weit und so lange gehen wie früher, er hat oft Schmerzen in beiden Knien, namentlich beim Heben schwerer Gegenstände, beim langen Stehen und Gehen und beim Treppensteigen. Jedes feste Auftreten macht Schmerzen in den Knien. Wegen dieser Beschwerden sucht er die chirurgische Poliklinik auf.

Status: Für sein Alter deutlich in der Entwicklung zurückgebliebener Patient, Körpergröße 150 cm. Schnurrbart und Behaarung der Axillae fehlen ganz. Genitalbehaarung ganz gering. Penis schwach entwickelt, Testikel wesentlich kleiner als beim Erwachsenen, etwa kleinmandelgroß. Tubera frontalia und parietalia stehen etwas vor, Gaumen normal gewölbt, leichte Caries der Zähne, Zähne sonst regelmäßig, o. B., Claviculae etwas stärker gekrümmt als normal. Obere Extremitäten gerade. Epiphysen der Handgelenke etwas verdickt. Finger im Vergleich zu den langen Armen etwas kurz.

Thorax nicht deformiert, Knorpel-Knochengrenzen der Rippen nur wenig verdickt. Die Wirbelsäule zeigt im Brustteil eine deutliche Abflachung, keine seitliche Abweichung. Die Oberschenkel sind nicht verbogen, die Unterschenkel gerade. Am Knie springen die Condyl. interni und die Tibiaköpfe etwas stark nach innen vor, Genu valgum ganz leichten Grades. Die Knöchel sind etwas plump, aber nicht sichtlich verdickt. Plattfüße. Sämtliche Knochen auf Druck nicht empfindlich. Funktion der Kniee normal. Beim maximalen Beugen etwas Schmerzen im Knie. Alle Reflexe normal. Keine Anämie.

Röntgenbilder (rechtes Knie, rechte Hand mit Handgelenk):

Rechtes Knie (Tafel II, Fig. 5): Sehr deutliche Atrophie der Corticalis und Spongiosa aller sichtbaren Knochen. Epiphysenfuge der Tibia schmal mit deutlicher, frischer Verkalkungszone auf der medialen Seite des Tibiakopfes, 5 mm distal davon zweite, ältere Verkalkungszone, zwischen beiden Verkalkungszonen strukturlose Zone. Im distalen Diaphysenende des Femur 2 ca. linsengroße Aufhellungen (Knorpelinseln), eine nahe der Mitte der Epiphysenlinie, die zweite 4 cm von der Epiphysenlinie entfernt auf der medialen Seite des Femur.

Rechte Handgelenksgegend und Hand (Tafel II, Fig. 4): Atrophie der Handknochen, Verdünnung und Auffaserung der Corticalis der Metacarpalia und Phalangen. Distales Ulnaende becherförmig erweitert. Radius und Ulnaepiphysenknorpel wenig verbreitert, etwas unregelmäßig. Am Rande derselben verbreiterte Verkalkungszone, 5 mm diaphysenwärts davon schwache zweite Verkalkungszone, zwischen beiden strukturlose Zone.

Diagnose: Spätrachitis in Heilung.

Verlauf: Patient erhält Phosphor 0,01 auf Emulsio oleosa 100,0, zweimal täglich einen Eßlöffel! (0,0015! p. d.). Die Knie-schmerzen verschwinden sehr rasch. Nach vierwöchentlicher Behandlung erscheint Patient nicht mehr. Er erscheint erst wieder Mitte Oktober und verlangt „die Medizin“, da in der letzten Zeit die Schmerzen wieder aufgetreten sind. Behandlung während 6 Wochen. Die Schmerzen verschwinden auch dieses Mal sehr rasch.

Bei der Nachuntersuchung am 24. XI. 1917 (vier Monate nach Beginn der ersten Behandlung) ist Patient ganz beschwerdefrei. Eine Röntgenaufnahme der rechten Hand zeigt, daß die aufgelockerte Struktur der Metacarpalia und Phalangen sich merklich verdichtet hat. Die Epiphysenknorpel an Radius und Ulna haben normale Breite gewonnen, die frühere strukturlose Zone diaphysenwärts von denselben, hat ziemlich gute Struktur bekommen, läßt sich aber noch erkennen, die becherförmige Ausladung des distalen Epiphysenendes der Ulna ist ganz geschwunden.

Fall 3. (Fig. 15 u. Tafel III, IV.)

F., Dante, 18 $\frac{3}{4}$ Jahre.

Anamnese (26. IV. 1918): Beide Eltern leben, sie sollen beide gesund, mittelgroß, von normaler Statur sein (Vater 163 cm, Mutter 150 cm). Patient ist das älteste von 4 Geschwistern, eine Schwester von 13 Jahren soll relativ groß sein, die Brüder von 8 und 7 Jahren sollen eher etwas klein sein, aber nicht in auffallendem Maße, alle haben gerade Glieder.

Patient soll mit 1—1 $\frac{1}{2}$ Jahren laufen gelernt haben, er soll als Kind stark krumme Beine gehabt haben bis etwa zum 7. Jahre. Die

Beine seien von selbst wieder gerade geworden. Patient kam mit 7 Jahren in die Schule, er soll unter seinen Mitschülern einer der kleinsten gewesen sein. Er konnte in der Schule alles mitmachen, gehen, turnen, spielen. Während der ganzen Schulzeit hatte er überhaupt über nichts zu klagen. Beschwerden fingen erst im 14. Lebensjahre an und bestanden in Schmerzen in beiden Knien beim Gehen, auch bei kürzerem Gehen. Patient konnte deshalb nie spazieren gehen, blieb immer zu Hause. Seit dem 13. Jahre arbeitet

Fig. 15.

Fall 3, 18 $\frac{3}{4}$ Jahre.
Körperlänge 147 cm.

Patient in einer Glühlampenfabrik als Glasbläser. Es ist eine leichte Arbeit, zu einer schwereren Arbeit ist Patient nicht fähig, da er beim Stehen und Gehen Schmerzen in den Knien bekommt. Seit ca. 1 Jahr hat Patient auch zuweilen Schmerzen im Rücken beim Bücken und seit einigen Wochen Schmerzen in den Füßen beim Gehen. Patient hat in den letzten 2 Jahren mehrmals Ärzte konsultiert wegen seiner Knieschmerzen. Er erhielt jedesmal zum Einreiben, was aber ohne Erfolg war. Er sucht die chirurgische Poliklinik wegen der Knieschmerzen auf.

Status: Für sein Alter auffallend kleiner Patient. Körperlänge 147 cm. Die ganze körperliche Entwicklung etwas zurückgeblieben. Keine Andeutung von Schnurrbart, Achselhaare eben angedeutet, Pubus etwas schwach entwickelt, schneiden in gerader Linie nach oben ab. Genitalien ziemlich gut entwickelt. Rechter Testis annähernd normal, linker etwas kleiner, mandelgroß.

Schilddrüse nicht vergrößert, nicht deutlich zu palpieren. Abdomen von normaler Wölbung. Milz nicht palpabel. Innere Organe o. B.

Reflexe: Bauchdeckenreflex schwach, Cremasterreflex normal. Patellarreflexe deutlich gesteigert, Fußsohlenreflexe schwach, Achillessehnenreflex normal. Periostreflex am Radius

beiderseits lebhaft.

Knochensystem: Die Tubera frontalia und parietalia treten etwas stärker vor als normal. Gaumen abnorm stark gewölbt. Zähne regelmäßig, mäßige Caries, keine rachitischen Schmelzdefekte.

Thorax nahezu symmetrisch. Claviculae mäßig geschweift. Die linke Schulter steht wesentlich höher als die rechte. Die Knorpel-Knochengrenzen der Rippen sind schon äußerlich zu sehen, bei der Palpation sehr deutlich knotig verdickt. Scapulae o. B. Mäßige

Linksskoliose der Brustwirbelsäule, namentlich in ihren mittleren Partien, mäßige kompensatorische Rechtsskoliose der Lendenwirbelsäule. Becken äußerlich o. B.

Arme gerade. Die Handgelenksepiphyphen deutlich verdickt. Untere Extremitäten im Vergleich zum Körper etwas kurz. Das rechte Bein zeigt eine leichte X-Beinstellung. Das linke Bein ist im ganzen annähernd gerade. Beide Oberschenkel scheinen leicht nach außen konvex gebogen. Beide Kniegelenke sind deutlich plump, beide innere Condyli treten abnorm stark nach innen vor. Die Tibia zeigt eine leichte innenkonkave Krümmung. Knöchelgegend deutlich verdickt und plump. Der linke Fuß zeigt leichte Plattfußstellung, am rechten ist ein Plattfuß erst angedeutet.

Die Femora und Tibiae sind, namentlich in der Kniegelenksgegend, sehr deutlich druckempfindlich, auch die Rippen, Sternum und die Wirbelsäule, namentlich die Lendenwirbelsäule, leicht druckempfindlich.

Röntgenbilder (linkes und rechtes Knie, linke Hand, linke Knöchelgegend) Fig. 6—9 auf Tafel III und IV.

Linkes Knie (Fig. 6): Die Knochen sind abnorm durchsichtig, leichte Atrophie des Knochens an Corticalis und Spongiosa festzustellen. Der Epiphysenknorpel der Tibia unregelmäßig wellig verlaufend. Im medialen Abschnitt 6—7 mm breite Knorpelfuge. Auf der lateralen Seite ist dieselbe, wohl wegen des gewellten Verlaufs der Epiphysenscheibe, durch welche sich verschiedene Schichten in der Projektion decken, weniger deutlich. An der Grenze zwischen dem breiten Knorpel und der Diaphyse verbreiterte Verkalkungszone. Weiter diaphysenwärts in einer 1 cm breiten strukturenlosen Zone zwei weitere Verkalkungszonen, deren entferntere 1,7 cm von der Basallinie entfernt liegt. Die Basallinie des Epiphysenknorpels stark verkalkt. Das Diaphysenende der Tibia auf der medialen Seite stark becherförmig ausgeladen. An der Fibula an Stelle des Epiphysenknorpels stark verwachsene, 1 cm breite Zone. An Stelle des Epiphysenknorpels des unteren Femurendes eine 1½ bis 2 cm breite, etwas aufgehellte, sehr verwaschene Zone.

Rechtes Knie (Fig. 7): Im ganzen wie links. Die Epiphysenscheibe der Tibia verläuft regelmäßiger wie links. Auch hier sind drei parallele Verkalkungszonen sichtbar.

Linke Hand mit Handgelenksgegend (Fig. 8): Die distalen Epiphysenknorpel von Radius und Ulna stark verbreitert. Die durchsichtige Knorpelzone am Radius 5 mm breit. An sie schließt sich diaphysenwärts eine ca. 1 cm breite Zone von sehr undeutlicher Struktur an, in der zwei bis drei quere Schatten nachzuweisen sind. Die Struktur der Metacarpalia und Phalangen stark rarefiziert. Die Corticalis der Phalangen in ein ziemlich lockeres Netzwerk von Knochenbälkchen aufgelöst.

Linke Knöchelgegend (Fig. 9): Der Schaft der Tibia scheint in der Architektur ziemlich normal. Die Corticalis der Fibula zeigt deutliche Längsstreifung (Atrophie). Knorpelfuge von Tibia und Fibula stark verändert. Basallinie stark verkalkt. Knorpelfuge verbreitert, gegen die Diaphyse sehr unscharf begrenzt, sie mißt mit der anschließenden strukturlosen, etwas dunkleren Zone 1,2 cm. An der Grenze zwischen Diaphyse und strukturloser Zone intensive, quere Verkalkungslinie. Auch innerhalb der strukturlosen Zone 1 bis 2 quere verwaschene, dunkle Streifen.

Diagnose: Rezidivierende Rachitis im Pubertätsalter.

Verlauf: Patient erhält Phosphor 0,01 auf Emulsio oleosa 100,0 2mal täglich 1 Eßlöffel! (0,0015 p. d.), nach 14 Tagen ist wesentliche Besserung der Beschwerden zu konstatieren. Patient hat die weitere Behandlung sehr unregelmäßig durchgeführt, konnte später nicht mehr genau verfolgt werden.

Fall 4. (Fig. 16 u. Tafel V, VI.)

P., Käthchen, 12 Jahre.

Anamnese (24. III. 1911): Von der Familie nichts Genaueres bekannt. Patientin soll sich als Kind normal entwickelt haben. Sie gehörte in der Schule zu den kleineren. Sie lernte leicht, konnte alle körperlichen Anstrengungen, Turnen, Spaziergänge, mit ihren Kameradinnen mitmachen. Seit einigen Monaten ermüdet sie leicht; sie hat bei allen stärkeren Anstrengungen und nach längerem Stehen oder Gehen Schmerzen in den Knien, die nach und nach zugenommen haben. In letzter Zeit konnte Patientin nur noch langsam gehen, nicht mehr springen. Auch das Treppensteigen macht ihr Beschwerden. Patientin ist noch nicht menstruiert.

Status: Für ihr Alter kleines, in der Entwicklung zurückgebliebenes Mädchen; sie macht den Eindruck eines 9—10 Jahre alten Kindes, nur der Gesichtsausdruck entspricht ihrem Alter. Körperbau gut proportioniert, Muskulatur und Fettpolster ordentlich entwickelt. Keine Struma. Mammae angedeutet, Pubes- und Achselhaare nur ganz schwach angedeutet. Leicht anämisches Aussehen. Herz und Lungen normal. Abdomen nicht aufgetrieben, Leber und Milz nicht zu fühlen.

Knochensystem: Die Tubera frontalia und parietalia stehen nicht besonders vor. Zähne ziemlich regelmäßig, leichte Caries der Backenzähne. Claviculae normal. Thorax nicht deformiert, etwas weich, Knorpel-Knochengrenzen der Rippen deutlich verdickt. Die Wirbelsäule zeigt eine leichte Linksskoliose und eine vermehrte Lendenlordose. Die Knochen der oberen Extremitäten gerade, deutliche, aber mäßige Auftreibung der Handgelenksepiphysen. Beide Beine zeigen leichtes Genu varum, bei zusammengestellten Füßen klaffen die Knie um 4—5 cm, Ober- und Unterschenkelknochen sind im ganzen

gerade. Kniegelenke etwas verdickt, ebenso die Knöchel. Alle Reflexe normal.

Röntgenbilder (rechtes Knie, linke Knöchelgegend, linkes Handgelenk, linke Hand) Tafel V, Fig. 10—13: Sehr deutliche Atrophie der Knochen, namentlich deutlich am Handskelett sichtbar. Alle sichtbaren Epiphysenfugen sind stark verbreitert, an allen ist etwa an der Grenze zwischen dem verbreiterten Knorpel und dem Knochen eine etwas verwaschene, auffallend breite und ziemlich intensive, alte Verkalkungslinie zu erkennen.

Diagnose: Spätrachitis, leichte *Genua vara*.

Behandlung mit Phosphorlebertran 0.01 : 100,0 3mal täglich 1 Theelöffel.

Rechtes Knie, linke Knöchelgegend, linke Hand nach 7monatlicher Phosphorbehandlung Tafel VI, Fig. 14—16: Die Knochenatrophie hat sich deutlich gebessert. Die Epiphysenfugen sind nahezu zur Norm zurückgekehrt, sie zeigen eine deutliche, feine präparatorische Verkalkungszone an normaler Stelle. Die Knochenstruktur, die an Stelle der früher verbreiterten Epiphysenknorpel getreten ist, ist am oberen und unteren Tibiaende noch etwas verwaschen und schwach angedeutet.

Fall 5. (Fig. 17 u. Tafel VII.)

F., Eugen, 19 Jahre.

Anamnese (4. VIII. 1909): Vater und Mutter sollen gesund sein, der Bruder des Vaters wurde beim Militär wegen X-Bein operiert. Patient ist das 4. Kind von 5 Geschwistern, die alle größer sind wie Patient. Patient lernte erst mit 2 Jahren laufen, bekam dann die englische Krankheit. Schon damals begannen sich O-Beine zu bilden. In der Schule war Patient immer der kleinste. Im Alter von 4—5 Jahren bekam Patient Beinschienen für die verkrümmten Beine. Soviel er sich erinnern kann, wurde er schon als Schulknabe beim Gehen sehr rasch müde, so daß er mit den Kameraden nicht mitkommen konnte. Er hatte oft Schmerzen in den Beinen. Die rasche Ermüdbarkeit hat seit dem 10. Jahr stark zugenommen. Vor einem halben Jahr wurde er mit Lebertran behandelt. Seit 2—3 Jahren sind die Beschwerden besonders stark, Patient wird beim Gehen sehr schnell müde, hat Schmerzen in den Knien und in den Knöcheln, so daß Patient keinen Beruf erlernen oder aus-

Fig. 16.

Fall 4, 12 Jahre.

üben kann. Er hilft zu Hause bei der Fabrikation von Mineralwasser, so gut er kann.

Status: Im Wachstum sehr stark zurückgebliebener Jüngling. Körperlänge 147 cm. Penis gut entwickelt, Hoden klein, gut mandelgroß. Behaarung des Mons veneris etwas spärlich, geradlinig nach oben abschneidend, nur schwache Andeutung von Achselhaaren. Linksseitige Skoliose der Brustwirbelsäule, kompensatorische der Lendenwirbelsäule nach rechts. Ziemlich starke Lendenlordose.

Fig. 17.

Fall 5, 19 Jahre.
Körperlänge 147 cm.

Ganz leichtes Caput quadratum. Claviculae stark gekrümmt. Zähne ziemlich regelmäßig. Thorax nicht deform, deutlicher rachitischer Rosenkranz. Epiphysen an den Handgelenken, am Knie und namentlich an den Knöcheln deutlich verdickt. Hochgradige O-Beine infolge von Verkrümmung der Ober- und Unterschenkel. Becken o. B. Röntgenbilder (rechtes Knie, linkes Knie, rechtes Handgelenk). Linkes Knie (Tafel VII, Fig. 17): Mäßige Knochenatrophie, die Tibia dicht unterhalb des Tibiakopfes etwas medial abgelenkt. Von der Tibiaepiphysenscheibe ist nur das mediale Drittel als 6—7 mm breites Knorpelband erhalten, mit breiter, verwaschener, (von einer früheren Remission herrührender) Verkalkungslinie an der Grenze zwischen dem verbreiterten Knorpel und der Diaphyse. Dieser Epiphysenknorpel ist (durch Kompression) auf der medialen Seite wulstartig vorgebuchtet. Von dem lateralen Abschnitte des Epiphysenknorpels ist nur noch die deutlich verkalkte Basallinie und eine daran anschließende, etwas verwaschene Zone zu erkennen. Auf der medialen Seite des Diaphysenendes ist, ca 1 cm von der alten Verkalkungslinie entfernt, eine zweite schwächere Verkalkungslinie zu beobachten. Rechtes Knie (Tafel VII, Fig. 18) wie das linke.

Rechtes Handgelenk (Tafel VII, Fig. 19): Die distalen Enden von Radius und Ulna becherförmig erweitert (Kompression). Epiphysenknorpel verbreitert, unregelmäßig, gehen gegen die Diaphyse zu in eine fast strukturlose, fleckige Übergangszone über, in derselben ist am Radius eine quere, ziemlich breite Verkalkungslinie (alte Remission) zu erkennen. An den Metacarpalia ausgesprochene Atrophie des Knochens.

Diagnose: Spätrachitis, Genua vara.

Patient erhält Phosphorlebertran 0,01:100,0. 2mal täglich 1 Teelöffel. Später 0,02:100,0 2mal täglich 1 Teelöffel.

23. XI. 1909, nach 3½ monatlicher Phosphorlebertranbehandlung hat Patient keine Schmerzen in den Knien mehr, nur hie und da noch in den Knöcheln. Er kann viel besser arbeiten als früher. Körpergröße 149 cm. Er ist also um 2 cm gewachsen.

Rechtes Knie, 3 Monate nach Phosphorbehandlung (Tafel VII, Fig. 20): Die Knochenatrophie zeigt geringe Besserung, die Knochenstruktur ist etwas deutlicher geworden, die bucklige Verwölbung des medialen Epiphysenknorpelabschnittes hat sich etwas abgeflacht. Der Epiphysenknorpel ist viel undeutlicher geworden, die alte Verkalkungszone ist weniger intensiv wie früher, aber noch deutlich zu erkennen. Daneben ist eine zweite gegen die Norm etwas verbreiterte und verwaschene Verkalkungszone an normaler Stelle aufgetragen.

Fall 6. Fig. 18—20 u. Tafel VIII—X.)
G., Franziska, 18½ Jahre.

Anamnese (20. II. 1909): Eltern und 7 Geschwister sind gesund. Patientin soll sich als Kind normal entwickelt haben, wann sie laufen lernte, ist nicht zu erfahren. Mit 14 Jahren kam sie in eine Spinnerei, wo sie immer stehen und laufen mußte, sie hatte damals aber noch keine Beschwerden von seiten der Beine. Seit 2 Jahren ist sie in einem Kaffeesortiergeschäft beschäftigt, seit jener Zeit ist sie viel müde, kann nicht lange stehen und gehen, da sie davon Schmerzen in beiden Unterschenkeln bekommt. Seit jener Zeit bemerkte sie auch, daß die Beine langsam krumm wurden. Mit 14 Jahren bekam sie die Periode, aber nur 3mal, seither hat sie dauernd ausgesetzt. Patientin kommt wegen der krummen Beine in die Klinik.

Status: Im Wachstum stark zurückgebliebenes Mädchen von infantilem Habitus, das den Eindruck eines 12—14jährigen Mädchens macht, Körperlänge 145 cm. Die sekundären Geschlechtsmerkmale sind in Anbetracht des Alters schlecht ausgebildet. Mammæ ziemlich schwach entwickelt, der Mons veneris zeigt nur eine schwache Behaarung, etwas mehr die großen Labien, die Behaarung der Achselhöhlen fehlt fast ganz. Intelligenz mäßig entwickelt.

Fig. 18.

Fall 6, 18½ Jahre.
Körperlänge 145 cm.

Die Tubera frontalia und parietalia stehen nicht besonders vor, Zähne ziemlich regelmäßig, ziemlich stark kariös. Thorax nicht deformiert, mäßige Auftreibung der Knorpel-Knochengrenzen der Rippen, die Rippen auf Druck nicht empfindlich. Die Wirbelsäule zeigt eine kurze Rechtsskoliose der oberen Brustwirbelsäule und eine lange Linksskoliose der unteren Brust- und der Lendenwirbelsäule. Die Skoliose ist beweglich. Arme gerade, ohne Deformitäten. Die Epiphysen der Handgelenke nicht verdickt. Das Becken zeigt äußerlich keine Deformität, es ist auf Druck nicht empfindlich. Die Beine sind ausgesprochene O-Beine, das linke ist stärker verbogen als das rechte, die Verbiegung betrifft die Oberschenkel nur in geringem Grade, dagegen stark die Gegend der oberen Tibiaepiphyse, etwas weniger, aber auch stark, die Gegend der unteren Tibiaepiphyse. Die Epiphysen des Kniegelenks sind deutlich verdickt, ebenso die Malleolen. Die Tibiae sind auf Druck etwas empfindlich. Mäßiger Plattfuß beiderseits. Der Gang ist sehr schwerfällig, watschelnd, Patientin kann nur langsam gehen, beim Gehen hat sie Schmerzen in der Kniegegend.

Abdomen nicht aufgetrieben, innere Organe ohne pathologischen Befund, Milz nicht fühlbar.

Röntgenbilder (linkes Knie, linke Knöchelgegend, rechte Hüfte, linkes Handgelenk):

Linkes Knie (Tafel VIII, Fig. 21): Deutliche Atrophie des Knochens, namentlich an der Fibula deutlich zu sehen. Der Epiphysenknorpel des Femur und der Tibia quillt auf der medialen Seite buckelförmig vor. Der Epiphysenknorpel des Femur als 1 cm breites Band ziemlich gut sichtbar, viel deutlicher der Epiphysenknorpel der Tibia, er ist auf der medialen Seite viel deutlicher ausgeprägt als auf der lateralen, wo er zum Teil etwas fleckige Struktur zeigt. Deutliche Verkalkung an der Basallinie, schwächer an der Grenze zwischen dem verbreiterten Epiphysenknorpel und der Diaphyse.

Linke Knöchelgegend (Tafel VIII, Fig. 23): Deutliche Atrophie der Knochen. 1 cm breite Epiphysenfuge an Tibia und Fibula.

Rechte Hüfte (Tafel VIII, Fig. 22): Am Femurkopf ist ein fast 1 cm breiter Epiphysenknorpel zu sehen mit deutlicher Verkalkung der Basallinie und deutlicher Verkalkungszone an der Grenze zwischen verbreitertem Knorpel und Schenkelhals.

Linke Hand (Tafel VIII, Fig. 24): Ausgesprochene Knochenatrophie, namentlich an den Metacarpalia sichtbar. Das vordere Radius- und Ulnaende ist kaum aufgetrieben, die Knorpelfuge selbst nicht wesentlich verbreitert, es schließt sich aber an sie diaphysenwärts eine ca. $\frac{3}{4}$ cm breite Zone von undeutlicher, fleckig verwaschener Struktur an. An der Ulna eine schwache Verkalkungszone an normaler Stelle sichtbar (frische Heilungsvorgänge).

Diagnose: Spätrachitis, doppelseitiges Genu varum.

22. II. 1909: In Chloroformäthernarkose Osteotomie beider Tibiae unterhalb des Tibiakopfes (von der medialen Seite her). Beiderseits Ausmeißeln eines Keiles zur mikroskopischen Untersuchung. Links wird auch die Fibula durchmeißelt, um eine vollständige Redression zu ermöglichen. Der Knochen ist weich, blutet stark. Redressement, Gipsverband.

Röntgenbilder: Rechte und linke Kniegegend (Tafel IX, Fig. 25, 26), 2 Wochen nach der Osteotomie.

Rechtes Knie, 8 Monate nach der Osteotomie (Tafel IX, Fig. 27): Die Knochenstruktur hat gegenüber früher an Kompaktheit merklich zugenommen. Die Epiphysenfugen sind fast verschwunden. Nur auf der medialen Seite der Tibia ist noch ein deutlicher, aber gegenüber früher stark verwaschener Rest des Epiphysenknorpels zu erkennen.

14. IV. 1909 (7 Wochen nach der Osteotomie): Die operierten Unterschenkel sind beiderseits fest konsolidiert. Massage, Bewegung.

24. IV. 1909 (8½ Wochen nach der Osteotomie): Beginn mit Gehen.

30. IV. 1909 (9½ Wochen nach der Osteotomie): Wiederbeginn der Phosphorlebertranbehandlung, die schon kurze Zeit vor der Operation angewandt worden war, zunächst in einer Dosis von 0,01:100,0 3mal täglich 1 Teelöffel, später 0,02 und 0,03:100,0 2mal täglich 1 Teelöffel. Bald nach Wiederbeginn der Phosphorbehandlung treten die Menses wieder auf (Mai 1909).

12. VII. 1909: Patientin geht beschwerdefrei, Stellung der Beine sehr wesentlich gebessert, es bestehen nur noch ganz leichte O-Beine. Patientin wird entlassen. Zu Hause wird die Phosphorlebertranbehandlung fortgesetzt bis Ende Juli.

20. X. 1909: Körperlänge 146 cm, hat also seit Februar nur um 1 cm zugenommen. Die Menses seit Mai 1909 regelmäßig, alle 4 Wochen. Keine Schmerzen beim Gehen. Rosenkranz, Auftreibung der Knie- und Knöchelepiphysen anscheinend etwas geringer als im Februar. Tibiae nur noch wenig druckempfindlich.

Mikroskopische Untersuchung des bei der Osteotomie aus beiden Tibiae gewonnenen Keils: Partielle Entkalkung in Müllerscher Flüssigkeit.

Querschnitt durch die Corticalis (Fig. 19 und Tafel X, Fig. 28 bis 30): Die Corticalis des Knochens ist in ein unregelmäßiges Netzwerk von Knochenbälkchen aufgelöst, die stellenweise mehr parallel (Tafel X, Fig. 28), stellenweise mehr spongiosaartig angeordnet sind (Tafel X, Fig. 29). Die Knochenbälkchen haben einen Durchmesser von $\frac{1}{10}$ — $\frac{1}{3}$ mm, sie sind überall von lamellosem Bau, im Zentrum verkalkt, am Rande von osteoiden Säumen von 20—70 μ . Breite besetzt, auch diese sind von lamellosem Bau. An der subperiostalen Fläche erreichen die kalklosen Auflagerungen stellenweise bis 200 μ .

Die Grenze zwischen kalkhaltigem und kalklosem Knochen wird durch eine schmale, dunkel gefärbte, etwas unscharf begrenzte

Fig. 19.

Querschnitt durch die Corticalis der Tibia unterhalb des Tibiakopfes. Die Corticalis sehr atrophisch, in ein Netzwerk von Bälkchen aufgelöst (Einzelheiten s. Text und Tafel X, Fig. 28–30).

Fig. 20.

Längsschnitt durch die Tibia corticalis an der Stelle ihrer Verbiegung unterhalb des Tibiakopfes. Atrophie der Corticalis. Keilförmige Zone aus fibrösem Gewebe; an Stelle des hier verschwundenen lamellösen Knochens Netzwerk, von kalklosen geflechtartigen Knochenbälkchen (Umbauzone). (Einzelheiten s. Text.)

Übergangszone von körnig-krümeliger Verkalkung gebildet (Tafel X, Fig. 30). Ein Teil der Oberflächen der Knochenbälkchen ist mit Osteoblasten besetzt. Osteoblasten und perforierende Kanäle finden sich nur in geringer Zahl. Das Mark ist ein zellarmes, fibröses Mark, das von sehr weiten, 20–80 μ im Durchmesser messenden, von einem feinen Endothelbelag ausgekleideten Kapillaren durchzogen wird und stellenweise Einlagerungen von Fettzellen und spärlich Rundzellen und kleine Rundzellenanhäufungen und kleine Blutungen enthält.

Ein Längsschnitt durch den excidierten Keil (Fig. 20) der anderen Seite zeigt nur spongiösen Knochen von sehr lockerem Gefüge von lamellösem Bau mit osteoiden Säumen von 20–70 μ Breite. In der Mitte des Präparates schiebt sich eine keilförmige Zone von 6 mm breiter Basis vom Periost aus in den Knochen ein. Im Bereiche dieser Zone fehlen Knochenbälkchen von lamellösem Bau vollständig. Die keilförmige Zone besteht aus einem fibrösen Gewebe, in dem ein dichtes Netzwerk von geflechtartigen, kalklosen Knochenbälkchen sich gebildet hat. Nur in einzelnen

dieser Bälkchen finden sich kleine verkalkte Zentren von unscharfer Begrenzung; einige etwas größere, fleckig verkalkte Herde finden sich an der periostalen Basis dieser Zone. In den Maschen dieser geflechtartigen, osteoiden Bälkchen weite Blutkapillaren. Das Mark im Bereiche der Spongiosa ist zellarmes fibröses Mark, stellenweise von größeren oder kleineren Gruppen von Fettzellen durchsetzt. Ziemlich zahlreiche Blutungen im Mark.

Fall 7. (Fig. 21 u. Tafel XI.)

Sch., Elise, 17½ Jahre.

Anamnese (9. III. 1909): Eltern mittelgroß, gesund. Patientin ist einziges Kind, ihre Mutter hat sonst nie geboren. Patientin lernte mit 14 Monaten gehen. Sie machte mit 3 Jahren Masern und Lungenentzündung durch, wonach sie das Laufen verlernte; mit 4 Jahren konnte sie wieder gehen. Ob sie damals auch englische Krankheit hatte, weiß sie nicht anzugeben. Sie gehörte in der Schule zu den größeren. Sie blieb erst vom 13. Jahre an im Wachstum zurück. Im Alter von 14 Jahren (November 1905) kam sie in ein Kolonialwarengeschäft als Verkäuferin, wo sie viel stehen und gehen mußte. Mit 16 Jahren begannen die eigentlichen Beschwerden. Patientin konnte nicht mehr lange stehen und gehen. Sie ermüdete sehr rasch und bekam dann Schmerzen in den Knien und Füßen. Auch konnte sie keine schweren Gegenstände mehr heben. Bald nach dem 16. Jahre mußte sie wegen dieser Beschwerden ihre Stelle aufgeben. Sie blieb zu Hause, ging aber noch herum. Es trat zu Hause zeitweise leichte Besserung der Beschwerden ein, im ganzen blieb aber der Zustand unverändert. Patientin ist noch nicht menstruiert. Jetzige Beschwerden: Patientin fühlt sich schwach, kann nur langsam gehen. Schmerzen in den Knien, namentlich rechts, bei längerem Gehen. Sie kann sich nur schwer bücken und schlecht die Treppe gehen.

Status: Für sein Alter sehr schlecht entwickeltes Mädchen, das bezüglich Größe und Körperbau den Eindruck eines 12—13 Jahre alten Kindes macht, Körperlänge 143 cm, nur der Gesichtsausdruck ist dem Alter entsprechend. Intelligenz normal. Körperbau grazil, sehr geringe Muskulatur und Fettpolster. Anämische Hautfarbe, geringe Anämie der sichtbaren Schleimhäute. Fleckige Pigmentierungen auf der Stirn und den Wangen. Keine Ödeme, keine Drüsenschwel-

Fig. 21.

Fall 7, 17½ Jahre.
Körperlänge 143 cm.

lungen. Sekundäre Geschlechtsmerkmale ganz unentwickelt, Brüste eben angedeutet, Pubes- und Achselhaare nur schwach angedeutet. Menstruation noch nicht eingetreten.

Schädel o. B., die Tubera treten nicht besonders vor. Gaumen etwas stark gewölbt. Die Zähne zeigen keine rachitischen Veränderungen. Die Zähne des Unterkiefers stehen ziemlich stark unregelmäßig und schief, etwas ineinander geschoben. 3 Schneidezähne stehen links von der Medianlinie, einer rechts. Thorax nicht deform, außerordentlich elastisch, läßt sich von vorn nach hinten und seitlich leicht zusammendrücken, ist von gummiartiger Konsistenz. Deutliche, sogar sichtbare Auftreibungen der Knorpel-Knochengrenzen der Rippen. Claviculae etwas stark geschwungen. Die Wirbelsäule zeigt keine nennenswerte Verbiegung. Arme gerade, sehr deutliche Verdickung der Handgelenksepiphysen. Das linke Bein zeigt ein leichtes *Genu varum*, das rechte Bein ein ausgesprochenes *Genu valgum* von ca. 130 Grad. Die Oberschenkelknochen sind annähernd gerade, ebenso der rechte Unterschenkel, der linke Unterschenkel ist leicht nach außen konvex gebogen. Die Kniegelenksepiphysen und namentlich die Knöchelgegenden sind stark verdickt.

Herzdämpfung etwas breit, Spitzenstoß etwas breit, hebend, Herzaktion beschleunigt, deutliches systolisches Geräusch im 3. Interkostalraum links vom Sternum. Starkes Nonnensausen. Abdomen etwas aufgetrieben, schlaff, Leber eben fühlbar, weich, Milz nicht zu fühlen. Körpergewicht 29,5 kg.

Nervenstatus: Grobe Kraft gering, Muskulatur gleichmäßig stark atrophisch. Kein Tremor, kein Intentionszittern, kein Nystagmus, keine Ataxie. Reflexe: Fußsohlenreflex beiderseits lebhaft, Bauchdeckenreflex beiderseits positiv, Patellar-, Achillessehnen-, Triceps-, Vorderarmreflex positiv, nicht gesteigert. Sensibilität: Für Tastgefühl, Schmerz, Temperatur normal. Pupillen reagieren normal.

Röntgenbilder (rechtes Knie, linke Hüfte, linke Knöchelgegend, linkes Handgelenk):

Rechtes Knie (Tafel XI, Fig. 31): Ausgesprochene Knochenatrophie, Corticalis dünn, Spongiosa locker, sehr durchlässig. Der Epiphysenknorpel des unteren Femurendes als 1 cm breiter, heller, strukturloser Streifen zu sehen, auf der lateralen Seite ist er buckelförmig vorgebuchtet (Kompressionserscheinung). Auch der Epiphysenknorpel des oberen Tibiaendes zeigt sich als 1 cm breite, strukturlose Zone, von welcher nur der basale Teil hell ist, der der Diaphyse zugekehrte ist auch strukturlos, gibt aber etwas mehr Schatten. Die Basallinie beider Epiphysenknorpel ist deutlich verkalkt.

Linke Hüfte (Tafel XI, Fig. 32): Am Schenkelhals ist eine ca. 1 cm breite, etwas unregelmäßige Epiphysenfuge zu erkennen, mit ziemlich kräftiger Verkalkung der Basallinie.

Linke Knöchelgegend (Tafel XI, Fig. 33): Knochenatrophie. Die

Epiphysenknorpel von Tibia und Fibula fast 1 cm breit. Stark verkalkte Basallinie, wolkige Verkalkungszone an der Grenze zwischen dem stark verbreiterten Epiphysenknorpel und der Diaphyse.

Linke Hand (Tafel XI, Fig. 34): Knochenatrophie, Auffaserung der Corticalis von Radius, Ulna und Metacarpalia. Die Epiphysenknorpel von Radius und Ulna stark verbreitert, unregelmäßig, gehen vermittelt einer verwaschenen, strukturlosen Zone in die Diaphyse über. Die Schaftenden von Radius und Ulna becherförmig erweitert, ihr Ende unregelmäßig ausgefranst.

Diagnose: Spätrachitis, Genu valgum rechts, Genu varum links.

Rechtes Knie (Tafel XI, Fig. 35): 2½ Monate nach Phosphorbehandlung: Im Vergleich zu früher ist die Knochenstruktur viel deutlicher geworden. Am Epiphysenknorpel der Tibia ist deutlich eine neue, noch wolkige, noch nicht ganz zusammenhängende, breite Verkalkungszone zu erkennen (Heilungsvorgänge).

Fall 8. (Fig. 22 u. Tafel XII.)

K., Heinrich, 18 Jahre.

Anamnese (März 1911): Über die Familie des Patienten und über seine Kindheit ist mir nichts Näheres bekannt. Patient ist als Schlosserlehrling tätig. Etwa seit einem Jahr leidet er an Schmerzen in den Knien, namentlich bei längerem Stehen und Gehen. Er ermüdet sehr rasch. Vor einigen Monaten bemerkte er, daß seine Knie krumm waren. Die Krümmung, hat, wie er glaubt, seither zugenommen. Da die Beschwerden seit einiger Zeit so stark sind, daß er nicht mehr gut arbeiten kann, und die verkrümmten Knie ihn stören, sucht er Hilfe in der Klinik.

Fig. 22.

Status: Für sein Alter etwas kleiner Patient, der einen wesentlich jüngeren Eindruck macht, als man von seinem Alter erwarten würde. Körperlänge 162½ cm, der Körperbau kräftig, etwas plump, Muskulatur gut entwickelt. Penis und Testikel ausgewachsen, entsprechen einem Erwachsenen. Behaarung des Mons veneris sehr spärlich, Behaarung der Achselhöhle und Schnurrbart fehlten vollständig. Kopf o. B., die Tubera frontalia und parietalia treten nicht besonders vor, Zähne stehen regelmäßig, mäßige Zahnkaries. Claviculae o. B., Brust breit, zeigt deutliche Auftreibung der Knorpel-Knochengrenzen (rachitischer Rosenkranz). Arme gerade, deutliche Auftreibung der Handgelenksepiphysen. Die Beine zeigen beiderseits ein Genu valgum

Fall 8, 18 Jahre.
Körperlänge 162½ cm.

mäßigen Grades, die Kniegelenksepiphysen sind plump, etwas verdickt. Ober- und Unterschenkel an sich gerade. Doppelseitiger Klumpfuß leichten Grades. Wirbelsäule gerade, Abdomen etwas aufgetrieben, Milz nicht fühlbar. Innere Organe o. B. Reflexe: Patellar-, Achillessehnen-, Fußsohlen-, Kremaster-, Bauchdeckenreflexe normal.

Röntgenbilder (rechtes Knie, linke Knöchelgegend, linkes Handgelenk):

Rechtes Knie (Tafel XII, Fig. 36): Sehr deutliche Atrophie der Knochen. Tibiaepiphysenknorpel verbreitert, mißt ca. $\frac{3}{4}$ cm. Die Basallinie zeigt deutlichen dunklen Verkalkungstreifen. Vom Epiphysenknorpel distalwärts 4 annähernd parallele Verkalkungstreifen in einem Abstand von je ca 5 mm. Der erste liegt etwas mehr diaphysenwärts als der normalen präparatorischen Verkalkungszone entsprechen würde. Er ist intensiv und mehrere Millimeter breit, der zweite ist noch sehr deutlich, aber schmaler, der dritte und vierte ist nur schmal und schwach angedeutet. Die Knochenstruktur ist zwischen erstem und zweitem Verkalkungstreifen kaum angedeutet, weiter distal wird sie deutlicher. Am Femur an Stelle des Epiphysenknorpels ca. 1 cm breite, verwaschene Zone. Es sind auch hier die 4 Verkalkungstreifen zu erkennen, aber weiter auseinander gerückt als an der Tibia (diese Befunde illustrieren deutlich vier aufeinander folgende Remissionen, die letzte hat ihrer Lage nach vor kurzer Zeit stattgefunden, ist aber in letzter Zeit wieder durch eine Exazerbation abgelöst worden).

Linke Knöchelgegend (Tafel XII, Fig. 37): Knochenatrophie. Die Epiphysenscheibe der Tibia ist als $\frac{3}{4}$ cm breite, helle Zone zu erkennen, die zum Teil etwas Knochenstruktur aufweist. Die Basallinie des Knorpels verkalkt. Am Rande der verbreiterten Epiphysenfuge gegen die Diaphyse zu ziemlich breiter Verkalkungsschatten, der an den Rändern des Knochens deutlich als aus zwei parallelen, konfluierenden Streifen bestehend zu erkennen ist.

Linkes Handgelenk (Tafel XII, Fig. 38): Knochenatrophie an allen sichtbaren Knochen. Die Diaphysenenden von Radius und Ulna becherförmig ausgeweitet. Beide Epiphysenknorpel, namentlich der der Ulna, stark verbreitert, unregelmäßig, und sehr verwaschen in die Diaphyse auslaufend. Namentlich an der Ulna breite, sehr feinporige Übergangszone (osteoide Zone). Am Radius zwei nach der Diaphyse zu verschobene Verkalkungslinien, zwei ebensolche, aber schwächere, sind an der Ulna zu erkennen.

Diagnose: Spätrachitis, Genu valga, kongenitale Klumpfüße leichten Grades.

Suprakondyläre Osteotomie beider Oberschenkel. Aus dem einen Oberschenkel wird ein kleines Knochenstück zur mikroskopischen Untersuchung entnommen.

Mikroskopische Untersuchung: Zur Untersuchung

steht nur ein kleines Corticallstück aus dem Femur zur Verfügung, das bei der Osteotomie gewonnen wurde. Die Corticall ist atrophisch, von erweiterten, 100—150—220 μ im Durchmesser messenden Haverschen Räumen durchzogen, die ein lockeres fibröses Mark enthalten. Perforierende Kanäle ziemlich zahlreich, Osteoklasten spärlich. Die Oberflächen- und Binnenräume des Knochens sind zum großen Teil von osteoiden Säumen ausgekleidet, die eine durchschnittliche Breite von 10—30 μ aufweisen. Sie sind größtenteils von Osteoblasten besetzt.

Fall 9. (Fig. 23 u. Tafel XIII.)

K., Julius, 19 $\frac{3}{4}$ Jahre.

Anamnese (April 1911): Über Familie und Kindheit des Patienten ist mir nichts Näheres bekannt. Er war immer schwächlich und ermüdete leicht. Seit dem 14. Jahr leidet er an Schmerzen in den Knien und Knöcheln, namentlich nach längerem Stehen und Gehen. Er kann nicht weit laufen. Seit einigen Jahren hat er X-Beine, die in letzter Zeit schlimmer geworden sind. Da ihn in letzter Zeit die übereinander geschobenen Knie stören und er viel Schmerzen in den Knien hat, sucht er die Klinik auf.

Status: In der Entwicklung und im Wachstum sehr stark zurückgebliebener Jüngling, der bezüglich Körpergröße und sonstiger Entwicklung den Eindruck eines höchstens 13—14jährigen Knaben macht. Die sekundären Geschlechtsmerkmale ganz unentwickelt, Schnurrbart und Achselbehaarung fehlen ganz. Penis nur ganz schwach angedeutet. Penis und Testikel relativ gut entwickelt, aber noch nicht ganz ausgewachsen. Muskulatur ziemlich schwach, keine Struma, Abdomen etwas aufgetrieben, Milz nicht palpabel. Stuhl normal, innere Organe o. B. Scabies.

Kopf o. B., die Tubera frontalia und parietalia stehen nicht besonders vor, Zähne etwas unregelmäßig, leichte Karies. Brustkorb flach, sonst nicht deformiert, die Knorpel-Knochengrenzen deutlich aufgetrieben. Arme gerade, zeigen sehr deutliche Verdickungen der Handgelenksepiphysen. Die Beine stehen beide in X-Beinstellung, die Condyl interni der Femora prominieren innen stark. Die Knöchelgegend deutlich verdickt. Ober- und Unterschenkel an sich gerade. Wirbelsäule gerade.

Röntgenbilder (linkes Knie, rechtes Handgelenk):

Fig. 23.

Fall 9, 19 $\frac{3}{4}$ cm.

Linkes Knie (Tafel XIII, Fig. 39): Knochenatrophie. Die Epiphysenknorpel von Femur und Tibia verlaufen sehr unregelmäßig, stark wellig, ihre Breite ist deshalb auch schwer zu bestimmen, sie dürfte wenigstens $\frac{3}{4}$ cm betragen. Die Unregelmäßigkeit und hügelige Beschaffenheit der Epiphysenknorpel bedingt auch den in der Röntgenprojektion eigentümlich verworfenen und zerrissenen Verlauf eines ziemlich breiten Verkalkungsbandes, das in ca. $\frac{3}{4}$ cm Abstand von der Basallinie verläuft. In je ca. 1 cm Abstand diaphysenwärts noch zwei schwache Reste von zwei älteren Verkalkungslinien.

Fig. 24.

Fall 10, 18 Jahre.
Körperlänge 145 cm.

Rechtes Handgelenk (Tafel XIII, Fig. 40): Ausgesprochene Knochenatrophie. Die Schaftenden von Radius und Ulna becherförmig ausgeweitet, die Epiphysenknorpel sehr stark verbreitert, an der Ulna 1 cm breit und unregelmäßig. Am Radius eine breite, unregelmäßige Verkalkungslinie, $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ cm von der Basallinie entfernt. An der Ulna ist eine entsprechende Verkalkungslinie nur angedeutet.

Diagnose: Spätrachitis, Genua valga.

Fall 10. (Fig. 24—26 u. Tafel XIV, XV.)
K., Elise, 18 Jahre.

Anamnese (Januar 1910): Beide Eltern und 5 jüngere Geschwister sind gesund und von normaler Größe. Wann Patientin laufen lernte, weiß sie nicht anzugeben. Sie war in der Schule immer die kleinste. Sie soll leicht gelernt haben. Schon mit 14 Jahren war sie einen Kopf kleiner als ihre Altersgenossen. Von 14—16 Jahren machte sie Hausarbeit ohne Beschwerden. Mit 16 Jahren lernte sie nähen, seither ist sie viel gegessen. Seit $\frac{3}{4}$ Jahren hat Patientin Beschwerden. Nach längerem Stehen und Gehen bekam sie reißende Schmerzen in den Knien und in den Knöcheln, sie wurde sehr leicht müde. Oft mußte sie sich wegen Müdigkeit und Gliederschmerzen einen halben Tag ins Bett legen. Seit einem halben Jahr verkrümmten sich die Knie zunehmend. Patientin beschäftigte sich in letzter Zeit mit Nähen. Sie konnte nicht viel herumgehen. Seit 3 Wochen arbeitet sie nicht mehr. Patientin ist noch nicht menstruiert.

Status: Für ihr Alter stark zurückgebliebenes Mädchen von vollkommen kindlichem Habitus, Körperlänge 145 cm. Körper grazil, Muskulatur und Fettpolster schwach entwickelt. Gesicht blaß,

etwas gedunsen, Haut und Schleimhäute etwas blaß, keine Exantheme, keine Drüenschwellungen. Deutliche Struma von mäßiger Ausdehnung, Struma weich. Mammæ schwach angedeutet, Pubes- und Achselhaare fehlen. Herz und Lungen o. B. Hämoglobingehalt des Blutes 62 Proz. Abdomen nicht aufgetrieben, Leber und Milz nicht palpabel. Motilität normal, Sensibilität, abgesehen von einer geringen allgemeinen Überempfindlichkeit, normal. Reflexe: Patellarreflexe wegen der Beindeformität schwer auslösbar, Achillessehnenreflexe normal, Fußsohlenreflex lebhaft. Bauchdeckenreflex vorhanden, Pupillenreaktion normal.

Das Schädeldach zeigt keine rachitischen Veränderungen, die Tubera frontalia und parietalia prominieren nicht besonders. Zähne etwas unregelmäßig, obere mittlere Schneidezähne fehlen, künstlicher Ersatz, mäßige Karies. Tonsillen stark hypertrophisch. Thorax nicht deform, Knorpel-Knochengrenzen deutlich aufgetrieben. Die Wirbelsäule zeigt im Brustabschnitt eine leichte Linksskoliose und leichte Abflachung. Arme gerade, deutliche Verdickung der Handgelenksephysen. Beide Beine zeigen hochgradiges Genu valgum von ca. 130 Grad. Die Kniegelenks- und Knöchelepiphysen sehr deutlich verdickt. Jeder Druck auf Sternum, Rippen, Becken und Unterschenkelknochen ist deutlich schmerzhaft.

Röntgenbilder (linkes Knie, linke Hüfte, linke Knöchelgegend, linke Hand):

Linkes Knie (Tafel XIV, Fig. 41): Knochenatrophie. Der Epiphysenknorpel des Femur ist als ca. 1 cm breites, strukturloses Band zu erkennen. Die Basallinie ist etwas verkalkt, an den Knorpel fügt sich diaphysenwärts eine ca. 1—1½ cm breite, fast strukturlose Zone an. In dem, dem Epiphysenknorpel benachbarten, Teil der Diaphyse sind, parallel zum Knorpel in je 1 cm Abstand, im medialen Drittel des Knochens etwa 8 schwache, quere, dunkle Linien zu erkennen, die sich an die Corticalis der medialen Tibiabegrenzung anlehnen und mit zunehmendem Abstand von dem Epiphysenknorpel immer kürzer werden. Der Epiphysenknorpel der Tibia im ganzen wie der des Femur, er verläuft aber stark wellig bzw. hügelig, so daß im mittleren Abschnitt des Knorpels die Schichten sich in der Projektion stark überlagern. Auf der medialen Seite des Tibiakopfes, diaphysenwärts vom Knorpel, 7 feine Verkalkungslinien in Abständen von 3—8 mm; auf der lateralen Seite des Femur und des oberen Tibiaendes, schmale periostale Osteophyten.

Linke Hüfte (Tafel XIV, Fig. 42): Knochenatrophie. Der Epiphysenknorpel des Schenkelhalses als 1 cm breites Band zu erkennen, deutlich verkalkte Basallinie. Der Femurkopf ist im Bereiche der Epiphysenfuge etwas nach lateral und oben abgerutscht (Coxa valga).

Linke Knöchelgegend (Tafel XIV, Fig. 43): Knochenatrophie. Das Knorpelband von Tibia und Fibula ca. ¾ cm breit, diaphysen-

wärts vom Knorpel drei schwächere Verkalkungslinien, die namentlich auf der medialen Seite der Tibia deutlich sind.

Linkes Handgelenk (Tafel XIV, Fig. 44): Knochenatrophie. Die Diaphysenenden von Radius und Ulna becherförmig erweitert, die Epiphysenknorpel stark verbreitert und unregelmäßig, gegen die Diaphyse zu schließt sich eine fast 1 cm breite, fast strukturlose, Zone an, in welcher am Radius deutlich, an der Ulna etwas schwächer, eine etwas unregelmäßige, verwaschene Verkalkungszone sich findet.

Diagnose: Spätrachitis, Genua valga, Struma.

Behandlung mit Phosphorlebertran 0,01:100,0 3mal täglich 1 Teelöffel.

Februar 1910: In Chloroformäthernarkose suprakondyläre Osteotomie beider Oberschenkel, der Knochen ist auffallend weich. Excision von zwei kleinen Knochenkeilen zur mikroskopischen Untersuchung. Gipsverbände.

Gleich nach der Operation wird die Phosphorbehandlung in einer Dose von 0,02:100,0 3mal täglich 1 Teelöffel, fortgesetzt.

12. IV. 1910 (2 Monate nach der Osteotomie): Osteotomie vollständig geheilt.

Röntgenbilder: Beide Oberschenkelknochen (2 Monate nach Osteotomie, Tafel XV, Fig. 45, 46): Zirka 5 cm oberhalb des Epiphysenknorpels starke Abknickung des Knochenschaftes. Die Osteotomiestelle zeigt einen deutlichen, schattengebenden, periostalen und einen stark verkalkten myelogenen Callus. Die stark verbreiterten Epiphysenknorpel sind in ihrer ganzen Ausdehnung von ca. $1\frac{1}{2}$ cm Breite stark verkalkt und als intensiv dunkles, ein wenig wolkiges Band zu erkennen. Die Befunde sind rechts und links fast ganz gleich.

Mikroskopische Untersuchung: Das 2 cm breite kortikale Knochenstück ist stark aufgelockert, stellt ein ziemlich lockeres Gefüge von mehr oder weniger parallel verlaufenden, miteinander anastomosierenden Bälkchen dar, die in ein fibröses Mark eingebettet sind. Auf dem Präparat der rechten Seite (Fig. 25 u. 26) ist der kortikale Knochen auf einer ziemlich scharf begrenzten Stelle von ca. 1 cm Breite ganz besonders stark rarefiziert, so daß hier vom alten Knochen nur noch einige dem Periost anliegende, nur ca. $\frac{1}{2}$ mm breite Knochenbälkchen vorhanden sind (Fig. 26). An anderen Schnitten erscheint an dieser Stelle der alte kortikale Knochen in eine Anzahl weit auseinander liegende Bälkchen aufgelöst (Fig. 25). An der besonders rarefizierten Stelle ist fibröses Mark in einer Breite von 3—4 mm entwickelt und von einem feinen Netzwerk von sehr dünnen Bälkchen durchzogen, die sich mikroskopisch als Bälkchen von geflechtartigem Bau erweisen. Auch bei stärkerer Vergrößerung zeigt sich der kortikale Knochen hochgradig aufgelockert, von weiten

Haverschen Räumen durchzogen. Die Oberflächen- und Binnenräume des Knochens sind in ihrer überwiegenden Mehrzahl von osteoiden Säumen ausgekleidet, die eine Breite von 15—42 μ aufweisen und zum größten Teil einen regelmäßigen Belag von Osteoblasten zeigen. An der oben beschriebenen lokalisierten, sehr stark rarefizierten Stelle wird das Mark von einem lockeren Netzwerk im Zentrum verkalkter, am Rande kalkloser, sehr schmaler Knochenbälkchen von geflechtartigem Bau ausgefüllt. Osteoklasten finden sich am alten Knochen in normaler Zahl, sie sind an den geflechtartigen Bälkchen etwas reichlicher vorhanden als an den lamellösen. Perforierende

Fig. 25.

Fig. 26.

Querschnitte durch die Corticalis des unteren Femurendes. Atrophie der Corticalis. An einer ca. 1 cm breiten Stelle ist die Corticalis (lamellöser Knochen) besonders rarefiziert und aufgelöst. Im fibrösen Mark dieser Stellen Netzwerk von sehr dünnen Bälkchen von geflechtartigem Bau (Umbauzonen). (Einzelheiten s. Text.)

Kanäle in normaler Zahl. Das Mark stellt ein fibröses Mark von mäßigem Zellgehalt dar, das die ganze Randzone, soweit sich Knochenbälkchen finden, einnimmt. Es wird von sehr weiten, blutgefüllten Kapillaren durchzogen, die einen Durchmesser von 21 bis 155 μ und darüber besitzen. In das fibröse Mark sind spärlich Rundzellen und stellenweise kleinere Rundzellenherde oder kleinere Fettzellengruppen eingestreut. Das fibröse Mark umkleidet auch die in-

nersten Knochenbälkchen mit einer 30—100 μ breiten Schicht und grenzt dann ziemlich scharfrandig an das zentrale Mark an, das im wesentlichen ein Fettmark ist, stellenweise aber doch ziemlich viel Rundzellen enthält.

Fall 11. (Fig. 27—28 u. Tafel XVI, XVII.)

B., Elise, 14 Jahre.

Anamnese (Januar 1910): Über Familie und Kindheit der Patientin ist mir nichts bekannt. Seit 1—2 Jahren soll Patientin X-Beine haben, die langsam immer schlimmer geworden sind. Sie wird dadurch stark belästigt, da sie beim Gehen die Knie mühsam umeinander führen muß. Sie ermüdet sehr leicht, kann nicht lange stehen oder gehen, da sie dann starke Schmerzen in den Knien bekommt.

Fig. 27.

Fall 11, 14 Jahre.

Status: Für ihr Alter etwas kleines Mädchen in sonst ihrem Alter ziemlich entsprechender Entwicklung. Brüste etwas entwickelt, Pubes an den großen Labien ziemlich reichlich, Mons veneris noch zum kleinen Teil behaart, Achselhaare schwach entwickelt. Muskulatur ordentlich entwickelt, keine Exantheme, keine Drüenschwellungen, keine Struma. Abdomen nicht aufgetrieben, Milz nicht palpabel. Innere Organe o. B. Menstruation seit 3 Monaten aufgetreten.

Schädel o. B., kein besonderes Prominieren der Tubera parietalia und frontalia. Zähne ziemlich regelmäßig, nicht von rachitischem Typus. Claviculae o. B. Thorax nicht deform, ausgesprochener, sogar deutlich sichtbarer rachitischer Rosenkranz. Arme gerade, sehr deutliche Auftreibung der Handgelenksephysen. Beide Knie stehen in sehr ausgesprochener X-Beinstellung. Oberschenkel an sich sonst ziemlich gerade, die Unterschenkel zeigen oberhalb der Malleolen eine leichte Abbiegung nach innen. Die Kniegelenksephysen und namentlich die Knöchel sehr deutlich verdickt. Die Rippen und Tibiae auf Druck etwas empfindlich. Wirbelsäule gerade.

Röntgenbilder (beide Knie, linke Knöchelgegend, linkes Handgelenk):

Linkes Knie (Tafel XVI, Fig. 47): Deutliche Knochenatrophie. Die Epiphysenfuge des Femur ca. $\frac{3}{4}$ cm breit, sehr verwaschen, auch

die anstoßenden Teile der Diaphyse von sehr undeutlicher, verwaschener Struktur. Die Epiphysenfuge der Tibia wellig und hügelig verlaufend, mit zwei Vorbuchtungen in die Epiphyse. Am medialen Rande des Tibiakopfes ist die Epiphysenscheibe als 1 cm breites Band zu erkennen. In der Mitte des Knochens ist sie infolge ihres unregelmäßigen Verlaufes schwer zu bestimmen, da sich verschiedene Teile überlagern. Die Basallinie erscheint in der Mitte des Knochens infolge des unregelmäßigen Epiphysenknorpels in der Projektion doppelt. Auf der Außenseite des äußeren Tibiaendes eine schmale Osteophytenlage.

Rechtes Knie (Tafel XVI, Fig. 48): Ähnliche Verhältnisse wie links. Der Epiphysenknorpel der Tibia verläuft etwas regelmäßiger wie links. In den Epiphysenknorpeln des Femur und der Tibia sind deutliche wolkige Kalkablagerungen zu erkennen.

Linke Knöchelgegend (Tafel XVI, Fig. 49): Leichte Knochenatrophie. Tibia und Fibula im untersten Abschnitt leicht medialwärts abgebogen. Epiphysenknorpel annähernd normal breit, nur auf der medialen Seite stärker verbreitert, dasselbe an der Fibula. Die Basallinie beider Epiphysenknorpel deutlich verkalkt, es ist eine schmale Verkalkungszone an normaler Stelle zu erkennen, dagegen eine über 1 cm breite, fast strukturlose Zone.

Linkes Handgelenk (Tafel XVI, Fig. 50): Knochenatrophie. Epiphysenfuge des Radius etwas unregelmäßig und wenig verbreitert, mit deutlicher verbreiteter Verkalkungslinie an normaler Stelle, an die sich eine 1 cm breite, strukturlose Zone diaphysenwärts anschließt. Der Epiphysenknorpel der Ulna ist bedeutend breiter und unregelmäßiger, geht sehr unscharf in die Diaphyse über, er enthält auch etwas verwaschene Kalkablagerungen.

Diagnose: Spätrachitis in Heilung, Genua valga.

Januar 1910: In Chloroformäthernarkose suprakondyläre Osteotomie beider unteren Femuren, Excision je eines Keils zur mikroskopischen Untersuchung. Redressement, Gipsverbände. Glatte Heilung.

Patientin erhielt schon zwei Wochen vor der Operation und gleich nach der Operation wieder Phosphorlebertran 0,02:100,0, 3mal täglich 1 Teelöffel.

Röntgenbilder: Rechte Knöchelgegend (3½ Monate nach Beginn der Phosphorbehandlung, Tafel XVII, Fig. 51): Knochenatrophie annähernd unverändert. An dem unteren Tibia- und Fibulaepiphysenknorpel ist eine breite, sehr intensive Verkalkungszone an normaler Stelle aufgetreten.

Rechtes Handgelenk (3½ Monate nach Beginn der Phosphorbehandlung, Tafel XVII, Fig. 52): Die Knochenatrophie hat sich anscheinend etwas gebessert, am Tibiaepiphysenknorpel stark verbreiterte, ca. 3 mm breite, sehr intensive Verkalkungszone an normaler

Stelle. Auch an der Ulna starke Verkalkungszone. Der an die Verkalkungslinie sich anschließende Diaphysenteil ist auf eine Strecke von ca. $1\frac{1}{2}$ cm noch deutlich aufgeheilt, zeigt aber schon deutliche Knochenstruktur.

Rechtes unteres Femurende (3 Monate nach Osteotomie, Tafel XVII, Fig. 53): Osteotomie gut geheilt, mäßiger, schon deutlich verkalkter, periostaler Callus, namentlich im einspringenden Winkel. Stark verkalkter myelogener Callus. Der Epiphysenknorpel des Femur als schmales Band zu erkennen, diaphysenwärts davon folgt ein sehr stark verbreitertes, $\frac{1}{2}$ bis stellenweise über 1 cm breites, wolkiges Verkalkungsband.

Rechtes Knie ($5\frac{1}{2}$ Wochen später, Tafel XVII, Fig. 54): Knochenatrophie kaum verändert. Die breite Verkalkungszone am Femur hat sich zu einem sehr dunklen, $\frac{3}{4}$ cm breiten Band mit diaphysenwärts unscharfer Begrenzung verdichtet. Am Tibiaepiphy-

Fig. 28.

Querschnitt durch die Corticalis des unteren Femurendes. Starke Atrophie des Knochens. (Einzelheiten s. Text.)

senknorpel 3 mm breite, sehr intensive Verkalkungszone an normaler Stelle, diaphysenwärts davon 1 cm breite, fast strukturlose Zone.

Mikroskopische Untersuchung: Untersucht wurde je ein durch Osteotomie gewonnener, ca. 2 cm langer, Knochenspan aus beiden Femora. Die Corticalis (Fig. 28) besteht aus einer ca. 1 mm breiten, ziemlich kompakten äußeren Lamelle, der sich nach dem Markraume zu ein lockeres Netzwerk von feinen, $\frac{1}{10}$ — $\frac{1}{4}$ mm breiten spongiösen Knochenbälkchen anschließt. Aller Knochen ist von lamellösem Bau. Die ziemlich kompakte Corticalis wird von einigen, wenig erweiterten Haversschen Kanälen durchzogen, daneben aber auch noch von einer ungewöhnlich großen Zahl von perforierenden Kanälen. Ein großer Teil der Oberflächen- und Binnenräume, mit Ausnahme der perforierenden Kanäle, zeigen osteoide Säume in einer Breite von 10—32 μ , die größtenteils von Osteoblasten besetzt sind. Osteoklasten sind in geringer Zahl anzutreffen. Die subperiostale Fläche des untersuchten Stückes zeigt fast durchgehend eine Resorptionsfläche. Das Knochenmark ist nur in der nächsten

Umgebung des kortikalen Knochens lockeres fibröses Mark, im übrigen, auch in der Umgebung der spongiösen Bälkchen, zeigt es den Charakter des Fettmarks.

Fall 12. (Fig. 29 u. Tafel XVIII.)

B., Max, 18 Jahre.

Anamnese (7. IV. 1917): Vater starb vor 3 Jahren an unbekannter Krankheit. 3 Geschwister leben, sind gesund und von normaler Größe. Patient ist der jüngste. Er lernte erst mit 6 Jahren gehen, war immer kränklich und schwächlich und hat nie die normale Schule, sondern eine Spezialklasse, besucht, da er nie gut gehen konnte. Mit 13 Jahren kam er in die Anstalt für rachitische und skrofulöse Kinder in Aegeri. Er wurde damals mit Massage und Sonnenbädern behandelt. Später erhielt er Gipsverbände für die damals schon hochgradig verbogenen Beine. Patient konnte seither leidlich gehen. Seit einem Jahr ist Patient als Schneiderlehrling beschäftigt, er hat seither viel Schmerzen im Rücken, im Kreuz und in beiden Beinen. Die Schmerzen schwanken stark an Intensität. In letzter Zeit kann Patient kaum mehr die Treppen gehen.

Status: Sehr kleiner Patient von zwergenhaftem Wuchs, die unteren Extremitäten sind im Vergleich zum Körper besonders kurz, Körperlänge 134 cm. Die allgemeine körperliche Entwicklung stark zurückgeblieben. Schnurrbart und Achselhaare nur angedeutet, Pubes nur schwach entwickelt, Penis leidlich entwickelt, Testikel deutlich hypoplastisch, rechts mandelgroß, links nur wenig größer. Aussehen etwas blaß. Hämoglobingehalt des Blutes 100 Proz. Innere Organe o. B. Abdomen nicht aufgetrieben, Milz nicht palpabel, Reflexe normal. Intelligenz normal.

Die Tubera parietalia und frontalia treten nicht besonders vor, Gaumen abnorm stark gewölbt, sehr hoch, Zähne, namentlich die obere Reihe, stark ineinander geschoben, so daß einzelne nach außen, andere nach innen disloziert sind, sonst vollständig erhalten, keine Schmelzdefekte, Weisheitszähne nicht sichtbar. Claviculae abnorm stark geschwungen, Thorax nicht deformiert, deutliche Auftreibung der Knorpel-Knochengrenzen der Rippen, Linksskoliose der Brustwirbelsäule, am Becken springt die Symphyse etwas stark vor, leichte Kartenherzform des Beckens (durch das Röntgenbild festge-

Fig. 29.

Fall 12, 18 Jahre.
Körperlänge 134 cm.

stellt), Humerus beiderseits gerade, die Vorderarmknochen zeigen im proximalen Drittel eine mäßige Abknickung volar und ulnar, die Handgelenksepiphysen sind deutlich verdickt. Die Oberschenkel sind nach vorn und außen verbogen, die Tibiae stark geschwungen, in ihrer oberen Hälfte nach vorn und median ausgebogen. Bei Orientierung der Kniescheibe nach vorne sind die distalen Abschnitte der Unterschenkel und die Füße um 20 Grad nach einwärts rotiert. Die Knieepiphysen sind mäßig verdickt, ebenso die Knöchel. Plattfüße. Kopf und Brust sind auf Druck nicht empfindlich, dagegen sind die Wirbelsäule und das Becken ausgesprochen druckempfindlich. Der Gang ist schwerfällig, watschelnd, Patient kann nur langsam gehen, er hat dabei Schmerzen in den Beinen.

Röntgenbilder (rechtes Knie, linke Hand):

Linke Hand: Hochgradige Atrophie der Knochen. Auftreibung der Epiphysengegend von Radius und Ulna, Diaphysenende der Ulna stark becherförmig ausgeweitet. Knorpelfuge am Radius sehr undeutlich zu sehen, an ihrer Stelle eine ca. 1 cm breite strukturlose Zone. Knorpelfuge an der Ulna deutlicher, auch hier ca. 1 cm breite, gegen die Diaphyse sehr unscharf begrenzte, strukturlose Zone, die etwas heller ist als der benachbarte Knochen.

Diagnose: Spätrachitis, Deformitäten der Wirbelsäule, des Beckens und der Extremitäten.

Patient erhält Emulsio phosphorica Kassowitz 2mal (Phosphor 0,01:Emulsio oleosa 100,0) täglich 1 Eßlöffel (0,0015 P pro dosi).

Nach 5monatlicher Behandlung wesentliche Besserung der Gehbeschwerden, die Medikation wird ausgesetzt. Patient kommt aber nach 4 Wochen wieder, um die Medizin zu verlangen, da er nach Aussetzen derselben wieder mehr Schmerzen bekommen hat.

Röntgenbilder: Rechtes Knie (nach 5monatlicher P-Behandlung Tafel XVIII, Fig. 55): Hochgradige Atrophie der Knochen. In dem sehr weitmaschigen Bau des unteren Femurendes ist eine Epiphysenscheibe nicht deutlich zu erkennen, doch ist in der medialen Hälfte der Femurepiphyse eine 1 1/2 cm breite Epiphysenscheibe angedeutet. Aus der ganzen Struktur dieser Gegend ist sehr zu vermuten, daß hier größere, vielleicht unregelmäßige Knorpelreste vorhanden sind, jedenfalls ist der 1 1/2 cm breite, vollkommen strukturlose medialste Teil dieser Epiphysenfuge mit ziemlicher Sicherheit zu erkennen. Der Tibiaepiphysenknorpel ist sehr unregelmäßig verlaufend. Er zeigt eine leicht verkalkte Basallinie und eine in einem Abstand von 2—3 mm parallel dazu verlaufende frische Verkalkungslinie. Auf diese folgt diaphysenwärts eine breite, fast strukturlose Zone.

Linke Hand (nach 5monatlicher P-Behandlung, Tafel XVIII, Fig. 56): Ausgesprochene Knochenatrophie. Epiphysen des Handgelenks verdickt. In der fast 1 cm breiten, strukturlosen (osteoiden)

Zone der Radiusepiphyse ist eine mäßig intensive, frische Verkalkungslinie zu erkennen, diaphysenwärts davon in $\frac{3}{4}$ cm Abstand eine weitere schmale Verkalkungslinie, die die strukturlose (osteoid) Zone ziemlich scharf gegen die Diaphyse zu begrenzt.

Becken: Becken- und Oberschenkelknochen sind für Strahlen stark durchlässig und deshalb ziemlich schwer darzustellen. Das Becken zeigt eine sehr deutliche seitliche Kompression in der Gegend der Hüftgelenkspfannen. Die oberen Femurabschnitte haben sehr lockere Struktur. Die Corticalis ist verschmälert, die Spongiosa sehr grobmaschig. Zwischen Kopf und Schenkelhals ist beiderseits eine 8 mm breite, helle Knorpelfuge deutlich zu erkennen. Beide Oberschenkel zeigen eine deutliche Verbiegung mit Konvexität nach außen. Die Schenkelhälse stehen in annähernd normalem Winkel zum Femurschaft. Die Femurköpfe stehen dagegen nicht in der Achse des Schenkelhalses, sondern sind etwas nach lateral disloziert, so daß eine Art von Coxa valga zustande kommt.

Unterschenkel: Die linke Tibia zeigt eine ausgesprochene S-förmige Verkrümmung, und zwar eine stärkere Verbiegung im oberen Drittel mit Konvexität nach innen und eine schwächere im unteren Drittel mit Konvexität nach außen. Die Fibula weist nur eine Verbiegung unterhalb der Mitte auf mit Konvexität nach innen. Beide Knochen sind für Strahlen abnorm durchlässig, namentlich sind die spongiösen Anteile der Knochen stark aufgelockert und grobmaschig. Die Corticalis der Tibia ist auf der konvexen Seite der starken Biegung sehr verdünnt, auf der konkaven Seite ist sie etwas verdickt. Die Corticalis der Fibula ist gegen den Markraum nicht deutlich abzugrenzen, sie zeigt eine ausgesprochene Längsstreifung. Die Knochen des rechten Unterschenkels zeigen ähnliche Verbiegungen wie der linke, nur sind sie bedeutend weniger ausgeprägt. 5 cm unterhalb der oberen Epiphysenfuge findet sich auf der medialen Seite der rechten Tibia eine bohnen große Exostose. Die oberen Epiphysenfugen von Tibia und Fibula sind schwer zu erkennen. Man sieht an ihrer Stelle eine $\frac{3}{4}$ —1 cm breite, sehr stark verwaschene Zone, die stellenweise durch einen verwaschenen strichförmigen Schatten gegen die Diaphyse abgegrenzt ist.

Eine $1\frac{1}{2}$ Jahre später (20. X. 1918) aufgenommene Beckenaufnahme zeigt die gleichen Deformitäten des Beckens wie früher. Die Epiphysenfugen in den Schenkelhälsen sind nicht mehr zu erkennen, dagegen ist die Valgusstellung des Schenkelkopfes sehr deutlich ausgeprägt.

Fall 13. (Fig. 30 u. Tafel XIX.)

B., Berthold, 14 Jahre.

Anamnese (April 1917): Vater ist gestorben, Mutter und zwei Schwestern leben noch, sie sollen normal sein. Patient war von Kindheit an schwach auf den Beinen, hatte von Kindheit an krumme Beine,

konnte aber früher etwas gehen, seit Jahren aber nicht mehr. Er ist geistig sehr schwach.

Status: Knabe von zwerghaftem Wuchs, Körperlänge ca. 92 cm, bei Berücksichtigung der Verbiegungen der unteren Extremitäten ca. 106—108 cm. Pubes- und Achselhaare etwas schwach entwickelt, was in Berücksichtigung des Alters des Patienten nicht auffallend wäre. Penis ziemlich stark entwickelt, rechter Testis klein, ca. haselnußgroß, linker gut entwickelt. Gesichtsausdruck idiotisch. Keine Struma, keine Drüenschwellungen. Hautfarbe deutlich anämisch. Abdomen aufgetrieben, Leber und Milz nicht palpabel. Fett-

polster und Muskulatur ziemlich schwach. Große motorische Unruhe, die wohl mit dem Geisteszustand des Patienten zusammenhängt. Fußsohlen- und Achillessehnenreflexe sehr lebhaft.

Fig. 30.

Fall 13, 14 Jahre.
Körperlänge ca. 108 cm.

Kopf wenig verändert, die Tubera frontalia und parietalia treten nicht besonders hervor. Gaumen stark gewölbt, Oberkiefer vollkommen zahnlos, am Unterkiefer nur zwei rudimentäre, laterale Schneidezähne. Zunge dick. Claviculae stark gekrümmt. Thorax etwas deformiert, rechts stärker gewölbt wie links, untere Thoraxapertur sehr weit. Deutlicher rachitischer Rosenkranz. Thorax weich, komprimierbar. Wirbelsäule stark verbogen, rechts-konvexe Kyphoskoliose. Der ganze Thorax ist stark auf das Becken gesunken. Linker Oberarm ziemlich gerade, rechter etwas gebogen. Beide Vorderarme deutlich bogenförmig, aber in mäßigem Grade, verkrümmt, mit Konvexität auf der Streckseite. Die Handgelenksepiphysen ziemlich stark

nach vorn und außen gebogen. Die Tibiae zeigen im mittleren Abschnitt eine sehr starke Biegung mit vorderem Scheitel. Der untere Tibiaabschnitt ist außerdem nach außen abgebogen und nach außen rotiert, das letztere rechts stärker als links. Die Verbiegungen der Beine sind so hochgradig, daß es schwer ist, sich über die Verhältnisse am Knie zu orientieren, da die ganzen Beine nur aus Verbiegungen bestehen. Die Knöchel sind deutlich verdickt. Alle Knochen, namentlich Sternum, Rippen und Scapulae sind auf Druck empfindlich, eine genaue Prüfung ist beim Geisteszustand des Patienten nicht möglich.

Röntgenbilder (rechtes Knie, rechte Knöchelgegend, rechte Hand):

Rechtes Knie (Tafel XIX, Fig. 57): Alle Knochen äußerst atrophisch, eine eigentliche Corticalis ist an Femur, Tibia und Fibula kaum mehr zu erkennen, der ganze Knochen besteht aus einem unregelmäßigen, wirren, sehr groben Netzwerk von Knochenbälkchen. Die Epiphysenscheibe des Femur ist schwer nachzuweisen, an ihrer Stelle ist eine ca. 1 cm breite, sehr strukturarme, stellenweise fast strukturlose Zone zu erkennen. Die Epiphysenscheibe der Tibia ist bedeutend deutlicher an der ziemlich scharf gezeichneten Basallinie zu erkennen, an die sich diaphysenwärts eine ca. 1 cm breite, strukturlose, zum Teil helle Zone anschließt. An der Fibula ist ein sehr deutlicher, heller, strukturloser Epiphysenknorpel zu erkennen, der sich mit einer breiten Zunge in die Diaphyse hinein erstreckt; er mißt am Rande 1 cm, in der Mitte $1\frac{1}{2}$ cm Breite. Die Fibula gibt nur einen schwachen Schatten.

Rechte Knöchelgegend (Tafel XIX, Fig. 58): Alle Knochen äußerst atrophisch, wie in der Kniegegend, die Tibia ist an ihrer starken Biegungsstelle stark umgebaut, gibt hier einen stärkeren Schatten. Der untere Tibiaepiphysenknorpel ist ziemlich deutlich zu sehen, gegen die Diaphyse zu stark verwaschen, $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ cm breit. Der untere Epiphysenknorpel der Fibula ist fast 1 cm breit, nach der Diaphyse zu stark verwaschen, das untere Fibulaende becherförmig erweitert. Keine Verkalkungslinien.

Linke Hand (Tafel XIX, Fig. 59): Hochgradige Knochenatrophie. Epiphysenfugen des Radius und namentlich der Ulna deutlich als $\frac{3}{4}$ —1 cm breite, helle, strukturlose Zone zu erkennen, die gegen die Diaphyse zu sehr unscharf und verwaschen begrenzt ist. Die Diaphysenden becherförmig erweitert.

Diagnose: Spätrachitis, Kyphoskoliose, hochgradigste Verbiegungen der unteren Extremitäten, Idiotie.

Fall 14. (Fig. 31 u. Tafel XX.)

F., Karl, $16\frac{1}{2}$ Jahr.

Anamnese: Beide Eltern sollen gesund sein. Der Knabe ist der vierte von neun Geschwistern, von denen drei im Alter von 1—9 Jahren an akuten Krankheiten gestorben sind. Über Lues der Eltern ist nichts bekannt. Die überlebenden Kinder, mit Ausnahme des Patienten, sehen alle sehr kräftig, gut gebildet und gesund aus, die Brüder (mehrere) sind alle militärpflichtig. Der Knabe wurde nach Angabe der Mutter 4—6 Wochen zu früh geboren. Er entwickelte sich körperlich sehr langsam, den ersten Zahn bekam er mit 20 Monaten, er lernte weder gehen noch stehen und erst spät sitzen, dabei soll er aber körperlich anscheinend nicht krank gewesen sein. Geistig blieb er außerordentlich stark zurück, lernte nicht sprechen, sondern konnte nur wenige tierische Laute aus-

stoßen. Patient hat nie laufen gelernt. Mit 13 Jahren erlitt der Knabe, als er auf ein Nachtgeschirr gesetzt wurde (ohne gröbere Gewalteinwirkung) eine Fraktur des linken Oberschenkels, die etwas verlangsamt mit Dislokation heilte. In den folgenden Jahren erlitt er zahlreiche Frakturen der unteren Extremitäten und auch einer Clavicula infolge ganz geringfügiger Ursachen, z. B. beim Herausheben aus dem Bade. 10 Frakturen sind sicher festgestellt. Vom 15. Lebensjahre an entwickelten sich sehr hochgradige Verkrüm-

Fig. 31.

Fall 14, 16½ Jahre.

Körperlänge 120—125 cm.

mungen der unteren Extremitäten, die jedenfalls, zum Teil wenigstens, mit schlecht geheilten Frakturen in Zusammenhang zu bringen sind. Die Verkrümmungen wurden so hochgradig, daß die Beine hinderliche Anhängsel des Körpers wurden und fortwährend mit Dekubitalgeschwüren bedeckt waren, die überaus leicht bluteten, weshalb das stärker verkrümmte, rechte Bein zwischen mittlerem und oberem Drittel des Unterschenkels amputiert wurde (Patient war damals 16—17 Jahre alt).

Mit dem 17. Jahre wurde Patient wegen vollständiger Idiotie in einer Pflegeanstalt untergebracht. Seit dieser Zeit erlitt er keine Frakturen mehr, das Skelett hat sich seither vollständig konsolidiert.

Status (unter Zuhilfenahme der vor der Amputation aufgenommenen Photographie): Vollständig idiotischer Knabe, in der körperlichen Entwicklung hochgradig zurückgeblieben, von Körpermaßen, die einem 6—7jährigen Knaben entsprechen würden, Körperlänge ca. 120—125 cm (die später, im 27. Lebensjahre, vorgenommene Messung ergibt höchstens 125 cm, den Krümmungen des linken Beines nach gemessen). Der Thorax ist vorn nur wenig deformiert, Knorpelknochengrenzen der Rippen?, stark ausgeprägte Kyphoskoliose nach rechts, Arme gerade, bedeutende Verdickungen der Handgelenksephysen. Beide Oberschenkel zeigen eine sehr hochgradige Verbiegung der Schäfte mit Konvexität nach vorn und außen, der linke Unterschenkel ist in seiner Mitte fast rechtwinklig nach hinten abgelenkt mit starker Torsion (90 Grad) des unteren Endes nach außen. Der rechte Unterschenkel ist unterhalb der Mitte spitzwinklig nach hinten und außen abgelenkt. Sowohl die oberen, als die unteren Epiphysen der Unterschenkel scheinen sehr plump und verdickt.

Diagnose: Verschleppte Rachitis, Knochenbrüchigkeit; hochgradigste Verkrümmung beider unteren Extremitäten. Idiotie.

Bei der im 27. Lebensjahr des Patienten vorgenommenen Nachuntersuchung in der Pflegeanstalt zeigte sich, daß das Skelett vollständig konsolidiert war. Körperlänge ca. 125 cm. Die Deformitäten haben sich wie in der Fig. 19 erhalten, nur zeigt das rechte Bein einen Amputationsstumpf unterhalb des Knies. Keine Verdickungen der Knorpelknochengrenzen der Rippen, Handgelenksephysen etwas breit, aber nicht mehr knotig verdickt, wie auf dem Bild. Die körperliche Untersuchung ergibt als weitere bemerkenswerte Befunde: Trommelschlägelfinger, die Hoden klein, ungleich, bohnen- bis mandelgroß, Reflexe vorhanden, nicht gesteigert.

Röntgenbild des amputierten Beines: Die Knochen des Unterschenkels geben einen nur wenig intensiveren Schatten als die Weichteile. Die Corticalis zeichnet sich nirgends ab. Die Fibula zeigt eine Infraktion nach Art der Federpose, sie ist in der Umgebung derselben in ihrem Durchmesser stark reduziert. Die unteren Epiphysen von Tibia und Fibula geben einen fast gleichmäßigen Schatten, in dem die Epiphysenknorpel nicht zu erkennen sind.

Der Knochen läßt sich wie morsches Holz aufsagen.

Mikroskopische Untersuchung: Querschnitt durch den Tibiaschaft (Tafel XX, Fig. 60 u. 61): Die Corticalis der Tibia ist außerordentlich atrophisch, sie bildet keine kontinuierliche, kompakte Knochenschicht, sondern setzt sich aus mit-

einander anastomosierenden, durch weite Markräume getrennte Knochenbälkchen zusammen, deren Anordnung man etwa mit den Schriftzügen der hebräischen Druckschrift vergleichen könnte. Diese kortikalen Bälkchen bestehen aus lamellösem Knochen und sind verkalkt, bis auf relativ schmale kalklose Säume. Diese messen durchschnittlich $10-23\mu$ Breite, doch sind an der periostalen Fläche stellenweise kalklose Säume bis zu 200μ Breite vorhanden. Die kalklosen Säume sind größtenteils mit sehr gut gebildeten Osteoblasten besetzt. Die lakunäre Resorption durch Osteoklasten ist nicht vermehrt, Osteoklasten sind am lamellösen Knochen in normaler Zahl anzutreffen. Die Kittlinien sind in den Knochenbälkchen sehr zahlreich und nahe aneinander liegend, auch die neuesten Anlagerungssysteme, d. h. die zwischen der Knochenoberfläche und der nächsten Kittlinie gelegenen Knochenlagen sind überall schmal und größtenteils kalklos. Außer diesem durchweg lamellös gebauten Knochen finden sich in den peripheren Teilen des Markraumes, wo das Knochenmark fibrös ist, ein lockeres Netzwerk von sehr viel schmäleren Knochenbälkchen von geflechtartigem Bau, deren Entstehung zwischen Osteoblastenhäufen im fibrösen Mark überall zu verfolgen ist. Die geflechtartigen Knochenbälkchen sind zum Teil im Zentrum verkalkt, zum Teil kalklos. Das Knochenmark besteht im Zentrum des Knochen-schaftes aus Fettmark und ist hier nur von einzelnen Inseln und Zügen von fibrösem Mark durchsetzt, die periphere, der Corticalis benachbarte Schicht des Knochenmarkes zeigt fibröses Mark und ist von zahlreichen, sehr weiten Blutgefäßen durchzogen und enthält stellenweise kleine Blutungen. Das Periost ist stark verdickt, es enthält auf $\frac{4}{5}$ des Umfangs der Tibia ein Netzwerk von geflechtartigen Knochenbälkchen, eine Osteophytenlage von $1-3$ mm Dicke, die an einer Stelle durch einen Bluterguß abgehoben und dadurch an dieser Stelle geborsten ist.

Frontaler Längsschnitt durch die unteren Epiphysen von Tibia und Fibula (Tafel XX, Fig. 62): An Stelle der Epiphysenscheiben der Tibia und Fibula findet sich eine mächtige Knorpelwucherung, die sich aus zahlreichen Bändern und Inseln zusammensetzt, an deren gegen die Diaphyse zugekehrten Rändern ganz selten kleine Herde von verkalkter Knorpelgrundsubstanz und stellenweise Andeutungen von enchondraler Ossifikation wahrzunehmen sind. Die Knorpelmasse nimmt an der Tibia in der Längsrichtung eine Breite von 2 cm ein. Die Epiphyse ist sehr niedrig. Der kortikale und der spongiöse Knochen sind äußerst atrophisch und verhalten sich im feineren Bau wie der Knochen des Tibiaquerschnitts.

Längsschnitt durch die Basis des Os metatarsale I (Tafel XX, Fig. 63 u. 64): Der Epiphysenknorpel der Basis des Knochens verläuft wellig und zeigt drei kissenförmige Verdickun-

gen von 1—2,5 mm Dicke. Die Zellsäulen sind in diesen Verdickungen unregelmäßig, verlängert, die hypertrophische Knorpelschicht verbreitert; gegen den Markraum zu setzt sich der Knorpel in etwas unregelmäßige, breite, nicht sehr lange Pfeiler fort, deren Spitzen unregelmäßige Inseln von verkalkter Knorpelgrundsubstanz enthalten. Die vorläufige Verkalkungszone des Knorpels bildet dadurch eine diskontinuierliche Schicht, die durch die unregelmäßigen und breiten primären Markräume überall durchbrochen wird. An die Pfeiler schließen sich außerordentlich spärliche, sehr schmale, glattrandige Knochenbälkchen ohne Lamellenstreifung an, die aber gegen die Diaphyse zu sehr rasch lamellöse Struktur annehmen. Diese Bälkchen sind in der nächsten Umgebung der Ossifikationszone fast durchweg kalklos, aber schon in geringer Entfernung von derselben zentral verkalkt und zeigen hier osteoide Säume von 10—23 μ Breite. Alle Knochenbälkchen zeigen fast durchweg Osteoblastenbesatz. Der periostale Knochen ist äußerst atrophisch, nur Bruchteile eines Millimeters breit, von entsprechendem Bau wie die Corticalis der Tibia, es fehlen aber hier die periostalen und myelogenen Bälkchen von geflechtartigem Bau (Osteophyten). Das Mark besteht aus Fettmark, dem nur spärliche Lymphocyten eingestreut sind, in der Nähe der Ossifikationszone ist es reich an Spindelzellen. Es enthält zahlreiche, äußerst weite, dünnwandige Gefäße.

Fall 15. (Fig. 32 u. Tafel XXI—XXIV.)

S., Martha, 20 Jahre.

Anamnese (August 1917): Großvater mütterlicherseits an Lungentuberkulose, ein Bruder des Vaters an Bauchfelltuberkulose gestorben. Eltern und zwei Brüder sind gesund. Patientin ist das zweite Kind, beide Brüder sind von normaler Größe. Patientin ist einige Wochen zu früh geboren, sie wog bei der Geburt nur 5 Pfund, sie wurde künstlich ernährt mit Kuhmilch, später mit Nestlémehl und Milch mit Kalkwasser. Patientin war von Geburt an schwächlich, von der 5. Woche an soll der Arzt gesagt haben, das Kind sei rachitisch. Sie litt von früher Jugend an an Durchfällen. Mit einem Jahr konnte sie noch nicht sitzen, kaum den Kopf heben. Das Kind kam mit einem Jahr in eine Heilstätte für rachitische und skrofulöse Kinder, wo mangelhafte körperliche Entwicklung, rachitischer Rosenkranz und Verkrümmungen der Unterschenkel festgestellt und von ärztlicher Seite die Diagnose auf Rachitis gestellt wurde. Bei der Aufnahme mit 1 Jahr betrug die Körperlänge 65 cm, das Körpergewicht 6600 g. Das Kind wurde mit Freiluft-Liegekur, Lebertran und Hämatogen behandelt. Mit einem Jahr sollen die unteren Schneidezähne durchgebrochen sein, mit 3½ Jahren waren alle Zähne vorhanden. Im 2., 3. und 4. Lebensjahr machte Patientin mehrere Krankheiten durch, Masern, Keuchhusten, Diphtherie, Skorbut, Bronchitis und exsudative Pleuritis, sie litt auch öfter an Diar-

rhöen. Erst mit $2\frac{1}{2}$ Jahren machte sie die ersten Gehversuche, mit 3 Jahren konnte sie gehen, sie konnte frei nur mit Vorsicht gehen und nicht springen, meist ging sie nur an den Wänden entlang oder an einen Stuhl gestützt. Nach Angabe der Mutter dauerte das Gehen nur ca. $\frac{1}{2}$ Jahr, nach einem Fall bekam Patientin Schmerzen in einem Schienbein und mußte deshalb liegen. Sie kam seither nie mehr richtig zum Gehen, sie konnte sich nur an Stühle gestützt fort-

Fig. 32.

Fall 15, 20 Jahre.
Körperlänge ca. 104 cm.

schleppen. Beim Stehen und Gehen hatte sie aber immer Schmerzen in den Beinen und im Rücken. Auch das Sitzen machte Müdigkeit und Schmerzen im Rücken, so daß Patientin fast immer liegen mußte. Im Alter von $6-7\frac{1}{2}$ Jahren war Patientin dann wegen Bauchfelltuberkulose in Behandlung in zwei Krankenanstalten (Kinderspital und Heilstätte für rachitische Kinder). Mit 8 Jahren kam sie noch einmal in letztgenannte Anstalt, in welcher sie insgesamt gegen 5 Jahre mit Unterbrechungen verbracht hat, wegen Diarrhöe, Anämie, Unvermögen zu gehen. Die körperliche Entwicklung und das Wachstum gingen äußerst langsam vor sich, was schon aus der sehr geringen Körpergröße der Patientin deutlich hervorgeht. Die Körperlänge betrug mit 1 Jahr 65 cm, mit $3\frac{1}{2}$ Jahren 92 cm, mit 7 Jahren 103 cm, mit $9\frac{1}{2}$ Jahren 110 cm. Etwa seit dem 13. Jahre haben sich langsam stärkere Verkrümmungen der Beine ent-

wickelt, wohl zum Teil durch das Stehen, wie die Mutter angibt, zum Teil auch spontan im Bett. Im Alter von 15 Jahren fiel Patientin und brach das rechte Schienbein, der Bruch heilte in einigen Wochen, Patientin konnte aber seither gar nicht mehr auf den Beinen stehen. Vor ca. 1 Jahr steigerten sich die Schmerzen der Patientin stark. Beim Heben im Bett und bei Bewegungen hatte sie starke Schmerzen in den Armen und in den

Beinen, namentlich in den Knien und in den Schienbeinen, auch nachts hatte Patientin oft Schmerzen. Sie hat zeitweise viel geschwitzt, mit der Verdauung hat sie von frühester Kindheit an viel Last gehabt, sie litt sehr viel an Durchfällen bis zum heutigen Tage.

Status: Im Wachstum und in der Entwicklung hochgradig zurückgebliebenes Mädchen, das trotz seiner 20 Jahre den Eindruck eines 6—7jährigen Kindes macht. Der Kopf im Vergleich zum Körper relativ groß. Alle Körperteile, Brust, Extremitäten, Hände und Füße von infantilen Dimensionen, Länge des Fußes von der Ferse bis zur Spitze der Großzehe 16 cm. Die Körperlänge geträgt vom Scheitel zur Fußsohle, geradlinig gemessen, ohne Berücksichtigung der Beinverkrümmungen, 104 cm. Muskulatur und Fettpolster sehr atrophisch. Der Habitus ist ein vollkommen kindlicher. Brüste vollkommen unentwickelt, Genitalien kindlich, keine Andeutung von Körperbehaarung, keine Menstruation. Aussehen blaß, anämisch, Hämoglobingehalt des Blutes 25 Proz., fleckige Pigmentierungen im Gesicht. Keine Exantheme und Drüenschwellungen. Schilddrüse deutlich vergrößert, im linken Lappen nußgroß, im rechten noch größerer, harter, kolloider Knoten.

Kopf o. B. Die Tubera frontalia und parietalia treten nicht besonders vor, Zähne regelmäßig, an den Schneidezähnen Schmelzdefekte am freien Rande (rachitischer Typus). Auf beiden Seiten des Ober- und Unterkiefers ist nur je 1 Prämolargahn vorhanden (je einer ist retiniert). Gaumen etwas stark gewölbt, Claviculae stark S-förmig gekrümmt. Der Thorax ist nicht stark deformiert, nur in seiner unteren Apertur stark erweitert wegen der starken Auftreibung des Leibes. Sehr ausgesprochener, sogar sichtbarer rachitischer Rosenkranz. Oberarme ziemlich gerade, nur der rechte leicht nach außen verbogen. Vorderarme stark gekrümmt, zeigen im distalen Drittel starke volare und radiale Abknickung (Madelungsche Handdeformität). Die Handgelenke sind stark verdickt. Hände sehr klein, Finger schlank und spitz. Becken hochgradig deformiert, die Symphyse springt stark vor. Beide Femora hochgradig bogenförmig verkrümmt mit Konvexität nach vorn und außen, sie springen aus der atrophischen Muskelmasse stark hervor, der linke Oberschenkel in der Mitte leicht geknickt. Die Epiphysen der Kniegegend, die Kondylen der Femora und die Tibiaköpfe zeichnen sich in den atrophischen Weichteilen äußerst scharf ab, sie erscheinen im Vergleich zu den relativ dünnen Femurschäften sehr breit. Die Tibiae hochgradig säbelscheidenförmig verkrümmt und das untere Ende etwas nach außen abgebogen. Knöchel verdickt. Füße klein, grazil, leichte kolbige Verdickung der Endphalangen der Zehen (Trommelschlägelzehen). Wirbelsäule stark verkrümmt, thorakaler Teil flach, starke Linksskoliose der Lendenwirbelsäule, der Thorax ist dadurch stark auf das Becken gesenkt. Alle Knochen sind auf Druck mehr

oder weniger empfindlich, das Becken stark, Brustkorb ziemlich stark, Oberschenkel, Unterschenkel und Fuß mäßig, Vorderarme und Wirbelsäule etwas und Oberarme nur sehr wenig empfindlich. Die Knickungsstellen an den Vorderarmknochen sind merklich empfindlicher als der übrige Teil der Vorderarmknochen. Diese Knickungsstellen zeigen auch noch eine deutliche federnde Biegsamkeit.

Abdomen sehr stark aufgetrieben, kleine Nabelhernie, Milz nicht palpabel, große Neigung zu Durchfällen.

Röntgenbilder (sämtliche Knochen):

Alle Knochen zeigen einen sehr hohen Grad von Atrophie, am reinsten zeigt sich diese am Skelett der Hand und des Fußes, während alle anderen Knochen, mehr oder weniger, sekundäre Veränderungen zeigen in Form von stellenweiser, sekundärer Verdichtung der Knochenstruktur an Stellen alter Frakturen, Infraktionen oder Verbiegungen. Die Metacarpalia, Metatarsalia und Phalangen (Tafel XXIV, Fig. 70, 72) zeigen nur eine strichförmige Corticalis und eine auf die Epiphysengegenden beschränkte, äußerst spärliche und äußerst dünne, spinnwebartige Spongiosa. Alle Knochenschäfte, auch die der langen Knochen, sind relativ schlank und dünn, die Epiphysen im Vergleich zu ihnen aufgetrieben. Der rechte Oberarm zeigt eine Infraktion im unteren Drittel mit sehr deutlicher, unregelmäßiger Spalte im Knochen. Radius und Ulna zeigen sowohl rechts als auch links je eine Infraktion älteren Datums (Tafel XXIII, Fig. 68, 69). Man erkennt bei allen Infraktionen eine schmale, am rechten Radius aber 3 mm breite, quere Aufhellung der Knochenstruktur. Der Knochen sieht hier, namentlich auf der Platte, aus, wie wenn seine Struktur quer ausradiert worden wäre. Daneben ist bei allen Infraktionen an den Vorderarmknochen eine leichte Callusbildung zu erkennen, in Form von deutlichen, schattengebenden, periostalen Auflagerungen auf der konkaven Seite des an der Infraktionsstelle verbogenen Knochens. Die distalen Enden von Radius und Ulna becherförmig ausgeweitet, die Gegend der Epiphysenknorpel und die Epiphysen sehr verwaschen, lassen aber auf den meisten Bildern einen stark verbreiterten und gegen die Diaphyse unscharf begrenzten Epiphysenknorpel erkennen. Alle Epiphysenknorpel sind ziemlich schwer zu erkennen, da der Durchlässigkeitsunterschied zwischen den Epiphysenknorpeln und den äußerst atrophischen Knochen kaum mehr besteht. Deshalb sind die Epiphysenknorpel nur an einzelnen und nur an gut gelungenen Bildern mit Deutlichkeit nachzuweisen, so z. B. an einer der Aufnahmen des linken Knies von der Seite, wo die Epiphysenknorpel von Femur und Tibia als sehr verwaschene Bänder von $\frac{3}{4}$ —1 cm Breite deutlich zu erkennen sind. An den Epiphysenknorpel des Femur schließt sich eine 2—2½ cm breite, strukturlose Zone an, an diejenige der Tibia eine fast ebenso breite. Die rechte Tibia (Tafel XXII, Fig. 66) zeigt in ihrer Mitte eine leichte Knickung,

an dieser Stelle ist ihr Schatten in einer Breite von 3 mm quer unterbrochen, diese Biegungsstelle wird durch eine der konkaven Seite angelagerte, ca. 5 mm breite, mäßig verkalkte Osteophytenschicht zusammengehalten. Die linke Tibia (Tafel XXII, Fig. 67) zeigt an genau derselben Stelle des Knochenschaftes ein älteres Stadium derselben Veränderung. An Stelle der queren Aufhellung eine quere Verdichtung (verkalkter myelogener Callus). Die Hinterwand der Tibia ist auch hier durch eine die konkave Seite der Biegungsstelle ausfüllende Osteophytenschicht lokal verstärkt. Oberhalb und unterhalb dieser alten Biegungsstelle je zwei kleine, ganz lokale Infraktionen der konvexen Seite des Knochenschaftes in Form von ganz kleinen, lokalen, die äußeren Schichten der ca. 2 mm dicken Corticalis betreffenden Unterbrechungen. Beide Fibulae (Tafel XXII, Fig. 66, 67) zeigen je eine Infraktion nach Art der Federpose, wodurch sie beide auf lange Strecken außerordentlich verdünnt sind. Beide Oberschenkel sind am unteren Ende hirschenstabförmig verkrümmt, sie zeigen an mehreren Stellen Infraktionen.

Das Becken ist für Röntgenstrahlen sehr durchlässig, zeigt hochgradigste Kartenherzform (Tafel XXI, Fig. 65).

Diagnose: Spätrachitis (verschleppte Rachitis), hochgradige Verkrümmung der Extremitäten, zum Teil durch Infraktionen der Knochen.

2. Übergangsfälle.

Fall 16. (Fig. 33 u. Tafel XXV—XXVII.)

H., Julie, 29 Jahre.

Anamnese (September 1917): Vater an Herzlähmung gestorben, Mutter lebt und ist gesund. Die Mutter hat 13mal geboren, 8 Kinder starben im Alter von 14 Tagen bis 3 Jahren an unbekannten Krankheiten (einmal Diphtherie), 5 Geschwister leben noch, Patientin ist die vierte von den lebenden. Die Geschwister sind von normaler Größe, ein Bruder schwächlich, eine Schwester herzleidend nach Gelenkrheumatismus. Patientin lernte mit 1½ Jahren laufen, konnte immer gut gehen, mit 7 Jahren kam sie in die Schule, sie gehörte in der Schule eher zu den Größeren, konnte alles mitmachen, was die anderen Kinder taten. Sie nahm auch am Turnunterricht teil ohne jegliche Beschwerden. Als Patientin mit 13 Jahren aus der Schule kam, half sie in einer Pension im Zimmerdienst. Mit 14 Jahren kam sie in die Lehre zu einer Schneiderin. Sie ermüdete aber bei der Arbeit so stark, daß sie die Arbeit aufgeben mußte. Ihrer Lehrmeisterin war es aufgefallen, daß sie einen häßlichen, watschelnden Gang, „wie eine Ente“ bekam, Patientin merkte es selber aber nicht. Nur konnte sie nicht viel gehen, da sie sehr rasch ermüdete. Mit 16 Jahren wurde Patientin menstruiert und hatte seither die Periode regelmäßig und in gewöhnlicher In-

tensität bis zur Ovariectomie im Jahre 1916. In den ersten Jahren der Erkrankung hatte Patientin oft um die Zeit der Periode Schmerzen in den Beinen. Erst mit dem 16. Jahre begannen bei der Patientin intensivere Beschwerden, sie fühlte sich sehr schwach in den Knien und unsicher, sie konnte nicht gut im Abwärtsgehen innehalten und sank manchmal in die Knie. Auch zum Treppen auf- und abgehen hatte Patientin keine Kraft. Sie wurde nach und nach immer schwächer. Erst gegen das 18. Jahr bekam Patientin Schmerzen, und zwar in den Rippen und in der Kreuz- und Lenden-

Fig. 33.

Fall 16, 29 Jahre.

Körperlänge ca. 128 cm.

gegend. Patientin kam in ein Asyl, wo ihr Leiden als Hüftgelenkentzündung angesehen und durch Soolbäder behandelt wurde.

Vom 18. Jahr an konnte Patientin nur noch mit Stöcken und bald nur noch mit Krücken gehen. Später bekam Patientin auch einen krummen Rücken und einen vorn stark vorspringenden Brustkasten.

Vom 18. bis 21. Jahr ging Patientin an Krücken, später konnte sie überhaupt nicht mehr gehen.

Mit 23 Jahren wurde sie in einem Krankenhaus mit Röntgenstrahlen bestrahlt, wodurch die Tätigkeit der Ovarien ausgeschaltet werden sollte, die Periode verschwand aber nicht. Über spontane Schmerzen hatte Patientin sich nicht zu beklagen, doch waren seit dem 18. Jahre alle Knochen auf Berührung und Druck empfindlich. Mit 25 Jahren kam Patientin in eine orthopädische Anstalt, wo sie Salzbäder und $\frac{1}{2}$ Jahr Phosphorlebertran in kleinen Dosen

(0,01:100, 2mal täglich 10 cm) erhielt. Die Behandlung war ohne wesentlichen Erfolg. Außerdem wurden die Beine in Extension gelegt. Der Zustand blieb immer ungefähr gleich. Am 23.IX. 1916 wurde die doppelseitige Ovariectomie ausgeführt, seither fühlt sich Patientin besser, sie hat beim Aufsitzen weniger Schmerzen wie früher.

Status: Patientin macht im ganzen Habitus und Körperbau den Eindruck eines Kindes. Dimensionen des Thorax und der Extremitäten infantil. Länge des Fußes von der Ferse bis zur Spitze

der Großzehe 21 cm, Körperlänge, ohne Berücksichtigung der Knochenverbiegungen, 128 cm. Aussehen leicht anämisch. Innere Organe o. B. Abdomen leicht aufgetrieben, Leber und Milz nicht palpabel. Mediane Narbe unterhalb des Nabels. Muskulatur des ganzen Körpers atrophisch und schlaff.

Kopf o. B. Tubera frontalia und parietalia treten nicht besonders vor, Kopf- und Gesichtsknochen nicht druckempfindlich, Gaumen hoch, abnorm stark gewölbt, Zähne regelmäßig, es fehlen eine Anzahl, die übrigen zeigen leichte Caries. Claviculae gestreckt, eher weniger geschwungen als normal. Thorax ziemlich stark deform, unterer Umfang weit, Rippen rechts stärker gewölbt als links, weich, sehr biegsam, mäßiger Druck nicht schmerzhaft. Das Sternum zeigt unterhalb des Manubrium eine muldenförmige Einsenkung. Knorpel-Knochengrenzen der Rippen deutlich verdickt, namentlich an der 7. und 8. Rippe. Kompression des sehr elastischen Thorax etwas empfindlich. Das Becken auffallend klein, zeigt schon bei der äußeren Palpation ein starkes Vorspringen der Symphyse (Schnabelbecken), die Beckenschaufeln lassen sich seitlich stark zusammendrücken, federn sehr stark, Schmerzen dabei ganz unbedeutend.

Humeri gerade, starker Cubitus valgus, Radius und Ulna bis auf das äußerste distale Ende gerade. Beide Handgelenke zeigen einen hohen Grad von Madelungscher Deformität. Linke Hand: Die Radiusepiphyse zeigt gegen den Schaft eine starke winklige Abknickung nach volar und radial. Auch das distale Ende der Ulna ist etwas in dieser Richtung abgeknickt, aber weniger wie der Radius, es steht infolgedessen abnorm stark vor. Infolge dieser Abknickung des unteren Radiusendes steht die Hand in Bajonettstellung zum Vorderarm. Die rechte Hand zeigt die gleiche Deformität wie die linke, nur ist die Abknickung der Radiusepiphyse etwas weniger scharf. Diese Handdeformitäten sind nach Angabe der Patientin ganz langsam und spontan entstanden, ohne Gewalteinwirkung. Die Knickungsstelle beider Radii ist auf Druck empfindlich und federt sehr deutlich. Hände schmal, Finger dünn, Gelenke sehr biegsam, lassen sich leicht überstrecken.

Beide Femurschäfte annähernd gerade, ausgesprochenes Genu valgum und leichte Bajonettstellung beider Knie infolge einer Abbiegung der unteren Femurepiphyse nach hinten. Die inneren Kondylen der Femora springen stark vor. Unterschenkel annähernd gerade, im unteren Drittel nur leicht nach einwärts gebogen. Knöchel etwas plump. Am rechten unteren Fibulaende fühlt man etwa handbreit oberhalb der Fibulaspitze eine leichte Einknickung in der Kontur der Fibula. Das distale, an die Knickung anschließende, Fibulastück ist leicht nach außen disloziert, es läßt sich nur ca. 3 cm weit verfolgen, geht dann in eine leicht eingesunkene, mehrere Zentimeter

lange Stelle von ziemlich harter Konsistenz über, an die sich dann die etwas mehr prominierende Spitze des Malleolus anschließt. Die leicht eingesunkene Partie an der Fibula ist deutlich federnd und leicht druckempfindlich (s. Röntgenbild, Tafel XXVII, Fig. 70—80). Füße normal. Die Wirbelsäule zeigt im Brustteil eine hochgradige Kyphose und leichte Linksskoliose, die Lendenlordose ist abnorm stark ausgebildet. Der Brustkorb ist sehr stark auf das Becken herabgesunken, so daß die Rippen das Becken berühren. Brustbein und Becken auf Druck kaum empfindlich, die Scapulae dagegen ziemlich stark.

Reflexe: Patellarreflexe etwas gesteigert, namentlich der linke, Fußsohlenreflexe normal, kein Babinski. Bauchdeckenreflex sehr lebhaft, gesteigert. Periostreflex am Vorderarm sehr lebhaft, gesteigert.

Röntgenbilder (beide Knie, beide Handgelenke, beide Knöchelgelenken):

Von den beiden Handgelenken existieren Röntgenbilder vom September 1915 und September 1917. Die zweite Aufnahme ist also 1 Jahr nach der Kastration aufgenommen. Die Bilder von 1915 zeigen folgende Veränderungen:

Linkes Handgelenk (Tafel XXVI, Fig. 74): Hochgradige Atrophie der Knochen, die sich relativ schwach gegen die Weichteile abheben. Die Atrophie ist namentlich an den Epiphysen, den Handwurzelknochen und den Metacarpalia stark ausgesprochen, die Ulna hat noch eine relativ ordentliche, kompakt erscheinende Corticalis. Der Radius zeigt eine Abknickung radialwärts im äußersten Ende der Diaphyse. An dieser Stelle ist die Corticalis mehrfach unterbrochen und der ganze Knochen an der Biegungsstelle in einer Breite von $\frac{1}{2}$ bis 1 cm sehr deutlich aufgehellt. Die Aufhellung macht den Eindruck, wie wenn die Knochenstruktur im Bilde ausradiert worden wäre. Die Epiphysenfuge des Radius ist nicht zu erkennen, dagegen sehr deutlich diejenige der Ulna, sie mißt ca. 8 mm, mit der anschließenden strukturlosen, fleckig verwaschenen Zone über 12 mm. Auch die Epiphysenfuge am Os metacarpale I ist noch zu erkennen.

Rechtes Handgelenk (Tafel XXVI, Fig. 76): Verhältnisse im ganzen wie rechts. Die Radiusepiphyse am distalen Ende der Diaphyse radialwärts abgebogen. An der Biegungsstelle quere, 1 cm breite, unregelmäßig begrenzte und etwas unscharfe Aufhellung des ganzen Knochenschattens, die Ulnaepiphysenscheibe ca. 1 cm breit, mit der fleckig verwachsenen osteoiden Zone zusammen ca. $1\frac{1}{2}$ cm. Auch das Ulnaköpfchen ist etwas radial abgebogen.

Die Bilder vom September 1917 (Tafel XXVI, Fig. 75 u. 77) zeigen fast genau die gleichen Verhältnisse wie 1915. Die Knochenatrophie ist die gleiche, sie hat sogar noch etwas zugenommen. Der einzige Unterschied in den Bildern besteht darin, daß 1917 die Ab-

biegung der Radii und der Ulnaköpfchen radialwärts ein wenig zugenommen hat und die Epiphysenfugen der Ulnae sich um einige Millimeter verschmälert haben. Die quere Aufhellung an der Abbiegungsstelle der Radii ist genau wie auf den Bildern von 1915 vorhanden. Überhaupt ist die Übereinstimmung der Bilder von 1915 und 1917 bis in die Details eine so außerordentlich große, daß es schwer fällt, sie ohne Bezeichnung voneinander zu unterscheiden.

Linke Hand von 1917: Außerordentliche Atrophie der Knochen. Die Metacarpale und Phalangen zeigen keine Corticalis mehr, der ganze Knochen äußerst durchlässig, zeigt nur eine gleichmäßige, schwache Zeichnung. Metacarpale und Phalangen des Daumens ziemlich stark verbogen, auch mehrere andere Metacarpalia und Phalangen zeigen leichte Verbiegungen.

Linkes Knie von 1917 (Tafel XXV, Fig. 73): Hochgradigste Knochenatrophie. Die Knochen heben sich kaum von den Weichteilen ab, die Epiphysen zeigen überhaupt keine Knochenstruktur. Am linken Knie ist die Femurepiphyse gegen den Schaft stark nach lateral abgebogen, die Fibula zeigt nahe am Köpfchen eine Infraktion mit ziemlich starker Abknickung. Am rechten Knie ganz ähnliche Verhältnisse.

Becken: Hochgradige Atrophie des Knochens und sehr ausgesprochene Kartenherzform des Beckens.

Von der rechten Knöchelgegend existieren Bilder vom Dezember 1913, September 1914 und Oktober 1917 (Tafel XXVII, Fig. 78—80). 1913 wurde die rechte Knöchelgegend röntgenographisch aufgenommen, da Patientin Schmerzen in der Gegend des rechten äußeren Knöchels hatte. Es fand sich außer der hochgradigen, allgemeinen Knochenatrophie ein eigenartiger Befund am unteren Fibulaende. Ca. 8 cm oberhalb der Spitze des Malleolus externus hört der Fibula-schaft plötzlich mit einer etwas zackigen, schrägen Linie auf. Von dem distalen Fibulaabschnitt ist im unmittelbaren Anschluß an diese Bruchfläche nur noch ein ca. 3 cm langes Stück der lateralen Corticalis erhalten, das abgebrochen und etwas nach lateral disloziert ist, vom übrigen Fibulaumfang sind in dieser Höhe nur noch einige feine, spinnwebartige Stränge zu sehen. Weiter distal folgt eine ca. $2\frac{1}{2}$ cm lange, vollkommen schattenlose Lücke und zu unterst, mit ganz unscharfer Grenze, die ca. $2\frac{1}{2}$ cm hohe Spitze des Malleolus. Die nachträglich vervollständigte Anamnese ergab, daß Patientin 1904, also im Alter von 14 Jahren, einen Schlag gegen den äußeren Malleolus erhalten hatte und seither an Schmerzen in dieser Gegend litt. Ein im Jahre 1905 aufgenommenes Röntgenbild dieser Gegend, von dem leider nur noch ein vergilbter Abzug aufzutreiben war, zeigt, daß es sich ursprünglich um eine doppelte Infraktion der Fibula handelte, an genau derselben Stelle, an der später der beschriebene eigenartige Röntgenbefund sich findet. Auf dem Rönt-

genbild von 1905 ist die Fibula noch in ganzer Länge kontinuierlich zu verfolgen, jedoch ist schon auf diesem Bilde der Knochenteil, der auf den späteren Bildern vollständig ausgefallen ist, etwas unscharf und verwaschen. Außer diesen lokalen Veränderungen zeigt das Röntgenbild von 1905 die sehr deutlichen und typischen Veränderungen der Spätrachitis, eine mäßige Atrophie des Knochens in Corticalis und Spongiosa und eine starke, unregelmäßige Verbreiterung des Epiphysenknorpels der Tibia, dieser mißt $\frac{3}{4}$ cm. Aus dem Vergleich des Röntgenbildes von 1905 mit den späteren Bildern ergibt sich mit Sicherheit, daß wir es hier mit den Folgen einer traumatischen Einwirkung, einer doppelten Infraktion der Fibula, zu tun haben, im Anschluß an welche einzelne Knochenstücke zur Resorption gekommen sind, und vielleicht durch ein kalkloses Gewebe ersetzt worden sind. Vergleichen wir die in den Jahren 1913, 1914 und 1917 aufgenommenen Bilder der rechten Knöchelgegend miteinander, so ergibt sich auch hier, wie in den Bildern der Handgelenksgegenden von 1914 und 1917, eine bis in die Einzelheiten gehende Übereinstimmung der Bilder, so daß es schwer ist, dieselben ohne genaue Bezeichnung voneinander zu unterscheiden. Der einzige Unterschied dieser drei Bilder besteht in einer deutlich sichtbaren, zunehmenden Atrophie der Weichteile.

Linke Knöchelgegend 1917: Sehr hochgradige Atrophie der Knochen. An der Fibula ist eine 1 cm breite Epiphysenfuge noch deutlich nachweisbar, an der Tibia ist sie nicht zu erkennen, jedoch hört die Corticalis an der Tibia ca. 2 cm von der deutlich erkennbaren Basallinie entfernt auf.

Diagnose: Osteomalacie aus Spätrachitis hervorgegangen, über das 29. Lebensjahr hinaus persistierende, rachitisch verbreiterte Knorpelfugen, hochgradige Deformitäten.

Fall 17. (Fig. 34 u. Tafel XXVIII.)

St., Sophie, 26 Jahre.

Anamnese (12. III. 1918): Patientin lernte mit $1\frac{1}{2}$ Jahren gehen, ob sie als Kind rachitisch war, weiß sie nicht. Sie gehörte in der Schule immer zu den kleineren, konnte aber mit den anderen Kindern alles mitmachen, laufen, springen, spielen usw. Die ersten Beschwerden bekam Patientin mit 15 Jahren: Schmerzen in den Knien und Knöcheln beim Bergabgehen. Patientin bemerkte zu jener Zeit zufällig, daß sie X-Beine hatte. Mit 16 Jahren kam sie in die französische Schweiz in eine Pension als Volontärin, wo sie viel zu tun hatte. Die Arbeit machte ihr große Beschwerden, sie wurde sehr schnell müde und wenn sie lange stehen und gehen mußte, war sie einige Tage lang müde, sie bekam beim Arbeiten auch Schmerzen in den Beinen und Armen. Sie hielt es in dieser Stelle nur 7 Wochen aus und mußte dann wegen zunehmenden Beschwerden nach Hause. Sie wurde damals als rheumatisch behandelt, mit Wicklungen und

Einreibungen der Beine, aber ohne Erfolg. Patientin konnte wegen Leistungsunfähigkeit infolge ihrer Beschwerden keinen Beruf ausüben. Sie fühlte sich nur wohl, wenn sie sitzen konnte, beim Stehen und Gehen hatte sie Schmerzen. Der Zustand wurde von Jahr zu Jahr schlimmer, besonders im Winter, im Sommer fühlte sie sich immer etwas besser. Patientin nahm einige Jahre Soolbäder in Rheinfelden, die ihr gut taten, aber doch keine wesentliche Besserung

Fig. 34.

Fall 17, 26 Jahre.

Körperlänge 144 cm.

brachten. Die X-Beine nahmen immer zu. Mit 21 Jahren (19. III. 1912) wurde Patientin wegen der X-Beine operiert (Osteoklasie beider unteren Oberschenkelenden), die Füße standen damals beim Geradestehen 17 cm auseinander. Patientin lag 3 Wochen, kam dann mit Verbänden nach Hause und ging in der ersten Zeit mit den Verbänden. Das linke Bein heilte gut, im rechten hatte sie aber immer

noch Schmerzen. Dieses Bein hat sich später wieder verbogen, und zwar im Sinne des O-Beines.

Zwei Jahre später (10. XII. 1913), im 23. Lebensjahre der Pat., wurde das verkrümmte rechte Bein abermals operiert (suprakondyläre Osteotomie des rechten Oberschenkels). Die damalige Krankengeschichte (Bürgerspital Basel) bezeichnet die Patientin als „kleines, sehr grazil gebautes Mädchen, von infantilem Habitus und etwas blassem Aussehen. Thorax schmal, Mammae schwach entwickelt, Geschlechtsmerkmale überall schwach“. Patientin lag nach der Osteotomie 11–12 Wochen, danach lernte sie erst langsam wieder laufen, erst 10 Monate nach der Operation konnte sie ohne Stock gehen. Nach der zweiten Operation (23. Lebensjahr) verschlimmerten sich die allgemeinen Beschwerden wesentlich, Pat. bekam Schmerzen im ganzen Skelett, namentlich in der Brust, am Gürtel, in den Hüften, Armen und Beinen. Alle Knochen waren auf Druck und Berührung sehr empfindlich, man durfte Pat. kaum anrühren. Die Knochen sollen sehr weich gewesen sein, die Schlüsselbeine, Rippen und das Brustbein sollen biegsam gewesen sein. In den letzten zwei Jahren und namentlich im letzten Frühjahr verbog sich der Brustkorb, das Brustbein bildete einen starken Winkel nach vorn, Patientin wurde um ca. 10 cm kleiner. Vor einem Jahr war das Leiden am schlimmsten, Patientin konnte kaum allein stehen; wie sie im Bett lag, mußte sie liegen bleiben, sie konnte sich nicht selber drehen. Um Pat. im Bett zu wenden, mußte man am Nachthemd ziehen. Trotz ihres Zustandes war Patientin bei Tag meist auf, saß am Tisch oder in einem Stuhl. Im verflossenen Winter ging es etwas besser, sie konnte sich im Bett selber etwas drehen, aber nur mit großer Mühe und äußerst langsam. — Patientin wurde mit 15½ oder 16 Jahren menstruiert, Periode regelmäßig, sie war immer ohne Einfluß auf die Beschwerden. Seit dem 20. oder 21. Jahre litt Patientin zeitweise, oft wochenlang, an Durchfällen (2–3 Stühle pro Tag), ohne erkennbare Ursache, seit 1 Jahr ist der Stuhl normal, doch kommen auch jetzt noch alle paar Monate Durchfälle von einigen Tagen bis 1–2 Wochen vor. Vor 1 Jahr hatte Patientin einen Ausschlag von großen bis handtellergrößen, schmerzhaften Flecken auf den Beinen mit Fieber. Damals setzte die Periode 2 Monate aus. Seit dem 17. Jahr hatte Patientin oft, zeitweise täglich, zeitweise mit größeren Unterbrechungen, Krämpfe in beiden Händen, sie konnte dann stundenweise die Finger nicht öffnen (Tetanie?). Diese Anfälle kamen im Winter mehr als im Sommer, seit ca. 1 Jahr kamen sie nicht mehr vor. Seit etwa dem 23. Jahr hat Patientin bräunliche Sommersprossen im Gesicht.

Status 12. III. 1918: Kleines, mageres Mädchen, Körpergröße 144 cm, von blassem Aussehen, Muskulatur und Fettpolster schwach entwickelt. Keine Ödeme, keine Drüsenschwellungen. Im

Gesicht, an Stirn, Wangen, Lippen fleckige Pigmentationen, die sich aus Gruppen von bräunlichen Sommersprossen zusammensetzen. Hals schlank, Schilddrüsengegend flach, eher eingesunken, der rechte Schilddrüsenlappen als kleine, körnige Masse eben zu fühlen, linker Lappen nicht palpabel, Schilddrüse auf keinen Fall vergrößert. Abdomen leicht gewölbt, nicht aufgetrieben, Milz nicht palpabel. Innere Organe o. B. Appetit gut, täglich 1 Stuhl. Periode regelmäßig. Allgemeine Körperentwicklung hypoplastisch, Behaarung des Mons veneris etwas schwach, auch Achselhöhlen schwach behaart. Mammæ klein und flach, deutlicher, flacher Drüsenkörper; 6 cm unterhalb und etwas medial von der linken Mamilla kleine akzessorische Brustwarze.

Die Tubera frontalia und parietalia treten nur wenig mehr vor als normal. Gaumen etwas stark gewölbt, Zähne fehlen am Unterkiefer ganz, am Oberkiefer stehen nur die Eckzähne und wenige Reste der Molaren. Die Eckzähne stark verwittert, braun, haben keinen Schmelz. Claviculae abnorm stark gebogen. Thorax stark zusammengesunken, die Rippen berühren das Becken. Die Gegend des unteren Sternalendes springt keilförmig vor. Knorpel-Knochengrenzen der Rippen deutlich verdickt. Becken stark deformiert, die Symphyse springt stark schnabelförmig vor. Wirbelsäule stark in sich zusammengesunken, Rücken flach, leichte Rechtsskoliose der mittleren Brustwirbelsäule, mäßige kompensatorische nach links der Lendenwirbelsäule. Es besteht eine starke Lordose der untersten Brust- und der Lendenwirbelsäule, Beckensenkung dadurch stark vermehrt. Obere Extremitäten gerade und schlank. Etwas oberhalb der Mitte der rechten Ulna leichte, aber scharfe Knickung nach außen, Knickungsstelle nicht druckempfindlich. Handgelenksepiphysen schlank, nicht verdickt. Beide Oberschenkel stark nach vorn und außen bogenförmig gebogen, der linke Oberschenkel zeigt außerdem noch eine ziemlich starke Abbiegung nach hinten im unteren Drittel. Die Unterschenkel erscheinen im Knie etwas nach hinten subluxiert. Unterschenkel gerade, mäßige Plattfüße. Knie und Knöchel etwas plump.

Druckempfindlichkeit: Kopf nicht, Sternum nicht, Brustkorb nur rechts unten druckempfindlich. Seitliche Kompression des Beckens schmerzhaft, lokaler Druck auf Beckenschaufeln und Symphyse nicht schmerzhaft. Rechter Oberschenkel nicht druckempfindlich, der linke schon bei leichter Berührung hochgradig empfindlich, fast wie bei Osteomyelitis. Vor 1 Jahr soll auch der andere Oberschenkel so empfindlich gewesen sein. Tibiae nicht druckempfindlich.

Jetzige Beschwerden: Patientin hat Schmerzen im linken Oberschenkel, keine im rechten, auch nicht im Rücken oder in den Hüften. Sie fühlt sich unsicher auf den Beinen, kann nur ganz

wenig gehen mit einem Stock und auf der anderen Seite gestützt. Beim Sitzen hat sie keine Beschwerden, beim Liegen hat sie zurzeit nur Schmerzen, wenn sie das linke Bein bewegt.

Röntgenbilder (beide Ober- und Unterschenkel, beide Hände):

Linker Oberschenkel (Tafel XXVIII, Fig. 81): Das Femur ist für Röntgenstrahlen außerordentlich durchlässig, es zeigt in der Projektion von vorne eine leichte Biegung, namentlich der Mitte des Schaftes, nach außen. Corticalis sehr stark verdünnt. Spongiosa sehr weitmaschig und durchsichtig. Im distalen Drittel des Oberschenkels mehrere quer durch den Knochenschaft verlaufende, etwas verwaschene, dunkle Linien. Auf der lateralen Seite des Femurschaftes, etwa in der Mitte desselben, zeigt die Corticalis eine unscharf begrenzte, ca. 1 mm breite Unterbrechung.

Linke Hand und Handgelenk (Tafel XXVIII, Fig. 82): Radius und Ulna stark rarefiziert. Das distale Radiusende etwas verdickt, von stark wabiger Struktur, zeigt keine Epiphysenfuge mehr, dagegen zwei quere, unscharfe, schmale, dunkle Streifen, die ihrer Lage nach wohl die frühere Epiphysenfuge begrenzen. Das Handskelett hochgradig atrophisch. Die Corticalis der Metacarpalia stark verdünnt und aufgelockert. Die Corticalis der Phalangen als solche nicht mehr vorhanden, sondern in ein ziemlich grobmaschiges, spongiöses Netzwerk aufgelöst.

Diagnose: Osteomalacie, aus Spätrachitis hervorgegangen, hochgradige „osteomalacische“ Deformitäten, die die früheren „rachitischen“ abgelöst haben.

Verlauf: Phosphorbehandlung seit 15. III. 1918.

Phosphori 0,01,

Emulsio oleosa ad 100,0,

2mal täglich 1 Eßlöffel (= 0,0015 p. d.).

6. V. 1918. Thorax nur noch ganz wenig empfindlich. Linker Oberschenkel fast nicht mehr empfindlich.

3. VI. 1918. Thorax nicht mehr, auch linker Oberschenkel gar nicht mehr empfindlich. Patientin bewegt sich außerordentlich viel besser und rascher, kann fast frei gehen, verträgt den Phosphor sehr gut. Appetit gut, Stuhl normal.

3. Osteomalacie.

Fall 18. (Fig. 35.)

N., Frieda, 31 Jahre.

Anamnese (24. IV. 1916): Vater an Phthise gestorben, Mutter lebt und soll gesund sein, 4 Geschwister sind als ganz klein gestorben, eine Schwester ist lungenkrank, 4 Geschwister sind ganz gesund. Patientin weiß nichts über die frühe Kindheit anzugeben, auch nicht, wann sie laufen lernte. Als Kind soll sie sich ganz normal

entwickelt haben. Die Periode trat mit 15 Jahren auf, war regelmäßig, ohne Beschwerden. In der Pubertätszeit hatte Patientin auch gar keine Beschwerden beim Gehen, usw. Patientin war an verschiedenen Orten in Stellung, meist als Dienstmädchen, sie konnte immer gut arbeiten. Mit 27 Jahren Heirat, Patientin wurde bald nach der Verheiratung schwanger. Die erste Gravidität verlief ganz normal, im 7. Monat derselben machte Patientin noch Touren auf Höhen der Umgebung ihres Dorfes, bei welchen sie Steigungen von ca. 1000 m glatt und ohne Beschwerden überwand. Spontane Geburt, Patientin stillte das Kind 3—4 Wochen. Die zweite Gravidität folgte der Geburt fast unmittelbar, Patientin hatte 7 Wochen nach der ersten Geburt wieder eine Periode, dann trat die zweite Gravidität ein. Während dieser hatte Patientin viel Beschwerden, sie wurde schnell müde, hatte Schmerzen in den Hüften und im Kreuz, sie ging schwerfällig und watschelnd und konnte sich nicht bücken. Die Beschwerden nahmen bis zum Ende der Gravidität zu. Spontane, leichte Geburt, Patientin stillte 3—4 Wochen. Die Beschwerden waren nach dem Wochenbett nahezu verschwunden. 4 Monate nach der zweiten Geburt fiel Patientin die Treppe hinunter (Dezember 1914) und quetschte sich den Rücken und die Kreuzgegend. Einen Monat später (Januar 1915) begannen wieder die alten Beschwerden, die Patientin schon während der zweiten Gravidität gehabt hatte. Sie glaubte sie als Folgen des Unfalls ansehen zu müssen und wurde in dieser Auffassung auch von einem Arzt bestärkt. Einige Monate später ging Patientin wegen ihrer Beschwerden einige Wochen in ein Spital, wo Rücken und Lenden eingerieben und massiert wurden, aber ohne jeden Erfolg. Im Sommer 1915 waren die Beschwerden etwas besser, nahmen aber im Winter wieder zu. Im Januar 1916 (1 Jahr 5 Monate nach der zweiten Geburt) wurde Patientin wieder schwanger. Seither haben sich die Beschwerden konstant und sehr bedeutend verschlimmert. Patientin klagt gegenwärtig über Schmerzen in den Hüften und im Kreuz und in den ganzen Beinen, besonders in den Knien („schmerzhaft Müdigkeit“), sie kann nicht lange gehen und geht nur sehr langsam und watschelnd. Am besten verträgt sie das Sitzen, doch bekommt sie bei längerem Sitzen Schmerzen im Rücken und im Kreuz. Das Liegen ist ihr beschwerlich, da der

Fig. 35.

Fall 18, 31 Jahre.
Körperlänge 154 cm.

Druck auf die Brust beim Liegen ihr Schmerzen macht. Wenn sie sich im Bett drehen will, kann sie das nur ganz langsam und nur zentimeterweise tun, da jede raschere Bewegung ihr Schmerzen macht. In diesem Stadium wurde mir Patientin wegen der angebliehen Unfallfolgen zugewiesen.

Status: Kleine Patientin von schwächtigem Körperbau, Muskulatur ziemlich schwach entwickelt. Hautfarbe etwas blaß, Schleimhäute etwas anämisch, keine Exantheme, keine Drüsenschwellungen, keine Struma. Innere Organe o. B. Alle Reflexe normal. Abdomen leicht aufgetrieben, Uterus stark vergrößert (letzte Periode am 3. oder 4. I. 1916), Gravidität im 4. Monat.

Schädel o. B. Gaumen o. B. Thorax nicht deformiert, keine Verdickungen der Knorpel-Knochengrenzen der Rippen, Thorax etwas weich, leicht zusammendrückbar. Arme gerade, o. B., Beine gerade, o. B. Rücken etwas flach, Wirbelsäule nicht verkrümmt. Das Becken zeigt kein abnormes Vorspringen der Symphyse, bei der inneren Untersuchung zeigt die Symphysengegend ganz leichte quere Verengerung. Alle Knochen des Skeletts sind auf Druck mehr oder weniger empfindlich, am stärksten die spongiösen Knochen, und zwar sind die Scapulae und das Becken von innen stark druckempfindlich, die Rippen, das Sternum, die Wirbelsäule, das Kreuzbein und das Becken von außen ziemlich stark druckempfindlich, etwas weniger druckempfindlich sind Ober- und Unterschenkelknochen, mäßig druckempfindlich sind die Knochen der oberen Extremitäten, nur leicht druckempfindlich auch der Schädel. Bei Druck auf die Scapulae ist deutliches Pergamentknistern zu fühlen. Patientin kann nur sehr langsam und vorsichtig gehen, hat dabei Schmerzen im Kreuz und in den Beinen, sehr hochgradig watschelnder Gang, Plattfüße.

Röntgenuntersuchung: Herr Spitalarzt Dr. J. Kopp am Kantonsspital in Luzern hatte die Freundlichkeit, mir kurze Zeit nach Untersuchung der Patientin 2 Röntgenbilder von derselben herzustellen (linkes Knie mit unterer Hälfte des Oberschenkels, linke Hand mit vorderem Drittel des Vorderarms). Die Bilder zeigen sehr deutlich eine mäßige Atrophie der Knochen, erkennbar an einer deutlichen Verschmälерung der Corticalis an dem den Epiphysen benachbarten Teil der Diaphysen (Femur, Tibia, Fibula), ferner an einer Aufblätterung der Corticalis, die sich am Radius und der Ulna und mit besonderer Deutlichkeit an den kleinen Handknochen (Metacarpalia und Phalangen) zeigt, in genau derselben Weise, wie ich sie bei der Spätrachitis leichteren Grades beobachtet und beschrieben habe. Diese Veränderungen sind deutlich erkennbar, wenn man sein Augenmerk auf die Dicken- und Strukturverhältnisse der Corticalis und des Knochens überhaupt legt, können aber beim flüchtigen Betrachten der Platten leicht übersehen werden.

Diagnose: Floride puerperale Osteomalacie, Gravidität im 4. Monat.

Therapie und Verlauf: Patientin erhielt Phosphorlebertran 0,06 (!):200,0 zweimal täglich 1 Teelöffel, d. h. die Tagesmaximaldosis auf zwei Tagesdosen verteilt. Da der Zustand ein rasch fortschreitender zu sein schien und schon einen sehr hohen Grad von subjektiven Beschwerden erzeugt hatte, wurde die eventuelle Einleitung der künstlichen Frühgeburt in einer Anstalt in Betracht gezogen. Nach 3 Wochen war noch kein wesentlicher Erfolg der Therapie zu konstatieren, nach 5 Wochen war aber eine so auffallende Besserung der subjektiven Beschwerden und der Druckempfindlichkeit der Knochen eingetreten, daß von einer künstlichen Frühgeburt abgesehen und die Therapie unverändert fortgesetzt wurde.

Am 2. VI. 1916, knapp 2 Monate nach Beginn der Phosphorbehandlung, gibt Patientin an, daß die Schmerzen im Kreuz und in den Hüften fast ganz aufgehört hätten, ebenso die Schmerzen in den Beinen und daß nur noch Müdigkeit in den Beinen bestehe. Objektiv ließ sich feststellen: Der seitliche Druck auf das Becken, der Druck auf die Rippen und auf die Scapulae ist kaum mehr schmerzhaft, von innen ist das Becken dagegen noch druckempfindlich.

Patientin hat die Phosphorthherapie in unveränderter Weise bis zum Ende der Schwangerschaft fortgesetzt und hat im September 1916 in einer Anstalt einen ausgetragenen Knaben geboren. Patientin hat nicht gestillt. Nach der Geburt wurde die Phosphorthherapie mit kleineren Phosphordosen 0,01:100,0 zweimal täglich 1 Teelöffel fortgesetzt. Patientin fühlte sich zunehmend besser.

Die Nachuntersuchung am 5. IX. 1917, 1 Jahr nach der 3. Geburt ergab folgendes: Subjektiv fühlt sich Patientin außerordentlich viel besser als früher, sie kann wieder viel besser gehen. Sie kann noch nicht sehr lange gehen oder stehen, da sie leicht ermüdet, bei stärkerer Ermüdung fühlt sie auch noch Schmerzen in den Beinen, namentlich von den Knien an abwärts, bei längerem Sitzen auch etwas im Rücken und im Kreuz, aber lange nicht so stark wie früher. Bei längerem Arbeiten ermüdet sie auch stark in den Armen. Patientin beschäftigt sich und arbeitet den ganzen Tag, sie besorgt ihren Haushalt und ihre 3 Kinder selbst. Die Menses sind seit der letzten Geburt etwas unregelmäßig, alle 6—7 Wochen, 2—3 Tage dauernd.

Objektiv ist festzustellen: der früher sehr stark watschelnde Gang ist vollständig verschwunden, Patientin geht wieder normal, vermeidet aber, rasch zu gehen. Es sind auch jetzt, außer einer ganz leichten Beckendeformität, keine Deformitäten der Knochen festzustellen. Die Scapulae sind noch deutlich druckempfindlich, das ganze Beinskelett noch wenig, das Armskelett nur sehr wenig.

Rippen, Brustbein und Becken von außen sind nicht druckempfindlich, dagegen etwas die Symphysengegend und das Becken von innen, sowie die Wirbelsäule.

Die Röntgenbilder (Unterschenkel, Hand) ergeben immer noch einen leichten Grad von Atrophie der Knochen wie vor 11½ Jahren. Becken im Röntgenbild nicht deformiert.

Fall 19.

R., Hulda, 36 Jahre. (Tafel XXIX.)

Anamnese (August 1917): Heredität o. B., als Kind machte Patientin Diphtherie, mit 26 Jahren Gelenkrheumatismus durch, sie war sonst immer gesund. Die Menstruation trat mit 16 Jahren auf, war immer regelmäßig, aber schwach. Bis zu ihrer Heirat war Patientin immer gesund. Sie heiratete mit 27 Jahren und wurde danach sogleich schwanger. Während der Gravidität verspürte sie noch keine Beschwerden. Geburt spontan und normal, Patientin stillte nur 2 Tage lang. Beim Aufstehen vom Wochenbett fühlte Patientin die ersten Beschwerden ihres jetzigen Leidens. Sie wurde schnell müde und konnte nicht lange stehen und gehen und hatte, namentlich bei Anstrengungen, Schmerzen im Kreuz, die sehr lange als Rheumatismus und Ischias behandelt wurden. Patientin glaubt auch heute noch ihr Leiden auf die Anwendung von antikonzeptionellen Mitteln, die ihr Mann seit Geburt ihres Kindes anwendete, zurückführen zu müssen. Die Schmerzen wurden immer heftiger und griffen langsam auch auf die Hüften über und später auch auf die Brust. Patientin wurde lange als hysterisch behandelt. 3 Jahre nach der ersten Geburt Fehlgeburt im 4. Monat, bald darauf Scheidung. Das Leiden zog sich, langsam schlimmer werdend, etwa 8 Jahre hin. Die Schmerzen ergriffen auch die Knie und die Beine, Patientin konnte sehr schlecht laufen und sank leicht in die Knie ein. Alle Knochen waren auf Druck und stärkere Berührung schmerzhaft. Sogar das Liegen machte ihr Schmerzen. Patientin ging aber immer noch herum, sie war nie ganz bettlägerig, obschon sie beim Liegen am wenigsten Beschwerden hatte. Vor 2 Jahren war ihr Leiden am schlimmsten, sie konnte kaum mehr frei gehen, meist schleppte sie sich an den Wänden entlang, oder an eine Stuhllehne gestützt, herum. Im Laufe der Jahre ist Patientin langsam in sich zusammengesunken, sie soll im ganzen um ca. 10 cm kleiner geworden sein. Vor ca. 1¼ Jahren konsultierte sie eine orthopädische Anstalt, wo ihr Leiden erkannt wurde. Sie wurde dort am 31. VII. 1916 kastriert und danach 8—9 Monate lang mit Phosphorlebertran behandelt. Seit dieser Behandlung ist eine zunehmende Besserung zu konstatieren. Zurzeit kann Patientin wieder gut gehen, jedoch ermüdet sie langes Gehen und Stehen noch stark, die Schmerzen sind auch sehr stark zurückgegangen, treten nur noch nach längerem Stehen und Gehen

auf. Patientin hilft etwas im Laden ihrer Schwester, nachmittags muß sie meist einige Stunden liegen.

Status: Kleine Patientin, der man schon äußerlich ansieht, daß sie stark ineinander gesunken ist. Muskulatur und Fettpolster ziemlich schwach entwickelt, Aussehen nicht anämisch. Keine Drüenschwellungen, rechter Schilddrüsenlappen etwas vergrößert. Innere Organe o. B. Reflexe: Pupillen normal, Patellarreflexe etwas gesteigert, links $>$ rechts, Achillessehnenreflex links $<$ rechts, ungefähr normal, Fußsohlenreflex schwach, links $>$ rechts. Bauchdeckenreflex nicht deutlich auszulösen. Am Abdomen breite Laparotomienarbe unterhalb des Nabels.

Kopf o. B., kein besonderes Hervortreten der Tubera, Zähne fehlen, künstlicher Zahnersatz. Brust nicht deformiert, etwas weich, komprimierbar. Wirbelsäule im ganzen gerade, in der Lendenwirbelsäule anscheinend ineinander gesunken. Der Rippenbogen liegt dem Becken fast auf, so daß zwischen Thorax und Becken jederseits eine tiefe Hautfalte entstanden ist. Am Becken springt die Symphysengegend etwas stärker vor als normal. Arme und Beine gerade. Weder Brust noch Beckenschaufeln sind auf Druck empfindlich, dagegen etwas die Symphysengegend, die Oberschenkelknochen, die Tibiae und die Mittelfußknochen.

Röntgenbilder (Wirbelsäule, Becken, linker Unterschenkel, linker Fuß, beide Hände):

Wirbelsäule gerade, die Lendenwirbelsäule ist etwas in das Becken hineingesunken, so daß die Querfortsätze des V. Lendenwirbels die Beckenschaufeln berühren. Das Becken zeigt leichte Kartenherzform.

Am Unterschenkel ist eine leichte Atrophie der Knochen an einer Verdünnung mit stellenweiser Aufblätterung (Fibula) der Corticalis zu erkennen, viel deutlicher sind die Auflockerung der Spongiosa und die Aufblätterung der Corticalis an den Knochen der Hand (Tafel XXIX, Fig. 83) und des Fußes. Diese Veränderungen sind etwas stärker ausgeprägt als im Fall 21, aber durchaus keine exzessiven.

In der Basis der Grundphalanx des Mittelfingers und der Endphalanx des Daumens ziemlich scharf umschriebene, bohnen große, am Daumen etwas kleinere, ausgesprochene Aufhellung der Knochenstruktur (Enchondrome?).

Diagnose: Puerperale Osteomalacie, Deformität der Wirbelsäule, leichte des Beckens, Heilungszustand nach Ovariectomie und Phosphorbehandlung.

Fall 20.

B., Minna, 44 Jahre.

Anamnese (3. VIII. 1917): Patientin lernte mit $1\frac{1}{2}$ Jahren gehen, weiß von Rachitis in der Jugend nichts. Keine Kinderkrank-

heiten. Menses mit 12 Jahren, meist alle 14 Tage, stark, im 19. Jahr setzte die Periode 1 Jahr aus, vom 20. Jahr an Periode alle 3—4 Wochen, mit etwas Krämpfen verbunden. In den Entwicklungsjahren keine besonderen Störungen, nur in dem Jahr, in dem die Periode aussetzte, viel Müdigkeit. Seit dem 20. Jahr soll die Patientin etwas blutarm sein. Heirat mit 26 Jahren, zwei Jahre danach erste Schwangerschaft, während welcher Patientin keine Beschwerden von seiten des Knochensystems hatte, sie litt nur etwas an Schmerzen in beiden Nierengegenden und mußte wegen „Nierenentzündung“, die vom 2. Schwangerschaftsmonat an bestanden haben soll, ca. 10 Wochen liegen. Heilung der Nierenaffektion nach der Geburt. 3 Jahre später zweite Schwangerschaft, vom 3. Monat an fühlte sich Patientin müde, hatte Schmerzen im Kreuz beim Stehen und Gehen, nicht beim Liegen. Spontane Geburt, die 3 Tage dauerte. Auch nach der Geburt fühlte sich Patientin schwach. Sie hat nicht gestillt. $\frac{1}{4}$ Jahr nach der Geburt hatte Patientin viel Schmerzen in der unteren Bauchgegend und im Kreuz, sie mußte viel liegen, später kam sie in eine Frauenklinik, wo die Schmerzen auf Knochenerweichung zurückgeführt wurden. Sie kam dann 9 Monate lang in ein chirurgisches Spital, wo vor jetzt 10 Jahren die doppelseitige Ovariectomie ausgeführt wurde. Ein Nachtrag zur Operationsgeschichte sagt, daß ein kleines Stückchen des einen Ovariums zurückgelassen worden sei. Nach der Operation bestanden die Menses in gleicher Weise fort wie früher. Patientin mußte nach der Operation langsam wieder laufen lernen, sie behielt ihre alten Beschwerden, Mattigkeit, Unfähigkeit zu arbeiten, Schmerzen im Kreuz und in den Beinen, Kraftlosigkeit, auch noch in den folgenden Jahren. Drei Jahre nach der Ovariectomie trat zum Erstaunen aller eine dritte Schwangerschaft ein. Im letzten Jahre vor dieser letzten Schwangerschaft hatte sich der Zustand etwas gebessert durch Einnahme von Medikamenten. In der dritten Schwangerschaft nahmen die Beschwerden aber wieder zu. Spontane Geburt. 6 Wochen nach derselben trat die Menstruation wieder ein, hörte aber nach dem 2. Mal für immer auf. Seit jener Zeit empfand Patientin eine dauernde Verschlimmerung ihres Leidens, sie war nur sehr wenig arbeitsfähig, mußte viel liegen, war aber nicht dauernd im Bett. Im großen und ganzen haben die Beschwerden, die zeitweise etwas wechselten, dauernd etwas zugenommen. Patientin soll in den letzten Jahren etwas kleiner geworden sein. Seit einem Jahr hat sie auch Schmerzen in der Knöchelgegend und in den Füßen.

Status: Mittelgroße Patientin in gutem Ernährungszustand. Aussehen nicht anämisch. Innere Organe o. B. Abdomen etwas ausgedehnt, auf Druck überall etwas empfindlich. Reflexe normal.

Kopf o. B. Zähne fehlen größtenteils. Thorax nicht stark deformiert, der untere Thoraxrand etwas nach außen umgebogen.

Die Wirbelsäule zeigt eine mäßige Totalkyphose, die Kreuzbein-
gegend ist ziemlich flach. Die oberen und unteren Extremitäten
zeigen keine Deformitäten. Die Symphyse des Beckens tritt etwas
stark vor, auch bei der innerlichen Untersuchung fühlt man den
vorderen Beckenteil schnabelförmig verengt in mäßigem Grade, das
Promontorium ist nicht zu fühlen. Alle Knochen sind auf Druck
mehr oder weniger stark empfindlich, am stärksten das Brustbein,
die Rippen und das Becken von innen, ziemlich stark auch das
Becken von außen und die Wirbelsäule, sowie die Knochen der
unteren Extremitäten. Auch die Knochen der oberen Extremitäten
und der Schädel sind etwas druckempfindlich. Patientin geht lang-
sam und vorsichtig wegen der Kreuzschmerzen, aber nicht watschelnd.

Röntgenuntersuchung (linker Unterschenkel, rechte
Hand): An den Knochen des Unterschenkels ist eine leichte Rarefi-
zierung der Knochen festzustellen, die Corticalis von Tibia und Fi-
bula nimmt von den Epiphysen gegen die Schaftmitte zu langsamer
an Dicke zu als normal. An der Hand ist eine deutliche, aber mäßige,
Rarefizierung der Knochen in Form einer Verdünnung und Auf-
faserung der Corticalis festzustellen.

Diagnose: Puerperale Osteomalacie.

Fall 21. (Fig. 36.)

F., Anna, 52 Jahre.

Anamnese (29. VIII. 1917): Familienanamnese o. B. Als
kleines Kind hatte Patientin Keuchhusten, sie mußte danach zum
zweiten Mal laufen lernen. Sie war als Kind immer klein, immer
etwas kleiner als ihre Kameradinnen, aber immer kräftig. Im Alter
von 26 Jahren hatte sie Gesichtsröse und böse Augen, sonst war sie
immer gesund. Menses vom 20. bis 51. Lebensjahr regelmäßig,
haben seither aufgehört, sie hat nie geboren. Patientin war als
Köchin beschäftigt. Vor 7 Jahren begann das Leiden mit Schmerzen
im Rücken und im Kreuz. Die Schmerzen bestanden namentlich
abends und wurden sehr lange als Rheumatismus angesehen. Pa-
tientin wurde in verschiedenen Polikliniken behandelt, an einem Ort
mit Bädern und Massage als Rheumatismus, aber ohne Erfolg, im
Gegenteil verschlimmerte sich dadurch das Leiden so stark, daß
Patientin ihre Arbeit aufgeben mußte. Sie fühlte sich schwach, hatte
das Gefühl, keinen Halt zu haben, und sank leicht in die Knie. Alle
Knochen fingen an, weh zu tun, namentlich die Kreuzgegend und die
Brust. Patientin konnte schlecht gehen, sie wackelte wie ein Be-
trunkener. Eine Kur in einem Erholungsheim hatte auch keinen
Erfolg. In einer zweiten Poliklinik konnte nichts als Ursache ihrer
Beschwerden gefunden werden, in einer dritten wurde ihr Leiden
als Neuralgie behandelt. Später fand ein Arzt eine Geschwulst in
der Lendengegend, die er röntgen ließ. Da sich zeigte, daß diese
Geschwulst die verkrümmte Lendenwirbelsäule war, schickte er Pa-

tientin in eine orthopädische Anstalt, wo ihr Leiden als Osteomalacie erkannt wurde. Patientin lag 5 Monate in einem Krankenhaus, wo sie Phosphorlebertran erhielt. Dadurch besserte sich ihr Leiden erheblich. Sie konnte aber auch nach der Entlassung noch nicht lange gehen oder sitzen. Erst ganz allmählich besserte sich der Zustand. 1912 wurde sie mit Pituitrininjektionen behandelt, aber ohne Erfolg, die Schmerzen wurden im Gegenteil schlimmer. Eine Badekur brachte nur sehr geringe Besserung, besseren Einfluß hatten später Soolbäder und Sonnenbäder. Die Schmerzen haben in den letzten

Fig. 36.

Fall 21, 52 Jahre,
Körperlänge 142 cm.

Jahren ganz allmählich abgenommen, bis 1915 war Patientin aber noch ganz arbeitsunfähig. 1915 begann sie wieder, sich zu beschäftigen, wenn auch mit Schmerzen, auch seither langsame Besserung. Auch zurzeit kann Patientin noch nicht lange arbeiten, sie kann keine grobe Arbeit tun und muß wegen Rücken- und Kreuzschmerzen oft sitzen, eine dauernde Stelle kann sie noch nicht annehmen.

Status: Sehr kleine Patientin mit starkem Fettpolster und gut entwickelter Muskulatur. Aussehen nicht anämisch. Keine Struma. Innere Organe o. B. Reflexe: Pupillarreflex normal, Patellarreflex rechts > links, rechts lebhaft, links schwach, Fußsohlenreflex rechts > links, lebhaft. Achillessehnenreflex rechts = links, normal.

Kopf o. B. Zähne fehlen zum Teil, sonst regelmäßig. Brustkorb nicht stark deformiert. Der Rücken zeigt ein auffallendes Bild, Patientin ist sehr deutlich zusammengesunken, zwischen Thorax und Becken jederseits zwei tiefe Hautfalten. Die Wirbelsäule ist stark ineinander gesunken, im Brustteil flach, im Lendentheil zeigt sie eine sehr starke lokalisierte Ausbiegung nach links und außen, die wie ein harter Tumor sich anfühlt. Der Brustkorb steht sehr niedrig, die Rippen ruhen direkt den Beckenschaufeln auf. Der Brustkorb bildet hinten rechts, dicht unter der rechten Scapula, einen deutlichen Rippenbuckel. Die Symphyse des Beckens steht etwas stark nach vorn vor. Obere und untere Extremitäten gerade, o. B. Alle Knochen sind auf Druck empfindlich, stark das Brustbein und die Vorderseite der Rippen und die Scapulae; mittelmäßig das Becken, die Wirbelsäule, die seitliche Thoraxwand und die Tibiae; wenig die Oberarm- und Vorderarmknochen. Hand- und Fußknochen nicht druckempfindlich. Die Empfindlichkeit der Knochen soll früher viel stärker ge-

wesen sein. Jetzige Beschwerden: Leichte Ermüdbarkeit, Schmerzen in der Lendengegend, namentlich links und im Kreuz bei längerem Stehen und Gehen und bei Anstrengungen.

Patientin geht vorsichtig, langsam, etwas watschelnd.

Röntgenbilder (Wirbelsäule, Becken, rechte Kniegegend, rechter Fuß, rechte Hand): Das Röntgenbild zeigt keine wesentliche Deformierung des Beckens, die Wirbelsäule weist eine starke, auf die Lendenwirbelsäule lokalisierte Linksskoliose auf. Femur, Tibia und Fibula zeigen eine mäßige Atrophie an der Verschmälерung ihrer Corticalis. Auch das Handskelett zeigt eine mäßige Rarefizierung des Knochens, die Corticalis der Metacarpalia ist mäßig verdünnt und aufgelockert, die Corticalis der Phalangen stärker verdünnt, die Struktur der Phalangen grobmaschig und aufgelockert. Am Fuß sind diese atrophischen Erscheinungen noch etwas deutlicher, an den Fußphalangen ist eine Corticalis höchstens angedeutet. Sämtliche Metatarsalia sind etwas verborgen, ebenso die ersten Phalangen der 2. bis 5. Zehe.

Diagnose: Nicht puerperale Osteomalacie.

Fall 22. (Fig. 37.)

H., Bertha, 55 Jahre.

Anamnese (August 1917): Über Rachitis in der Kindheit ist nichts zu erfahren. Patientin lernte spät gehen. Im Alter von 38 Jahren machte Patientin Lungenentzündung durch, sonst war sie immer gesund. Die Menstruation begann mit 16 Jahren, war immer regelmäßig. Heirat mit 26 Jahren. Patientin hat 5mal geboren. Geburten alle etwas schwer, während dieser 5 Geburten hatte Patientin keine besonderen Beschwerden von seiten des Knochensystems. Vor 12 Jahren wurde Patientin wegen Gebärmutter-senkung operiert. Letzte Geburt vor 15 Jahren. Seit 3 Jahren hat Patientin erst Beschwerden. Das Leiden fing an mit Schmerzen in den Beinen und im Rücken. Die Schmerzen bestanden nur beim Gehen oder bei Anstrengungen, in der Ruhe waren sie nicht vorhanden. Patientin fühlte sich bald sehr schwach in den Beinen, so daß sie sich beim Stehen halten mußte. Der Gang wurde immer unsicherer und wurde ausgesprochen watschelnd. Im letzten Winter konnte Patientin nur am Stocke gehen, sie litt dabei viel an Schmerzen in der Kniegegend und im Kreuz, aber auch das Liegen war schmerzhaft, da Patientin den Druck der Körperlast auf den Thorax schmerzhaft verspürte. Patientin ist nicht kleiner geworden.

Fig. 37.

Fall 22, 55 Jahre.

Status: Kleine, etwas atrophische Patientin, von nicht anämischem Aussehen, Muskulatur mäßig, Fettpolster schwach entwickelt. Mäßige Struma nodosa. Innere Organe o. B. Reflexe o. B., normal. Gang langsam, unsicher, etwas watschelnd.

Kopf o. B. Zahnersatz, die Zähne sollen sich vor 4 Jahren zu lockern begonnen haben, so daß Patientin viele davon mit den Fingern ausziehen konnte. Thorax nicht wesentlich deformiert, etwas weich. Mäßige Kyphose der oberen Brustwirbelsäule, vermehrte Lendenlordose. Deutliche Querfalte zwischen Thorax und Becken. Der untere Thoraxrand ist dem oberen Beckenrand deutlich genähert. Die Symphyse springt etwas stark vor. Arme gerade, mäßiger Grad von O-Beinen. Die Knochen der unteren Extremitäten und das Kreuzbein sind deutlich druckempfindlich, ebenso das Sternum. Wirbelsäule, Becken und Brustkorb mäßig empfindlich, Schädel nicht druckempfindlich.

Röntgenbilder (Unterschenkel, Hand): Mäßige Atrophie der Knochen, wie in den vorerwähnten Fällen, Rarefizierung der Knochenstruktur, namentlich am Handskelett deutlich sichtbar.

Diagnose: Nichtpuerperale Osteomalacie.

Therapie: Emulsio phosphorica Kassowitz 2mal täglich 1 Eßlöffel! (pro dosi 0,0015! P).

Patientin wurde 3 Monate nach Beginn der Behandlung nachuntersucht. Sie fühlt sich seit der Behandlung viel besser, sie kann viel besser gehen, steigt mühelos und ohne Schmerzen Treppen auf und ab, was sie früher nicht konnte.

Fall 23. (Fig. 38 u. Tafel XXX, XXXI.)

M., Barbara, 43 Jahre.

Anamnese (September 1917): Vater an Lungenentzündung, Mutter an Mammacarcinom gestorben, 2 Brüder starben als ganz klein, eine Schwester lebt und ist gesund. Als Kind war Patientin normal, sie gehörte in der Schule zu den mittelgroßen. Auch in den Pubertätsjahren entwickelte sie sich normal, sie hatte damals keine Gehbeschwerden. Die Periode begann mit 17 Jahren und war regelmäßig, nur vor 8 und vor 3 Jahren, als das Leiden der Patientin besonders stark war, setzte die Periode je ein halbes Jahr aus, seit 2 Jahren ist sie wieder regelmäßig. Patientin heiratete mit 22 Jahren, sie hat in den darauffolgenden 5 Jahren 4mal geboren und eine Fehlgeburt durchgemacht. Die Fehlgeburt kam vor der letzten Schwangerschaft und war mit einer großen Blutung verbunden. Schon während der ersten und zweiten Schwangerschaft litt Patientin an Schwäche in den Beinen und Rückenschmerzen, was aber nach der Geburt wieder verschwand. In der dritten Schwangerschaft litt Patientin noch mehr an Schwäche, sie war müde und konnte nicht gut gehen. In der vierten, letzten Schwangerschaft

(vor 16 Jahren), traten die früheren Beschwerden in bedeutend verstärktem Maße auf. Patientin konnte schwer gehen und litt an Schmerzen in den Knien und in den Knöcheln, im Rücken und in den Lenden. Patientin bekam einen stark watschelnden Gang und wenn sie saß, konnte sie nur mit Mühe wieder aufstehen. Nach der Geburt, die 2 Tage dauerte und schwer, aber spontan war, verschwanden die Beschwerden nicht mehr, im Gegenteil verschlimmerte sich das Leiden immer mehr. Patientin konnte bald nicht mehr ohne Unterstützung gehen, sie mußte sich mit Stöcken stützen oder am Stuhl halten. Sie fing an einzusinken, der Rücken wurde krumm und die Oberschenkel verkrümmten sich. 4 Jahre nach der Geburt konnte Patientin noch etwas gehen, seither mußte sie aber dauernd liegen. Patientin hatte sich damals nie behandeln lassen. Vor 8 Jahren kam sie in die medizinische Klinik in Zürich, wo sie mit Phosphor behandelt wurde. Der Zustand hatte sich dadurch so wesentlich gebessert, daß Patientin wieder etwas gehen konnte. Zu Hause verschlimmerte sich der Zustand aber wieder, so daß Patientin wieder bettlägerig wurde. Vor 3 Jahren wurde sie in sehr verwahrlostem Zustande wieder in die Klinik gebracht, wo sie sich noch jetzt befindet. Ihr Zustand hat sich auf innere Behandlung sehr wesentlich gebessert, Patientin hat aber nicht wieder laufen gelernt.

Status: Kleine, stark verkrüppelte Patientin von ca. 104 cm Länge. Intelligenz normal, keine Struma, Haut etwas blaß. Innere Organe o. B. Patellarreflexe wohl infolge der Deformitäten der Knie, nicht auszulösen, Fußsohlenreflexe lebhaft.

Die Tubera des Schädels treten nicht besonders vor, die Zähne sind zum großen Teil ausgefallen oder kariös, der Thorax ist sehr nieder, stark zusammengesunken, das Sternum springt abnorm stark vor (Hühnerbrust). Der rechte Oberarm zeigt infolge einer alten Fraktur eine leichte Knickung mit Winkel nach außen. Der rechte Vorderarm zeigt 2—3 Querfinger oberhalb des Handgelenks eine volare und etwas ulnare Abknickung (Madelungsche Handdeformität), die spontan und langsam entstanden sein soll. Auch

Fig. 38.

Fall 23, 43 Jahre.
Körperlänge ca. 104 cm.

der linke Oberarm zeigt eine Abknickung mit Winkel nach außen, im oberen Drittel. Hier soll nie eine Fraktur bestanden haben. Am linken Vorderarm die gleiche Deformität wie rechts, nur etwas schwächer. Die Wirbelsäule zeigt eine sehr starke Kyphose im oberen Teil der Brustwirbelsäule, der Brustkorb ist ganz auf das Becken herabgesunken und ruht auf diesem auf. Beide Oberschenkel stark verkrümmt, scheinbar in der Mitte geknickt. Sie ruhen immer, nach der linken Seite umgelegt, auf der Unterlage, Unterschenkel gerade. Druckempfindlichkeit der Knochen: Schädel nicht, Brustkorb und Becken wenig, Wirbelsäule etwas, Scapulae deutlich, Ober- und Unterarme, Ober- und Unterschenkel ziemlich druckempfindlich.

Röntgenbilder: Von der Patientin existieren Röntgenbilder vom Januar 1915 und Dezember 1917.

Ich habe zum Vergleich nur Bilder der oberen Extremitäten herangezogen, da diese die Einwirkung des Krankheitsprozesses auf den Knochen in reiner Weise zeigen, während bei den unteren Extremitäten, infolge der langen Bettlägerigkeit der Patientin, ein gewisser Grad von Inaktivitätsatrophie der Knochen mit im Spiele ist, der nicht zum eigentlichen Krankheitsbild gehört.

Linker Humerus vom Januar 1915 (Tafel XXXI, Fig. 86): Hochgradige Atrophie des ganzen Knochens. Der Humerusschaft zeigt drei Infraktionen. Die oberste zeigt sich als stumpfwinklige Abknickung des Knochenschaftes ohne scharfe Winkelbildung. Die Corticalis des Knochens ist nicht gebrochen, auf der konvexen Seite ist sie nur verbogen, aber gut erhalten, während sie auf der konvexen Seite am Knickungswinkel auf eine Strecke von 12—15 mm ganz verwaschen, wie ausradiert ist. Um die Biegungsstellen herum ist ein leicht schattengebender, periostaler Callus zu sehen. Die mittlere Infraktion kennzeichnet sich auch durch eine deutliche Abknickung des Knochenschaftes ohne jede dislocatio ad latus. Der Knochen zeigt hier eine große, ca. 1½ cm breite, unscharf begrenzte Aufhellung der Knochenstruktur, die wie ausradiert erscheint. Ein periostaler Callus ist hier nicht zu sehen. Die dritte, distale Infraktion zeigt nur eine schräg durch das untere Humerusende verlaufende, ca. 4 mm breite, unscharf begrenzte Aufhellungszone, ohne jede Knickung des Knochens. Es ist ausdrücklich zu erwähnen, daß eine Fraktur des linken Humerus klinisch nie bestanden hat.

Linker Humerus von 1917, fast 3 Jahre nach der ersten Aufnahme (Tafel XXXI, Fig. 87). Der Humerus hat eine annähernd normale Corticalis erhalten, die an den Stellen der früheren 3 Infraktionen sogar eine leichte, als Callusbildung erscheinende Verdickung nach außen und nach innen angenommen hat. Die Knickung der mittleren Infraktion hat sich etwas gestreckt, die Knickung der obersten Infraktion ist gleich geblieben.

Linker Vorderarm von 1915 (Tafel XXX, Fig. 84): Hochgradige Atrophie der Knochen, namentlich sehr deutlich an den Metacarpalia und Phalangen zu sehen. Der Radius zeigt im distalen Drittel eine $\frac{3}{4}$ cm breite, unscharf begrenzte Aufhellung des ganzen Knochenquerschnitts ohne Dislokation der Knochenfragmente ad axin oder ad latus. Auch die Ulna zeigt zwei quere Aufhellungen, eine schmale proximale, im Bereiche welcher der Knochen etwas verdickt ist und eine breitere distale, bei welcher die der Aufhellung benachbarten Knochenfragmente ad latus gegeneinander verschoben sind.

Im Bereiche der proximalen Aufhellung der Ulna zeigt der Knochen eine ganz leichte axiale Knickung, aber keine sonstige Dislokation. Der Knochen ist an der Aufhellungsstelle durch periostale Auflagerungen leicht spindelig verdickt und es macht den Eindruck, daß hier ein schwach verkalkter Callus besteht. Die Aufhellung im Knochenschatten betrifft sowohl den Knochen selbst, als auch den Callus, und zwar ist sie im Callus und in der Corticalis ca. 4—7 mm breit und verschmälert sich nach dem Innern des Knochens rasch, so daß sie hier nur schmal und sehr verwaschen ist. Die distale Aufhellung der Ulna verläuft annähernd quer durch den Knochen in einer Breite von fast 1 cm. Die Ränder der Aufhellungszone gegen den Knochen sind sehr unscharf und verwaschen und der Knochen zeigt im Bereiche der Aufhellung eine deutliche Dislokation der Knochenfragmente ad latus. Diese Knochenstelle macht den Eindruck, als ob es sich hier um eine Fraktur im Bereiche der Aufhellungszone handelte, oder als ob die Knochenfragmente einer Fraktur nachträglich sich aufgeheilt hätten. — Im Bereiche der beiden nahe am Handgelenk gelegenen Aufhellungen im Radius und in der Ulna scheinen die Weichteile des Vorderarms, nach ihren Umrissen zu schließen, leicht spindelförmig verdickt. Es sei auch hier ausdrücklich erwähnt, daß sowohl nach der Krankengeschichte, wie auch nach den sehr exakten Angaben der intelligenten Patientin, am linken Oberarm und Vorderarm nie eine Fraktur vermutet oder angenommen worden ist, da nie hochgradige Schmerzen oder die Zeichen eines Knochenbruches an diesen Körperteilen bestanden haben sollen.

Linker Vorderarm von 1917 (Tafel XXX, Fig. 85): Die Knochen haben nahezu normale Dichte und Struktur erhalten, überall ist eine ziemlich kräftige Corticalis ausgebildet. An Stelle der proximalen Aufhellung an der Ulna, ist eine lokale Verdickung der Corticalis nachzuweisen, von den beiden distalen Aufhellungen ist nichts mehr zu sehen.

Diagnose: Puerperale Osteomalacie, alte, multiple Verbiegungen und Infraktionen der Knochen. Heilungsstadium.

Die im Vorstehenden beschriebenen 15 Fälle von Spätrachitis geben ein anschauliches Bild von dieser Erkrankung und bilden

eine fortlaufende Reihe von Beobachtungen vom leichten bis zum allerschwersten Grade der Erkrankung. Die Erkrankung betraf 9mal Knaben, 6mal Mädchen. Das Alter der beschriebenen Fälle liegt zwischen 12 und 20 Jahren. Auf die verschiedenen Altersstufen verteilen sich die Beobachtungen wie folgt:

12—14 Jahre	3 Fälle,
14—16 „	1 Fall,
16—18 „	6 Fälle,
18—20 „	5 Fälle.

Ich möchte der Übersicht halber eine Einteilung vornehmen in leichte Fälle, das sind solche, bei welchen die Erkrankung zu keiner wesentlichen Deformität des Skeletts geführt hat (Fall 1 bis 3), in mittelschwere Fälle, bei welchen sich die Erkrankung in der Entstehung der sog. Belastungsdeformitäten sichtbar äußert (Fall 4—11) und in schwere Fälle, bei welchen es zu komplizierteren Verbiegungen des Skeletts kommt (Fall 12—15). Diese Einteilung ist eine willkürliche, da die einzelnen Grade der Erkrankung fließend ineinander übergehen und da der Grad der Skelettdeformitäten nicht ein sicherer Maßstab für die Schwere der Skeletterkrankung ist; denn der Grad der Deformitäten ist natürlich nicht nur vom Grad der Krankheit, sondern auch von der Art und dem mehr oder weniger hohen Grad der mechanischen Beanspruchung der Extremitäten abhängig, die in den einzelnen Fällen sehr verschieden sein können. Aus praktischen Gründen wird diese Einteilung aber nützlich sein. Theoretisch viel wichtiger ist die Einteilung in verschleppte Rachitis oder Rachitis inveterata, bei welcher die Krankheit in der frühen Jugend begonnen hat und, ohne je auszuheilen, sich bis in das Adoleszentenalter erhalten hat und in die eigentliche Spätrachitis oder Rachitis tarda, bei welcher die Erkrankung im Adoleszentenalter erst entsteht. Auf diese Einteilung komme ich noch zurück.

Nach meiner Erfahrung der letzten Jahre ist die Spätrachitis in ihren leichteren und mittleren Graden eine gar nicht seltene Erkrankung und auch die schweren Fälle gehören nicht zu den sehr großen Seltenheiten, wie man glauben könnte. Einmal auf die Erkrankung aufmerksam geworden, habe ich sie immer häufiger beobachtet. Namentlich scheinen mir die leichten Grade häufig zu sein. Fälle, wie die oben beschriebenen Fälle 1 und 2,

habe ich unter den Patienten der chirurgischen Poliklinik in den letzten 2 Jahren noch mehrmals gesehen. Die Fälle mittleren Grades umfassen alle Fälle von sog. Belastungsdeformitäten, die ich in dem Zeitabschnitt, in welchem ich mein Material gesammelt habe, untersuchen konnte, und über die ich Aufzeichnungen und Bilder besitze. Eine Anzahl ähnlicher Fälle, die ich in dieser Zeit nur flüchtig gesehen habe und die ich deshalb nicht verwerten kann, boten aber alle ohne Ausnahme die deutlichen Zeichen der Spätrachitis dar. Daß über die Spätrachitis bisher nur so wenig bekannt ist, liegt also nicht an ihrer Seltenheit, sondern an der vorherrschenden Meinung, die Rachitis sei eine Krankheit nur des jugendlichen Alters und an einem Mangel eingehender Studien über die Spätrachitisfrage. Deshalb ist die Spätrachitis den Internen und Kinderärzten fast unbekannt geblieben, was schon daraus hervorgeht, daß ihre Lehrbücher nichts oder fast nichts über die Spätrachitis enthalten. Nur bei den Chirurgen und Orthopäden hat die Mikuliczsche Lehre von der rachitischen Natur der Belastungsdeformitäten mehr oder weniger Anerkennung, aber noch nicht die einwandfreie wissenschaftliche Bestätigung gefunden. Die spärlichen und sehr lückenhaften Angaben, die bisher über die Spätrachitis in der Literatur niedergelegt sind, habe ich in meiner früheren Arbeit über die Spätrachitis ausführlich zusammengestellt, hier deshalb nicht noch einmal besprochen.

Da die Rachitis eine Krankheit ist, die sich anatomisch im wesentlichen in Veränderungen an den Knochen äußert, wird auch ihr klinisches Bild hauptsächlich durch die Knochenveränderungen bestimmt. Wir kennen zwar bei der jugendlichen Rachitis Einwirkungen des Krankheitsprozesses auf den Gesamtorganismus, die sich in dem Auftreten von Anämie, von Durchfällen, Bronchitiden, Kopfschweißen, aufgetriebenem Leib und Vergrößerung der Milz äußern, doch ist von diesen Symptomen nicht sicher zu sagen, ob sie eine direkte Folge der rachitischen Erkrankung sind oder von komplizierenden Erkrankungen herrühren, denen das durch die Rachitis affizierte Kind in hohem Maße ausgesetzt ist. Verglichen mit der jugendlichen Rachitis treten diese allgemeinen Symptome bei der Spätrachitis sehr wesentlich

zurück und wir sehen ihr Krankheitsbild noch mehr wie bei der jugendlichen Rachitis durch die Veränderungen am Knochensystem beherrscht. Ein Symptom, das ich bei der Spätrachitis vollständig vermißt habe, sind die bei der jugendlichen Rachitis so charakteristischen Kopfschweiße, das gleiche gilt auch von der Vergrößerung der Milz, die in keinem Falle gefunden wurde. Auch komplizierende Erkrankungen der Brustorgane, wie Bronchitiden, wurden in keinem Falle beobachtet und Durchfälle nur bei der 20jährigen Patientin im Falle 15, die in den Kinderjahren lange wegen tuberkulöser Peritonitis und Pleuritis behandelt wurde, die seit früher Jugend an aufgetriebenem Leib und sehr hartnäckigen Durchfällen litt und bei der die Vermutung sehr nahe liegt, daß diese Durchfälle mit einer tuberkulösen Darmerkrankung zusammenhängen. Bei allen andern 14 Patienten fehlen jedoch jegliche Symptome von seiten des Darmes, dagegen ist ein leichter Grad von aufgetriebenem Leib bei den Fällen 5, 7, 9 und ein stärkerer beim Falle 13 und dem schon erwähnten Falle 15 zu konstatieren. In mehreren der Fälle war ein leichter Grad von Anämie vorhanden (Fall 4, 7, 9, 10 und 13) und ein starker Grad beim Falle 15.

Das klinische Bild der Spätrachitis wird aber durch eine Erscheinung sehr stark beherrscht, der infolgedessen eine wichtige diagnostische Bedeutung zukommt, es ist die Hemmung der allgemeinen Entwicklung des Körpers, die in allen untersuchten Fällen deutlich ausgesprochen ist. Diese Entwicklungshemmung zeigt sich einmal in einem sehr deutlichen Zurückbleiben im Körperwachstum, die eine Teilerscheinung der rachitischen Knochenstörung (s. oben) ist, weiter aber in einer vom rachitischen Knochenprozeß nicht direkt abhängigen Hemmung der allgemeinen körperlichen Entwicklung, namentlich in bezug auf die Entwicklung der sekundären Geschlechtsmerkmale und die Zeichen der Reife. Die Wachstumshemmung ist je nach der Dauer des Bestehens der Erkrankung eine verschiedene. Es ist nicht möglich, für dieses Abhängigkeitsverhältnis eine genaue zahlenmäßige Unterlage zu schaffen, da die anamnestischen Daten über den Beginn der Erkrankung oder den Stillstand des Wachstums meist nicht vollständig und zuverlässig genug sind. Aus naheliegenden theoretischen Gründen

ist die erwähnte Abhängigkeit des Grades der Wachstumshemmung von der Schwere, aber namentlich von der Dauer der Erkrankung anzunehmen. Was den Grad der Wachstumshemmung betrifft, so sehen wir z. B. in den nach der Anamnese relativ frischen Fällen 8 und 11 eine mäßige, aber deutliche Wachstumshemmung, in den meisten anderen Fällen mittleren Grades, bei denen größtenteils ein wenigstens mehrjähriges Bestehen der Erkrankung festzustellen war, aber ein Zurückbleiben des Wachstums um 10 bis 20 und mehr Zentimeter unter einem für das betreffende Alter bescheidenen Mittelmaß. Bei denjenigen Fällen endlich, bei denen, wie bei den Fällen 12–15, die Erkrankung aus der früheren Kindheit oder aus dem Säuglingsalter in das Adolozentenalter hinübergeschleppt ist, sehen wir sehr ausgesprochene Grade von eigentlichem Zwergwuchs mit Körperlängen von ca. 104–110–130 cm entstehen. Außer am verminderten Körperwachstum zeigt sich die Entwicklungshemmung namentlich an der mangelhaften Entwicklung der Genitalien und der sekundären Geschlechtsmerkmale. Bei den männlichen Patienten sind allein beim Falle 8 die Genitalien (Penis und Testikel) stark entwickelt, bei den Fällen 3 und 8 nur wenig hypoplastisch, bei allen anderen sind aber die Hoden mehr oder weniger in der Entwicklung zurückgeblieben, kleiner als normal, mandelgroß, bohngroß, zuweilen ungleich, oder die ganzen Genitalien vollkommen kindlich. Bei allen Patienten aber, auch bei denen mit relativ guter Entwicklung der Genitalien, ist die Behaarung des Mons veneris mangelhaft oder ganz fehlend; mangelhaft oder gar nicht entwickelt sind auch die Achselhaare und der Schnurrbart. Bei den Mädchen finden wir ganz entsprechende Verhältnisse, die Körperentwicklung aller untersuchten Patientinnen ist nicht ihrem Alter entsprechend, sie sehen alle jünger aus als ihrem Alter entspricht, oder machen infantilen Eindruck, im Falle 6 sind die Brüste leidlich entwickelt, in allen anderen Fällen aber mehr oder weniger infantil, trotz des reifen Alters. Von den untersuchten weiblichen Patienten ist nur im Falle 11 die Behaarung des Mons veneris stärker angedeutet, aber doch nicht voll entwickelt; in allen anderen Fällen zeigen die äußeren Genitalien vollkommen kindlichen Habitus durch den mehr oder

weniger vollständigen Mangel der Genitalbehaarung. Auch die Behaarung der Achselhöhlen ist entsprechend sehr mangelhaft oder ganz fehlend. Entsprechend der schlechten allgemeinen Entwicklung ist auch die Menstruation bei den weitaus meisten Patientinnen trotz reifen Alters noch nicht aufgetreten. Nur im Falle 11 ist die Menstruation früh und bisher regelmäßig (allerdings erst 3 Monate) aufgetreten, im Falle 6 ist die Menstruation im Alter von 14 Jahren 3mal aufgetreten, hat dann aber vollkommen ausgesetzt, um erst wieder mit 19 Jahren, nach kräftiger Phosphorbehandlung einzusetzen. In allen anderen Fällen ist die Menstruation aber noch nicht eingetreten, trotzdem fast alle diese Patientinnen (außer dem 12jährigen Falle 4) sich bereits im reifen Alter befinden.

Die in den 15 beschriebenen Fällen durchweg beobachtete Hemmung der allgemeinen Entwicklung rechtfertigt es wohl, von einem rachitischen Infantilismus zu sprechen. Er ist diagnostisch von großer Bedeutung, da er namentlich in denjenigen Fällen, bei welchen Deformitäten der Knochen fehlen, auf die rachitische Natur des Grundleidens aufmerksam machen kann. In den leichten Fällen 1 und 2 war es gerade der Infantilismus, der mich veranlaßte, die Knochen dieser Patienten durch die Röntgenographie einer näheren Untersuchung zu unterziehen.

Neben diesen Fällen habe ich aber auch gelegentlich leichtere, spätrachitische Veränderungen bei normal oder sogar stark in die Länge gewachsenen und normal entwickelten Individuen beobachten können, bei welchen vielleicht gerade das starke Längenwachstum des Pubertätsalters für eine rachitische Erkrankung des Skeletts disponiert hat. Hier handelte es sich aber augenscheinlich um spät einsetzende oder nur kurz dauernde Erkrankungen.

Daß eine Hemmung des Körperwachstums und der allgemeinen Entwicklung auch durch die jugendliche Rachitis verursacht wird, ist bekannt, sie ist in vielen Fällen von Rachitis wohl schwer nachzuweisen, weil die jugendliche Rachitis eine in der Regel rascher verlaufende und rascher heilende Krankheit ist, als die Rachitis des Adoleszentenalters, in allen länger dauern-

den Fällen ist sie aber auch bei der jugendlichen Rachitis immer nachzuweisen¹⁾.

Die Rachitis ist sicher nicht die einzige Ursache des Infantilismus, nach meinen bisherigen Erfahrungen ist sie aber eine seiner häufigeren Ursachen.

Von weiteren allgemeinen Symptomen ist zu erwähnen, daß die Reflexe in allen untersuchten Fällen (Fall 1, 2, 3, 7, 10) normal waren, nur im Fall 14 ist eine leichte Steigerung zu konstatieren. Erwähnen möchte ich noch das Vorkommen von auffälligen Pigmentationen der Gesichtshaut bei den Fällen 7 und 15.

Was den Beginn der Spätrachitis anbetrifft, so können wir zwei große Gruppen von Erkrankungen unterscheiden, die verschleppte Rachitis (*Rachitis inveterata*), bei welcher die Krankheit schon in früher Jugend als kindliche Rachitis bestanden hat und, ohne auszuheilen, bis zum Adoleszentenalter und darüber hinaus besteht und die eigentliche Spätrachitis (*Rachitis tarda*), bei welcher die Erkrankung entweder nach einer in früher Jugend überstandenen Rachitis im Pubertätsalter von neuem (rezidivierende Rachitis), oder nach einer rachitisfreien Kindheit im Adoleszentenalter zum erstenmal entsteht (eigentliche Spätrachitis). Ich möchte diese beiden letzten Gruppen der rezidivierenden und der im Adoleszentenalter zum erstenmal entstehenden Rachitis nicht voneinander trennen, da die anamnestischen Angaben in der Regel nicht mit Sicherheit feststellen lassen, ob in früher Kindheit eine Rachitis bestanden hat oder nicht. Übrigens scheinen mir alle diese Unterabteilungen nicht in allen Fällen scharf voneinander zu trennen zu sein und ineinander überzugehen, da der Verlauf der Rachitis überhaupt, und namentlich derjenige der Spätrachitis, kein gleichmäßiger ist, und die Erkrankung sehr häufig von kürzeren oder längeren Remissionen unterbrochen wird. Das macht auch die Unterscheidung, ob man es mit einer verschleppten oder rezidivierenden Erkrankung zu tun hat, oft unmöglich.

Als mit großer Wahrscheinlichkeit zur verschleppten Rachitis gehörend scheint mir von den beschriebenen Fällen der Fall 5

1) Vgl. z. B. die hübschen vergleichenden Bilder in Wohlaue r, Atlas und Grundriß der Rachitis. München 1911 (Lehmann).

(19jähriger Jüngling) zu sein, aus dessen Anamnese zu erfahren ist, daß er als Kind rachitisch war, erst mit 2 Jahren laufen lernte, in der Schule immer der kleinste war, schon als Schulknabe nach wenigen Minuten Gehen ermüdete und Schmerzen in den Beinen bekam, welche Beschwerden seit dem 10. Jahre stark zugenommen haben. Zur verschleppten Rachitis zu rechnen ist weiter der Fall 12 (18jähriger Jüngling), der erst mit 6 Jahren laufen lernte, immer kränklich und schwächlich war, aus körperlichen Gründen nie die normale Schule besucht hat, mit 13 Jahren wegen Genua valga mit Gipsverbänden behandelt wurde und seit einem Jahr wegen Gehstörungen infolge von Rücken-, Kreuz- und Beinschmerzen vollkommen arbeitsunfähig ist. Weiter möchte ich zur verschleppten Rachitis den Fall 13 rechnen, der, geistig schwach entwickelt, von Kindheit an schwach auf den Beinen und von zwerghaftem Wuchs war und mit 14 Jahren so hoch gradige Verkrümmungen der Beine zeigt, daß schon deshalb an ein Gehen gar nicht zu denken ist; ferner der Fall 14 eines idiotischen Knaben, der sich von Geburt an sehr langsam entwickelte, sehr spät sitzen und nie laufen lernte und vom 13. Lebensjahre an an hochgradiger Knochenbrüchigkeit litt, infolge welcher es zu monströsen Verkrümmungen der unteren Extremitäten kam. Von ganz besonderem Interesse ist der Fall 15 von sicher festgestellter verschleppter Rachitis bei einem 20jährigen Mädchen, weil hier die Rachitis von ärztlicher Seite schon im ersten Lebensjahr festgestellt und bei einem mehrmaligen, im ganzen mehrjährigen Aufenthalt des Kindes in einer ärztlich geleiteten Anstalt durch fast die ganze Kindheit hindurch verfolgt wurde. Das Kind hat nur kurze Zeit seines Lebens, etwa $\frac{1}{2}$ Jahr lang, gehen können (im Alter von $3-3\frac{1}{2}$ Jahren), nach einem Falle wurde es bettlägerig und konnte seither nie mehr gehen, es bildeten sich im Bett die hochgradigsten Deformitäten der Knochen aus.

Diese Fälle von verschleppter Rachitis sind von sehr großem theoretischem Interesse, da der Nachweis, daß die Spätrachitis hier eine ungeheilte Rachitis des Kindesalters ist, es im höchsten Grade wahrscheinlich macht, daß wir es auch in den anderen Fällen mit einer der jugendlichen Rachitis identischen Affektion zu tun haben.

Der zuletzt erwähnte Fall 15 einer sicher nachgewiesenen verschleppten Rachitis ist noch deshalb von besonderem Interesse, weil wir hier die Rachitis von der frühen Kindheit bis zum 20. Lebensjahre verfolgen können und die Patientin nun ihre Krankheit in das Alter hinübernimmt, in welchem wir nach der alten Auffassung keine Rachitis mehr, sondern nur noch eine Osteomalacie kennen.

Die noch nicht erwähnten Fälle 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 zähle ich zu der eigentlichen Spätrachitis, glaube aber, daß vielleicht, oder sogar wahrscheinlich, der eine oder der andere dieser Fälle sich als verschleppte Rachitis erweisen würde, wenn wir genauere anamnestische Angaben über diese Patienten besitzen würden.

Was die Reihenfolge der Entstehung der klinischen Symptome bei der Spätrachitis betrifft, so glaube ich, daß das erste nachweisbare Symptom, jedenfalls in den schwereren Fällen, die Hemmung oder der Stillstand des Wachstums und der Entwicklung ist. Ich schließe das aus den Angaben der Fälle 7 und 10 und aus dem Fall 1. Fall 7 (17 $\frac{1}{2}$ jähr. Mädchen) gibt an, daß sie vom 13. Jahre an im Wachstum zurückblieb, aber erst mit 16 Jahren eigentliche Beschwerden bekommen habe. Fall 10 (18jähr. Mädchen) war in der Schule immer die kleinste, schon mit 14 Jahren war sie einen Kopf kleiner als ihre Altersgenossen, erst mit 17 Jahren bekam sie subjektive Beschwerden. Diese beiden Angaben über den Wachstumsstillstand jahrelang vor Beginn der eigentlichen Beschwerden, die in beiden Fällen bestimmt als erst 1 $\frac{1}{2}$ bzw. $\frac{3}{4}$ Jahre bestehend angegeben werden, erscheinen mir nicht nur glaubhaft, sondern sicher richtig, in Anbetracht der hochgradigen Wachstumshemmung, den diese beiden Fälle aufweisen. Auch der Fall 1 spricht sehr deutlich für das frühe Auftreten der Wachstums- und Entwicklungshemmung. Der 15 $\frac{1}{2}$ jährige Patient, der wegen eines stenosierenden Kropfes ärztliche Hilfe aufsuchte, zeigte einen sehr ausgesprochenen rachitischen Infantilismus, rachitischen Rosenkranz und leichte aber deutliche Auftreibungen der Epiphysen der langen Knochen und röntgenologisch die deutliche rachitische Atrophie der Knochen und die rachitischen Knorpelveränderun-

gen, er hatte aber über keine subjektive Beschwerden von seiten des Knochensystems zu klagen.

Die klinischen Symptome der Spätrachitis sind, soweit sie die subjektiven Beschwerden betreffen, sehr gleichförmige und typische, immer wird zuerst über leichte Ermüdbarkeit geklagt, die Patienten können nicht lange gehen oder stehen und sich nicht anstrengen, später treten ganz regelmäßig Schmerzen in den Beinen, in den Knien und Knöcheln oder auch in den Unterschenkeln auf, nur Fall 3 und 15 gibt sie im Rücken und in den Beinen an. Die Schmerzen treten hauptsächlich bei Anstrengungen, bei längerem Stehen und Gehen, beim Treppensteigen, namentlich beim Abwärtsgehen, auf, oder beim Heben von Gegenständen, beim festen Auftreten und beim Arbeiten. Die Kranken fühlen sich schwach auf den Beinen, sinken leicht ein, können nur langsam gehen.

Es bilden sich langsam Deformitäten der Knochen, Skoliosen und die typischen Belastungsdeformitäten der Knie, Genua valga und vara und fast immer Plattfüße. In den schweren Fällen kommen noch bogenförmige Verbiegungen der Ober- und Unterschenkel und Verbiegungen der Knochen der oberen Extremitäten hinzu (Fall 12, 13, 14, 15). Die schweren Fälle werden bettlägerig, die Deformitäten nehmen auch noch im Bett zu unter der Einwirkung des Muskelzuges und unter der Einwirkung von Frakturen und Infraktionen (Fall 14, 15).

Im Falle 14 von verschleppter Rachitis bestand eine eigentliche Knochenbrüchigkeit im Alter von 13—16 $\frac{1}{2}$ Jahren, während welcher Zeit sich wenigstens 10 Frakturen ereigneten; im Falle 15 erlitt die Patientin im 15. Lebensjahr eine Fraktur der rechten Tibia. Über Infraktionen der Knochen ist von den Patienten im allgemeinen nichts zu erfahren, da sie meist unbemerkt entstehen; in den Fällen 14 und 15 bestanden nach den Röntgenbildern aber zahlreiche Infraktionen. Der Grad der Deformitäten am Skelett ist nicht allein vom Zustande der Knochen abhängig, sondern auch von der Pflege, die dem kranken Knochen zu teil wird und von der Schonung, die die Patienten selbst ihren Gliedern angedeihen lassen. Es ist wohl kein Zufall, daß gerade bei den beiden hochgradig Schwachsinnigen und deshalb sehr indolenten Individuen (Fall 13 und 14) die Deformitäten der un-

teren Extremitäten geradezu erschreckende Grade angenommen haben.

Genua valga und vara sind bei den untersuchten Fällen etwa gleich stark vertreten, ein Fall weist je ein Genu varum und valgum zugleich auf (Fall 7), und Fall 15 zeigt eine typische Deformität des unteren Radiusendes, die der Madelung'schen Handdeformität entspricht und auf einer volaren und radialen Abknickung des unteren Radiusendes (etwas auch des unteren Ulnaendes) durch eine langsam entstandene Verbiegung oder Infraktion des Radius beruht. Durch diese Verbiegung springt das Ulnaköpfchen auf der ulnaren Seite abnorm stark vor.

Betrachten wir unsere 15 Fälle von Spätrachitis auf ihre Deformitäten, so erkennen wir, daß sie alle die typischen Belastungsdeformitäten des Adoleszentenalters aufweisen, und zwar finden wir in jedem der Fälle mehrere derselben beim selben Individuum vereinigt: Skoliose, Genua valga oder vara und Plattfüße. Diese Feststellung ist von großer Bedeutung für die Frage der Ätiologie der sog. Belastungsdeformitäten, da die Ansichten über die eigentliche Ursache derselben heute noch nicht definitiv erledigt erscheint. Viele glauben heute noch, daß eine starke „physiologische“ Belastung des Skelettsystems im jugendlichen Alter imstande ist, die Belastungsdeformitäten zu erzeugen. Es scheint zwar von vornherein unwahrscheinlich, daß die physiologische Belastung des Skeletts, auch wenn sie intensiv ist, eine Verbiegung desselben hervorruft, und die andere Ansicht, daß den Verbiegungen eine Erkrankung des Skeletts zugrunde liege, scheint sehr viel wahrscheinlicher. Hoessly¹⁾ hat nun kürzlich gezeigt, daß bei knochengesunden Individuen, die infolge von Verlust, Lähmung oder sonstiger Gebrauchsunfähigkeit eines Beines das andere abnorm belasten, das abnorm belastete Bein meistens gar keine Deformitäten zeigt, und daß dort, wo Deformitäten auftreten, diese ganz andere sind als die sog. Belastungsdeformitäten. Es treten nämlich bei diesen Individuen Deformitäten auf, die unschwer aus einer Anpassung an die ge-

1) Hoessly, Zur Frage der Belastungsdeformitäten. Münchner med. Wochenschr. 1919, Nr. 14, S. 373.

steigerte Belastung zu erklären sind, Hypertrophie des gesunden Beines, Genu recurvatum und Knickfuß, aber nicht die gewöhnlichen Belastungsdeformitäten. Danach kann also die abnorme Belastung nicht als die Ursache der Belastungsdeformitäten angesprochen werden, sondern nur als das auslösende Moment. Für das Zustandekommen der Belastungsdeformitäten bedarf es auch danach einer abnormen Weichheit und Nachgiebigkeit des Skeletts, als deren Ursache hauptsächlich die Rachitis, speziell die Spätrachitis, in Frage kommt. Es ist deshalb von besonderem Interesse, das Vorkommen von Belastungsdeformitäten bei sicher festgestellter Spätrachitis zu prüfen. Da nun, wie ich erwähnt habe, bei allen von mir untersuchten Fällen von Spätrachitis die sog. Belastungsdeformitäten, Skoliose, Genua valga und vara und Plattfüße fast ausnahmslos miteinander kombiniert vorkommen, scheint mir der Schluß wohl berechtigt, daß die Spätrachitis als die Ursache der Belastungsdeformitäten anzusprechen ist in allen Fällen, bei denen eine andere, greifbare, Ursache nicht nachgewiesen werden kann. Dieser Schluß scheint mir um so mehr berechtigt, als meine in wenigen Jahren gesammelte Zahl von Spätrachitisfällen beweist, daß die Spätrachitis nicht so selten ist, als man bisher annahm und meine Erfahrungen an einem großen poliklinischen Material mich gelehrt haben, daß leichte, aber floride, ohne subjektive Beschwerden verlaufende rachitische Veränderungen als zufälliger Nebebefund bei älteren Kindern und Adoleszenten sowohl durch klinische, als namentlich durch röntgenologische Untersuchung häufig nachzuweisen sind. Damit scheint mir die schon von v. Mikulicz mit Bestimmtheit ausgesprochene, des überzeugenden Beweises aber noch entbehrende Behauptung, daß die Belastungsdeformitäten Folge einer spätrachitischen Erkrankung sind, bestätigt und durch neue Tatsachen sichergestellt.

Von den bekannten rachitischen Deformitäten war in meinen Fällen nur eine, die *Coxa vara*, durch kein Beispiel vertreten. Die *Coxa vara* ist von den Belastungsdeformitäten weitaus die seltenste und dies mag der Grund sein, warum sie in meiner Beobachtungsreihe nicht vorkam. Auch die *Coxa vara* ist meines Erachtens zu den rachitischen Deformitäten zu rechnen, soweit nicht eine andere, bekannte, Ätiologie nachgewiesen werden kann

(kongenitale und traumatische Coxa vara). Für einzelne der in der Literatur niedergelegten Fälle von Coxa vara adolescentium ist die rachitische Ätiologie nachgewiesen worden, für eine größere Reihe von Fällen der Schweizer. orthopädischen Anstalt in Zürich hat Frösch¹⁾ den klinischen und röntgenologischen Nachweis der rachitischen Natur der Deformität zu leisten gesucht. Es ist ihm meines Erachtens auch gelungen, wenn auch seine Bilder, die zum großen Teile nicht aus dem floriden Stadium der Erkrankung stammen, nicht die hochgradigen und eindrucklichen Veränderungen zeigen, wie meine Spätrachitisfälle. In einem kürzlich von mir beobachteten Falle von Coxa vara waren aber die typischen Zeichen der Spätrachitis klinisch und röntgenologisch aufs deutlichste nachzuweisen. Warum die Coxa vara, die bei den ungünstigen mechanischen Bedingungen des Schenkelhalses häufiger zu erwarten wäre, viel seltener vorkommt, als die anderen rachitischen Deformitäten, kann ich nicht sagen.

In zwei der beschriebenen Spätrachitisfälle fand sich eine andere Deformität des Schenkelhalses, im Falle 10 ein deutliches Abrutschen des Hüftgelenkkopfes nach außen-oben (Tafel XIV, Fig. 42) und im Falle 12 eine Abbiegung der Schenkelhäse nach oben, also eine *Coxa valga*. Es mag paradox erscheinen, daß eine Belastung des Schenkelhalses in diesen beiden Fällen eine Verschiebung der Femurepiphyse nach oben-außen und eine Aufwärtsbiegung der Schenkelhäse erzeugt, also Deformitäten, die scheinbar dem Drucke entgegengerichtet sind. Für den ersten Befund konnte ich keine plausible Erklärung finden, wenn nicht auch hier die Erklärung des zweiten Befundes anwendbar ist. Die Aufwärtsbiegung der Schenkelhäse im Falle 12 scheint mir aber erklärbar als eine kompensatorische Biegung, die durch eine ziemlich starke Ausbiegung des Femur mit äußerer Konvexität bedingt ist. Die Untersuchung der unteren Extremitäten des Falles 12 (Fig. 29) zeigt, namentlich deutlich auf dem Röntgenbilde, daß die komplizierten Verbiegungen der Beine dieses Falles aus einigen aufeinanderfolgenden Biegungen bestehen, die ein System von Krümmungen und kompensatorischen Gegenkrümmungen bilden. Die Tibiae haben eine gestreckte S-Form, indem einer

1) Frösch, Zur Pathogenese der Coxa nova. Inaug.-Diss. Zürich, 1918.

Einwärtsbiegung in der oberen Hälfte eine kompensatorische Auswärtsbiegung in der unteren entspricht. So scheint auch der Auswärtsbiegung des Oberschenkels die Einwärts-, d. i. Aufwärtsbiegung des Schenkelhalses als kompensatorische Krümmung zu entsprechen.

Deformitäten am Schädeldach, d. h. das abnorme Vortreten der Tubera frontalia und parietalia wurde in den Fällen 1, 3, 5, 12 nur andeutungsweise oder nur in ganz leichtem Grade gefunden, in allen anderen Fällen dagegen vollkommen vermißt, was wohl damit zusammenhängt, daß diese Deformität nur in dem Alter in stärkerem Maße sich ausbildet, in dem der Schädel stark wächst, d. h. in der frühen Kindheit; im Adoleszentenalter wächst der Schädel aber nicht mehr stark. Es ist aber auffallend, daß sogar im Falle 15 von sicher aus der ersten Kindheit verschleppter Rachitis, eine Schädeldeformität nicht vorhanden ist. Dagegen fand ich mehrmals einen abnorm hohen und stark gewölbten Gaumen. Die Zähne waren oft unregelmäßig gestellt, die typisch rachitischen Zähne, bei welchen ein Schmelzdefekt einen atrophischen oder unregelmäßigen und zackigen Rand der Zähne erzeugt, habe ich nur im Falle 1 und 15 in mäßigem Grade gesehen. Im Falle 13 waren die Kiefer fast vollkommen zahnlos, es waren nur zwei rudimentäre untere Schneidezähne vorhanden. Über den Zahndurchbruch in diesem Falle ist nichts bekannt, wahrscheinlich handelt es sich hier, wie in den Fällen von Kassowitz und v. Genser, darum, daß das Milchgebiß ausgefallen, das bleibende Gebiß aber noch nicht durchgebrochen ist. Im Falle 15 sind 4 Prämolargähne vom bleibenden Gebiß retiniert.

Neben den Deformitäten bestehen in allen Fällen Auftreibungen der Epiphysenfugen, der rachitische Rosenkranz, und Auftreibungen der Handgelenksepiphysen, auch der Knie- und Knöchelepiphysen. Diese Auftreibungen sind in den meisten Fällen deutlich, in einzelnen Fällen, unter denen sowohl die leichteren als auch die schweren vertreten waren, waren sie etwas weniger ausgeprägt (Fall 2, Fall 6 an den Handgelenken, Fall 12), so daß hier das Röntgenbild zur Bestätigung der Epiphysenknorpelveränderungen gerne zu Rate gezogen wurde.

Die Druckempfindlichkeit der Knochen ist leider

nicht in allen Fällen, wohl aber in den Fällen 2, 3, 6, 10, 12, 15 geprüft worden. Fall 2, der auf dem Röntgenbild frische Heilungsvorgänge aufweist, ist nicht druckempfindlich, dagegen sind die Knochen der frischen Fälle 3, 6, 10, 12, 15 alle deutlich druckempfindlich. Aus diesen Beobachtungen, sowie aus der Beobachtung bei der Heilung der Spätrachitis unter Phosphorbehandlung, sowie bei der Osteomalacie in frischem, wie auch unter Phosphor heilendem Stadium, glaube ich schließen zu können, daß die Druckempfindlichkeit der Knochen nur in den floriden Fällen oder bei noch nicht weit vorgeschrittener Heilung vorhanden ist, während sie bei weiter fortgeschrittener Heilung, auch wenn die anatomischen Veränderungen noch lange nicht ausgeglichen sind, mehr oder weniger verschwindet. Dieses Verhalten der Druckempfindlichkeit der Knochen scheint mir das einzige klinische Symptom zu sein, das uns ein gewisses Urteil über das augenblickliche Stadium des Krankheitsprozesses erlaubt.

Betrachten wir nun die beiden Übergangsfälle 16 und 17, so erkennen wir, daß bei beiden die Erkrankung als typische Spätrachitis begonnen hat, sowohl bezüglich des Alters, in dem die Erkrankung aufgetreten ist, als auch bezüglich ihrer Symptome. Im Fall 16 begannen die Beschwerden im 14. Lebensjahr mit den typischen Gehbeschwerden, leichter Ermüdbarkeit beim Gehen, dann folgten Schmerzen in den Beinen, Unsicherheit und Kraftlosigkeit in den Knien. Nach dem 18. Jahre änderte sich das Krankheitsbild insofern, als die Schmerzen mehr auf die spongiösen Knochen übergingen, auf Rippen, Kreuz- und Lendengegend und ein Zusammensinken der Wirbelsäule eintrat, das zu einem krummen Rücken und einem starken winkeligen Vorspringen des Brustbeines führte. Zu den typischen rachitischen Verkrümmungen der Knie, zu Genua valga und vara, ist es in diesem Falle nicht gekommen, vielleicht deshalb, weil die sehr intelligente Patientin ihre Beine, wie sie selbst sagte, schon frühzeitig schonte und seit dem 18. Jahre an Stöcken, später an Krücken ging. Wohl infolge des starken Gebrauches der Hände beim Gehen mit Stöcken und Krücken haben sich hochgradige Verbiegungen der Handgelenksepiphysen ausgebildet. Auch bezüglich der mangelhaften allgemeinen körperlichen Entwicklung

reicht sich der Fall durchaus in das Bild der typischen Spätrachitis ein. Die Menstruation trat nur relativ wenig verspätet, mit 16 Jahren, auf, doch zeigen die dürftige Körperentwicklung und vor allem die sehr kleinen absoluten Maße der einzelnen, nicht deformierten Körperteile, z. B. des Fußes, bei der jetzt ausgewachsenen Patientin, daß auch hier eine hochgradige Hemmung der körperlichen Entwicklung stattgefunden hat. Das Bild der Spätrachitis wird noch vervollständigt durch das Vorhandensein des für die Spätrachitis typischen röntgenologischen Befundes der Knochen und der Epiphysenknorpel, die auf einem im 15. Lebensjahre aufgenommenen Röntgenbild der rechten Knöchelgegend festzustellen sind und die noch weit über das Wachstumsalter hinaus (29. Lebensjahr!) bestehen, worauf ich später noch zurückkomme. Es trat also in diesem Falle ein gewisser Wechsel in den klinischen Erscheinungen um das 18. Lebensjahr ein, indem vor dem 18. Lebensjahr die Beschwerden fast ausschließlich die Beine betrafen, nach dem 18. Jahre aber die Beschwerden im Brustkorb und in der Wirbelsäule und im Kreuz die Hauptrolle spielten und daß es nach dem 18. Lebensjahre zu einem hochgradigen Zusammensinken der Wirbelsäule kam, infolgedessen die Patientin in ihrem 29. Lebensjahre das typische Bild der Osteomalacischen (s. Fig. 21) darbietet. — Ist schon in diesem Falle der Wechsel der klinischen Erscheinungen an der Grenze des Wachstumsalters sehr ausgesprochen, so tritt er in noch viel deutlicherer Weise im Fall 17 vor uns. Auch bei dieser Patientin begann das Leiden als typische Spätrachitis im Alter von 15 Jahren und bot eine Reihe interessanter Allgemeinerscheinungen. Schon eine im 23. Lebensjahre aufgenommene Krankengeschichte des Bürgerspitals Basel bezeichnet sie als klein, sehr grazil, von infantilem Habitus, mit schwach entwickelten Mammæ und überall schwach ausgebildeten Geschlechtsmerkmalen. Die Menstruation trat mit 15½ oder 16 Jahren auf und hat mit einem einmaligen Unterbruch von 2 Monaten regelmäßig fortbestanden. Seit dem 20. oder 21. Lebensjahre bestanden häufige Durchfälle ohne besondere Ursache und zeitweise Krämpfe der Hände, die wohl sicher als tetanische anzusprechen sind und seit dem 23. Lebensjahre bestanden auffallend große, braune Sommersprossen im Gesicht.

Die Beschwerden von seiten des Knochensystems begannen mit 15 Jahren mit leichter Ermüdbarkeit und Schmerzen in den Knien und Knöcheln. Es kam zur Ausbildung von Genua valga, die operiert wurden, da aber das rechte Knie sich in ein Genu varum umwandelte, wurde dieses im 23. Lebensjahre noch einmal operiert. Von diesem Lebensalter an änderte sich das Krankheitsbild sehr wesentlich, es traten Schmerzen im ganzen Skelett auf, namentlich auch in der Brust, im Kreuz und in den Hüften, die Wirbelsäule sank außerordentlich in sich zusammen, das Brustbein verbog sich in einem sehr starken Winkel nach vorne (Hühnerbrust). Auch hier bietet die Patientin heute, in ihrem 27. Lebensjahre, das typische Bild der Osteomalacie (s. Fig. 22). Sahen wir im Falle 15 von verschleppter Rachitis die jugendliche Rachitis aus der ersten Kindheit ununterbrochen in die Spätrachitis übergehen, so sehen wir in den beiden Übergangsfällen 16 und 17 das typische Krankheitsbild der Spätrachitis sich in das klassische Bild der Osteomalacie verwandeln. Die Veränderung des Krankheitsbildes vollzog sich im 18. bzw. im 23. Lebensjahre der Patientinnen, also etwa um die Zeit der Grenze der Wachstumsperiode, dadurch, daß die vorher hauptsächlich auf die unteren Extremitäten beschränkten Beschwerden und Deformitäten durch solche an den spongiösen Knochen, namentlich an der Wirbelsäule und am Thorax, abgelöst wurden. Daß in den beiden Übergangsfällen die Menstruation nur eine relative Verspätung zeigte, indem sie in beiden Fällen vom 16. Lebensjahre an ungestört fort dauerte, hängt vielleicht damit zusammen, daß in diesen Fällen die Krankheit relativ spät, d. h. erst im 14. bzw. 15. Lebensjahre, begann, während in den meisten früher erwähnten Fällen von Spätrachitis, bei denen die Menstruation fast durchweg sehr stark verspätet oder viele Jahre ganz ausgeblieben war, der Beginn der Erkrankung stets ein viel früherer war. Es scheint demnach, daß die Spätrachitis nur dann einen wesentlichen Einfluß auf die Menstruation ausübt, wenn die Erkrankung schon vor oder während des Alters der sexuellen Reifung, d. h. im 10. bis 13. Jahre beginnt, während ihr Einfluß ein relativ geringer ist, wenn die Erkrankung erst nach diesem Zeitpunkt auftritt.

Die Röntgenuntersuchung ist bei der Rachitis eine sehr wertvolle anatomische Untersuchungsmethode. Daß es wohl möglich ist, aus dem Röntgenbilde nicht nur die makroskopischen Hupterscheinungen des rachitischen Prozesses, sondern auch das Stadium seiner Entwicklung, ev. Heilungsvorgänge und Remissionen, herauszulesen, haben Fraenkel und Lorey¹⁾ für die kindliche Rachitis nachgewiesen. Ich möchte hier gleich vorweg nehmen, daß alle Befunde, die sich röntgenologisch bei der kindlichen Rachitis erheben lassen, auch bei der Spätrachitis mit derselben Deutlichkeit und Sicherheit nachzuweisen sind, mit gewissen, durch das höhere Alter des Patienten bedingten Modifikationen, auf die ich noch zurückkomme.

Ich möchte im folgenden versuchen, zusammenhängend darzustellen, was wir bei der Rachitis, speziell bei der Spätrachitis, von den anatomischen Veränderungen am Knochen auf dem Röntgenbild erkennen können. An der Knochensubstanz dokumentiert sich der rachitische und osteomalacische Prozeß zuerst in der Hemmung der Kalkablagerung in den Knochen, die zu der Bildung der osteoiden Säume führt. Die dadurch bedingte Kalkarmut der Knochen muß sich in einer vermehrten Durchlässigkeit der Knochen für Röntgenstrahlen zeigen. Eine weitere Veränderung am rachitischen und osteomalacischen Knochen ist die Hemmung der physiologischen Apposition bei normaler oder nur wenig gehemmter Resorption, die zu einer Atrophie des alten Knochens führt. Die Atrophie und Rarefifikation des alten Knochens ist auf dem Röntgenbild an einer Auflockerung der Spongiosastruktur und an einer Verdünnung und Auflockerung der Corticalis zu erkennen.

Die rachitische Störung der enchondralen Ossifikation findet sich natürlich nur in den Fällen, bei denen die Erkrankung in die Periode des Knochenwachstums fällt, d. h. bei der Rachitis und der Spätrachitis, während sie bei der Osteomalacie der Erwachsenen natürlich fehlt. Zu der rachitischen Knorpelstörung gehört zunächst die Hemmung im Wachstum der Epiphysen-

1) E. Fraenkel u. Lorey, Die Rachitis im Röntgenbild. Archiv und Atlas der norm. und patholog. Anatomie in typischen Röntgenbildern, Hamburg 1910, Bd. 22.

knorpel. Davon ist im histologischen Bild und im Röntgenbild natürlich nichts zu sehen, sie zeigt sich aber in der Hemmung des Längenwachstums der Knochen. Die eigentliche, auch im Röntgenbild festzustellende Störung der enchondralen Ossifikation besteht darin, daß zunächst die den Epiphysenknorpel gegen die Diaphyse zu begrenzende, feine Verkalkungslinie, die normalerweise auf das Röntgenbild eben zu sehen ist, verschwindet. Da gleichzeitig die Markgefäße aufhören, in den langsam wachsenden Knorpel einzudringen und ihn einzuschmelzen, bleibt der gewucherte Knorpel unverbraucht liegen (Hemmung der Markraumbildung und Verarbeitung des Epiphysenknorpels). Es kommt so zu einer Verbreiterung der Epiphysenknorpel, die in langdauernden, schweren Fällen zum Liegenbleiben von fast tumorartig aussehenden Knorpelmassen führen kann (Looser, Péron und Mesley). In den freien Rand dieser Knorpelmasse dringen die Markgefäße nur wenig tief und sehr unregelmäßig ein, so daß ihr Rand eine sehr unregelmäßige, zackige und ausgefrante Begrenzung annimmt. Durch Quellung und Degeneration des liegeengebliebenen Knorpels und namentlich auch durch Kompression und seitliches Ausweichen der weichen Knorpelmassen und des sich anschließenden weichen osteoiden Gewebes (Pommer) bei der Belastung, bilden sich die schon äußerlich bei schwerer Rachitis sichtbaren Verdickungen der Epiphysengegenden. Die an den verbreiterten und unregelmäßigen Epiphysenknorpel bei der Rachitis sich anschließende enchondrale Knochenbildung ist, soweit es sich um den normalen Ossifikationsprozeß von lamellösem Knochen handelt, unregelmäßig und spärlich. Dagegen erzeugen die in jener Zone bei jeder schweren Rachitis nachweisbaren mechanischen Einwirkungen, die sich in Abbiegungen, „Abscherung“ und meist deutlich erkennbarer Kompression dieser Zone durch die Belastung zeigt, eine mehr oder weniger hochgradige Bildung von feinporigem, kalklosem, geflechtartigem Knochen, dessen Bildung oft auch in den den Knorpel durchziehenden Knorpelmarkkanälen zu verfolgen ist. Dadurch entsteht das, was wir als „osteoid Zone“ an der rachitischen Ossifikationsgrenze zu bezeichnen gewohnt sind.

Die eben geschilderten Veränderungen an der Ossifikationszone sind auf dem Röntgenbilde deutlich zu verfolgen und zeigen

sich in einer mehr oder weniger hochgradigen Verbreiterung und unregelmäßigen Begrenzung der Knorpelfugen gegen die Diaphyse (Fig. 39 u. 40). Die an die Knorpelwucherungszone sich anschließende, mehr oder weniger breite osteoide Zone ist meist weder gegen den Knorpel noch gegen den Knochen der Diaphyse scharf abzugrenzen; sie bildet meist mit dem Epiphysenknorpel zusammen, der in seinen vorgeschobenen Teilen sehr häufig von osteoidem Gewebe durchsetzt ist, das sich auch in den ihn durchziehenden Knorpelmarkkanälen findet, und bei Remissionen auch Kalk aufnehmen kann, eine mehr oder weniger breite, verwaschene, strukturlose oder sehr strukturarme Zone, die bei der Spätrachitis bis zu 2 cm und darüber betragen kann. Da diese Zone auch gegen die Diaphyse sehr unscharf und unregelmäßig begrenzt ist, gewinnt das Diaphysenende eine gegen die Wucherungszone sehr unregelmäßige, unscharfe, zackige, wie ausgefranste Begrenzung. Wenn zugleich die Wucherungszone stark in die Breite entwickelt ist, zeigt sich das Schaftende der Epiphyse zugleich mehr oder weniger becherförmig erweitert.

Während die rachitische Störung am Knochen im ganzen Skelett in gleicher Intensität nachzuweisen ist, sind in der Intensität der rachitischen Knorpelstörung an den einzelnen Ossifikationszonen sehr starke Unterschiede vorhanden. Wie P o m m e r und S c h m o r l nachgewiesen haben, ist die Intensität der Knorpelstörung proportional der Wachstumsintensität der einzelnen Epiphysenknorpel. Die Knorpelstörung ist deshalb an den schnell wachsenden Knochenenden, wie z. B. am unteren Femur- und am oberen Tibiaende, oder am distalen Ende der Vorderarmknochen hochgradig, an den langsam wachsenden, kleinen Knochen dagegen, z. B. an den Knochen der Hand, im gleichen Falle gering und fehlt bei leichteren Fällen hier sogar ganz.

Der Verlauf der Rachitis ist sehr oft kein gleichmäßiger, sondern er ist, wie die Erfahrung zeigt, nicht selten von Remissionen und Exazerbationen unterbrochen. S c h m o r l hat die anatomischen Veränderungen bei der heilenden und rezidivierenden Rachitis und F r a e n k e l und L o r e y ihren röntgenologischen Ausdruck bei der kindlichen Rachitis beschrieben. An den Epiphysenknorpeln ist die beginnende Heilung an dem Wiederauftreten einer präparatorischen Verkalkungszone zu erkennen, aber

Schematische Darstellung der rachitischen Epiphysenveränderungen im floriden, Heilungs- und Remissionsstadium (nach den eigenen Röntgenbefunden).

Fig. 39.

Normales Epiphysenende. Epiphysenknorpel schmal und regelmäßig, mit deutlicher, verkalkter Basallinie und präparatorischer Verkalkungszone. Spongiosa dicht, in der Diaphyse bis an die präparatorische Verkalkungszone reichend. Corticallis kräftig, von der Epiphysenlinie an rasch an Dicke zunehmend.

Fig. 40.

Floride Rachitis. Epiphysenknorpel verbreitert, gegen die Diaphyse unregelmäßig begrenzt. Zwischen ihm und der Diaphyse strukturlose, osteoide Zone. Die Verkalkung der Basallinie und die präparatorische Verkalkungszone fehlen. Spongiosa aufgelockert, Corticallis verdünnt, ihr diaphysäres Ende durch den sich seitlich buckelförmig vorwölbenden Epiphysenknorpel becherförmig ausgeweitet.

Fig. 41.

Rachitis in beginnender Heilung. Auftreten einer Verkalkungslinie mitten im Knorpel in der Gegend der Knorpelzellsäulen und Verkalkung der Basallinie, die meist breiter erscheint als normal.

Fig. 42.

Rachitis in fortschreitender Heilung. Die Verkalkung des Knorpels schreitet gegen den freien Knorpelrand fort und erzeugt eine stark verbreiterte Verkalkungszone.

Während des Rezidivs gebildeter Knorpel
Während der früheren Remissionsperiode gebildete Verkalkungslinie

Fig. 43.

Rezidivierende Rachitis. Die bei der Heilung gebildete Verkalkungszone ist durch das Wachstum des Knorpels von ihrer normalen Stelle diaphysenwärts verschoben worden und bleibt trotz des Rezidivs größtenteils erhalten. Auch die während der Remission etwas breiter als normal verkalkte Basallinie behält meist ihre Verkalkung auch während des Rezidivs, wenn dasselbe nicht zu lange dauert.

sie tritt, wie Schmörl gezeigt hat, nicht am Rande der Knorpelwucherung, sondern inmitten des Knorpels in der Höhe der Knorpelzellsäulen auf, dort, wo sie normalerweise, wenn die Verbreiterung des Knorpels nicht bestände, auftreten würde (Fig. 41). Sie ist zuerst schmal und verbreitert sich bei fortdauernder Heilung langsam gegen den Rand des Knorpels. Hält die Remission lange an, so kann die ganze Knorpelwucherung mit Kalksalzen imprägniert werden und ein sehr stark verbreitertes Kalkband darstellen (Fig. 42), das erst durch Abbau des überflüssigen

Fig. 44.

Rachitis, in deren Verlauf mehrere Remissionen und Rezidive aufeinander gefolgt sind.

Materials auf das normale Maß reduziert wird. Sehr häufig werden aber die Heilungsvorgänge durch Rezidive unterbrochen. In diesem Falle rückt die neu entstandene Verkalkungszone mit dem Knorpelwachstum diaphysenwärts und bleibt hier als mehr oder weniger unterbrochenes Kalkband nachweisbar (Fig. 43). Tritt später wieder eine Remission ein, so entsteht wieder eine neue Verkalkungszone in der Höhe der Knorpelzellsäulen, die von der ersten, mehr diaphysenwärts gerückten, je nach der Länge des sie trennenden Rezidivs durch eine mehr oder weniger breite, kalklose Zone getrennt ist. So können beim Abwechseln von Remissionen und Exazerbationen 2, 3 und mehr Verkalkungslinien übereinander nachzuweisen sein, die im Röntgenbild eine eigenartige Schichtung von dunkeln und hellen Zonen erzeugen (Fig. 44).

Die Heilungsvorgänge an der Knochensubstanz bestehen darin, daß die kalklosen Randzonen der Knochensubstanz und die während der Erkrankung im Periost und im Knochenmark gebildete geflechtartige Knochensubstanz (Osteophysen) Kalksalze aufnehmen und daß durch normalen Anbau von lamellösem Knochen die Atrophie der Knochensubstanz sich langsam wieder ausgleicht. Gleichzeitig wird bei fortschreitender Heilung der geflechtartige Knochen durch lamellösen ersetzt, der, entsprechend dem engmaschigen Bau des geflechtartigen Knochens, zunächst auch ein dichtes Gefüge hat, aber allmählich durch Umbau auf ein annähernd normales Maß und auf eine normale Architektur umgearbeitet wird, zuweilen bleibt aber eine dauernde Verdickung der Knochen zurück (rachitische Hyperostose).

Ich komme zu den speziellen Röntgenbefunden bei den untersuchten Fällen. Alle 15 untersuchten Fälle zeigen auch auf dem Röntgenbild die typischen rachitischen Veränderungen am Knochen und an den Epiphysenknorpeln in einem der Schwere des klinischen Bildes entsprechenden leichteren oder schwereren Grade. Die zum Bilde der Rachitis gehörende Atrophie der Knochen ist in keinem einzigen Falle zu vermissen, und schon in den leichteren Fällen deutlich, in den schweren aber sehr stark ausgeprägt. Sie bildet ein außerordentlich wichtiges Kriterium für die Diagnose der Spätrachitis. Sie zeigt sich an der Corticalis in den leichten Fällen an einem Schmälerwerden derselben, was namentlich an den, den Epiphysen benachbarten, Enden des Knochenschaftes zu erkennen ist; hier nimmt die Dicke der Corticalis gegen die Mitte des Schaftes abnorm langsam an Dicke zu, gleichzeitig blättert die Corticalis in einzelne Schichten auf, was aber nicht an allen Knochen in gleicher Weise geschieht; an den großen Knochen der unteren Extremitäten ist mehr die Verdünnung der Corticalis, an den Vorderarmknochen mehr die Aufblätterung der Corticalis zu beobachten. In hochgradigen Fällen ist die Corticalis auch auf dem Röntgenbild nur noch papierdünn, oder der ganze Röhrenknochen macht den Eindruck eines spongiösen Knochens. An der Spongiosa ist die Atrophie an einem Weit- und Grobwerden der Maschen der Spongiosastruktur und an der großen Durchlässigkeit der Spongiosa für Röntgenstrahlen zu erkennen. Die

Röntgendarstellung der Knochenstörung bei der Spätrachitis bestätigt aufs vollkommenste die schon von Pommer aufgestellte und von Schmorl bestätigte Tatsache, daß der rachitische Knochenprozeß im ganzen Skelett, ohne Ausnahme, ausgebreitet ist; denn wir finden die erwähnte Rarefikation des Knochens, auch in den leichten Fällen, in allen, auch in den kleinen, wenig beanspruchten Knochen, z. B. in denjenigen der Hand und des Fußes, ausgeprägt. Bei meinen röntgenologischen Untersuchungen bei der Spätrachitis, wie übrigens auch bei der Osteomalacie, die zusammen ca. 200 Röntgenplatten umfaßt, habe ich sogar gefunden, daß die rachitische Atrophie der Knochen an den kleinen Knochen der Hand und auch des Fußes in der Regel besonders leicht darzustellen und zu erkennen ist. Dies kommt wohl daher, daß die Projektion von Knochen von geringer Dickenausdehnung und typischer, übersichtlicher Architektur, wie es die Metacarpalia und die Phalangen sind, unter günstigeren Bedingungen geschieht, als die Projektion von voluminösen Knochen, wo dicke Schichten sich überlagern. Die Verdünnung und Aufblätterung der Corticalis der Metacarpalia und die Auflösung der normalerweise kompakten Corticalis der Phalangen in ein zierliches Bälkchenwerk scheint mir für die Diagnose der Knochenatrophie besonders charakteristisch und praktisch verwertbar. Ich möchte deshalb die Aufnahme des Handskeletts mit Einbeziehung der Handgelenksepiphysen für die Rachitis und auch für die Osteomalacie in den meisten, namentlich auch in den leichteren, Fällen als besonders aufschlußreich empfehlen. Die Darstellung der kleinen Knochen ergibt aber auch bei den schweren Fällen meist ein zuverlässigeres Bild vom Grade des atrophischen Zustandes des Skeletts als die großen Knochen, da bei den kleinen, infolge des Fehlens von Deformierungen und sekundären Veränderungen, die rachitische Knochenstörung in ihrer reinen Form erscheint, während an den deformierten größeren Knochen gerade in den schweren Fällen die sekundären Veränderungen den ursprünglichen atrophischen Zustand oft stark verdecken.

Ebenso wie die Knochenatrophie wurden in allen Fällen von Spätrachitis auch die typischen rachitischen Knor-

pelveränderungen gefunden. Sie besitzen allerdings nicht die gleichmäßige und allgemeine Ausbreitung über das ganze Skelett, wie die Knochenveränderungen; denn, da sie nicht aus einer vermehrten Wucherung des Knorpels hervorgehen, sondern durch ein unverarbeitet Liegenbleiben des wachsenden Knorpels zustande kommen, sind sie natürlich an den stark wachsenden Ossifikationsbezirken viel stärker ausgebildet als an den langsam wachsenden. Wir sehen deshalb auch bei der Spätrachitis die Epiphysenfugen des Femur und der Tibia und die distalen Epiphysenfugen von Radius und Ulna am stärksten, die Epiphysenfugen der kleinen Knochen der Hand und des Fußes auch in schweren Fällen aber nur wenig, in leichteren Fällen kaum oder nicht verändert.

Da die rachitische Knorpelwucherung ihre Entstehung einer Hemmung der normalen Verarbeitung des Knorpels verdankt, ist es auch zu verstehen, daß wir bei der Spätrachitis die typische rachitische Knorpelveränderung noch in einem Alter finden, in welchem die Epiphysenknorpel schon ganz oder fast ganz verschwunden sein sollten, so z. B. bei dem 18jährigen Fall 8, bei dem 19jährigen Fall 5, dem fast 20jährigen Fall 9, dem 20jährigen Fall 15. Am auffallendsten in dieser Beziehung ist aber der Fall 16, bei welchem wir noch im 29. Lebensjahre, in welchem die Epiphysenknorpel schon etwa ein Jahrzehnt verschwunden sein sollten, noch breite, typisch rachitische Epiphysenfugen, z. B. am distalen Ulnaende, mit aller wünschenswerten Deutlichkeit nachweisen können. Ich möchte hierzu erwähnen, daß Schmorl¹⁾ bei einer 34jährigen Osteomalacischen, die vom 25. Jahre an erkrankt war, typische rachitische Knorpelveränderungen an den Rippen fand. Hier liegt die Vermutung sehr nahe, daß die Patientin ihre rachitische oder osteomalacische Erkrankung, wie man sie bezeichnen will, in einem wahrscheinlich leichteren Grade schon aus der Wachstumsperiode in das erwachsene Alter hinübergeschleppt hat.

Ich habe bei der Untersuchung der Spätrachitis die Beobachtung gemacht, daß die rachitische Knorpelstörung

1) Verhandl. d. Deutsch. Patholog. Gesellsch. 1909, 13. Tagung, Diskussion, S. 61.

auf dem Röntgenbild in den leichteren und mittelschweren Fällen meist viel deutlicher zu erkennen ist als in den schweren, da bei jenen der Kontrast zwischen Knorpel und Knochen immer noch ein deutlicher ist, während gerade bei den schweren Fällen die Durchlässigkeit des Knochens für Röntgenstrahlen eine so hochgradige wird, daß eine Unterscheidung zwischen Knorpelwucherung und Knochen nur noch sehr schwer oder zuweilen gar nicht mehr gemacht werden kann. So ist z. B. die Erkennung der rachitischen Knorpelwucherung trotz starker Entwicklung derselben in den Fällen 11, 12, 13, 15 nur schwer sichtbar und nur an einzelnen Ossifikationsbezirken mit größerer Deutlichkeit festzustellen. Am auffallendsten zeigt das erwähnte Verhalten der Fall 14, bei welchem das Röntgenbild des unteren Tibiaendes gar nichts von einer vorhandenen Epiphysenfuge zeigt, während die anatomische Untersuchung an dieser Stelle einen fast tumorartig verbreiterten Epiphysenknorpel nachgewiesen hat (vgl. Tafel XX, Fig. 62). In diesen hochgradigen Fällen mit sehr starker Rarefaktion der Knochen geben die Fibula und das distale Ulnaende meiner Erfahrung nach die deutlichsten Bilder von der Knorpelstörung. Da sie beide zu den stark wachsenden Knochen gehören, zeigen sie die Knorpelstörung auch in starkem Grade und für die Projektion sind sie besonders gut geeignet, da sie infolge ihrer geringen Dickenausdehnung die schärfsten Bilder geben und da die bei den großen Knochen oft störende Überlagerung dicker Schichten (namentlich bei etwas schiefer Projektion) bei ihnen fehlt. Auch bei den leichten und mittelschweren Fällen scheinen mir die Knorpelveränderungen am distalen Ulnaende am deutlichsten und klarsten im Röntgenbild nachweisbar.

Auch für die röntgenologische Beurteilung der Epiphysenknorpelveränderungen ist es nötig, scharfe Strukturbilder zu besitzen und es ist sehr angezeigt, Bilder von verschiedenen Ossifikationsbezirken herzustellen, da es nicht immer möglich ist, alle wünschenswerte Auskunft aus den Veränderungen einer einzelnen Wachstumszone herauszulesen. Das ist zuweilen erst aus der Vergleichung verschiedener Ossifikationsbezirke möglich.

Die Untersuchung der Epiphysenknorpel bei der Spätrachitis zeigt, daß die Rachitis, worauf schon P o m m e r auf Grund der

Analyse der mikroskopischen Bilder bei der jugendlichen Rachitis und neuerdings Schmorl hingewiesen haben, sehr häufig keinen kontinuierlichen Verlauf zeigt, sondern bei längerem Verlaufe häufig von zeitweisen Remissionen unterbrochen wird. So sehen wir z. B. in den Fällen 1 und 2 am Vorhandensein einer verbreiterten Verkalkungszone an normaler Stelle inmitten des verbreiterten und verwachsenen Epiphysenknorpels, daß diese Fälle sich zur Zeit der Untersuchung gerade in einem Heilungsstadium befinden. Viel häufiger als diese ganz frischen Heilungsvorgänge sind die Zeichen alter Remissionen, die sich am Vorhandensein nach der Diaphyse zu verschobener Verkalkungslinien zeigen. Solche alte „Remissionslinien“ zeigen fast alle Fälle. So zeigen die Fälle 2, 3, 4, 6, 7 deutlich je eine alte Remission, die Fälle 4 und 8 je zwei, der Fall 8 vier, der Fall 9 acht alte Remissionslinien und die Fälle 10, 11, 12 je mehrere, nur sehr schwach angedeutete Remissionen. Die Fälle 13 und 14 zeigen keine alten Remissionslinien, doch zeugt der starke Umbau der Knochensubstanz im Fall 13, der eine wabenartige Struktur weitmaschiger, verkalkter Bälkchen zeigt, die sicher während des Verlaufes der Krankheit neu entstanden und verkalkt sind, daß auch hier früher Remissionen des Krankheitsprozesses vorhanden waren. Auch im Falle 15 weisen die verkalkten Umbaustrukturen der Tibia und die verkalkten Callusbildungen darauf hin, daß auch hier während des Krankheitsprozesses zeitweise Kalk abgelagert worden ist. Nur im Falle 16 ist so gut wie gar nichts nachzuweisen, was auf das Bestehen einer früheren Remission hindeuten könnte. Die Remissionslinien sind nicht in allen Ossifikationsbezirken mit der gleichen Konstanz nachzuweisen, sie treten zuerst und am stärksten an den Epiphysen des Knies auf und sind hier bei Exazerbationen auch am längsten noch sichtbar, während sie z. B. an den Epiphysen des Handgelenks etwas später auftreten und auch früher wieder verschwinden, denn wir sehen in mehreren Fällen an den Knieepiphysen mehr Remissionslinien als am Handgelenk, und zwar hier nur die letztentstandenen (z. B. Fall 8, 9). In den Fällen, wo die Epiphysenscheibe stark wellig oder, besser gesagt, hügelig verläuft, können die Remissionslinien durch die Projektion eigenartig unterbrochen erscheinen (oberes Tibiaende des

Falles 9) oder sich direkt überschneiden (oberes Tibiaende Fall 9, 10, 11). Auch eine schiefe Projektion im Röntgenbild, wie sie namentlich bei der Darstellung der Knöchelgegend leicht möglich ist, kann zu einer Verschmelzung von zwei oder mehreren Remissionslinien im Bilde führen (unteres Tibiaende des Falles 8). Hier kann man aber meist am Rande des Knochens sehen, daß die eine breite Verkalkungslinie aus zwei sich in der Projektion größtenteils deckenden Schatten besteht.

Der durch die röntgenologischen Befunde nachgewiesene sehr unregelmäßige und häufig durch kürzere oder längere Remissionen unterbrochene Verlauf der Rachitis, der in Wirklichkeit wahrscheinlich noch viel komplizierter ist, als sich durch die relativ grobe Untersuchung der Verkalkungsverhältnisse im Röntgenbild nachweisen läßt, macht es, worauf schon Schmorl hinweist, verständlich, warum die Stoffwechselversuche bei der Rachitis bis jetzt noch zu keinem einheitlichen Resultat geführt haben und einander sehr widersprechende sind und läßt weitere solche Versuche zunächst noch als wenig aussichtsreich erscheinen; denn wir können, wenigstens bis jetzt, in keinem Falle wissen, in welchem Stadium der Progression oder Remission sich der untersuchte Fall befindet. Der klinische Befund gibt hierüber keine, auch nur entfernt genügende, und der Röntgenbefund nur ganz grobe Anhaltspunkte.

Sehr interessant sind die Heilungsvorgänge unter der Wirkung der Phosphormedikation, die in allen mit Phosphor behandelten Fällen ohne Ausnahme (Fall 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12), zum Teil sogar in sehr eklatanter Weise (Fall 4, 10, 11), zu sehen sind. Die erste Erscheinung bei der Heilung scheint mir die Verkalkung der Basallinie zu sein, die auch normalerweise eine schmale Verkalkungslinie zeigt, bei der Heilung der Rachitis aber auffallend breit und plump verkalkt. Diese basale Verkalkungslinie scheint, auch sehr resistent zu sein, denn wir sehen sie auch bei Remissionen persistieren (Fall 4, 5, 6 u. a.). Einer besonderen Erwähnung bedürfen die Heilungsvorgänge an den Epiphysenknorpeln bei dem 18½ Jahre alten Fall 6, weil hier die Resorption der Epiphysenknorpel ohne die Bildung einer Knorpelverkalkungszone vor sich geht. Offenbar handelt es sich hier darum, daß in diesem

Falle der Knorpel verbraucht ist, keine Wachstumsenergie mehr besitzt und deshalb auch keine frische Wucherungszone mehr bildet, die verkalken könnte; er wird einfach als verbraucht abgebaut. Bei dem 19^{3/4} Jahre alten Fall 9 sehen wir noch eine schmale Verkalkungszone nach Phosphordarreicherung auftreten. Ein eigenartiges Verhalten im Abbau des Epiphysenknorpels zeigen drei Fälle von Genu varum, bei welchen der obere Tibiaepiphysenknorpel unregelmäßig abgebaut wird, indem der mediale Anteil desselben (etwa $\frac{1}{3}$) länger stehen bleibt, als der mittlere und laterale, der zur Zeit der Untersuchung schon mehr oder weniger vollständig verschwunden ist. Es handelt sich hier um das längere Stehenbleiben desjenigen Knorpelanteils, der durch die Knie deformität unter abnorm vermehrtem Druck steht. Beim Genu valgum sehen wir das Entsprechende auf der äußeren Seite des Knorpels nicht.

Eine mehr allgemeine Druckerscheinung sehen wir an den Epiphysenknorpeln der Knieepiphysen sehr deutlich (Fall 5, 6, 7), das ist die Kompression der weichen rachitischen Knorpelmassen und der benachbarten osteoiden Zonen, die zu einem seitlichen Hervorquellen oder zu einer buckeligen Vorbuchtung dieser Zone und zu einem seitlichen Ausbiegen der benachbarten, dünnen Corticalis führt. Diese Bilder illustrieren sehr schön die schon von P o m m e r betonte Tatsache, daß die Kompression und das seitliche Ausweichen der osteoiden- und der Knorpelwucherungszone durch die Belastung die Epiphysenverdickung hervorruft, sie zeigt aber auch, daß gerade an jenen weichen Wachstumszonen, auch wenn keine stärkeren Deformationen bestehen, mechanische Reizeinwirkungen vorhanden sind, die nach der oben vertretenen Auffassung zur Bildung von geflechtartigem Knochen, zur Bildung der „osteoiden Zonen“ führen muß.

Während wir die rachitische Knorpelveränderung unter der Phosphorthherapie rasch sich bessern und verschwinden sehen, bessert sich bei der Spätrachitis die im Röntgenbild sichtbare Knochenveränderung, die Knochenatrophie, nur sehr langsam; auch nach mehrmonatlicher Behandlung sehen wir die Knochenatrophie im Röntgenbild relativ wenig gebessert, zuweilen noch fast unverändert, während die Knorpel in dieser Zeit meist schon

mehr oder weniger geheilt sind. Das ist wohl verständlich, denn die Beseitigung der rachitischen Knorpelstörung ist ein abbauender Prozeß, der weniger Zeit und Kraft braucht, wie der aufbauende der Knochenbildung.

Bei der Spätrachitis ist die Heilung des Knochenprozesses eine viel langsamere als bei der jugendlichen Rachitis. Dieser Unterschied in der Heilungstendenz der Knochenatrophie in der frühen Kindheit und im Adoleszentenalter erklärt sich daraus, daß zur Zeit der großen Wachstumsperiode in den ersten zwei Lebensjahren dem Körper intensivere Kräfte zur Ausgleichung der Knochenatrophie zur Verfügung stehen als im Adoleszentenalter. In der großen Wachstumsperiode der ersten zwei Lebensjahre sind die Appositions- und Resorptionsvorgänge am Knochen bedeutend lebhaftere als zur Zeit des bedeutend langsameren Knochenwachstums der Pubertätszeit. Schon deshalb muß die Knochenatrophie bei der Rachitis im Säuglingsalter bedeutend rascher entstehen, sich aber auch bei der Heilung bedeutend rascher wieder ausgleichen als im Pubertätsalter. Es kommt aber noch dazu, daß das sehr jugendliche Bindegewebe im Säuglingsalter eine große Neigung und Leichtigkeit zur Osteophytbildung (s. Einleitung) hat, während im Pubertätsalter die Fähigkeit des Bindegewebes zur Osteophytbildung eine bedeutend geringere ist. Dieser Unterschied zeigt sich schon sehr deutlich in der Leichtigkeit und Raschheit der Callusbildung nach Frakturen im frühen Kindesalter gegenüber der Pubertätszeit. Auch die in der Regel sehr reichliche Bildung der Osteophyten an allen Stellen mechanischer Irritationen durch Verbiegungen, usw., bei der kindlichen Rachitis führt bei der Heilung zu einem raschen Ausgleich der Knochenatrophie, indem der bei der Heilung erfolgende Ersatz der reichlichen Osteophytenlagen (geflechtartiger Knochen) durch definitiven, lamellösen Knochen zu einem raschen Ausgleich der Knochenatrophie, ja sogar oft zu einer Verdickung der Knochen führt. Demgegenüber erfolgt bei der Spätrachitis die Bildung der Osteophyten nur in sehr mäßigem Grade, so daß auch aus diesem Grunde die Knochenatrophie sich bei der Spätrachitis viel langsamer ausgleicht als bei der kindlichen Rachitis. Periostale Osteophyten konnte ich in den untersuchten Spätrachitisfällen im Röntgenbild

nur in sehr mäßiger Ausdehnung und Dicke bei den Fällen 1, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15 und 16 feststellen.

Die therapeutisch angewendeten Phosphordosen waren in den einzelnen Fällen etwas verschieden. Ich bin nach den ersten Versuchen zu etwas größeren Dosen übergegangen, als gewöhnlich üblich sind, von der Erwägung ausgehend, daß die für die kindliche Rachitis üblichen Dosen für die halberwachsenen oder nahezu erwachsenen Individuen entsprechend zu steigern sind. Ich habe deshalb den Phosphor in den meisten Fällen in einer Lösung von 0,03:100,0 zweimal täglich einen Teelöffel verschrieben, d. h. die Tagesmaximaldosis (0,003) auf 2 Dosen täglich verteilt verabfolgt und habe gefunden, daß diese Dosis ausnahmslos, auch bei monatelanger Darreichung, sehr gut vertragen wird und in den untersuchten Fällen nie zu irgendwelchen Störungen und nie zu Klagen von seiten der Patienten Veranlassung gegeben hat. Über die in den einzelnen Fällen verabreichte Gesamtdosis kann ich keine zuverlässigen Angaben machen. In den Fällen 2, 3, 12, 16 und 17 wurde statt Phosphorlebertran Phosphor in der oben erwähnten Dosis in Mandelölemulsion verabreicht. In allen mit letzterer behandelten Fällen traten dieselben guten, zum Teil auch röntgenologisch festgestellten, therapeutischen Resultate hervor. In den Fällen 2 und 12 traten nach zeitweiligem Aussetzen der Medikation wieder verstärkte Beschwerden auf, so daß die Patienten die Fortsetzung der Medikation selbst wieder verlangten. Ich erwähne das nur, weil in der pädiatrischen Literatur die Diskussion, ob die heilende Wirkung des Phosphorlebertrans dem Phosphor oder dem Lebertran zuzuschreiben sei, keine einheitliche Beantwortung erfahren hat. Nach meinen eigenen Erfahrungen, namentlich bei der Behandlung der Osteomalacie und einigen weiteren Spätrachitisfällen, außer den erwähnten, kann ein Unterschied, ob der Phosphor mit Lebertran oder mit Mandelöl verabfolgt wird, nicht festgestellt werden. Auch die Phosphormandelölemulsion hatte in allen von mir behandelten Fällen regelmäßig heilend gewirkt, oft in sehr eklatanter Weise.

Frakturen und Infraktionen sehen wir nur bei den schweren Fällen 14, 15 und 16, dagegen können wir bei den mittelschweren Fällen 6, 10 und 11 die Heilung von Osteotomien der

Tibia und des Femur auf dem Röntgenbild verfolgen. In allen drei Fällen heilte die Osteotomie innerhalb einer als normal zu bezeichnenden Zeit, im Falle 6, bei welchem die Osteotomie und Redression der Tibiae mehr eine Infraktion als eine Fraktur der Knochenschäfte erzeugte, mit einem geringen Callus. Bei den Fällen 9 und 11 aber, bei denen nach der Osteotomie die Frakturenden in stark gegeneinander abgeknickter Stellung zur Heilung gebracht wurden, sehen wir einen sehr deutlichen und starken periostalen und myelogenen Callus auftreten, der auch rasch und stark verkalkt ist, wie das Röntgenbild zeigt. Daß in diesen beiden Fällen der Callus rasch und stark verkalkt ist, ist nicht verwunderlich, da wir gleichzeitig unter der gleich nach der Osteotomie einsetzenden Phosphorbehandlung sehr starke Heilungsvorgänge an den Epiphysenknorpeln in Form von sehr massigen Kalkablagerungen in denselben beobachten konnten. Es ist übrigens eine bekannte Tatsache, daß wir sowohl bei der Rachitis als auch bei der Osteomalacie trotz der allgemeinen Knochenstörung meist eine auffallend gute Tendenz zur Frakturheilung haben. Das hängt wohl damit zusammen, daß die Bildung von geflechtartigem Knochen, den der primitive Callus darstellt, bei der Rachitis eine ungewöhnlich starke, bei der Spätrachitis und Osteomalacie, dem physiologischen Verhalten der älteren Knochen entsprechend (s. Einleitung), bedeutend schwächer, aber nicht aufgehoben ist. Es kommt deshalb bei der jugendlichen Rachitis meist leicht und rasch zur Callusbildung und auch bei der Spätrachitis und Osteomalacie ist in der Regel eine nennenswerte Verzögerung der Callusbildung nicht festzustellen. Nur in ganz schweren Fällen von Rachitis und Osteomalacie scheint auch die Bildung des geflechtartigen Knochens, und damit auch die Callusbildung verzögert zu sein. Ob bei der Rachitis und Osteomalacie der zunächst kalklose Callus dann auch durch Kalkaufnahme eine gewisse Festigkeit erlangt, hängt nur noch davon ab, ob während des Heilungsverlaufes, wenigstens zeitweise, Kalk in den Knochen abgelagert wird. Das dürfte wohl nach dem über den Verlauf der Rachitis und Spätrachitis Gesagten in sehr vielen Fällen der Fall sein.

Die Frakturen weisen bei der Spätrachitis, wie bei der Rachitis und Osteomalacie überhaupt, morphologisch nicht viel Besonderes auf, dagegen bedürfen die Infraktionen noch der

Erwähnung. Wir sehen bei diesen verschiedene eigenartige Formen. Die gewöhnlichsten kennzeichnen sich durch eine Spaltbildung im Knochen (Fall 15 Femora und Humeri) oder gelegentlich auch durch einen mehr oder weniger ausgedehnten lokalen Einbruch der verdünnten Corticalis, während der übrige Teil des Knochenquerschnitts keine vollständige Kontinuitätstrennung zeigt. Diese Infraktionen heilen wie die Frakturen. Eine zweite besondere Form der Infraktionen zeigen die Fibulae des Falles 15, es sind diejenigen, die man nicht unzutreffend als Infraktionen nach Art einer Federpose oder Weidenrute bezeichnet hat. Bei diesen knickt, wie auch im Röntgenbild zu sehen ist, nur die Corticalis der konkaven Seite der Biegungsstelle ein, während die Corticalis der konvexen Seite sich nur verbiegt, so daß die eingeknickte Corticalis die gegenüberliegende Wand des Knochens berührt und der Markraum an dieser Stelle ganz aufgehoben ist. Diese Dislokation der Knochenwand teilt sich in dem sehr dünnen Knochen aber auch den benachbarten Teilen der Corticalis mit, so daß die einander gegenüberliegenden Wände der Corticalis auf eine größere Strecke gegeneinander verlagert sind und der Markraum von der Knickungsstelle aus sich nur langsam nach beiden Seiten zu erweitert (Fall 15, rechte Fibula). Wie ich in früheren Untersuchungen feststellen konnte (vgl. Fig. 5 und 6 meiner mehrfach zitierten Arbeit), bildet sich nach so einer Infraktion um den ganzen verengten, sozusagen zusammengedrückten, Teil des Knochenschaftes eine scheidenförmige Auflagerung von Osteophyten. Solche Osteophyten, die vor allem die konkave Seite der Knickungsstelle ausfüllen, sind im Falle 15 an der linken Fibula zu sehen. Trotz dieser Auflagerungen bleibt der kollabierte Knochen aber auf eine längere Strecke verdünnt.

Die dritte Art der Infraktionen, die nicht nur bei schweren Fällen von Spätrachitis, sondern auch von kindlicher Rachitis und Osteomalacie nachzuweisen ist, ist die interessanteste (Fig. 1—5, Tafel XXII, Fig. 66, Tafel XXIII, Fig. 68, 69, Tafel XXVI, Fig. 74—77, Tafel XXVII, Fig. 78—80, Tafel XXX, Fig. 84, Tafel XXXI, Fig. 86). Sie zeichnet sich röntgenologisch dadurch aus, daß an den Stellen der Läsion eine meist den ganzen Knochen quer oder schräg durchsetzende Aufhellung des

Knochenschattens besteht, die im Röntgenbild den Eindruck macht, als ob eine Kontinuitätstrennung bestände. In selteneren Fällen bestehen mehr herdförmige Aufhellungen. Die klinische Untersuchung dieser Stellen, auf die man meist erst durch das Röntgenbild aufmerksam wird, da sie durch keinerlei auffällige, subjektive oder objektive Symptome die Aufmerksamkeit auf sich lenken, ergibt an der Infraktionsstelle meist nur eine gegenüber der Umgebung leicht erhöhte Druckempfindlichkeit. Zuweilen ist außerdem an diesen Stellen eine unbedeutende oder nur leichte Knickung der Knochenachse oder eine lokale Verdickung des Knochens zu entdecken, die den Eindruck eines kleinen, glatten, knotigen oder spindligen Callus macht. Bei Prüfung dieser Stellen auf ihre Festigkeit kann man oft nichts Abnormes oder nur eine leichte, federnde Biegsamkeit nachweisen, deren Prüfung Unbehagen oder einen leichten Schmerz auslöst. Nie findet man aber an diesen Stellen ausgesprochene falsche Beweglichkeit oder Krepitation.

Bei der Spätrachitis und Osteomalacie zeigen diese Infraktionen im Röntgenbild eine große Übereinstimmung und nur bei der jugendlichen Rachitis weisen manche Stellen kleine Abweichungen von diesem Bilde auf. Bei der Spätrachitis und Osteomalacie zeigt sich der leichteste Grad dieser Infraktionen an der konvexen Seite verbogener Knochen an einer kleinen, lokalen Aufhellung der dünnen Corticalis. Bei genauerem Zusehen findet man von diesen Stellen aus eine sehr schmale, helle, sprungartige Aufhellung quer oder schräg durch den Knochen gehen und zuweilen die gegenüberliegende Corticalis erreichen, an andern Stellen verlaufen aber millimeterbreite, helle, etwas zackige und unscharf begrenzte Sprünge quer, schräg oder z-förmig durch den ganzen Knochenschatten. An anderen Stellen erreichen diese queren oder schrägen Aufhellungen aber mehrere bis 8 und mehr Millimeter Breite. Die Aufhellung kann so stark sein, daß man glauben könnte, einen vollständigen Defekt des Knochens vor sich zu haben. Der Rand der Aufhellungen gegen den Knochen ist leicht zackig, verwachsen und unscharf, der angrenzende, schattengebende Knochen erscheint oft ganz unverändert, zuweilen gibt aber der Rand gegen die Aufhellung einen verdichteten Schatten, so daß die Aufhellung durch verwaschene, dunklere

Ränder eingefaßt erscheint. In diesen Fällen zeigt auch das Periost Veränderungen durch die Anwesenheit schwach oder deutlicher schattengebender Auflagerungen, die eine umschriebene, knotige Verdickung des Knochens erzeugen. Wenn ein solcher Callus besteht, so geht die Aufhellung dann meist auch in gewisser Intensität durch den Callus hindurch. Wenn solche mit Callusbildung einhergehende Aufhellungsstellen an verbogenen Knochen beobachtet werden, so erscheint der Callus als eine in der Mitte mehrere Millimeter hohe, nach den Seiten auslaufende, periostale Auflagerungsschicht, die die konkave Seite der Biegung ausfüllt, während die konvexe Seite meist nichts von callösen Auflagerungen zeigt. Durch zunehmende Verkalkung scheinen, auch in den schweren Fällen von Rachitis, diese Auflagerungszonen langsam zu verkalken und wir sehen in späteren Stadien die Aufhellungszone samt ihrem Callus als dunkle Stelle persistieren (Tafel XXII, Fig. 67).

Außer den erwähnten mehr oder weniger spalt- oder bandförmigen Aufhellungen konnte ich im Falle 16 noch größere Aufhellungsbezirke feststellen, so an den beiden abgebogenen, distalen Radiusenden fast 2 cm breite, sehr verwaschene und unregelmäßig begrenzte Aufhellungen im Bereiche der stärksten Biegung. Die größte Aufhellungsstelle beobachtete ich an der rechten Fibula desselben Falles (Tafel XXVII, Fig. 78—80), wo im 15. Lebensjahr der Patientin eine doppelte Infraktion des unteren Fibulaendes bestanden hatte, die die Patientin damals nicht gehindert hatte, wenn auch mit Beschwerden, auf dem rechten Bein zu gehen. Das zwischen den zwei Infraktionen gelegene Stück der Fibula ist im Röntgenbild zum größten Teil verschwunden und es ist von ihm nur noch ein Stück der äußeren Corticalis erhalten.

Auch bei der kindlichen Rachitis finden wir die Aufhellungsstellen in Form der queren Aufhellungen (Textfiguren 1 und 2) wie bei der Spätrachitis und Osteomalacie; die kleineren lokalen Aufhellungen haben aber beim Kinde mehr die Form lokaler, umschriebener, wie ausradiert aussehender Bezirke (Textfiguren 3 und 5), im Gegensatz zu den mehr spaltförmigen der Spätrachitis und Osteomalacie. Dieser Unterschied, der mir kein prinzipieller zu sein scheint, hat seine Ursache wohl in der Tat-

sache, daß der kalkhaltige Knochen des kleinen Kindes schon physiologisch weicher und weniger spröde ist, als der älterer Individuen und auf lokale traumatische Einwirkungen weniger durch Bildung von Rissen und Spalten als durch lokale Verbiegungen und Einbrüche der Corticalis reagiert.

Es sei noch erwähnt, daß diese eigenartigen Aufhellungen nur bei den schweren Graden der rachitisch-osteomalacischen Erkrankung vorkommen und daß sie in diesen Fällen meist in der Mehrzahl nachzuweisen sind. So konnten im Falle 15 von schwerster Spätrachitis zwölf solche Aufhellungen nachgewiesen werden, im Übergangsfalle 16 drei, im schweren Falle 23 von Osteomalacie sechs und in dem eingangs durch die Textfiguren 2—5 illustrierten Falle von kindlicher Rachitis mehrere. Außerdem habe ich solche Aufhellungszonen noch in andern Fällen von Rachitis beobachtet (vgl. z. B. Fig. 1), sowie auch in einem hier nicht beschriebenen Falle von Osteomalacie.

Man könnte an manchen Stellen, namentlich an stärker verbogenen Knochen, den Eindruck haben, daß die beschriebenen Aufhellungen Spaltbildungen oder Lücken im Knochen sind, die infolge fortschreitender Verbiegung des Knochens in einem gewissen Grade von Diastase gehalten werden. Man wird aber eines anderen belehrt, wenn man diese Aufhellungen auch an ganz unverbogenen Knochen sieht, wo ein solcher Mechanismus nicht in Frage kommt (vgl. z. B. Tafel XXX, Fig. 84, Radius, oder Tafel XXXI, Fig. 86, distalste Aufhellung im Humerus), und wenn man beobachtet, daß es im Bereiche der Aufhellungen nie zu seitlichen Verschiebungen der Knochenfragmente kommt, die bei echten Frakturen doch meist zu erwarten wären.

Diese Aufhellungszonen bei der Rachitis, Spätrachitis und Osteomalacie haben bisher in der Literatur keine Beachtung gefunden und sind, wo solche Befunde vorkamen, als Frakturen registriert worden. Bei einem Krankheitsbilde aber, der Osteopsathyrosis sind Aufhellungszonen von Kienboek¹⁾ beschrieben worden, die er als „Resorptionsringe“ bezeichnet und die er für die Osteopsathyrosis (überlebende Fälle von Osteogenesis imperfecta, mit der die Osteopsathyrosis auch pathologisch-ana-

1) Kienboek, Über infantile Osteopsathyrose. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen 1915, Bd. 23, S. 122.

tomisch identisch ist Looser¹⁾)), als charakteristisch bezeichnet hat. Auch bei Zesas²⁾ finde ich typische Abbildungen von Röntgenbildern von solchen Aufhellungszonen an beiden Vorderarmen einer Patientin mit Osteopsathyrosis, die er als Frakturen bezeichnet und deren Besonderheiten ihm offenbar entgangen sind. Er fand diese „Frakturen“ zufällig im Röntgenbild und sagt: „Angaben über die konstatierten Frakturen kann Patientin keine machen, sie stellt solche überhaupt in Abrede und lacht mit ungläubigem Achselzucken, wenn man sie davon zu überzeugen sucht.“ Also auch darin verhalten sich die Aufhellungszonen bei der Osteogenesis imperfecta genau gleich wie bei der Rachitis und Osteomalacie. Da noch bei einem dritten Krankheitsbild, bei der kongenitalen Lues solche Aufhellungszonen vorzukommen scheinen, wie aus den Abbildungen Bela Alexanders³⁾ in seiner Abhandlung über die ostealen Veränderungen bei kongenitaler Syphilis zu entnehmen ist, so kann es sich bei diesen Aufhellungen nicht um eine für die Rachitis und Osteomalacie charakteristische Erscheinung handeln, sondern um die Äußerung eines Vorganges, der bei verschiedenen Erkrankungen möglich ist.

Daß die Aufhellungszonen traumatischen Ursprungs sind, geht mit Deutlichkeit daraus hervor, daß sie an vielen Stellen die charakteristische Form von queren oder schrägen Sprüngen und Spalten im Knochen aufweisen, weiter aus der Tatsache, daß wir sie häufig an Stellen von deutlichen Verbiegungen oder Knickungen der Knochen auftreten sehen, wobei allerdings zu bedenken ist, daß die Knickungen auch erst nach dem Auftreten der Aufhellungsstellen entstanden sein können, und weiter daraus, daß sie zuweilen an Stellen früherer Infraktionen im Knochen auftreten (Tafel XXVII, Fig. 78—80). Es handelt sich bei den Aufhellungszonen aber sicher nicht um Frakturen, da ihre Entstehung und ihre Symptome nicht mit denen der Frakturen übereinstim-

1) Looser, Zur Kenntnis der Osteogenesis imperfecta congenita und tarda (sog. idiopathische Osteopsathyrosis). Mitteil. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir. 1905.

2) Zesas, Beitrag zur Pathologie der idiopathischen Osteopsathyrosis. Deutsche Zeitschr. f. Chir. 1913, Bd. 123, S. 380.

3) Bela Alexander, Die ostealen Veränderungen bei kongenitaler Syphilis. Leipzig 1915.

men. Ein vorausgegangenes, ausgesprochenes Trauma fehlt und die Schmerzen und schweren Funktionsstörungen des betroffenen Gliedes und die charakteristischen, objektiven, klinischen Erscheinungen einer Fraktur bestehen nie und haben nie bestanden, was alle Patienten klar und übereinstimmend angeben. Aber auch röntgenologisch fehlen einige wichtige Merkmale der Frakturen, der scharfe, zackige Rand der Fragmente und vor allem die Dislocatio ad latus der scheinbaren Fragmente, die bei echten Frakturen nur selten zu vermissen ist. Die Aufhellungszonen sind aber den Infraktionen zuzurechnen.

Das Entstehen der sprung- und rißförmigen Aufhellungen können wir vielleicht dadurch erklären, daß nach Kontinuitätstrennungen, Frakturen und Infraktionen, der Knochen, wie Bonome¹⁾ und Barth²⁾ gezeigt haben, die Knochenenden der Läsionsstelle nekrotisieren, abgebaut, und durch den neu entstehenden intermediären Callus durchwachsen und ersetzt werden. Wenn dieser intermediäre Callus längere Zeit kalklos bleibt, was bei florider Rachitis und Osteomalacie auch immer der Fall sein muß, so muß an der Stelle einer sprungförmigen Infraktion im Röntgenbild eine helle Zone entstehen. Für die größeren Aufhellungsbezirke scheint mir diese Erklärung nicht genügend. Sie müssen durch einen tiefer greifenden Prozeß verursacht sein, den ich bei der mikroskopischen Untersuchung der in den Textfiguren 2—5 im Radiogramm abgebildeten Präparate rachitischer Knochen, wie auch an den Keilexcisionen der Spätrachitisfälle 6 (Fig. 20) und 10 (Fig. 25 und 26) und an der Biegungsstelle von zwei osteomalacischen Sterna³⁾ beobachten konnte. Ich konnte dabei beobachten, daß an den Stellen der Verbiegungen der alte lamellöse Knochen durch lakunäre Resorption verschwindet und an seiner Stelle gleichzeitig in dem in diesen Reizbezirken stets fibrösen Mark geflechtartiger, zunächst kalkloser Knochen entsteht, daß es also hier unter der Einwirkung des traumatischen Einflusses einer Verbiegung zu einem Umbau des Knochens kommt. Das

1) Bonome, Zur Histogenese der Knochenregeneration. Virch. Arch. 1885, Bd. 100, S. 293.

2) Barth, Histologische Untersuchungen über die Knochenimplantation 1895, Bd. 17, S. 65.

3) Looser, l. c. S. 724—26.

Verschwinden des lamellösen Knochens unter dem Einfluß eines chronischen traumatischen Reizes, den eine sich entwickelnde Verbiegung bildet, scheint mir aus der allgemeinen Erfahrung erklärlich, daß der lamellöse Knochen auf chronische mechanische Reize sehr empfindlich ist. Wir sehen z. B. den Knochen unter dem Drucke eines Aneurysmas, unter dem Druck eines wachsenden Tumors, oder die Zahnwurzeln unter dem Druck der nachfolgenden, bleibenden Zähne abgebaut werden. So müssen wir uns auch vorstellen, daß bei atrophischen Knochen, die infolge ihrer Dünnhheit traumatischen Läsionen durch Verbiegungen und Infraktionen zugänglicher sind als normale, der lamellöse Knochen unter chronischem Druck und Reiz, der in einer solchen Läsionsstelle bestehen muß, abgebaut wird. Der lokale, mechanische Reiz bildet aber, wie wir an den gleichen Stellen sehen können, den Anreiz zur Bildung des geflechtartigen Knochens, der dadurch sich physiologisch ganz anders verhält wie der lamellöse. Da nun bei der Rachitis der neu gebildete geflechtartige Knochen lange kalklos bleibt, so kommt es bei diesen Stellen zu einem Umbau, bei welchem der alte, zum Teil kalkhaltige (lamellöse) Knochen abgebaut und durch neuen kalklosen (geflechtartigen) ersetzt wird. Durch diesen langsam vor sich gehenden Umbau wird die Kontinuität des Knochens nicht unterbrochen, es kommt aber zu den erwähnten leichten Störungen in der Festigkeit der vom Umbau betroffenen Stellen und zu den eigenartigen röntgenologischen Befunden, die Frakturen vortäuschen, wo keine solche vorhanden sind.

Ob auch die Aufhellungszonen bei der Osteogenesis imperfecta und der kongenitalen Lues auf dem gleichen oder einem ähnlichen Prozesse beruhen, kann ich mangels Untersuchungen solcher Aufhellungsstellen bei diesen Affektionen nicht sagen, es scheint mir aber sehr wahrscheinlich. Über die kongenitale Lues verfüge ich nicht über genügende eigene Untersuchungen, um mich über die Möglichkeit des Zustandekommens eines ähnlichen Prozesses auszusprechen. Bei der Osteogenesis imperfecta aber scheint mir das Zustandekommen des bei der Rachitis und Osteomalacie beobachteten Umbaues wohl möglich, da wir bei der Osteogenesis imperfecta Bedingungen wiederfinden, die in mancher Beziehung denen bei den Rachitis ähnlich sind. Die Atrophie

der Knochen haben wir bei der Osteogenesis imperfecta ebenso wie bei der Rachitis und damit die Möglichkeit der schubweisen Entstehung von Sprüngen und Spalten im Knochen und die Möglichkeit der Bildung fortschreitender Verbiegungen, die zum Abbau des alten, kalkhaltigen Knochens und zur Bildung des geflechtartigen Knochens führt. Daß der geflechtartige, junge Callusknochen auch bei der Osteogenesis imperfecta abnorm lange kalklos oder kalkarm bleibt, scheint mir nicht wahrscheinlich, da wir als die Störung bei der Osteogenesis imperfecta nur eine äußerste Langsamkeit und Hemmung der Knochenapposition kennen, aber nicht eine Hemmung in der Verkalkung des gebildeten Knochens. Es ist aber wohl denkbar, daß es bei der Osteogenesis imperfecta infolge der sehr stark gestörten Knochenbildung auch zu einer Störung in der Callusbildung kommt, bei welcher ein abnormes, vielleicht fibröses, nicht verkalkendes Callusgewebe gebildet wird. Auch bei der Osteogenesis imperfecta muß aber an den Aufhellungsstellen ein Callusgewebe zwischen den Knochenfragmenten vorhanden sein, da wir uns sonst die Diastase zwischen den Fragmenten und das Fehlen einer Dislokation derselben nicht erklären könnten. Neue Untersuchungen müssen weitere Aufklärung über das Zustandekommen der interessanten Erscheinung der Aufhellungszonen bringen, die wir nach dem hier Gesagten als eine pathologische Callusbildung an mechanisch irritierten Stellen, an fortschreitenden Verbiegungen und an schubweise sich bildenden Sprüngen und Infraktionen des Knochens bezeichnen können.

Was die Bezeichnung der beschriebenen Aufhellungszonen anbelangt, so kann ich mich mit dem von Kienboek dieser Erscheinung bei der Osteogenesis imperfecta gegebenen Namen „Resorptionsringe“ nicht befrenden, da diese Bezeichnung zu sehr nur von dem Eindruck des Röntgenbildes ausgeht und eine falsche Vorstellung von dem der Erscheinung zugrunde liegenden Vorgang gibt. Dem bei der Rachitis, Spätrachitis und Osteomalacie beobachteten anatomischen Vorgang entsprechend würde ich die Bezeichnung „Umbauzonen“ richtiger finden, um so mehr, als das Verschwinden der alten Struktur durchaus nicht nur in Form von Ringen, sondern auch in Form von geraden, schrägen und z-förmigen Spalten und Streifen und auch von größeren, un-

regelmäßigen Bezirken erfolgen kann. Für die Bezeichnung der Erscheinung im Röntgenbild würde aber die nichts voraussetzende und nur die Erscheinung im Bilde andeutende Bezeichnung *Aufhellungszonen* vorzuziehen sein.

Ich möchte noch auf einige Röntgenbilder des ersten der Übergangsfälle, des Falles 16, eingehen, dessen Erkrankung im 14. Lebensjahre als typische Spätrachitis begann und sich unter dem Bilde der typischen Osteomalacie bis jetzt, bis zum 29. Lebensjahre, fortgeschleppt hat. Die Röntgenbilder dieses Falles sind schon deshalb von ganz besonderem Interesse, weil sie uns die Veränderungen an ein- und demselben Knochen zu verschiedenen Zeiten des Krankheitsverlaufes zeigen, so die Veränderungen der rechten Knöchelgegend aus den Jahren 1905, 1913, 1914 und 1917 und der beiden distalen Vorderarmhälften aus dem Jahre 1915 und 1917. Die rechte Knöchelgegend wurde 1905, als Patientin 15 Jahre alt war, aufgenommen, weil Patientin ein Jahr vorher einen Schlag auf den äußeren Knöchel erhalten hatte und seither immer über Schmerzen an demselben klagte. Das Röntgenbild, von dem leider nur noch ein vergilbter Papierabzug aufzutreiben war, zeigt die typischen Erscheinungen der Spätrachitis, eine sehr deutliche, aber im Vergleich zum jetzigen Zustande noch mäßige Atrophie der Knochen und am unteren Tibiaende eine stark verbreiterte, ca. $\frac{3}{4}$ cm breite Epiphysenfuge. Neben diesem allgemeinen Befund zeigt die Fibula ca. 9 cm oberhalb der Spitze des Malleolus externus genau an der Stelle, die den eigenartigen Veränderungen der späteren Bilder entspricht, eine Infraktion der Fibula und 3 cm unterhalb eine zweite, leichte Knickung. Das zwischen den beiden Infraktionen gelegene, ca. 3 cm lange Fibulastück ist etwas nach lateral vorgewölbt, seine Außenwand etwas verdickt, seine der Tibia zugekehrte Innenwand und das distal von den Infraktionen gelegene Fibulastück etwas verwaschen, es ist aber daran noch sehr deutlich Corticallis und Markraum zu unterscheiden. 1913, also 8 Jahre später, ist der Allgemeinzustand der Knochen ein viel schwererer. Die Atrophie der Knochen hat stark zugenommen und auch das Bild der Infraktionen hat sich merkwürdig geändert, indem von der Fibula in der Gegend der alten Infraktionen nur die Außenwand des zwischen den beiden Infraktionen gelegenen Fibulastücks sich

erhalten hat, während die Innenwand dieses Stückes und ein distal davon gelegenes, mehrere Zentimeter langes Fibulastück auf dem Röntgenbild vollkommen ausgefallen scheint. Ich glaube nicht fehlzugehen, wenn ich diese eigenartige Umwandlung einer alten Infraktionsstelle dadurch erkläre, daß Patientin gleich nach Erleiden der Infraktion und noch jahrelang (bis zum 21. Jahre), trotz derselben gegangen ist und daß unter dieser chronischen Reizeinwirkung an der Infraktionsstelle der bei schwerer Rachitis und Osteomalacie mehrfach von mir beobachtete und oben genauer beschriebene Vorgang eingetreten ist: das Verschwinden des alten, lamellösen Knochens und Ersatz desselben durch kalklosen, geflechtartigen Knochen. Da die Röntgenbilder dieses Falles zeigen, daß, soweit man ihn rückwärts verfolgen kann, keine Remission eingetreten ist, so kann man sich wohl denken, daß der an dieser Stelle gebildete geflechtartige Knochen nie verkalkt ist. Ob jetzt an dieser Stelle noch geflechtartiger Knochen vorhanden ist, oder ob zuletzt vielleicht nur noch ein fibröses Gewebe an der Knochenlücke übrig geblieben ist, läßt sich natürlich nicht sagen. Was an den Bildern der rechten Knöchelgegend von 1913, 1914 und 1917 auffällt, ist ihre bis in kleine Details gehende Übereinstimmung, es ist also in den letzten 4 Jahren nicht das geringste Zeichen einer Veränderung der progressiven oder regressiven Knochen zu erkennen. Der einzige Unterschied in den Bildern ist eine deutlich zunehmende Atrophie der Weichteile. Bei der klinischen Untersuchung des rechten unteren Fibulaendes ist die Fibula in ihrer ganzen Kontinuität abzutasten, nirgends unterbrochen, das etwas nach außen dislozierte Corticisstück ist deutlich zu fühlen, distalwärts davon, wo auf dem Röntgenbild der vollständige Defekt ist, ist die Fibula leicht eingesunken, von derber Konsistenz und auf Druck etwas stärker empfindlich als die Umgebung. Diese Stelle der Fibula ist deutlich biegsam und elastisch.

Sehr interessant ist auch der Vergleich der Aufnahmen der Handgelenksgegenden von 1915 und 1917, die im 27. und 29. Lebensjahre der Patientin aufgenommen sind. Wir erkennen auf dem Bild von 1915 eine sehr hochgradige Atrophie der Knochen, der Radius zeigt dicht zentralwärts von der Epiphyse eine Abbiegung radialwärts und im Bereiche derselben eine $1\frac{1}{2}$ bis $3\frac{1}{4}$ cm

breite, etwas unscharfe Aufhellung, die wie mit dem Gummi ausstrahlt erscheint. Klinisch dokumentieren sich diese Abbiegungsstellen der Radii, die ganz langsam und spontan, ohne stärkere Gewalteinwirkung entstanden sind, durch eine deutlich ausgesprochene Druckempfindlichkeit und federnde Biegsamkeit. Auch bei diesen Abbiegungsstellen der Radii handelt es sich unzweifelhaft um den oben genauer beschriebenen Vorgang des Schwundes des alten lamellösen Knochens unter der lokalen Reizeinwirkung der Verbiegung und Ersatz desselben durch kalklosen, geflechtartigen Knochen. An der Ulna ist noch eine sehr stark verbreiterte, gegen die Diaphyse zu sehr unscharf begrenzte Epiphysenfuge vorhanden (!). Die Bilder von 1917 zeigen eine bis in kleine Details gehende, fast vollkommene Übereinstimmung mit den Bildern von 1915, mit dem einzigen Unterschiede, daß in den jüngsten Bildern die Abknickung des Radius sich etwas verstärkt hat und daß der Epiphysenknorpel der Ulna um einige Millimeter schmaler geworden ist. Von irgendwelchen Verkalkungs- oder Heilungsvorgängen ist gar nichts zu sehen, was um so bemerkenswerter ist, als Patientin 13 Monate vor Aufnahme der letzten Bilder zu therapeutischen Zwecken kastriert wurde. Wir sehen also von der Kastration auch nicht den geringsten heilenden Einfluß auf die Knochenveränderungen, während wir in den mit Phosphor behandelten, allerdings leichteren Fällen, ausnahmslos eine deutliche, meist sogar sehr starke, heilende Wirkung der Medikation feststellen konnten. Der Vergleich der Röntgenbilder dieses hochgradigsten Falles 16 aus den Jahren 1913, 1914 und 1917 und 1915 und 1917, die nicht nur bezüglich der Atrophie der Knochen, sondern auch bezüglich kleiner, lokaler Infraktionen der Corticalis und anderer Details und der weit über die Wachstumsperiode hinaus persistierenden Epiphysenknorpel eine fast vollkommene Übereinstimmung zeigen, illustrieren auf das Überzeugendste das Prinzip, das diesen Veränderungen zugrunde liegt: die Hemmung aller aktiven Prozesse am Knochen; denn wir haben es hier mit einer hochgradigsten Hemmung, mit

einem fast vollkommenen Stillstand eines jeglichen Geschehens am Knochen zu tun.

Wenn schon die röntgenologische Untersuchung den Beweis erbracht hat, daß wir es bei den 15 Fällen von Spätrachitis mit einer echten, mit der kindlichen Rachitis identischen, rachitischen Affektion zu tun haben, so wird diese Tatsache durch die histologischen Befunde der auch mikroskopisch untersuchten Fälle 6, 8, 10, 11 und 14 noch vollends bewiesen. Sie zeigen alle die typischen rachitischen Veränderungen, die Atrophie der alten Knochensubstanz und das Vorhandensein von osteoiden Säumen, die den größten Teil der Oberflächen- und Binnenräume derselben bedecken. Die Breite der osteoiden Säume ist in den einzelnen Fällen etwas verschieden. Im Falle 6 messen sie 20—70 μ , unter dem Periost aber bis 200 μ , in den anderen Fällen, bei welchen die Knochenatrophie nicht geringer ist als im Falle 6, sind sie aber erheblich schmaler, im Falle 8 10—30 μ , im Falle 10 15—42 μ und im Falle 11 10—32 μ . Durch die relativ geringe Breite der osteoiden Säume bei gleichzeitig starker Atrophie des Knochens gleichen diese letzten Fälle außerordentlich dem früher von mir ausführlich beschriebenen Falle 14, der bisher die einzige eingehende anatomische Untersuchung über einen klinischen Fall von Spätrachitis geblieben ist. Außer diesen Befunden existieren genauere anatomische Untersuchungen über Spätrachitis nur noch von Schmorl, der bei der systematischen Untersuchung der Skelette aller jugendlichen Individuen seines Sektionsmaterials mehrmals bei Individuen im Adoleszentenalter, die klinisch an keiner Knochenkrankheit gelitten hatten, verbreiterte osteoide Säume, also Spätrachitis, fand. Warum in den Fällen 8, 10, 11, die klinisch als Fälle mittelschweren Grades zu bezeichnen sind, osteoide Säume von nur geringer Breite vorhanden sind, die nach unserer bisherigen Auffassung nur für eine sehr leichte Rachitis sprechen würden, erklärt sich aus dem Vergleich dieser Befunde mit den Krankengeschichten und Röntgenbildern. Während beim Falle 6, der ziemlich breite osteoide Säume zeigt, das Röntgenbild kurz vor der anatomischen Untersuchung keine frischen Heilungsvorgänge aufweist und uns lehrt, daß die letzte Remission schon ziemlich lange zurückliegt (die genaue Zeit läßt sich nicht

angeben), lehren uns die Röntgenbilder des Falles 8, daß hier eine stärkere Remission vor kurzer Zeit stattgefunden hat. Beim Falle 10 finden wir, daß die Phosphorbehandlung in diesem Falle schon über einen Monat vor der Osteotomie eingesetzt hatte und in der Zeit von drei Monaten zu sehr intensiven Heilungsbildern in Form von äußerst starker Verkalkung der Knorpelbänder geführt hätte und im Falle 11 endlich waren an den Epiphysenknorpeln schon 4 Wochen vor der Osteotomie frische Verkalkungsvorgänge festzustellen, die auch hier durch die schon vor der Operation begonnene Phosphorthherapie eingeleitet waren. Die Ursache der relativ schmalen osteoiden Säume bei gleichzeitiger, starker Knochenatrophie in den Fällen 8, 10 und 11 liegt also darin, daß die anatomische Untersuchung in den Fällen 10 und 11 während eines Remissions- bzw. Heilungsstadiums, während welchem Kalk im Knochen abgelagert wird, im Falle 8 kurz nach einem solchen vorgenommen wurde. Wir sehen also bei den Remissionen bzw. der Heilung nicht nur die Knorpelveränderungen durch Verkalkung und Verarbeitung der Knorpel heilen, sondern auch die osteoiden Säume durch Verkalkung des Knochens relativ rasch verschwinden, während die Knochenatrophie, als die am schwersten zu reparierende Störung, am längsten andauert. Das letztere geht auch aus der Röntgenuntersuchung hervor. Nach diesen Befunden kann man wohl sagen, daß die Angabe von Pommer, die Breite der osteoiden Säume sei ein Maßstab für die Schwere der rachitischen Erkrankung, indem er für die schwere Rachitis 200—100 μ durchschnittliche Breite der osteoiden Säume, für die leichte Rachitis 38—27 μ angibt, wohl nur für kontinuierlich verlaufende Fälle gilt, die bei der jugendlichen Rachitis häufiger sind als bei der Spätrachitis, daß aber für alle Fälle der Satz gilt: Die Schwere der rachitischen Erkrankung am Knochen wird bestimmt durch die Breite der osteoiden Säume und durch den Grad der Atrophie des alten Knochens zusammen, wobei die Atrophie des alten Knochens die konstantere, die Breite der osteoiden Säume dagegen die unter Schwankungen des Krankheitsverlaufes mehr variable Komponente ist. Die osteoiden

Säume bleiben aber das für die Diagnose der Rachitis unerläßliche und charakteristischste Merkmal, da das Kalklosbleiben des neugebildeten Knochens für Rachitis und Osteomalacie pathognomonisch ist, die Atrophie des Knochens dagegen auch bei anderen Knochenerkrankungen vorkommt.

Die osteoiden Säume sind zum größten Teil von Osteoblastenlagern besetzt und dokumentieren sich dadurch sicher als neugebildete, Osteoklasten sind in mäßiger Anzahl vorhanden, perforierende Kanäle in den Fällen 6 und 10 in normaler Anzahl, in den Fällen 8 und 11 dagegen vermehrt. Ich habe den Eindruck gewonnen, daß ihre relativ große Anzahl in diesen Fällen auch mit lokalen Momenten, vielleicht auch mit gewissen Reizerscheinungen zusammenhängt. Das Knochenmark ist in den einzelnen Fällen etwas verschieden, im Falle 6 ein zellarmes, fibröses, von Fettzellen und lymphoiden Nestern durchsetztes Mark, auch im Falle 8 locker fibrös, im Falle 10 fibrös, von mäßigem Zellgehalt und im Falle 11 nur an der Oberfläche der Knochenbälkchen fibrös, sonst Fettmark. Dort, wo das Mark fibrös umgewandelt ist, ist es von sehr weiten Blutkapillaren durchzogen, die im Falle 6 20—80 μ , in den Fällen 8 und 10 bis zu 220 bzw. 155 μ Durchmesser haben. Auf dem Längsschnitt des einen untersuchten Knochenstücks im Falle 6 findet sich inmitten der Knochensubstanz ein keilförmiger Herd mit Basis am Periost, in dessen Bereich der lamellöse Knochen ganz verschwunden und durch ein enges Maschenwerk von geflechtartigem Knochen ersetzt ist. Auch an der Corticalis des Falles 10 finden wir an einer beschränkten Stelle der Corticalis dieselbe auf eine Strecke ganz besonders stark rarefiziert, wie lokal angefressen, oder in einzelne, weit voneinander abstehende Knochenbälkchen aufgelöst. Das an dieser Stelle besonders stark fibröse Mark enthält zahlreiche, nur relativ schmale Bälkchen von geflechtartigem Bau. Wir haben es bei diesen lokalen Befunden im Falle 6 und 10 wohl sicher auch mit den oben beschriebenen Stellen lokaler mechanischer Reizeinwirkungen zu tun, deren Charakteristikum ist, das lokale Verschwinden des lamellösen Knochens und das Auftreten von geflechtartigem an seiner Stelle (Umbauzonen).

Die oben beschriebenen 6 Fälle von Osteomalacie habe

ich alle im Sommer 1917 in Zürich gesammelt, 2 derselben kamen in dieser Zeit in der chirurgischen Poliklinik zur Beobachtung. Die Tatsache, daß es mir möglich war, in so kurzer Zeit ohne Schwierigkeiten eine solche Anzahl von Fällen zusammenzubringen¹⁾, die sich sicherlich noch leicht vermehren ließe, weist darauf hin, daß die Osteomalacie keine so seltene Erkrankung ist, wie man im allgemeinen annimmt. Die leichteren und mittelschweren Fälle von Osteomalacie scheinen mir nicht sehr selten, diesen Eindruck hatte ich schon in meiner Assistentenzeit in Heidelberg, wo ich unter dem poliklinischen Material mehrere solcher Fälle beobachtet habe, über die ich aber keine Aufzeichnungen besitze. Über diese leichteren Formen der Osteomalacie ist nur wenig bekannt, was wohl damit zusammenhängt, daß nach den Lehrbüchern und in der Vorstellung der Ärzte die Osteomalacie eine sehr seltene Erkrankung ist und daß ihr Bild fast ausschließlich nach jenen seltenen, schweren Fällen dargestellt wird, die zu schweren Deformitäten der Wirbelsäule, des Beckens und der Extremitäten führen. Die leichten Formen der Osteomalacie werden sicher sehr häufig verkannt, davon gaben die bitteren Klagen der Fälle 16 und 18 beredten Ausdruck, von denen der eine jahrelang als Rheumatismus, Ischias und Hysterie, der andere jahrelang als Rheumatismus und Neuralgie verkannt wurde. Die Diagnose der leichteren Osteomalacie ist meines Erachtens nicht so schwer und nicht so unsicher, wie allgemein in den Lehrbüchern behauptet wird, man muß aber im gegebenen Moment daran denken und darauf untersuchen. Die Untersuchung hat hauptsächlich Wert zu legen auf die Feststellung der charakteristischen Beschwerden, auf die Feststellung eventueller Deformitäten der Wirbelsäule und der Extremitäten, die nur durch Inspektion und Untersuchung des ganzen Körpers im Stehen geschehen kann, auf eventuelle Deformitäten des Beckens, auf die Druckschmerzhaftigkeit der Knochen, auf den Gang und auf die röntgenologische Untersuchung der Knochen. Dieser letzteren kommt eine wichtige Rolle zu.

1) Die Zahl meiner Beobachtungen hat sich seither auf 24 Fälle vermehrt, die alle der gewöhnlichen Osteomalacie zuzurechnen sind und mit der sog. Hungerosteomalacie nichts zu tun haben.

Die 6 beschriebenen Fälle betreffen alle Frauen. Teilen wir diese Fälle, wie die Spätrachitis, nach dem allgemeinen Eindruck der Schwere der Erkrankung und nach den gleichen Prinzipien wie dort, in leichte, mittelschwere und schwere Fälle ein, so möchte ich die Fälle 18, 19, 20, 21, 22 als mittelschwere, den Fall 23 als schweren bezeichnen. Es ist bei dieser Einteilung zu berücksichtigen, daß Deformitäten bei der Osteomalacie bei sonst gleichem Erkrankungsgrad etwas später entstehen müssen als bei der Rachitis, da bei dieser die Wachstumszonen der Epiphysen, die bei der Osteomalacie nicht mehr vorhanden sind, besonders leicht und besonders früh zu Deformierungen neigen. Die Schwere des Falles wird bei der Osteomalacie deshalb etwas mehr als bei der Spätrachitis durch die allgemeinen Beschwerden als durch den Grad der Deformitäten bestimmt. Als schwere Fälle möchte ich die bezeichnen, die zu komplizierten Deformitäten des Rumpf- und Extremitätenskeletts oder zu dauernder Bettlägerigkeit führen, als mittelschwere solche, die nur zu mäßigen Deformitäten geführt haben oder trotz stärkerer Beschwerden noch gehfähig geblieben sind, und als leichte solche, die zu keinen oder nur unbedeutenden Deformitäten oder nur zu leichten Beschwerden führen¹⁾.

Bezüglich des bekannten Zusammenhangs der Osteomalacie mit der Gravidität können wir die Fälle 18, 19, 20 und 23 als puerperale Osteomalacie bezeichnen, Fall 18 und 19 sind nichtpuerperale Fälle. In allen Fällen ist das Adoleszentenalter frei von den Erscheinungen der Spätrachitis gewesen. Das Alter, in dem die Erkrankung aufgetreten ist, ist verschieden, in den 4 puerperalen Fällen trat sie mit 26, 27, 28 und 29 Jahren auf, in den nichtpuerperalen erst mit 45 bzw. 52 Jahren. Im Falle 19 trat die Erkrankung im ersten Puerperium auf, in den Fällen 18 und 20 in der zweiten Gravidität, im Falle 23 waren osteomalacische Beschwerden während der ersten und zweiten Gravidität erst schwach ausgeprägt, in der dritten stärker und seit der vierten sehr stark. Im Falle 18 aber entstand die Erkrankung

1) Diese Einteilung soll nun den Zweck haben, die entsprechenden Krankheitsgrade der Spätrachitis und der Osteomalacie miteinander vergleichen zu können.

erst 12 Jahre nach der fünften und letzten Geburt, im Falle 21 hatte nie eine Geburt stattgefunden.

Die Angaben über die Beschwerden der Kranken sind im ganzen sehr gleichförmige, die Patientinnen geben an, daß sie schnell müde werden, sie können nicht lange gehen oder stehen, sich nicht bücken, fühlen sich schwach auf den Beinen, kraftlos, sinken leicht in die Knie, sie klagen über unsicheren Gang, haben das Gefühl keinen Halt zu haben, können sich schwer im Bett drehen, mit Mühe aufrichten. Dabei treten meist schon früh Schmerzen auf, zuweilen schon von Anfang an, zuweilen auch erst später. Die Schmerzen werden meist im Rücken und in den Hüften angegeben, in der Lendengegend und im Brustkorb oder in allen Knochen, in andern Fällen in den Beinen, in den Knien und Füßen. Die Schmerzen scheinen zuweilen das erste von den Patienten beobachtete Symptom zu sein, sie treten hauptsächlich bei Anstrengungen auf, sind nie sehr hochgradig, aber lästig. Eine Patientin beschrieb ihre Beschwerden als „schmerzhafte Müdigkeit“. Es tritt immer eine Gehstörung ein, die Patienten können nicht lange stehen und gehen, nicht schnell laufen, sie gehen langsam, vorsichtig, oft watschelnd. Nach und nach bilden sich Verkrümmungen der Wirbelsäule, die oft lange nicht bemerkt werden, die Patientinnen werden kleiner, in schweren Fällen tritt dauernde Bettlägerigkeit ein und es entstehen Deformitäten der Extremitäten und Infraktionen und Frakturen.

Die objektive Untersuchung ergab bezüglich des Beckens nur im schweren Falle 23 ein hochgradig osteomalacisches Kartenherzbecken, in allen andern Fällen höchstens einen ganz leichten Grad dieser Deformität, die in einem etwas starken Vorspringen der Symphyse sowohl bei der äußeren, als auch bei der inneren Untersuchung zu konstatieren war. Die Wirbelsäule zeigte in allen Fällen, außer in dem relativ akuten Falle 18, Deformitäten, die aber etwas verschiedener Form waren, im Falle 19 bestand bei im ganzen gerader Wirbelsäule nur ein abnormes Herabsinken der Lendenwirbelsäule auf das Becken, im Falle 22 und 23 eine mäßige, bzw. starke Kyphose der Brustwirbelsäule, im Falle 20 eine abnorme Totalkyphose der ganzen Wirbelsäule und im Falle 21 eine starke Linksskoliose der Lendenwirbelsäule. In allen Fällen waren die Knochen auf Druck

empfindlich, aber in verschiedenem Grade und in verschiedener Ausbreitung, was zum Teil wohl damit zusammenhängt, daß mehrere der Fälle sich in einem mehr oder weniger ausgesprochenen Stadium der Besserung oder Heilung befanden. Im floriden Falle 18 waren alle spongiösen Knochen ziemlich stark druckempfindlich, am stärksten Rippen, Sternum und Scapulae, etwas weniger das Becken und die unteren Extremitäten, ganz ähnlich war es auch bei den noch ziemlich florid scheinenden Fällen 20 und 21; bei dem auch noch ziemlich floriden Falle 22 waren hauptsächlich die unteren Extremitäten, das Kreuzbein und das Sternum druckempfindlich, weniger die Wirbelsäule und das Becken; in den im Heilungsstadium befindlichen Fällen 19 und 23 waren hauptsächlich die Extremitätenknochen noch mäßig druckempfindlich. Auch bei der Osteomalacie scheint mir die Druckempfindlichkeit der Knochen von allen Symptomen am meisten den Grad der Floridität des Prozesses anzudeuten. Wichtig scheint mir das Röntgenbild, da es uns in die Lage setzt, auch in den mittelschweren Fällen Knochenveränderungen mit Sicherheit nachzuweisen. In dem schweren Falle 23 (Bilder von 1915) fand sich eine der Schwere des Falles entsprechende hochgradige Atrophie aller Knochen mit Verbiegungen und alten Infraktionen. In allen andern mittelschweren Fällen fand sich ausnahmslos eine nur mäßige Atrophie der Knochen, die an einer Verdünnung der Corticalis der langen Knochen und namentlich deutlich an der bei der Spätrachitis beschriebenen Atrophie des Handskeletts zu erkennen ist. Außer den Erscheinungen am Skelett bieten die Symptome der Osteomalacie nichts Besonderes, zweimal war eine leichte Anämie vorhanden. Die Reflexe waren meist normal, zweimal etwas gesteigert und auf der einen Seite stärker als auf der andern. Mit diesem Symptom ist nach meiner Erfahrung nicht viel anzufangen.

Von den sechs Osteomalaciefällen hatte ich bei drei Gelegenheit, sie mit Phosphor zu behandeln, und zwar geschah es mit der bei der Spätrachitis angegebenen größeren Dosis, d. h. durch Verabreichung der Tagesmaximaldosis auf zwei Tagesdosen verteilt (0,0015 p. d.). In allen drei Fällen war der Erfolg ein guter, im Falle 20 war nach zweimonatlicher Behandlung eine deutliche Besserung der Beschwerden vorhanden und im Falle 22

hatte Patient nach dreimonatlicher Behandlung keine wesentlichen Schmerzen mehr, so daß sie wieder mühelos Treppen auf- und absteigen konnte, wozu sie vor der Behandlung nicht imstande war. Am eklatantesten aber ist der Behandlungserfolg im Falle 18, bei welchem die Erkrankung in der zweiten Gravidität begann, in der dritten Gravidität sich so stark verschlimmerte, daß Patientin im 4. Monat der Gravidität sich in einem schweren progressiven Zustand befand, in welchem sie nur schwer gehen konnte und jede Körperlage, auch das Liegen, ihr Schmerzen machte. Es wurde deshalb ernstlich die künstliche Unterbrechung der Schwangerschaft in Erwägung gezogen. Der Erfolg der Phosphorbehandlung trat erst etwa einen Monat nach Beginn der Behandlung deutlich hervor, war aber dann fortschreitend und so ausgezeichnet, daß Patientin die Gravidität ohne erhebliche Beschwerden zu Ende trug. Ein Jahr nach der spontanen Geburt ist Patientin wieder ganz arbeitsfähig, wird noch etwas leicht müde, hat aber keine andern Beschwerden mehr. Der früher sehr hochgradig watschelnde Gang ist ganz verschwunden. Zwei der Osteomalaciefälle waren früher durch Kastration behandelt worden, der eine (Fall 20)) ohne Erfolg, allerdings war hier ein Teil eines Ovariums zurückgelassen worden, so daß später noch einmal eine Gravidität eintrat. Im Falle 16 hatte dagegen anscheinend die Kastration guten Erfolg; da die Patientin aber gleichzeitig systematisch mit Phosphor behandelt worden war, ist der Erfolg wohl viel eher der Medikation als der Operation zuzuschreiben.

Vergleichen wir die klinischen Erscheinungen der Osteomalacie mit denjenigen der Spätrachitis, so erkennen wir, daß die beiden Krankheitsbilder sowohl in ihren Symptomen, als auch in ihrer Entwicklung und in ihrem Verlauf in den leichteren und schweren Fällen einander ganz außerordentlich ähnlich sind und nur geringfügige Unterschiede zeigen, die ganz notwendige Folgen des verschiedenen Alters der befallenen Patienten in den beiden Krankheitsgruppen sind. Beide Krankheitsgruppen machen im wesentlichen nur Erscheinungen von seiten des Knochensystems, sie beginnen mit leichter Ermüdbarkeit und Gehstörungen und Schmerzen

in den Beinen, im Kreuz und im Rücken, und Druckempfindlichkeit der Knochen und unterscheiden sich nur dadurch, daß bei der Spätrachitis die Beschwerden meist in den Beinen, bei der Osteomalacie häufiger, aber nicht ausnahmslos, im Kreuz und im Rücken beginnen und daß die später auftretenden Knochendeformitäten bei der Spätrachitis mehr die Beine, bei der Osteomalacie mehr die Wirbelsäule betreffen; d. h. daß die Spätrachitis mehr die sog. rachitischen, die Osteomalacie mehr die sog. osteomalacischen Deformitäten verursacht. Diese Unterschiede erklären sich durch das verschiedene Alter der beiden befallenen Lebensperioden und sind so selbstverständlich, daß man sie kaum zu erwähnen braucht. Da der rachitische oder osteomalacische Prozeß, der zu einer Atrophie der Knochen und zur Bildung von osteoiden Säumen führt, an allen Oberflächen und Binnenräumen des Knochens wirksam ist, macht er am fertigen Knochen die stärksten Veränderungen an den spongiösen Knochen, die infolge ihres Baues die relativ größte Oberfläche besitzen, am wachsenden Knochen aber an den Wachstumszonen, wo auf dem ganzen Knochenquerschnitt lebhaft neuer Knochen gebildet wird. Dadurch entstehen bei der Spätrachitis die Beschwerden und die Deformitäten mehr an den am stärksten belasteten Epiphysenfugen der unteren Extremitäten, bei der Osteomalacie aber an den am meisten belasteten spongiösen Knochen, an der Wirbelsäule und am Becken. In den schweren Fällen sind sie einander aber wieder ganz gleich.

Vergleichen wir auch die im Röntgenbild nachweisbare Knochenatrophie in beiden Krankheitsgruppen, so finden wir, daß beim Vergleich der Fälle von gleicher Schwere der Erkrankung kein wesentlicher Unterschied im Grade der Knochenatrophie zwischen der Spätrachitis und der Osteomalacie ist. Bei den schweren Graden der Spätrachitis und der Osteomalacie ist die Knochenatrophie in beiden Fällen eine hochgradige, in den Fällen mittleren Grades von Osteomalacie ist aber der Grad der Knochenatrophie nur ein mäßiger und nach meiner Erfahrung etwas geringer als bei den entsprechenden Fällen der Spätrachitis.

Von welcher Seite wir auch das Problem der

Rachitis und Osteomalacie betrachten und untersuchen, es ergibt sich immer und immer wieder die vollkommene Identität der beiden Krankheitsgruppen in klinischer und pathologisch-anatomischer Beziehung. Rachitis und Osteomalacie ist eine Krankheit, die das Skelett in jedem Alter befallen kann. Entsprechend der allgemeinen Erfahrung, „daß alle Organe des Körpers zur Zeit ihrer physiologischen Kulmination oder gesteigerten physiologischen Funktion am leichtesten Angriffspunkte für äußere Schädlichkeiten darbieten“ (Virchow); sehen wir das Skelett am häufigsten zur Zeit der ersten großen Wachstumsperiode in den ersten Lebensjahren erkranken, in zweiter Linie zur Zeit der zweiten großen Wachstumsperiode im Adoleszentenalter. Die Erkrankung dieses Alters, die wir als Spätrachitis bezeichnen, ist eine häufige. Beim Erwachsenen ist die rachitische bzw. osteomalacische Erkrankung bedeutend seltener, sie zeigt hier eine besondere, aber nicht ausschließliche Prädisposition für das weibliche Geschlecht und betrifft im größeren Teil der Fälle Frauen während der Gravidität, wahrscheinlich deshalb, weil durch den starken Kalkverbrauch der Mutter für den Aufbau des Fötus ein besonders prädisponierendes Moment für die Erkrankung vorliegt. Es gibt keine Altersgrenze zwischen jugendlicher Rachitis, Spätrachitis und Osteomalacie, wir sehen die jugendliche Rachitis in Spätrachitis und diese in die Osteomalacie direkt übergehen.

Über die Ätiologie der Rachitis und Osteomalacie haben die vorliegenden Untersuchungen nichts ergeben, es läßt sich nur so viel sagen, daß bei der Spätrachitis wohl allgemeine schädigende Ursachen, wie schlechte Ernährung, schlechte Wohnungsverhältnisse usw., die sicher als prädisponierendes oder verschlimmerndes Moment eine gewisse Rolle spielen, als eigentliche Ursache der Erkrankung auszuschließen sind; denn wir sehen in allen untersuchten Spätrachitisfällen von den Geschwistern einer mehr oder weniger zahlreichen Familie immer nur eines erkranken, während alle andern Geschwister, die unter den gleichen Verhältnissen gelebt haben, nicht an Spätrachitis erkrankt sind. Das gilt auch für den äußerst schweren Fall 15 von verschleppter Rachitis, der vom ersten Lebensjahr an unter

sehr guten hygienischen Verhältnissen lebte, zum Teil in Anstalten, zum Teil zu Hause, wo ich mich selbst über die Verhältnisse orientiert habe. Auf die verschiedenen Theorien, die die Rachitis bzw. Osteomalacie auf Erkrankungen von Organen mit innerer Sekretion zurückführen, wie mit Erkrankungen der Schilddrüse (Hönicke), der Epithelkörperchen (Hecker), der Thymus (v. Mettenheimer), der Ovarien (Fehling), der Hypophysis (Weiß), der Nebennieren (Stöltzner), möchte ich nicht eingehen, ich habe für keinen dieser vermuteten Zusammenhänge brauchbare Anhaltspunkte gefunden. Am meisten scheint mir immer noch eine infektiöse Ursache wahrscheinlich. Morpurgo hat durch Impfungen mit einem *Diplococcus* bei Hunderten von weißen Ratten eine Erkrankung erzeugt, die bei den Jungen eine rachitisähnliche, bei den Erwachsenen eine osteomalacieähnliche Erkrankung erzeugte. Ogata beschreibt eine Rachitis- und Osteomalacieepidemie in der japanischen Provinz Toyama, die Individuen in allen Lebensaltern betraf. Er selbst beobachtete 240 Fälle, die er in drei Kategorien: Kinder (1—15 Jahre), Jugendliche (16—25 Jahre) und Erwachsene (26—47 Jahre) einteilt. Die Erkrankung der Kinder betraf beide Geschlechter annähernd gleichmäßig und war eine typisch rachitische mit Epiphysenverdickungen und Deformitäten. Bei den Jugendlichen war das weibliche Geschlecht stark in der Überzahl, die beschriebene Erkrankung entspricht genau der Spätrachitis. Die schwereren Fälle waren aus der Kindheit verschleppt, die leichteren im jugendlichen Alter neu aufgetreten. Die Erkrankung begann mit Mattigkeit und Schmerzen an verschiedenen Körperstellen, den Rippen, den Knien und den Extremitäten, die Mädchen waren in der Entwicklung stark zurückgeblieben, ebenso im Körperwachstum (meist um ca. 20 cm), 20jährige machten den Eindruck von 12jährigen, die Mammæ waren unentwickelt, der Warzenhof vielfach pigmentiert, die Menstruation in ihrem Auftreten verspätet. Die Reflexe waren im allgemeinen gesteigert, es bestand oft Anämie. Es traten Verkrümmungen der Extremitäten und des Beckens auf. Die Erwachsenen zeigten die typischen Veränderungen der Osteomalacie.

Ich glaube in der vorliegenden Arbeit, wie auch in meiner

früheren über dieses Thema, gezeigt zu haben, daß das der rachitischen und osteomalacischen Knochenstörung zugrunde liegende Prinzip ein einfaches ist, daß aber die anatomischen Erscheinungen am Skelett sehr vielfältige, vielgestaltige und wechselnde sind, je nach den besonderen physiologischen Momenten, die am untersuchten Individuum, am untersuchten Knochen, an der untersuchten Stelle, gerade vorhanden sind. Bei dieser Betrachtungsweise erst klärt sich das Bild und werden auch die anfänglich kompliziert erscheinenden Vorgänge einfach und verständlich. Es scheint mir bei der Untersuchung eines pathologischen Vorganges, wie desjenigen der Rachitis und Osteomalacie, besonders nötig, nicht eine Untersuchungsmethode allein, sondern möglichst verschiedenartige zur Klärung der Verhältnisse heranzuziehen, das klinische Bild, den Verlauf, die anatomische Untersuchung in möglichst verschiedenen Formen und vor allem die normale Physiologie des Knochens immer im Auge zu behalten und alle gewonnenen Resultate zu einem Bilde der pathologischen Physiologie des Prozesses zu vereinigen. Diese physiologische Betrachtungsweise führt allein zu einem wirklichen Verständnis des pathologischen Vorganges und schützt vor einem Hängenbleiben an morphologischen Detailbildern.

Ich kann diese Arbeit nicht schließen, ohne wenigstens in groben Zügen Stellung zu nehmen zu dem großen Werk v. Recklinghausens über Rachitis und Osteomalacie, das bezüglich der Auffassung der Histogenese der Rachitis und Osteomalacie einen ganz anderen als den von mir vertretenen Standpunkt einnimmt. Ich bin auf v. Recklinghausens Auffassung des rachitisch-osteomalacischen Prozesses bisher nicht eingegangen, da derselbe auf einem ganz andern Boden der Betrachtungs- und Arbeitsweise steht als die meine, so daß eine Besprechung oder Widerlegung seiner Ansichten im einzelnen ein sehr weites Ausgreifen und sehr weitläufige Darlegungen nötig gemacht hätte, die eine klare Darstellung meiner eigenen Auffassung sehr beeinträchtigt hätten. Es kann auch nicht die Aufgabe dieses letzten Abschnittes sein, die v. Recklinghausenschen Ansichten über den rachitisch-osteomalacischen Prozeß im einzelnen zu besprechen, ich möchte nur auf einige prinzipielle Dinge hinweisen.

v. Recklinghausens Auffassung über die feineren Vorgänge am Knochen entspringen einer rein morphologischen Betrachtungsweise. Sie geht aus von feinen und feinsten Strukturbildern des erkrankten Knochens, die v. Recklinghausen durch eine Technik zur Darstellung bringt, deren Primitivität für den Untersucher unfehlbar das Verlieren einer jeglichen Übersicht über den pathologischen Vorgang und ein sich Verlieren in unklaren und vieldeutigen Detailbildern mit sich bringt. v. Recklinghausen hat seine Knochenuntersuchungen an Schnitten angestellt, die er freihändig „mit einem starken und scharfen Messer“ von dem unentkalkten Knochen abgetragen hat und die er nach seinem seit Jahren üblichen Verfahren ungefärbt oder unter Benutzung der metachromatischen Färbung durch Thionin und seiner Methoden zur Darstellung der Gitterfiguren (Eintrocknenlassen oder Eintauchen in Alaunlösung) untersucht, wobei er sein Hauptaugenmerk auf die Darstellung der nach ihm benannten Gitterfiguren und morphologischer Abweichungen in der Größe und Form der Knochenkörperchen, der Knochenkanälchen und anderer Details verlegt, aus welchen Veränderungen er bei der Rachitis und Osteomalacie die Mitwirkung eines destruktiven, mit Entkalkung und Einschmelzung der Knochensubstanz einhergehenden Prozesses glaubt annehmen zu können.

Ich kann auf die Frage der Bedeutung der v. Recklinghausenschen Detailbilder, speziell der Gitterfiguren, für einen Entkalkungsprozeß hier nicht näher eingehen und möchte nur erwähnen, daß die neuen, erweiterten Darlegungen von v. Recklinghausen meine in meiner früheren Arbeit genauer begründete und auch von Pommer, Schmorl, Axhausen u. a. vertretene Ansicht, daß die Gitterfiguren nichts für einen Entkalkungsprozeß im Knochen beweisen, nicht zu ändern vermochten. Ich möchte übrigens ausdrücklich betonen, daß ich der von v. Recklinghausen geübten Technik durchaus nicht die Berechtigung abspreche, ich habe sie selber viel zur raschen Orientierung über den Kalkgehalt der Knochen und über manche Details angewandt, kann ihr aber bei allen ihren Vorzügen eine ganz außerordentliche Einseitigkeit nicht absprechen. Vor allem ist sie nicht imstande, eine Übersicht über die pathologischen Veränderungen

zu gewähren, die es allein ermöglicht, das Wichtige vom Unwichtigen, das Typische vom Zufälligen zu trennen. v. Recklinghausen orientiert sich zu allererst nach dem „Vorkommen veränderter Stellen überhaupt“ und sagt „erst wenn beabsichtigt wird, die Quantität zu ermessen, und die Verteilung der veränderten Stellen nach der Zahl und der Anordnung zu bestimmen, erst dann ist der Versuch (! Verf.) angezeigt, große Schnitte zu erhalten und Übersicht zu gewinnen“. Ich habe aber aus v. Recklinghausens Darlegungen nicht entnehmen können, daß er diese Übersicht anders als durch Herstellung seiner erwähnten Knochenspännen versucht hat, etwa durch Herstellung von richtigen Schnitten oder gar von wirklichen Übersichtsschnitten mit dem von ihm verpönten Mikrotom. Die v. Recklinghausensche Untersuchungstechnik besteht also aus der makroskopischen Betrachtung der Objekte, der der Autor sehr große Sorgfalt angedeihen läßt und seinen sehr primitiven morphologischen Studien an den Knochenspännen. Die ganze eigentliche histologische Untersuchung an Mikrotomschnitten fehlt bei v. Recklinghausen vollständig. Ich glaube, daß auch die sehr zahlreichen Abbildungen von v. Recklinghausen, wie auch seine Beschreibungen, den klaren Beweis erbringen, daß mit seiner histologischen Technik eine Übersicht über den Krankheitsprozeß nicht zu gewinnen ist.

v. Recklinghausen baut seine Auffassung von der rachitisch-osteomalacischen Knochenstörung auf den mit seiner Technik dargestellten, feineren Strukturbildern auf, deren Beurteilung meines Erachtens ohne eine weite Übersicht über die Knochenveränderungen, ohne die Unterscheidung des normalen und unter mechanischen Reizeinwirkungen erfolgenden Umbaues, der oft sehr unregelmäßig gebauten, geflechtartigen Knochen erzeugt, nicht möglich ist. Er konstruiert sich von diesen Strukturbildern ausgehend eine Physiologie des Knochens nach rückwärts, statt die Pathologie auf der m. E. einzig möglichen Grundlage, auf den gesicherten Errungenschaften der normalen Anatomie und Physiologie des Knochens aufzubauen. v. Recklinghausen kommt auf diese Weise durch einen „Wald von neuen Namen und Tatsachen“ zur Annahme eines durch „Onkrosis“, „Halisteresis“ und „Thrypsis“ bedingten, der normalen Physiologie des Knochens

ganz fremden, Entkalkungs- und Abschmelzungsprozesses des Knochens.

Im Gegensatze dazu habe ich mich in meinen zahlreichen, selber untersuchten Rachitis- und Osteomalaciefällen, wie auch in meinen Untersuchungen über andere Knochenerkrankungen bemüht, von den normalen physiologischen Vorgängen auszugehen und an zunächst möglichst großen Übersichtsschnitten eine Übersicht über das pathologische Geschehen zu gewinnen und dann erst auf die Details und die feinen und feinsten Veränderungen einzugehen, wobei sich zeigte, daß die Annahme eines der normalen Physiologie fremden Entkalkungs- und Abschmelzungsprozesses zur Erklärung der Bilder gar nicht nötig ist, sondern daß diese sich, sogar die feinen und feinsten Veränderungen, einzig durch eine quantitative Störung der physiologischen Einzelvorgänge am Knochen erklären lassen, die unter den sehr vielfältigen und variablen lokalen, mechanischen Einwirkungen zu sehr vielgestaltigen Bildern führt.

Die eigenartige morphologische Betrachtungsweise hat v. Recklinghausen dazu geführt, den Begriff der rachitisch-malacischen Erkrankung sehr weit zu fassen und, da seine speziellen Strukturen des „malacischen Knochenschwundes“ sich in allen regressiven Knochenerkrankungen nachweisen lassen, fallen für ihn die scharfen Gegensätze zwischen Rachitis und Osteomalacie einerseits, und Porose, Hypoplasie, Dysplasie anderseits, hinweg. v. Recklinghausen faßt deshalb nicht nur Rachitis und Osteomalacie, sondern auch Ostitis deformans, Ostitis fibrosa mit ihren Folgeerscheinungen, den Knochencysten und den gutartigen Knochensarkomen, Epyriden usw. und die Osteogenesis imperfecta, aber auch die senile Atrophie und andere atrophische Zustände des Knochens in den Begriff der rachitisch-malacischen Erkrankung zusammen, die er nach rein äußeren Merkmalen in eine Reihe von Unterabteilungen einteilt. Ich kann dieser Tendenz v. Recklinghausens, die trennende Grenze zwischen den Systemerkrankungen der Knochen regressiver Natur fallen zu lassen, nicht beistimmen, denn die physiologische Betrachtungsweise auf Grund der von P o m m e r aufgestellten Fundamentalsätze zeigt uns, daß eine scharf trennende Grenze zwischen vielen dieser von

v. Recklinghausen zusammengeworfenen Affektionen wohl besteht, so z. B. zwischen Rachitis und Osteomalacie einerseits und Osteogenesis imperfecta anderseits oder zwischen seniler Osteomalacie und seniler Osteoporose, daß jedes dieser Krankheitsbilder einer ganz andern physiologischen Störung seine Entstehung verdankt, die im anatomischen Bild klar und deutlich zum Ausdruck kommt, wenn auch das makroskopische Bild und manche Detailbilder dieser Affektionen große Ähnlichkeit oder sogar Übereinstimmung in manchen Punkten aufweisen können.

Ich will mich mit diesen Beispielen begnügen und nur noch hervorheben, daß v. Recklinghausens Werk mich nicht bestimmen konnte, von der physiologischen Betrachtungsweise abzuweichen, da sie in. E. der einzige Weg zu einem tieferen Verständnis des Geschehens am Knochen ist und sie allein auch für kommende Untersuchungen eine gesicherte und geeignete Grundlage bildet. Die rein morphologische Betrachtungsweise v. Recklinghausens führt durch einen „Wald von neuen Namen und Tatsachen“ in jenes Dunkel zurück, aus dem Pommers durch die Feststellung seiner beiden physiologischen Fundamentalsätze die Lehre von der Rachitis und Osteomalacie emporgehoben hat. Pommers Werk ist dadurch nicht nur die grundlegende Arbeit für die Rachitis und Osteomalacie, sie ist auch die Grundlage der ganzen modernen Knochenpathologie geworden.

Literaturverzeichnis.

(In diesem Verzeichnis sind nur Arbeiten angeführt, die auf die Spätrachitis Bezug haben. Eine Anzahl anderer Arbeiten sind im Text in Fußnoten erwähnt.)

1. Anschütz, Über einige seltene Formen der Knochenatrophie und der Osteomalacie. Mitteil. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir. 1902, Bd. 9.
2. Bérard et Nordmann, Un cas d'ostéomalacie infantile. Lyon méd. 1904, Décembre.
3. Beyland, Du rachitis, de la fragilité des os, de l'ostéomalacie. Paris 1852.
4. Bezy, Ostéite de croissance et rachitisme tardif. Bull. de la Soc. d. méd. de Toulouse 1900.
5. Biedert. Verhandl. d. Gesellsch. f. Kinderheilkunde 1884, S. 91.

6. Bokay, v., Un cas rare de rachitisme tardif. Arch. de méd. des enfants 1910, Juni.
7. Bordet, Nanisme rachitique tardif. Lyon 1902.
8. Breus u. Kolisko, Die pathologischen Beckenformen. Leipzig u. Wien 1900, Bd. 1.
9. Cautley, Recrudescence or late rickets. Brit. med. Journ. 1896, Vol. 1, p. 13.
10. Chiari, Über zwei seltene Fälle von Rachitis. Mitteil. d. Wiener med. Doktorenkollegiums 1879.
11. Clutton, Late rickets. Saint Thomas Hosp. Rep., New Series 1884, Vol. 14, p. 103.
12. —, On adolescent or late rickets. The Lancet 1906, II, p. 1268.
13. —, Little etc., Rachitis adolescentium. Clinical Soc. of London 1906, 12. Okt. Münchner med. Wochenschr. 1907, Nr. 7, S. 196.
14. Colley, Juvenile Osteomalacie. Brit. med. Journ. 1884, I, p. 667.
15. Colley, F., Über Fettembolie nach gewaltsamer Gelenkbeugung und zur Kenntnis der Entstehung von Enchondromen. Deutsche Zeitschr. f. Chir. 1893, Bd. 36, S. 322.
16. Curschmann, Hans, Über Rachitis tarda. Mitteil. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir. 1905, Bd. 14.
17. Delcourt, Le rachitisme tardif. Bruxelles 1899.
18. —, Rachitis tarda. Allgem. Wiener med. Zeitung 1900, Bd. 45, S. 118, 130, 142, 152.
19. Deydier, Rachitisme tardif. Thèse de Lyon 1895, Serie I, No. 1077.
20. Drewitt, Case of late rickets. Transactions of the Patholog. Soc. of London 1881, Vol. 32, p. 386 u. 391.
21. Drey, Rachitis tarda. Monatsschr. f. Kinderheilk. 1906, Bd. 5, S. 103.
22. Duplay, Un cas de rachitisme tardif des poignets. Gaz. des hôp. 1891, Vol. 84, p. 1397.
23. Epstein, Über ein ungewöhnliches Syndrom der Tetanie beim Erwachsenen (Rachitis tarda). Med. Klinik 1911, Nr. 39.
24. Elmslie, The continuation of active rachitic processes in the bones into the adolescent period. St. Bartholomews Hosp. Rep. 1906, Vol. 42.
25. Genser, v., Traumatische Schädelrissur. Rachitis tarda. Beitr. z. Kinderheilk. a. d. 1. öffentl. Kinderkrankeninstitut in Wien. Herausgegeben v. Kassowitz, N. F., Wien 1893, Bd. 4.
26. Guérin, Die Rachitis. Deutsch von G. Weber. Nordhausen 1847.
27. Haedke, Zur Ätiologie der Coxa vara. Deutsche Zeitschr. f. Chir. 1903, Bd. 66, S. 89.
28. Hausmann, Über Genu varum adolescentium im Anschluß an einen infolge von Rachitis tarda entstandenen Fall. Diss. Straßburg 1909.
29. Hermann u. Johnson, A case of late rickets. Lancet 1909.
30. Hochsinger, Die Phosphorbehandlung der Rachitis. Wiener med. Blätter 1885, Bd. 8, S. 234 f.
31. Horwitz, Adolescent rachitis. Etiology and Pathology. Americ. Journ. of orthop. Surg. 1909.

32. Hutinel, Sur une dystrophie spéciale des adolescents. Rachitisme tardif avec impotence musculaire, nanisme, obésité et retard des fonctions génitales. *Gaz. des hôpitaux* 1912.
33. Hutinel et Harvier, Dystrophie ostéo-musculaire avec nanisme. *Arch. de méd. des enfants* 1912, Vol. 15.
34. James, Un case de rachitisme ayant débuté à l'âge de dix-sept ans. *Scottish med. and surg. Journ.* 1897.
35. Joachimsthal, Eine ungewöhnliche Form der Knochenerweichung. *Berliner klin. Wochenschr.* 1907, Nr. 44, S. 1404.
36. Kassowitz, Rachitis tarda. *Allgem. Wiener med. Zeitung* 1885, Bd. 30.
37. Keetly, A case of rachitis adolescentium. *Illustr. med. News* 1888.
38. Koenig, Osteomalacie infantile. Thèse Lyon 1905.
39. Lauper, Studie über Osteomalacie. *Fortschr. a. d. Gebiete d. Röntgenstrahlen* 1902, Bd. 5. Inaug.-Diss. Zürich 1902.
40. Lobstein. *Lehrbuch der pathologischen Anatomie*, Stuttgart 1835, Bd. 2, S. 170.
41. Looser, Über Spätrachitis. *Verhandl. d. Deutsch. Patholog. Gesellsch.* (Meran) 1905, Bd. 9.
42. —, Über Spätrachitis und die Beziehungen zwischen Rachitis und Osteomalacie. *Mitteil. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir.* 1908, Bd. 18.
43. —, Rachitis — Spätrachitis — Osteomalacie. *Korrespondenzbl. f. Schweiz. Ärzte* 1919, Nr. 29.
44. Lucas, On a form of late rickets associated with albuminuria, rickets of adolescents. *The Lancet* 1883, Vol. 1, p. 993.
45. Maffei, Un cas de rachitisme tardif. *Soc. Belge de Chirurgie* 1901, 22. Juli. *Ref. Fortschr. d. Röntgenstrahlen* 1901, Bd. 5, S. 144.
46. Marfan, Le rachitisme tardif. Rachitisme des grands enfants et des adolescents. *Journ. de méd. int. Paris* 1910.
47. Marsden, Late rickets. *Edinb. med. Journ., New Ser.* 1905, Vol. 17, p. 344.
48. Meißner, *Die Kinderkrankheiten*. Leipzig 1828, Bd. 2, S. 266.
49. Mesley, Contribution à l'étude anatomo-clinique de l'ostéomalacie. Thèse, Paris 1896.
50. —, Ostéomalacie infantile. *Rev. mens. des malad. de l'enfance* 1897, t. 15.
51. Miesowicz, Über späte Rachitis. *Wiener klin. Wochenschr.* 1908, Nr. 27.
52. Mikulicz, Die seitlichen Verkrümmungen am Knie und deren Heilungsmethoden. *Arch. f. klin. Chir.* 1878, Bd. 23.
53. Müller, Über die Verbiegung des Schenkelhalses im Wachstumsalter. *Beitr. z. klin. Chir.* 1889, Bd. 4, S. 137.
54. Müller, Leo, Rachitis tarda mit Enchondrom des Beckens. *Münchener med. Wochenschr.* 1906, Nr. 37, S. 1834.
55. Nicaise, Altérations et déformations du squelette dans le rachitisme. *Gaz. des hôp.* 1881, No. 94, p. 747.

56. Ogata, Die Symptomatologie der Rachitis und Osteomalacie in Japan. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynäkol. 1913, Bd. 18, S. 8.
57. Péron et Meslay, Un cas d'ostéomalacie chez une fillette de 15 ans. Rev. mens. des malad. de l'enfance 1895, t. 13.
58. Poland, Case of rachitic curvature of tibiae backwards. Brit. med. Journ. 1898, Vol. 1, p. 1515.
59. Poncet, Tuberculose inflammatoire et rachitisme tardif. Acad. de méd. 1907, 8. Oct.
60. Rath, Ein Fall von Spätrachitis. Zeitschr. f. orthopäd. Chir. 1907, Bd. 18.
61. Rensing, Über Rachitis sera sive adultorum. Inaug.-Diss. Freiburg i./Br. 1901.
62. Recklinghausen, v., Die fibröse oder deformierende Ostitis, die Osteomalacie und die osteoplastische Karzinose in ihren gegenseitigen Beziehungen. Festschr. d. Assistenten f. Virchow, Berlin 1891.
63. —, Untersuchungen über Rachitis und Osteomalacie. Jena 1910 (Gustav Fischer).
64. Ricklin, Kalzium- und Phosphorsäure-Stoffwechsel bei einem Fall von Rachitis tarda. Korrespondenzbl. f. Schweiz. Ärzte 1917, Jahrg. 47, S. 1586.
65. Rietschel, Rachitis tarda. Münchner med. Wochenschr. 1917, Vereinsber., S. 782.
66. —, Schwere Knochenerkrankung im Kindesalter. Osteomalacie? Rachitis? Ebenda 1903, Bd. 50.
67. Schabad, Zwei Fälle von sog. Spätrachitis. Mitteil. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir. 1911, Bd. 23, S. 82.
68. Schirmer, Nachtrag zur Arbeit von Lauper usw. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen 1905, Bd. 9.
69. Schmori, Über Rachitis tarda. Deutsches Arch. f. klin. Med. 1905, Bd. 85.
70. Schüller, Rachitis tarda und Tetanie. Wiener med. Wochenschr. 1909, Nr. 38.
71. Siegert, Über typische Osteomalacie im Kindesalter. Münchner med. Wochenschr. 1898, Nr. 44.
72. Stanski, Recherches sur les maladies des os désignées sous le nom d'ostéomalacie. Paris 1851.
73. Thiersch, Zu Ogstons Operation des Genu valgum. Arch. f. klin. Chir. 1879, Bd. 23.
74. Tixier u. Roederer, Osteomalacische Veränderungen des Skeletts bei einem 9jährigen Knaben. Bull. de la soc. de pédiatrie des Paris 1912.
75. Tobler, Über Spätrachitis. Verhandl. d. 28. Vers. d. Deutsch. Gesellschaft f. Kinderheilk., Karlsruhe 1911.
76. Variot, Sur une variété spéciale du rachitisme. Lésions rachitiques similaires du squelette chez trois frères avec troubles locomoteurs graves et prolongés. Bull. et mém. Soc. méd. des hôpit. 1897.

77. Weber, C. O., Enarratio consumptionis rachiticae in puella viginti duorum annorum observatae. Bonnae 1862.
78. Wieland, Rachitis tarda. *Ergebn. d. inn. Med. u. Kinderheilk.* 1914, Bd. 13.
79. Wohlaue, Atlas und Grundriß der Rachitis. *Lehmanns Medizinische Atlanten*, München 1911.

Tafelerklärung.

Fall 1, Spätrachitis, männl., 15½ Jahre (Fig. 13).

Tafel I.

- Fig. 1. Rechte Hand. Atrophie des Handskelettes leichten Grades, Epiphysenfugen von Radius und Ulna etwas verbreitert und unregelmäßig (Ulna). Das Ende der Ulna-Diaphyse etwas ausgeladen, Verkalkungszone am Radius deutlich, an der Ulna verwaschen in strukturloser Zone (S. 227).
- Fig. 2. Rechtes Knie. Leichte Atrophie der Knochen, Epiphysenfugen etwas verbreitert, ziemlich stark verbreiterte Verkalkungszonen (Remission), Osteophytenauflagerung an der Fibula (S. 227).
- Fig. 3. Rechte Knöchelgegend. Veränderungen an den Knochen und Epiphysenfugen wie in Fig. 2 (S. 227).

Fall 2, Spätrachitis, männl., 17 Jahre (Fig. 14).

Tafel II.

- Fig. 4. Rechte Hand. Atrophie der Knochen. Epiphysenfugen von Radius und Ulna etwas verbreitert. Zwei (breitere und schmälere) Verkalkungslinien (zwei Remissionen) in strukturloser Zone, distales Ulnaende becherförmig erweitert (S. 229).
- Fig. 5. Rechtes Knie. Ziemlich starke Atrophie der Knochen, dünne Corticalis und grobmaschige Spongiosa. Auf der medialen Seite des Tibiakopfes doppelte Verkalkungslinie, dazwischen ganz strukturelose Zone, Basallinie ziemlich stark verkalkt. Im distalen Femurende und in der Epiphyse des Femur einige kleinere, von dunklerem Hof umgebene Aufhellungen (Knorpelinseln) (S. 229).

Fall 3, Spätrachitis, männl., 18¾ Jahre (Fig. 15).

Tafel III.

- Fig. 6. Linkes Knie. Atrophie der Knochen. Epiphysenknorpel der Tibia etwas wellig, stark verbreitert, 3 ziemlich breite Verkalkungslinien (drei Remissionen), in strukturloser Zone Diaphysenende der Tibia medial becherförmig ausgeladen, Basallinien stark verkalkt (S. 231).
- Fig. 7. Rechtes Knie. Ähnlich wie Fig. 6 (S. 231).

Tafel IV.

- Fig. 8. Linke Hand. Ausgesprochene Atrophie des Handskelettes, die Corticalis der Phalangen in ein feines Netzwerk aufgelöst. Epiphysenknorpel von Radius und Ulna stark verbreitert, verwaschen in die Diaphyse auslaufend, mehrere „Remissionslinien“ angedeutet, distales Diaphysenende der Ulna becherförmig ausgeweitet (S. 231).
- Fig. 9. Linke Knöchelgegend. Atrophie der Knochen. Epiphysenknorpel verbreitert, grenzt an breite, strukturarme Zone an, die diaphysenwärts durch breite, alte Remissionslinie begrenzt wird (S. 232).

Fall 4, Spätrachitis, weibl., 12 Jahre (Frg. 16).

Tafel V.

- Fig. 10. Rechtes Knie. Ziemlich starke Atrophie der Knochen. Epiphysenknorpel stark verbreitert und unregelmäßig, an der Grenze zwischen diesen und der Diaphyse kräftige alte Verkalkungslinie (alte Remission). Basallinie stark verkalkt. Die Enden der Diaphyse becherförmig ausgeladen (S. 233).
- Fig. 11 und 12. Linke Knöchelgegend, linkes Handgelenk. Veränderungen ähnlich wie in Fig. 10 (S. 233).
- Fig. 13. Linke Hand. Knochenatrophie, Auffaserung der Corticalis der Phalangen in ein feines Netzwerk. Corticalis der Metacarpalia in feine Längsstreifen aufgelöst (S. 233).

Tafel VI.

- Fig. 14—16. Rechtes Knie, linke Knöchelgegend, linkes Handgelenk nach 7monatlicher Phosphorbehandlung. Knochenatrophie etwas gebessert, die breiten Knorpelfugen auf normale Breite reduziert, schmale Verkalkungszone an normaler Stelle, die verkalkten Basallinien weniger auffallend wie früher. Knochenstruktur an den Stellen der früher verbreiterten Knorpelfugen noch etwas schwach gezeichnet (S. 233).

Fall 5, Spätrachitis, männl., 19 Jahre (Fig. 17).

Tafel VII.

- Fig. 17. Linkes Knie. Atrophie der Knochen. Tibia unterhalb des Kopfes etwas verbogen. Der Epiphysenknorpel der Tibia nur auf der medialen Seite als fast 1 cm breites Band erhalten, diaphysenwärts davon zwei starke und zwei ganz schwache, alte Remissionslinien in gegenseitigen Abständen von 1, $\frac{3}{4}$ und $\frac{1}{2}$ cm, Basallinie stark verkalkt. Die Epiphysenknorpel von Tibia und Femur median stark buckelig vorgebuchtet (S. 234).
- Fig. 18. Rechtes Knie. Ähnlich wie Fig. 17 (S. 234).
- Fig. 19. Rechtes Handgelenk. Knochenatrophie. Epiphysenknorpel von Radius und Ulna verbreitert und unregelmäßig, starke und schwache

Remissionslinie, Diaphysenenden von Ulna und Radius stark becherförmig erweitert (S. 234).

- Fig. 20. Rechtes Knie nach $3\frac{1}{2}$ monatlicher Phosphorbehandlung. Knochenatrophie wenig gebessert. Im früher breiten Epiphysenknorpel fragment eine Verkalkungszone an normaler Stelle aufgetreten. Der distal davon gelegene Teil des ehemaligen Knorpels zeigt etwas Knochenstruktur. Die alten Verkalkungszonen, auch die breite, starke Verkalkungszone der Basallinie, undeutlicher geworden, die mediale bucklige Vorwölbung der Epiphysenknorpel gegen früher etwas abgeflacht (S. 235).

Fall 6, Spätrachitis, weibl., $18\frac{1}{2}$ Jahre (Fig. 18).

Tafel VIII.

- Fig. 21. Linkes Knie. Knochenatrophie. Verbiegung der Tibia unterhalb des Tibiakopfes. 1 cm breite Knorpelfugen, die sich auf der Innenseite von Femur und Tibia buckelförmig vorbuchten. Die lateralen Abschnitte der Epiphysenknorpel von Tibia und Femur undeutlich, von schwacher Knochenstruktur durchzogen. Becherförmige Ausladung der Diaphysenenden, alte Remissionslinie an der Grenze zwischen Knorpel und Diaphyse, Basallinie stark verkalkt (S. 236).
- Fig. 22. Rechte Hüfte. Knochenatrophie. 1 cm breite Knorpelfuge im Schenkelhals mit starker Remissionslinie an der Grenze gegen den Schenkelhals und stark verkalkte Basallinie (S. 236).
- Fig. 23. Linke Knöchelgegend. 1 cm breite Aufhellung an Stelle der Epiphysenfuge, in die stellenweise bereits etwas Knochenstruktur hineinragt (S. 236).
- Fig. 24. Linkes Handgelenk. Schmale Epiphysenfugen, an die sich eine breite Zone fleckig verwaschener Struktur anschließt (S. 236).

Tafel IX.

- Fig. 25. Rechter Tibiakopf zwei Wochen nach Osteotomie der Tibia. Schwache Infraktion der Fibula.
- Fig. 26. Linkes Knie, 2 Wochen nach Osteotomie von Tibia und Fibula.
- Fig. 27. Rechtes Knie, 8 Monate nach Osteotomie und Phosphorbehandlung. Knochenatrophie gebessert. Osteotomie geheilt. Der Epiphysenknorpel der Tibia im medialen Abschnitt noch etwas sichtbar, aber von Knochenstruktur durchzogen, keine präparatorische Verkalkungszone an normaler Stelle! (Erklärung S. 313.)

Tafel X.

- Fig. 28—30. Querschnitt durch die Corticalis der Tibia unterhalb des Tibiakopfes. Hämatoxylin-Eosinfärbung nach partieller Entkalkung des Knochens in Müllerscher Flüssigkeit. Corticalis stark atrophisch, in einzelne Lamellen aufgelöst (Fig. 28), stellenweise hat die Corticalis eigentlich spongiösen Bau (Fig. 29). Der Knochen von deutlich lamellösem Bau (Fig. 30); er ist im Zentrum verkalkt, seine Ränder in einer Breite von 20—70 μ kalklos. Grenze

zwischen kalkhaltigem und kalklosem Knochen körnig-krümelig verkalkt (Fig. 30). Die kalklosen Säume zum großen Teil von Osteoblasten besetzt, Osteoklasten und perforierende Kanäle in geringer Zahl. Das Mark besteht aus einem zellarmen fibrösen Gewebe mit eingestreuten Fettzellen und spärlichen Rundzellen, sehr weite Blutkapillaren, stellenweise kleine Blutungen (S. 237).

Fall 7, Spätrachitis, weibl., 17½ Jahre (Fig. 21).

Tafel XI.

- Fig. 31. Rechtes Knie. Starke Knochenatrophie. Epiphysenknorpel von Femur und Tibia 1 cm breit, im Tibiaknorpel leichte wolkige Kalk-einlagerung. Basallinie stark verkalkt (S. 240).
- Fig. 32. Linke Hüfte. Im Schenkelhals 1 cm breite Epiphysenfuge sichtbar, mit deutlich verkalkter Basallinie (S. 240).
- Fig. 33. Linke Knöchelgegend. Knochenatrophie. 1 cm breite Knorpelfugen von Tibia und Fibula, durch Verkalkungslinie gegen die Diaphyse abgegrenzt, Basallinie stark verkalkt. Auf der Innenseite des unteren Tibiaendes Osteophytenauflagerung (S. 240).
- Fig. 34. Linke Hand. Knochenatrophie. Sehr breite Knorpelfugen in Radius und Ulna, stark verwaschen in die Diaphyse auslaufend, Diaphysenenden (namentlich der Ulna) stark becherförmig erweitert (S. 241).
- Fig. 35. Rechtes Knie nach 2½ Monaten Phosphorbehandlung. Knochenstruktur gegen Fig. 31 deutlicher. Im Epiphysenknorpel von Tibia und Femur starke wolkige Kalkeinlagerungen (S. 241).

Fall 8, Spätrachitis, männl., 18 Jahre (Fig. 22).

Tafel XII.

- Fig. 36. Rechtes Knie. Knochenatrophie. Epiphysenknorpel $\frac{3}{4}$ cm breit. Diaphysenwärts davon vier breitere und schmalere, parallele Verkalkungstreifen (Remissionslinien), Basallinie stark verkalkt (S. 242).
- Fig. 37. Linke Knöchelgegend. Knochenatrophie. $\frac{3}{4}$ cm breite Epiphysenfuge, durch breite Remissionslinie und die stark verkalkte Basallinie begrenzt (S. 242).
- Fig. 38. Linkes Handgelenk. Knochenatrophie. Breite, verwaschene Epiphysenfugen an Radius und Ulna, zwei Remissionslinien, Diaphysenenden von Radius und Ulna stark becherförmig erweitert (S. 242).

Fall 9, Spätrachitis, männl., 19¾ Jahre (Fig. 23).

Tafel XIII.

- Fig. 39. Linkes Knie. Knochenatrophie. Epiphysenknorpel der Tibia stark hügelig verlaufend, infolgedessen Basallinie und die kräftige, am Rande der Tibia in ihrer Lage zum Epiphysenknorpel genau zu bestimmende Remissionslinie in der Projektion stark verworfen. Epiphysenknorpel $\frac{1}{2}$ bis $\frac{3}{4}$ cm breit. Diaphysenwärts von der starken Remissionslinie zwei weitere, etwas schwächere (S. 244).

- Fig. 40. Rechtes Handgelenk. Knochenatrophie. Sehr stark verbreiterte, verwaschen auslaufende Epiphysenknorpel, starke Remissionslinie an der Grenze zwischen Knorpel und Diaphyse, Diaphysenenden stark becherförmig ausgeladen (S. 244).

Fall 10, Spätrachitis, weibl., 18 Jahre (Fig. 24).

Tafel XIV.

- Fig. 41. Linkes Knie. Hochgradige Knochenatrophie. Epiphysenknorpel von Femur, Fibula und Tibia 1 cm breit, der Knorpel der Tibia stark hügelig verlaufend, die einzelnen Schichten in der Mitte der Tibia in der Projektion stark verworfen. Auf der medialen Seite von Tibia und Fibula 7, aber nur schwach ausgebildete, Verkalkungslinien. Auf der lateralen Seite des oberen Tibiaendes schwache Osteophytenauflagerung (S. 245).
- Fig. 42. Linkes Hüftgelenk. Im Schenkelhals des Femur 1 cm breite Knorpelfuge mit deutlich verkalkter Basallinie. Der Kopf des Femur ist etwas nach der lateralen Seite abgerutscht (Coxa valga) (S. 245).
- Fig. 43. Linke Knöchelgelenk. Knochenatrophie. Breite, verwaschene Epiphysenfugen an Tibia und Fibula, an der Tibia drei deutliche Remissionslinien, stark verkalkte Basallinie (S. 245).

Tafel XV.

- Fig. 44. Linkes Handgelenk. Knochenatrophie. Sehr breite, sehr verwaschene Knorpelfugen an Radius und Ulna, deutliche, aber ziemlich verwaschene Remissionslinien. Das distale Ulnaende stark becherförmig erweitert (S. 246).
- Fig. 45. Linkes unteres Femurende zwei Monate nach Osteotomie und Phosphorbehandlung. Die Osteotomiestelle zeigt deutlich verkalkten periostalen und myelogenen Callus. An Stelle des früher hellen, sehr breiten Epiphysenknorpels ein $\frac{1}{2}$ cm breites, sehr dunkles, verkalktes Band (S. 246).
- Fig. 46. Rechtes unteres Femurende. Verhältnisse ähnlich wie links (S. 246).

Fall 11, Spätrachitis, weibl., 14 Jahre (Fig. 27).

Tafel XVI.

- Fig. 47. Linkes Knie. Knochenatrophie. An Femur, Fibula und Tibia 1 cm breite Epiphysenfugen. Der Knorpel der Tibia verläuft stark hügelig, seine Schichten in der Mitte der Tibia in der Projektion stark verworfen. An Femur und Tibia je vier schwache Remissionslinien in der medialen Seite des Knochens. Diaphysenenden von Femur und Tibia becherförmig ausgeweitet. Auf der lateralen Seite des oberen Tibiaendes schmale Osteophytenauflagerung (S. 248).
- Fig. 48. Rechtes Knie. Die Epiphysenknorpel von Femur, Tibia und Fibula bedeutend schmaler wie in Fig. 47. Sie enthalten wolkige Kalk-

einlagerungen, an der Tibia auch streckenweise eine schwache Verkalkungszone an normaler Stelle (beginnende Heilung) (S. 249).

Fig. 49. Linke Knöchelgegend. Unteres Tibia- und Fibulaende etwas medianwärts abgebogen. Epiphysenknorpel von Tibia und Fibula ziemlich schmal, grenzt an eine breite, strukturelose Zone des Diaphysenendes. Eine Verkalkungszone an normaler Stelle ist bereits angedeutet. Vier Remissionslinien auf der medialen Seite der Tibia deutlich zu sehen (S. 249).

Fig. 50. Linkes Handgelenk. Knochenatrophie. Epiphysenknorpel von Radius und Ulna etwas verbreitert. Die Diaphysenenden von Radius und Ulna zeigen kaum Knochenstruktur. Etwas verbreiterte Verkalkungszone an annähernd normaler Stelle am Radius deutlich zu sehen (Heilungsstadium) (S. 249).

Tafel XVII.

Fig. 51 und 52. Rechte Knöchelgegend, rechtes Handgelenk, nach $3\frac{1}{2}$ Monaten Phosphorbehandlung. Knochenatrophie gegen Tafel XVI etwas gebessert. Epiphysenfugen von normaler Breite, begrenzt durch sehr intensive, verbreiterte Verkalkungszone. Die frühere breite, strukturelose Zone zeigt etwas Knochenstruktur, ist aber noch deutlich aufgeheilt (S. 249).

Fig. 53. Rechtes unteres Femurende, 3 Monate nach Osteotomie und $3\frac{1}{2}$ Monate Phosphorbehandlung. Die Osteotomiestelle zeigt deutlich verkalkten periostalen und myelogenen Callus. An Stelle des früheren breiten Epiphysenknorpels breites, wolkiges, verkalktes Band (S. 250).

Fig. 54. Rechtes Knie, $5\frac{1}{2}$ Wochen nach Fig. 53 aufgenommen. Noch ausgesprochene Atrophie der Knochen, Callus der Osteotomiestelle bedeutend stärker verkalkt als in Fig. 53. Das breite Kalkband an Stelle des Epiphysenknorpels des Femur etwas intensiver geworden, auch an dem etwas wellig verlaufenden Epiphysenknorpel der Tibia intensive, verbreiterte Verkalkungszone (S. 250).

Fall 12, Spätrachitis, männl., 18 Jahre (Fig. 29).

Tafel XVIII.

Fig. 55. Rechtes Knie, nach fünfmonatlicher Phosphorbehandlung. Hochgradige Atrophie der Knochen. Unteres Femurende von sehr grobmäschiger Struktur. Auf der medialen Seite des unteren Femurendes, der Epiphysenfuge entsprechend, $1\frac{1}{2}$ cm breite, helle Stelle (Teil der Epiphysenfuge?), Epiphysenfuge der Tibia schmal, in der Projektion stark verworfen, zeigt deutliche Verkalkungszone an normaler Stelle und deutlich verkalkte Basallinie. Auf der medialen Seite des unteren Tibiaendes mehrere schwache Remissionslinien (S. 252).

Fig. 56. Linke Hand nach fünfmonatlicher Phosphorbehandlung. Starke Atrophie der Knochen, Auffaserung der Corticalis der Phalangen. Epi-

physenknorpel von Radius und Ulna von annähernd normaler Breite mit deutlicher Verkalkungszone an normaler Stelle, diaphysenwärts davon 1 cm breite, strukturarme, etwas helle Zone, die durch Remissionslinie gegen die Diaphyse abgegrenzt ist (S. 252).

Fall 13, Spätrachitis, männl., 14 Jahre (Fig. 30).

Tafel XIX.

- Fig. 57. Rechtes Knie. Sehr hochgradige Atrophie der Knochen. Ihre Struktur sehr grobmaschig, wabenartig. Die Epiphysenfugen von Femur und Tibia schwer erkennbar, dagegen an der Fibula sehr breite, unregelmäßige Epiphysenfuge zu erkennen (S. 255).
- Fig. 58. Rechte Knöchelgegend von der Seite. Sehr starke Atrophie der Knochen mit wabenartiger Struktur. Epiphysenfuge der Fibula sehr stark verbreitert, verwaschen, unregelmäßig. Epiphysenfuge der Tibia schwer zu erkennen (S. 255).
- Fig. 59. Linke Hand. Sehr hochgradige Atrophie der Knochen. Die sehr stark verbreiterten, gegen die Diaphysen stark verwaschenen Epiphysenfugen von Radius und Ulna deutlich zu erkennen (S. 255).

Fall 14, männl., 16½ Jahre (Fig. 31).

Tafel XX.

- Fig. 60. Querschnitt durch die Tibia. Hochgradige Atrophie der Corticalis, der eine breite Osteophytenschicht aufgelagert ist. Zwischen dieser und der Corticalis Blutung, die die Osteophytenschicht abgehoben und zerrissen hat (S. 257).
- Fig. 61. Detailbild aus der Corticalis der Tibia. Die Corticalis in ein Netz unregelmäßiger Bälkchen aufgelöst. Die Bälkchen von lamellösem Bau, im Zentrum verkalkt, mit schmalen osteoiden Säumen auf der Oberfläche und breiteren auf der subperiostalen Fläche versehen. Fast überall deutliche Osteoblastenlager. Osteoklasten in normaler Zahl. Neben den breiteren, lamellös gebauten Bälkchen bedeutend schmalere, unregelmäßige, von geflechtartigem Bau im fibrösen Mark und im verbreiterten Periost (S. 257).
- Fig. 62. Frontaler Längsschnitt durch das untere Tibia- und Fibulaende. Knochenatrophie. Sehr hochgradige Verbreiterung der Tibia- und Fibula-Epiphysenknorpel (S. 258).
- Fig. 63. Längsschnitt durch die Basis des Metatarsale I. Mäßig verbreiteter Epiphysenknorpel. Hochgradige Atrophie der Corticalis und Spongiosa (S. 258).
- Fig. 64. Detailbild aus dem Epiphysenknorpel des Metatarsale I. Knorpel mäßig verbreitert, besitzt eine präparatorische Verkalkungszone, die von den primären Markräumen überall durchbrochen wird (kürzlich stattgehabte Remission). Äußerst geringe Knochenbildung (S. 258).

Fall 15, Spätrachitis, weibl., 20 Jahre (Fig. 32).

Tafel XXI.

Fig. 65. Becken. „Pseudosteomalacisches Becken“, hochgradige Kartenherzform (S. 263).

Tafel XII.

Fig. 66. Rechter Unterschenkel. Hochgradige Atrophie der Knochen. In der Mitte der Tibia 3 mm breite, quere Aufhellungszone, die durch einen, der konkaven Seite des Knochens angelagerten, Callus überbrückt wird. Die Fibula an der Biegungsstelle stark verdünnt. Die verbreiterten Epiphysenknorpel schwer sichtbar (S. 262).

Fig. 67. Linker Unterschenkel. Allgemeine Verhältnisse wie Fig. 66. In der Mitte der Tibia quere Verdichtung des Knochenschattens, die einer alten, jetzt verkalkten Aufhellungszone entspricht. Auch der die Stelle begleitende Callus viel stärker verkalkt als in Fig. 66. Oberhalb und unterhalb dieser Stelle mehrere kleine, lokale Aufhellungen in der vorderen Corticalis, die meist in schrägen Sprüngen durch die Knochen zu verfolgen sind (S. 263).

Tafel XXIII.

Fig. 68 und 69. Rechter und linker Vorderarm. Hochgradige Atrophie der Knochen. Radius und Ulna stark verbogen und leicht geknickt. Die stark verbreiterten und verwachsenen Epiphysenfugen am distalen Vorderarmende ziemlich deutlich zu sehen, die distalen Diaphysenenden becherförmig erweitert. An beiden Radii und Ulnae je eine quere Aufhellungszone mit dunklen Rändern und deutlichem, kalkhaltigem periostalem Callus auf der konkaven Seite (S. 262).

Tafel XXIV.

Fig. 70 und 72. Linke Hand, linker Fuß. Hochgradigste Atrophie des Hand- und Fußskeletts. Die Corticalis strichförmig, die Spongiosa spinngewebartig (S. 262).

Fig. 71. Rechtes Knie. Sehr hochgradige Atrophie der Knochen. Die Epiphysenknorpel schwer zu sehen.

Fall 16, Übergangsfall, weibl., 29 Jahre (Fig. 33).

Tafel XXV.

Fig. 73. Linkes Knie. Sehr hochgradige Atrophie und Durchsichtigkeit der Knochen. Infraktion des unteren Femur- und des oberen Fibularendes. Herdförmige Aufhellungen auf der medialen Seite der Tibia unterhalb des Tibiakopfes (S. 267).

Tafel XXVI.

Fig. 74. Linkes Handgelenk von 1915. Sehr hochgradige, etwas fleckige Atrophie der Knochen. Der Radius oberhalb der Epiphyse radialwärts abgeknickt. Im Bereiche der Knickungsstelle annähernd quere, unregelmäßige Aufhellungszone (Schatten wie ausstrahlt). Die

Ulna zeigt einen gut 1 cm breiten, sehr deutlichen, diaphysenwärts verwaschenen Epiphysenknorpel! (S. 266).

- Fig. 75. Dasselbe von 1917. Die Knochenatrophie hat etwas zugenommen. Die Aufhellungszone an der Knickungsstelle des Radius ist genau die gleiche geblieben, dagegen hat die Abknickung des Radius zugenommen. Die Epiphysenfuge der Ulna hat sich etwas verschmälert (S. 266).
- Fig. 76. Rechtes Handgelenk von 1915 und
- Fig. 77. Dasselbe von 1917 zeigen ganz entsprechende Verhältnisse wie die Figuren 74 und 75.

Tafel XXVII.

- Fig. 78. Rechte Knöchelgegend von 1913. Sehr hoch gradige Knochenatrophie. Der verbreiterte Epiphysenknorpel der Tibia im Röntgenbild noch schwach angedeutet, die Corticalis hört 1—2 cm von demselben auf. An der Stelle von zwei, vor dem 15. Lebensjahre entstandenen, Infraktionen der Fibula hochgradige Aufhellung der Fibula, von welcher an dieser Stelle nur noch ein etwas disloziertes Stück der äußeren Corticalis zu sehen ist (S. 267).
- Fig. 79. Dasselbe von 1914.
- Fig. 80. Dasselbe von 1917. Die Befunde haben sich durch die Jahre hindurch bis in kleine Details ganz unverändert erhalten. Die Knochenatrophie hat ganz wenig zugenommen, dagegen hat die auch im Röntgenbilde an den Konturen sichtbare Atrophie der Weichteile wesentlich zugenommen (S. 267).

Fall 17, Übergangsfall, weibl., 26 Jahre (Fig. 34).

Tafel XXVIII.

- Fig. 81. Linker Oberschenkel. Verbiegung und sehr hochgradige Atrophie des Oberschenkels (S. 272).
- Fig. 82. Linke Hand. Hochgradige Atrophie der Knochen. Verdünnung und Auffaserung der Corticalis der Phalangen. Radius- und Ulnaepiphysengegend etwas verbreitert, im Bereiche der früheren Epiphysenfugen eine 1 cm breite, besonders grobmaschige, gegen die Diaphyse durch eine feine, quere Verkalkungslinie (Radius) abgegrenzte Zone (S. 272)

Fall 19, Osteomalacie, weibl., 36 Jahre.

Tafel XXIX.

- Fig. 83. Linke Hand. Atrophie der Knochen. Auffaserung der Compacta der Phalangen. In der Basis der I. Phalanx des Mittelfingers und der II. Phalanx des Daumens herdförmige Aufhellungen (Chondrome?) (S. 277).

Fall 23, Osteomalacie, weibl., 42 Jahre (Fig. 38).

Tafel XXX.

- Fig. 84. Linker Vorderarm und Hand von Januar 1915. Sehr hochgradige Atrophie der Knochen. Am distalen Radiusende 7 mm breite, unscharf begrenzte, quere Aufhellung im Radius ohne Dislokation der benachbarten Fragmente. Gegenüber dem Radius ebensolche Aufhellung mit deutlicher Dislocatio ad latus (Fraktur). Höher oben an der Ulna dritte quere Aufhellung, die in der Corticalis breiter ist als in der Mitte des Knochenschattens, mit deutlicher periostaler Callusbildung (S. 285).
- Fig. 85. Linker Vorderarm von Dezember 1917. Die Knochenatrophie hat sich gegenüber Fig. 84 fast ausgeglichen (S. 285).

Tafel XXXI.

- Fig. 86. Linker Humerus von Januar 1915. Hochgradige, etwas fleckige Knochenatrophie. Doppelte Knickung des Humerusschaftes. Im Bereiche der Knickung in der Mitte annähernd quere, mit zackigen, unscharfen Rändern versehene Aufhellung des Humerusschaftes von 7 mm Breite. Distal davon, oberhalb des unteren Humerusendes, schräge, 4 mm breite Aufhellung ohne Knickung des Schaftes oder Dislokation der Fragmente ad latus (S. 284).
- Fig. 87. Linker Humerus vom Dezember 1917. Die Knochenatrophie hat sich ausgeglichen gegenüber Fig. 86. Form des Humerus unverändert, an Stelle der Knickungen und Aufhellungen in Fig. 86 sind genau entsprechende Verdichtungen des Knochens aufgetreten (S. 284).
-

Zu Fall 1. (♂, 15 $\frac{1}{2}$ J.)

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

LOOSER.

Zu Fall 2. (♂, 17 J.)

Fig. 4.

Fig. 5.

Zu Fall 3. (♂, 18³/₄ J.)

Fig. 7.

Fig. 6.

Zu Fall 3. (♂, 18³/₄ J.)

Fig. 8.

Fig. 9.

Zu Fall 4. (♀, 12 J.)

Fig. 10.

Fig. 11.

Fig. 12.

Fig. 13.

Zu Fall 4. (♀, 12 J.)

Fig. 14.

Fig. 15.

Fig. 16.

Zu Fall 5. (♂, 19 J.)

Fig. 17.

Fig. 18.

Fig. 19.

Fig. 20.

LOOSER.

Fig. 21.

Fig. 22.

Fig. 23.

Fig. 24.

Fig. 25.

Fig. 26.

Fig. 27.

Fig. 28.

Fig. 29.

Fig. 30.

Zu Fall 7. (♀, 17½ J.)

Fig. 32.

Fig. 33.

Fig. 34.

Fig. 31.

Fig. 35.

Fig. 37.

Fig. 38.

Fig. 36.

Zu Fall 9. (♂, 19³/₄ J.)

Fig. 39.

Fig. 40.

Zu Fall 10. (♀, 18 J.)

Tafel XIV.

Fig. 41.

Fig. 42.

Fig. 43.

Zu Fall 10. (♀. 18 J.)

Fig. 44.

Fig. 45.
LOOSER.

Fig. 46.

Fig. 49.

Fig. 50.

Fig. 47.

Fig. 48.

Fig. 51.

Fig. 52

Fig. 53.

Fig. 54.

Fig. 55.

Fig. 56.

Zu Fall 13. (♂, 14 J.)

Fig. 57.

Fig. 58.

Fig. 59.

Zu Fall 14. (σ , 16 $\frac{1}{2}$ J.)

Fig. 60.

Fig. 61.

Fig. 62.

Fig. 63.

Fig. 64.

Zu Fall 15. (♀, 20 J.)

Fig. 65.

Zu Fall 15. (♀, 20 J.)

Fig. 66.

Fig. 67.

Zu Fall 15. (♀, 20 J.)

Fig. 68.

Fig. 69.

Zu Fall 15. (♀, 20 J.)

Fig. 70.

Fig. 72.

Fig. 71.

Verlag von F. C. W. Vogel, Leipzig.

Zu Fall 16. (♀, 29 J.).

Fig. 73.

Fig. 74 (1915).

Fig. 75 (1917).

Fig. 76 (1915).

Fig. 77 (1917).

Fig. 80 (1917).

Fig. 79 (1914).

Fig. 78 (1913).

Zu Fall 17. (♀, 26 J.)

Fig. 81.

Fig. 82.

Zu Fall 19. (♀, 36 J.)

Fig. 83.

Zu Fall 23. (♀, 42 J.)

Fig. 84 (Jan. 1915).

Fig. 85 (Dez. 1917).

Zu Fall 23. (♀, 42 J.)

Fig. 86 (Jan. 1915).

Fig. 87 (Dez. 1917).