zen in der Unterbauchgegend mit Meteorismus vorkommen, die zur Fehldiagnose einer Appendicitis, Darmatonie, Darm spasmen, Nierenkolik usw. führen können. Wenige Massagen der Prostata beseitigen das wochen- und monatelange Leiden. Die Erscheinungen kommen durch Tonusschwankungen in den vegetativ innervierten Organen zustande und werden offenbar von der bei Prostatitis hypertonen Blase aus reflektorisch ausgelöst. Beziehungen zwischen Blase und Blutdruck sowie Magentonus sind ja bekannt.

R. KOLISCH: Balantidium coli als Krankheitserreger. Bei einem an Typhus verstorbenen Soldaten wurden siebähnliche Defekte der Darmschleimhaut und mit Balantidien vollgepfropfte Lymph- und Blutgefäße in der Submucosa gefunden. Bei einer 50 jährigen Dame mit ein Jahr lang anhaltenden Diarrhöen, Koliken und irregulärem Fieber sowie Milzschwellung, die zur Diagnose Malaria verleitet hatte, wurden wegen einer Eosinophilie von 17% unter 10 500 Leukocyten Darmparasiten vermutet und tatsächlich massenhaft Balantidien festgestellt. Große Dosen HCl — es bestand Achylie — und Chinineinläufe brachten Heilung. Die enzystierten Formen des Balantidium waren hartnäckiger als die freien. Auch Emetin und Papaverin sind zweckmäßige Heilmittel.

Aussprache: R. PALTAUF sowie A. LUGER haben bei Protozoenerkrankungen des Darmes keine Eosinophilie gefunden. P. SAXL hat bei Balantidienenteritis auch kein Fieber beobachtet. Wichtigkeit des rektoskopischen Befundes, der Geschwüre mit unterminierten Rändern ohne Ödem der Mucosa zeigt.

J. HALBAN: Zur Therapie der ovariellen Ausfallserscheinungen. Bei ovariellen Ausfallserscheinungen handelt es sich um eine Übererregbarkeit des Sympathicus. Organtherapie versagt. Dagegen bewähren sich einerseits Kalk, andererseits Theobromin und seine Derivate sowie Nitroglycerin, welche die Gefäße dauernd dilatieren und offenbar vor plötzlichen Erschlaffungen bewahren. Am zweckmäßigsten ist eine auf H.s Veranlassung hergestellte Theobromin Calcium lacticum-Verbindung in Tablettenform.

J. BAUER.

Gesellschaft für innere Medizin und Kinderheilkunde (Pädiatrische Sektion) Wien.

Sitzung vom 9. Februar 1922.

H. S. DIAMANTOPOULOS: Gliom und Status hypoplasticus. 13 Jahre alter Knabe mit unterentwickeltem Genitale, Hirndruckerscheinungen und Polyurie. Obduktionsbefund: Gliom, das Corpora mammaria und Tuber cinereum vollständig ersetzt. Hypoplasie des lymphadenoiden Gewebes. Atrophie des Schilddrüsen- und Hodenparenchyms. Die schon hypoplastisch angelegten Keimdrüsen werden im weiteren Wachstum gehemmt durch die durch den Tumor erfolgte Schädigung von Centren in der Regio hypothalamica. Hierauf — nicht auf eine gestörte Funktion der Hypophyse — könnte vielleicht die Polyurie und die geringe Störung des Längenwachstums zurückgeführt werden.

H. W. KÖNIG: 1. 5 Monate altes Kind mit Mikrostoma auf traumatischer (?) Basis. Vor 3 Monaten Stomatitis aphthosa oder Soor? Durch unzuverlässige Behandlung, Wegwischen der Beläge mit körnigem Zucker, ist das Lippenrot und ein Teil der Mund-

schleimhaut zerstört, der Alveolarfortsatz fehlt. Die Schneidezähne sind ausgefallen, die Backenzähne durch Retraction der Gingiva sichtbar (normal im 14. Monat durchbrechend). Jetzt hochgradige Schrumpfung der Mundöffnung. — 2. Bericht über eine **Bandwurmkur**, bei der eine ausgewachsene Taenia solium, daneben 10 Köpfe mit kurzem Anhang abgingen. Vielleicht werden auf die Invasion des ersten Wurmes hin vom Wirtsorganismus Gegenkörper gebildet, welche die Weiterentwicklung der später eingebrachten Würmer hemmen.

Aussprache: H. SVOBODA.

H. H. WIMBERGER: 1. Röntgenbild eines angeborenen beiderseitigen Tibiadefektes mit vikariierendem Eintreten der Fibula. — 2. Röntgenbild einer Mediastinalhernie bei Bronchostenose.

H. K. KASSOWITZ: Passagäre lymphoide Reaktion (Myeloblastämie) nach Staphylokokkenangina mit subfebrilem Verlauf. 12 000 Leukocyten, 34% Myeloblasten. Nach 10 Tagen Heilung mit normalem Blutbild.

Aussprache: H. LEHDORFF: Der Fall läßt vielleicht auch die Deutung einer Angina mit lymphatischer Reaktion zu. Hier kommen bis zu 50% Lymphocyten vor, meist große Zellen mit stark basophilem Protoplasma.

H. K. KASSOWITZ bespricht an 2 Fällen die Differentialdiagnose zwischen der diphtheroiden Form des Ohrekzems und der ekzematoiden Form der Ohrdiphtherie des Säuglings.

Aussprache: H. KNÖPFELMACHER, H. SCHICK.

Sitzung vom 23. Februar 1922.

RICHARD WAGNER: Therapeutischer Versuch mit Röntgentiefenbestrahlung der Milz bei zwei Fällen von akuter diffuser Glomerulonephritis. Es handelt sich nur um die Behandlung der Hämaturie als eines der akuten Erscheinungen der Nephritis lange Zeit überdauernden Restsymptoms. 12 jähriges Mädchen, 8 jähriger Knabe; beide mit positiver Tuberkulinreaktion. Anamnestic eine Purpura bzw. eine Angina. Starke Hämaturie, vor der Behandlung ganz stationär. Verschiedene therapeutische Maßnahmen ohne Erfolg. Nach der Bestrahlung ging der Blutgehalt des Harns binnen wenigen Tagen stark zurück und verschwand in einigen Wochen ganz.

Aussprache: K. HITZENBERGER berichtet über den gleichen Erfolg der Bestrahlung bei einem Erwachsenen mit 5 Monate alter Nephritis haemorrhagica. Vor der Behandlung gab der Harn 1 : 10 000 verdünnt positive Guajakreaktion, am 1. Tag nach der Behandlung 1 : 1000, am 4. Tag 1 : 160. Technik der Bestrahlung. Theorie nach R. STEPHAN, Frankfurt: Durch die Röntgenwirkung auf das retikuloendotheliale System der Milz wird die Blutgerinnungszeit herabgesetzt, die Gerinnbarkeit erhöht.

ISA JOHN: 1. Demonstration: Lebercystadenom bei einem Säugling. Ernährungszustand und Allgemeinbefinden auffallend gut. 8 Millionen Erythrocyten. Exitus an Masernpneumonie. Obduktionsbefund: Der ganze rechte Leberlappen ist von einem vielkammerigen Kystom substituiert. Linker Lappen unverändert. Gewicht der Leber 2750 g, Körpergewicht 9660 g. Die übrigen Organe ohne Besonderheit. — 2. **Rheumatismus nodosus** bei einem 8 jährigen Knaben. Vor 1 Jahr Gelenkrheumatismus, Endokarditis und Chorea; jetzt Chorearecidiv.

Aussprache: R. LÖWY, ZAPPERT.

HELMREICH.

DIAGNOSTISCHE UND THERAPEUTISCHE NOTIZEN.

ZUR TECHNIK DER PARENTERALEN CHININTHERAPIE.

Von

Dr. E. FRIEDBERG.

Chin. muriat. wird in 10proz. Lösung intramuskulär (Glutealmuskulatur) injiziert, die schlechte Löslichkeit des Chininsalzes durch Urethanzusatz gebessert. Das Rezept der zu benutzenden Lösung ist demnach (CAHN-BRONNER): Chin. muriat. 1,0; Urethan 0,5; Aquae dest. 10,0. Konzentriertere Lösungen sind wegen Nekrosegefahr zu vermeiden. Aber auch die obengenannte Lösung muß vor der Injektion ausgiebig erwärmt werden, schon ein geringer Niederschlag von Chininkristallen ist nach eigenen Versuchen geeignet, infolge Berührung der Gewebe mit konzentrierterem Chinin Nekrosen hervorzurufen. Ein derartiges schädliches Ausfallen von Chininkristallen habe ich verschiedentlich nach Durchspritzen der zur Injektion benutzten Rekordspritze mit Alkohol oder Äther in der Spritze selbst beobachtet. Hier genügt also die durch diese Desinfizienten bedingte Abkühlung der Rekordspritze zum teilweisen Ausfall der Lösung. Würde dagegen erwärmter Alkohol benutzt, blieb das Chininsalz vollkommen in Lösung. Seitdem wir

in der Freiburger Universitätskinderklinik sorgfältig darauf bedacht waren, nur eine ausgiebig erwärmte Lösung in erwärmter Rekordspritze zu injizieren, hatten wir unter 712 intramuskulären Injektionen keine einzige Chininnekrose. Ich glaube, daß die in der Literatur erwähnten Chininnekrosen, welche die parenterale Chinintherapie diskreditiert haben, zum großen Teil auf eine Verwendung von konzentrierteren Lösungen oder auf ein Ausfallen der verdünnten Chininlösung durch Abkühlung in der Rekordspritze zu beziehen sind. Die Dosierung im Kindesalter bei der Behandlung der Bronchopneumonien war folgende: Von 0—1. Jahr 1—1,5 ccm der obengenannten Lösung; von 2.—5. Jahr 1,5—2,5 ccm, von 6.—13. Jahr 2,5—4 ccm. Die Einspritzungen wurden nicht häufiger als täglich einmal vorgenommen, ihre Anzahl schwankte im allgemeinen zwischen 1—4 Injektionen. Über die mit dieser Methodik bei der kindlichen Bronchopneumonie gemachten Erfahrungen, namentlich über die notwendige scharfe Indikationsstellung, habe ich vor kurzem auf der 24. Versammlung südwestdeutscher Kinderärzte, Frankfurt a. M. (Arch. f. Kinderheilk. 70. 1922) berichtet. [Universitäts-Kinderklinik, Freiburg, Br. Direktor: Prof. Noeggerath.]