Konservierungsmittel.

E. H. Jenkins, W. L. Mitchell und A. W. Ogden: Chemische Konservierungsmittel. — 23. Jahresbericht der Connecticut Agric. Experim. Stat. 1899; New-Haven Conn. 1900, 139—152.

Die neueren Konservierungsmittel wie Borax, Borsäure, Formaldehyd, Salicylsäure, Benzoëssäure u. A., deren Anwendung in Amerika ausserordentlich gewachsen ist, unterscheiden sich von den älteren (Salz, Alkohol, Essig etc.) durch ihre Geschmackslosigkeit und ermöglichen es dem Einzelnen nicht zu unterscheiden, ob ein Konservierungsmittel vorliegt oder nicht. Gefährlich können die den Nahrungsmitteln zugesetzten Konservierungsmittel den Kranken und Genesenden werden, deren Körper naturgemäss weniger widerstandsfähig ist, und die daher auf frische Kost angewiesen sind. Verff. verlangen daher, dass durch das Gesetz alle Konservierungsmittel, die durch den Geschmack als solche nicht sofort zu erkennen sind, als Zusatz zu den Nahrungsmitteln verboten werden oder wenigstens der Zwang der Deklaration auch in Bezug auf die Menge der zugesetzten Substanzen auferlegt wird, wie es auch in England von berufener Seite gefordert wird. Da es von Wichtigkeit schien über die im amerikanischen Handel befindlichen Konservierungsmittel eine Uebersicht zu gewinnen, kauften Verff. zahlreiche Proben an und untersuchten sie qualitativ und, wenn möglich, quantitativ. Sie geben zugleich die vom Hersteller beigefügten Gebrauchsanweisungen und sonstigen Anpreisungen der Mittel bekannt.

Die Zusätze für Milch und Sahne (Freezine, Iceline etc.) bestehen aus Formaldehyd, Borax, Borsäure und Bikarbonat unter den abendteuerlichsten Namen.

Zur Konservierung von Citronensaft werden Salicylsäure für sich oder in Mischungen mit Borsäure angepriesen, auch β -Naphthol, Benzoëssäure und Natriumbenzoat. Ähnliche Mittel, ausserdem noch Bisulfit und Natriumsulfat werden für Bier und Wein angezeigt. Für Fleisch werden Gemische von Kochsalz, Borax, Borsäure, Kaliumsulfat, Natriumsulfit, Bikarbonat empfohlen, z. B. enthielt Maas und Waldstein's Präservesalz 29,05 — 33,16 % Borsäure und 7,26 — 7,59 % Chlor = 10,25 % Kochsalz. Eine Probe „Rex Magnus“ Präservesalz-Paste für Wurst bestand aus 2 % Natriumsulfat, 6,55 % Natriumsulfit, 21,03 % Natriumbikarbonat, 40,06 % Kochsalz und einem Rest von 30,36 %, welcher hauptsächlich aus Wasser bestand. Wenn die Gebrauchsanweisungen befolgt werden, so schwanken die einem Quart zugesetzten Mengen von Formaldehyd von 0,1—0,5 g oder von 0,47—3,6 g Borsäure; Sahne kann 0,94—5,0 g enthalten. Wenn Citronensaft nach den Gebrauchsanweisungen haltbar gemacht wird, können in ihm 0,36—0,9 g Salicylsäure oder 0,19—0,38 g Borax oder 0,6—0,7 g Natriumbenzoat gefunden werden. Bier kann im halben Liter 0,015 g Salicylsäure oder 0,15 g schweflige Säure enthalten.

A. Juckenack.

Rudolf Abel: Zum Kampfe gegen die Konservierung von Nahrungsmitteln durch Antiseptika. — Hyg. Rundschau 1901, 11, 265—281.

Von Konservierungsmitteln werden hauptsächlich Borsäure, Salicylsäure und schweflige Säure verwendet. Gegen die Verwendung dieser Stoffe muss die Hygiene Front machen, da sie gesundheitlich nicht unbedenklich sind und da die Gefahr besteht, dass bei Benutzung antiseptischer Stoffe die Nahrungsmittelfabrikanten es an der nöthigen Sorgfalt und Reinlichkeit fehlen lassen. Bestrafung aus §§ 12—14 des Nahrungsmittelgesetzes tritt nur dann ein, wenn ein Nahrungsmittel durch den Zusatz eines Konser-

virungsmittel thatsächlich geeignet ist, die menschliche Gesundheit zu schädigen. Eine vom Verf. bewirkte Zusammenstellung der über diesen Punkt vorliegenden Litteratur lehrt, dass die Untersuchungen über die gesundheitliche Wirkung der Konservierungsmittel häufig zu widersprechenden Ergebnissen geführt haben. Auf folgenden Wegen können neue Erfahrungen auf diesem Gebiete gesammelt werden: 1. durch Beobachtung von Erkrankungen nach dem Genuss konservirter Nahrungsmittel; dieser Weg ist schwer begehbar, da die Beobachtungen selten einwandfrei sind, die Schädigungen häufig chronisch verlaufen und die Menge der verzehrten Konservierungsmittel meist nicht sicher festgestellt werden kann. 2. Durch Beobachtung der Wirkung der Antiseptika bei therapeutischer Verwendung; hier handelt es sich indessen um kranke Menschen und stärkere Konzentrationen, als sie bei konservirten Nahrungsmitteln vorkommen. 3. Durch Thierversuche; die hierbei gewonnenen Ergebnisse können nicht ohne weiteres auf den Menschen übertragen werden. 4. Durch Versuche an gesunden Menschen; diese sind allein einwandfrei. — Zur einheitlichen Beurtheilung der mit Konservierungsmitteln versetzten Nahrungsmittel im ganzen Reich empfiehlt der Verf. den Erlass einer Kaiserlichen Verordnung auf Grund des § 5 des Nahrungsmittelgesetzes; Polizeiverordnungen für einzelne Bezirke sind nicht durchgreifend genug und erhöhen noch die Verwirrung. Für einzelne Nahrungsmittel, für die der Zusatz eines Konservierungsmittels sich als absolut nothwendig erweisen sollte, könnten bestimmte Mengen unter Deklaration zugelassen werden.

K. Windisch.

E. Rost: Ueber den Einfluss des Natronsalpeters auf den Stoffwechsel des Hundes. — Arb. Kaiserl. Gesundh.-Amt 1901, 18, 78—99.

Verf. unternahm es, an Hunden im Stickstoff-Gleichgewicht den Einfluss des Salpeters auf den Stoffwechsel in drei, sich über einen längeren Zeitraum erstreckenden Versuchsreihen festzustellen und zwar 1. bei Anwendung kleiner Gaben, 2. bei mittleren und grossen Gaben ohne gesteigerte Wasserzufuhr und 3. bei denselben Mengen, aber mit gleichzeitiger Deckung des durch die Harnausscheidung mehr ausgeführten Wassers. Die eingeführte Nahrung bestand aus fett- und sehnentfreiem Pferdefleisch, das stets analysirt wurde. Die Ergebnisse der drei Versuche am Hunde waren folgende: 1. Weder kleine noch grosse Mengen Natronsalpeter liessen einen Einfluss auf die Fresslust, das Wohlbefinden, Körpergewicht und die Kothentleerungen erkennen. 2. Kleine Gaben, die keine Harnausscheidung erzeugten, beeinflussten den Stoffwechsel nicht. 3. Bei grösseren Gaben von Salpeter, die eine lebhafte Harnausscheidung hervorriefen, liess sich bei geeigneter Versuchsanordnung (Darreichung von Wasser) eine unmittlbare Wirkung auf den Stoffwechsel, bestehend in einer Stickstoff-Sparung nachweisen. Wenn dem Hunde dagegen mit der Nahrung nicht genügend Wasser zur Ausscheidung des Salpeters gegeben wurde, so wurde die Salpeterwirkung durch die Salzwirkung (Wasserentziehung) verdeckt, die in einer Steigerung des Eiweisszerfalls bestand. Diese war in Wirklichkeit grösser, als der Versuch ergeben hatte; sie wurde durch die eigentliche Salpeterwirkung herabgedrückt. 4. Der Satz, dass eine Harnausscheidung in Folge von vermehrter Zufuhr von Wasser bei sonst gleichbleibenden Bedingungen den Eiweissumsatz nicht ändert, wohl aber, wenn der Körper vorher entwässert worden war, gilt auch, wenn gleichzeitig Salpeter gegeben oder die Wasserverarmung durch Salpeter erzielt wird. Schliesslich bespricht Verf. noch die mit anderen Salzen bezüglich ihrer Wirkung auf den Stoffwechsel bisher gemachten Be-

obachtungen und vergleicht hiermit die durch vorliegende Arbeit festgestellte Einwirkung des Salpeters.

Max Müller.

Lebbin und Kallmann: Ueber die Zulässigkeit schwefligsaurer Salze in Nahrungsmitteln. — Zeitschr. öffentl. Chem. 1901, 7, 324—334.

Die Verf. fütterten 2 Hunde längere Zeit hindurch (60 Tage) mit Hackfleisch, dem 0,2% neutrales Natriumsulfit zugesetzt war. Eine schädliche Einwirkung auf den Körper konnte nach der Tödtung der Thiere nicht nachgewiesen werden. Ausserdem erhielt eine Versuchsperson während 6 Tage ausschliesslich Schabefleisch, dem in den ersten 3 Tagen 1 g, später 2 g neutrales Natriumsulfit auf 1 kg Fleisch zugesetzt war. Eine nachtheilige Beeinflussung der Fleischausnutzung durch den Sulfitzusatz konnte nicht festgestellt werden, dieser ist daher nach Ansicht der Verfasser als gesundheitsschädlich nicht anzusehen. Um nun über die Wirkung des schwefligsauren Natriums auf die Magenschleimhaut Aufschluss zu erhalten, wurden weitere Versuche mit Kaninchen angestellt, denen reine Salzlösungen mittelst Schlundsonde in den Magen gebracht wurden. Es erhielt auf diese Weise während einiger Tage ein Thier eine 25%-ige, ein anderes eine 40%-ige Lösung neutralen Natriumsulfits. Wie sich nach der Tödtung der Thiere ergab, hatten die Lösungen keinerlei Schädigung der Organe hervorgerufen. Darauf bekamen 2 Kaninchen eine 25%-ige Kochsalzlösung, 2 andere 5 bzw. 2 g saures Natriumsulfit in 50 bzw. 20 g Wasser, sämtliche Thiere gingen an der Wirkung der Salzlösungen (Aetzwirkung) bald darauf ein. Auf Grund der Versuche sind die Verfasser der Meinung, dass die Lehre von der Giftigkeit der neutralen Salze auf Missverständniss und falsche Schlussfolgerungen zurückzuführen sei und endlich aus der Toxikologie der Nahrungsmittel verschwinden müsse.

Max Müller.

J. Kister: Ueber Gesundheitsschädlichkeit der Borsäure als Konservierungsmittel für Nahrungsmittel. — Zeitschr. Hygiene 1901, 37, 225 bis 240.

Verf. bespricht zunächst die weit auseinander gehenden Urtheile einer grossen Anzahl Forscher über die Zulässigkeit der Borsäure als Konservierungsmittel für Nahrungsmittel und theilt darauf die Ergebnisse seiner eigenen an Menschen und Thieren (Hühner, Hunde, Kaninchen, Meerschweinchen, Katzen) ausgeführten Versuche über die Schädlichkeit der Borsäure mit. Nach Genuss von 3 g Borsäure täglich wurden bei 3 gesunden erwachsenen Leuten bereits nach kurzer Zeit Gesundheitsstörungen beobachtet und zwar trat bei 2 Personen schon am 4. bzw. 10. Tage Eiweiss im Urin auf, das bei Unterbrechung des Versuches nach 2 Tagen wiederum verschwand, während bei der dritten Versuchsperson kurz nach einer einmaligen Gabe sich Durchfall und Brechreiz einstellte. Selbst Mengen von 1 g täglich blieben bei 4 gesunden Menschen nicht ohne Wirkung, vielmehr traten Störungen im Wohlbefinden (Erbrechen, Unwohlsein, Durchfall) auf; Eiweiss im Urin war jedoch an keinem Tage nachweisbar. Auch der Ausfall der Thierversuche zeigte, dass es nicht angängig ist, die Borsäure als unschädlich zu bezeichnen. Wenn auch zuzugeben sei, dass vielleicht zahlreiche Personen grosse Mengen Borsäure ohne sichtbare Schädigungen vertragen können, so dürfe dies doch nicht für die Harmlosigkeit der Borsäure geltend gemacht werden, sobald nachweislich bei anderen Personen schon geringere Mengen Störungen herbeiführen. Da nun augenblicklich allen möglichen dem Verderben ausgesetzten Nahrungsmitteln chemische Konservierungsmittel zugesetzt werden, wir demnach gar

nicht wissen können, wie grosse Mengen der verschiedensten Konservierungsmittel wir täglich mit unserer Nahrung verzehren, so hält Verf. mit Rücksicht auf die von ihm nachgewiesene thatsächliche Gesundheitsschädlichkeit der Borsäure einen Erlass von gesetzlichen Bestimmungen für nothwendig, durch welche ein Verbot des Zusatzes von Borsäure und ähnlichen chemischen Konservierungsmitteln zu unseren Nahrungsmitteln ausgesprochen wird.

Max Müller.

E. H. Jenkins und A. W. Ogden: Nachweis von Borsäure und Boraten in Nahrungsmitteln mit Curcuma-Papier. — 23. Jahresbericht der Connecticut Agric. Experim. Stat. 1899; New Haven Conn. 1900, 153—156.

Der Nachweis von Borsäure und Boraten mittelst Curcuma-Papier ist ein schärferer als derjenige mittelst Flammenfärbung; nur ist es nach Versuchen der Verff. empfehlenswerth, den Lösungen zwecks Nachweises der Borsäure Salzsäure hinzuzusetzen und nachher das Curcuma-Papier mit Ammoniak zu befeuchten. Die Menge der zuzusetzenden 32 0/0-igen Salzsäure betrage ungefähr ein Dreissigstel der zu prüfenden Flüssigkeit. Auf diese Weise ist es möglich, noch 1 Theil Borsäure in 10000 Theilen Wasser mit Sicherheit zu erkennen.

A. Suckenack.

F. W. Tunncliffe und O. Rosenheim: Ueber den Einfluss von Formaldehyd in der Nahrung auf den Stoffwechsel von Kindern. — Centralbl. f. Physiol. 1901, 25, 33—34.

In Anbetracht der wachsenden Verwendung, die der Formaldehyd bezw. das käufliche 40 0/0-ige „Formalin“ in letzter Zeit zur Konservierung von Nahrungsmitteln (besonders der Milch) gefunden hat, stellten Verff., um die Wirkung obengenannter Erzeugnisse auf den menschlichen Körper zu prüfen, Stoffwechselversuche an Kindern im Alter von 3—5 Jahren an, von denen das eine erst seit kurzem von einer Lungenentzündung genesen und noch schwächlich war. Die erzielten Ergebnisse sind folgende: 1. Formaldehyd in Mengen von 1:5000 in der Milch oder 1:9000 in der Gesamtnahrung hat keinen nachweisbaren Einfluss auf den Stickstoff-, Phosphor- oder Fettumsatz bei gesunden Kindern. 2. Formaldehyd in der obigen Menge hatte einen messbar verringerten Einfluss auf den Stickstoff-, Phosphor- und Fettumsatz bei einem schwächlichen Kinde. 3. Bei dem schwächlichen Kinde nahm während des Formaldehydzusatzes in der Nahrung die Harn- und Kothmenge zu. 4. In allen Fällen war der Lecithingehalt des Kothes unter dem Einfluss des Formaldehyds verringert. 5. In keinem Falle übte Formaldehyd eine antiseptische Wirkung auf die Darmfäulnis aus. 6. In keinem Falle war der geringste Einfluss auf das allgemeine Wohlbefinden der Kinder zu bemerken.

Max Müller.

Z. Peska: Zur Formaldehyd-Bestimmung. — Chem.-Ztg. 1901, 25, 743.

Das Verfahren der Titration mit Ammoniak, welches auf der Bildung von Hexamethylentetramin beruht, ist nicht ganz genau und verlässlich, weil das Hexamethylentetramin nicht völlig neutral reagiert und sich leicht mit freier Säure zersetzt. Bei der Anwendung von Lackmus als Indikator darf nur soweit titriert werden, dass die blaue Lackmusfarbe eben verschwindet und die Flüssigkeit doch keine ausgesprochene sogenannte neutrale Färbung hat. Anspruch auf absolute Genauigkeit hat die Jodmethode, bei welcher der Formaldehyd in alkalischer Lösung mit überschüssigem Jod zu Ameisensäure oxydiert wird, wenn keine fremden Stoffe, wie Aethylalkohol, Aceton oder Acetaldehyd vorhanden sind, welche durch Jodoformbildung erkannt werden. Verf. em-

pfeht das Verfahren in folgender Ausführung: 5 g Formaldehyd werden auf 500 ccm verdünnt. Von der Lösung werden 5 ccm in einem Stöpselglase mit 20 ccm $\frac{1}{10}$ N.-Jodlösung und 5 ccm Normallauge versetzt und 15 Minuten stehen gelassen. Dann setzt man 5 ccm N.-Säure zu und titriert mit $\frac{1}{10}$ N.-Thiosulfatlösung zurück. 1 ccm $\frac{1}{10}$ N.-Jodlösung entspricht 0,0015 g Formaldehyd.

G. Sonntag.

Oskar Blank und Hermann Finkenbeiner: Zur Formaldehyd-Bestimmung. — Chem.-Ztg. 1901, 25, 794.

Die Verf. bestätigen die Beobachtung Peska's (vergl. das vorstehende Referat) bezüglich der Jodmethode. Die von ihnen erzielten Ergebnisse der Ammoniak-Methode waren 1 bis 2% niedriger. Dagegen hat die von den Verf. ausgearbeitete Wasserstoffsuperoxyd-Methode (Diese Zeitschr. 1900, 3, 583) die beste Uebereinstimmung mit der Jodmethode gezeigt.

G. Sonntag.

Patente.

Emile Besse und Louis Lubin in Paris: Füll- und Verschlussverfahren, sowie Vorrichtung für Behälter zum Aufbewahren von Dauerspeisen u. dergl. D.R.P. 118838 vom 29. April 1900. — Patentbl. 1901, 22, 657.

Bisher wurden die Behälter zum Aufbewahren von Dauerspeisen, nachdem sie mit letzteren gefüllt waren, in der Weise verschlossen, dass man einen aufgesetzten Deckel auf seinem ganzen Umfange festlöthete, was wegen des dabei sich im Innern des Gefässes entwickelnden Dampfes mit verschiedenen Nachtheilen verbunden war. Zweck des neuen Verfahrens ist nun, diese Uebelstände zu vermeiden und zwar besteht dasselbe einfach darin, dass man die zu füllenden Behälter unter Belassung einer kleinen Oeffnung im Deckel vollständig schliesst und sie hierauf in ein die einzufüllende Speiseflüssigkeit enthaltendes, mit Deckel versehenes Gefäss so einsetzt, dass sie vollständig von der Flüssigkeit umgeben sind. — Saugt man nun aus dem zuletzt genannten Gefäss die Luft ab und lässt dieselbe plötzlich wieder zuströmen, so füllen sich durch die kleine Oeffnung die Behälter in Folge des Luftdrucks mit der Speise an, worauf sie aus dem Gefäss herausgehoben und durch Löthen völlig verschlossen worden.

Sollen feste Speisen, wie Fleisch, Gemüse oder dergl. eingefüllt werden, so werden diese zunächst bei geöffnetem Deckel, von der zugehörigen Flüssigkeit getrennt, eingefüllt, worauf nach Schliessen des Deckels die zugehörige Flüssigkeit in der oben beschriebenen Weise nachgefüllt wird.

Paul H. A. Leder in Baltimore, Maryland, V. St. A.: Verfahren zur Herstellung von Verschlüssen für Nahrungsmittel oder Getränke enthaltende Gefässe. D.R.P. 120049 vom 4. Oktober 1899. — Patentbl. 1901, 22, 829.

Die Herstellung der Gefässverschlüsse wird nach verschiedenen Methoden ausgeführt. Entweder behandelt man Asbestfaser mit Celluloselösung oder mit Cellulose- und Paraffinlösung vor oder nach dem Pressen bezw. Formen, oder man stellt erst eine Asbestpappe durch Aufeinanderpressen von mehreren Lagen Asbestpapier her, welche dann wie vorher imprägnirt wird. Schliesslich kann man auch mit Cellulose- und Paraffinlösung getränktes Asbestpapier zwischen nicht präparirte Asbestblätter legen und die so zusammengesetzte Pappe vor oder nach dem Pressen und Formen mit Cellulose- und Paraffinlösung behandeln.

Erste Würzburger Konserven- und Chokoladenfabrik W. F. Wucherer und Co. in Würzburg: Verfahren zum luftdichten Verschluss von Konservengefässen mittelst durch Kitt gedichteter elastischer Metallkapseln. D.R.P. 121691 vom 23. November 1900. — Patentbl. 1901, 22, 1156.

Kapseln aus dünnem Weichmetall werden durch Füllen und Auslaufenlassen oder durch Bestreichen der Innenseite mit einer dünnen Schicht eines auf etwa 130° erhitzten Harzkittes

versehen. Das Verschliessen der Konservengläser erfolgt in der Weise, dass die bis zum Klebrigwerden des Harzkittes erwärmten Kapseln auf die mit den heiss eingefüllten, oder in den Gläsern erhitzten Konserven fast voll gefüllten Gläser aufgesetzt werden, nachdem der Kapselboden mit einer Scheibe Pergamentpapier, Zinnfolie, Weissblech oder sonst geeignetem Material bedeckt wurde. Ueber die Kapsel wird nach dem Aufsetzen derselben mittelst einer Zange oder einer anderen geeigneten Vorrichtung ein 8–12 mm starker, elastischer Gummiring gestülpt, dessen Innendurchmesser in ungespanntem Zustande kleiner als der äussere Durchmesser der Rille unter dem Glasrand bezw. allgemein kleiner als der Umfang des Gefässes ist, gegen den der Kapselrand gepresst werden soll. — Der zwangsweise ausgedehnte Ring zieht sich im Augenblick des Ueberstülpens gleichmässig kräftig zusammen und presst augenblicklich den kittbekleideten Kapselrand fest an, indem er so einen schnellen, luftdichten Verschluss sichert. Der Ring bleibt bis zum Erkalten in seiner Lage, während der Kapseldeckel sich infolge der Luftverdünnung im Glasinneren nach innen wölbt, so dass auch die Presstheile oberhalb des Pressringes, insbesondere auch am Glasrande, fest angedrückt werden. — Nach dem Erkalten wird der Gummiring abgestreift. A. Oelker.

Trink- und Gebrauchswasser.

S. Meunier: Ueber den in der Nacht vom 9. auf den 10. März 1901 in Palermo beobachteten Blutregen. — *Compt. rend.* 1901, **132**, 894–896.

In dem Staub, welchen der Blutregen enthielt, fand Verf. neben Sand und kohlen saurem Kalk eisenhaltigen Thon, Chlornatrium, Gyps und organische Substanz. Die mikroskopische Prüfung ergab die Anwesenheit von vorherrschenden Quarzkörnern, ferner Diatomeenreste und Pflanzenfasern. Es handelt sich wohl um Staub aus der Sahara. (Vergl. auch diese Zeitschr. 1901, **4**, 844.) G. Sonntag.

W. W. Fisher: Ueber alkalische Wässer aus der Kalkformation. — *Analyst* 1901, **26**, 202–213.

Während in der Regel die aus Kalkformationen entspringenden Wässer in Folge ihres hohen Gehaltes an Kalk und Magnesia als hart bezeichnet werden müssen, zeigen die Brunnenwässer aus dem Kalkstein unter London lediglich Spuren von Kalk und Magnesia, enthalten hingegen eine beträchtliche Menge alkalischer Salze, wie Chlornatrium, Natriumsulfat und -karbonat, und sind in Folge dessen weich und von alkalischer Reaktion. Aehnliches Verhalten zeigen noch die Wässer von verschiedenen anderen Gegenden, so in Berkshire, Essex und in der Nähe von Windsor; einige derselben enthalten noch Spuren freien Ammoniaks bei geringem Salpetersäuregehalt. Ein Tiefbrunnen in Trafalgar Square besitzt in 100 000 Theilen 85,7 Theile Abdampfrückstand; hiervon waren:

Calciumkarbonat (CaCO_3) . . .	4,29 Thle.	Chlornatrium (NaCl)	27,34 Thle.
Magnesiumkarbonat (MgCO_3) . .	3,15 „	Chlorkalium (KCl)	2,16 „
Natriumkarbonat (Na_2CO_3) . . .	18,82 „	Eisenoxyd (+ Phosphorsäure) . .	0,40 „
Natriumsulfat (Na_2SO_4)	28,64 „	Kieselsäure (SiO_2)	1,00 „

Diese Zusammensetzung ist seit 44 Jahren konstant. Die von verschiedenen Seiten zur Erklärung der abnormalen Zusammensetzung dieser Wässer aufgestellte Annahme eines Eindringens von Seewasser weist Verf. aus verschiedenen Gründen zurück. Er sucht die Ursache in der undurchlässigen Thonschicht, welche den Kalkstein in weitem Umfange und in grosser Mächtigkeit bedeckt. Das Wasser, welches diese Thonschicht nicht durchdringen kann, tritt an den Rändern derselben ein und