Rapport Sur L'Herborisation Faite Les 1^{er} Et 2 Juin, De Bastia A Saint-Florent Par Le Mont Pigno, Et De Saint-Florent A Bastia Par Oletta Et Olmetto Di Tuda

M. Billiet

To cite this article: M. Billiet (1877) Rapport Sur L'Herborisation Faite Les 1^{er} Et 2 Juin, De Bastia A Saint-Florent Par Le Mont Pigno, Et De Saint-Florent A Bastia Par Oletta Et Olmetto Di Tuda, Bulletin de la Société Botanique de France, 24:10, lxvii-lxxi, DOI: [10.1080/00378941.1877.10830042](https://doi.org/10.1080/00378941.1877.10830042)

To link to this article: <http://dx.doi.org/10.1080/00378941.1877.10830042>

Published online: 08 Jul 2014.

Submit your article to this journal [↗](#)

Article views: 8

View related articles [↗](#)

siège d'un évêché qui ne fut transporté à Bastia que longtemps après la destruction de Mariana.

Après avoir récolté près de l'auberge : *Pinardia coronaria* Less., *Urtica urens* L., *U. pilulifera* L., *Fumaria officinalis* L., *F. densiflora* DC., et un peu plus loin : *Lavatera punctata* All., *Potentilla divaricata* DC., *Andryala sinuata* L., *Malva silvestris* L., on prend de nouveau le chemin de l'étang, et à travers les terres humides et les champs tourbeux on rencontre :

Ranunculus trilobus Desf.

Silene agrestina Jord.

Avena barbata Brot.

— *fatua* L.

Euphorbia stricta L.

Rumex crispus L.

Trixago viscosa Rehb.

Trifolium panormitanum Presl.

ce dernier s'élevant à plus d'un mètre.

Nous traversons aux bords de l'étang les terrains déjà explorés au début de notre herborisation ; puis nous atteignons des pâturages sablonneux où croissent en abondance :

Psamma arenaria R. et S.

Imperata cylindrica P. B.

Trifolium Cherleri L.

Plantago Berardi All.

— *maritima* L.

— *Coronopus* L.

Scrofularia ramosissima Lois.

Paronychia argentea Lam.

Scleropoa maritima Parl.

Panicum repens L.

Vulpia ligustica Link.

Lagurus ovatus L.

Centaurea sphærocephala L.

Cistus halimifolius L.

Ces deux dernières plantes exercent une véritable séduction sur quelques-uns d'entre nous, surtout le *Cistus halimifolius* aux jolies feuilles blanches, aux fleurs jaune-serin et dont les pétales sont tachés à l'onglet comme ceux de l'*Helianthemum guttatum*. Ce n'est plus une herborisation, c'est un fauchage ; ils en font des bottes énormes, comme s'ils s'étaient donné la mission d'en distribuer à tous les botanistes de l'Europe.

Pendant la nuit vient forcément mettre un terme à nos récoltes : on peut remarquer que déjà sous cette latitude le soleil reste moins longtemps sur l'horizon que dans le nord de la France et que le crépuscule finit plus brusquement. On se hâte de regagner la route où nous attendent les voitures, et il est nuit close quand on rentre à Bastia.

RAPPORT DE M. BILLIET SUR L'HERBORISATION FAITE LES 1^{er} ET 2 JUIN, DE BASTIA A SAINT-FLORENT PAR LE MONT PIGNO, ET DE SAINT-FLORENT A BASTIA PAR OLETTA ET OLMETTO DI TUDA.

L'une des excursions les plus intéressantes que puisse faire le botaniste aux environs de Bastia est certainement l'ascension du mont Pigno.

Une végétation très-variée pousse sur les schistes talqueux qui en for-

ment la masse et promet une abondante récolte; aussi chacun se prépare-t-il de bonne heure pour cette course.

A huit heures du matin, les voitures nous déposent à Cardo, petit village situé au pied même de la montagne.

Nous nous engageons immédiatement dans un sentier qui serpente en lacet sur les premiers contre-forts du Pigno.

Là croissent bon nombre des plantes récoltées le 29, à Erbalunga :

<i>Eufragia latifolia</i> Griseb.	<i>Stachys glutinosa</i> L.
<i>Dianthus velutinus</i> Guss.	<i>Trifolium stellatum</i> L.
<i>Chrysanthemum segetum</i> L.	<i>Hedypnois polymorpha</i> DC.
<i>Campanula Rapunculus</i> L.	<i>Euphorbia pinea</i> L.
<i>Euphorbia Characias</i> L.	<i>Parietaria diffusa</i> Mert. et Koch.
<i>Lavandula Stoechas</i> L.	<i>Briza maxima</i> L.
<i>Lagurus ovatus</i> L.	<i>Anthyllis rubriflora</i> DC.
<i>Cracca varia</i> G. G.	<i>Chrysanthemum Myconis</i> L.
<i>Urospermum Dalechampii</i> Desf.	<i>Campanula Erinus</i> L.
<i>Chlora perfoliata</i> L.	<i>Linaria Pelliceriana</i> DC.

Au bout de peu de temps nous atteignons la région des maquis. Le fond de la végétation y est représenté par :

<i>Arbutus Unedo</i> L.	<i>Erica arborea</i> L.
<i>Pistacia Terebinthus</i> L.	— <i>scoparia</i> L.
— <i>Lentiscus</i> L.	<i>Rosmarinus officinalis</i> L.
<i>Calycotome spinosa</i> Link.	<i>Cistus monspeliensis</i> L.
<i>Cytisus triflorus</i> L'Hér.	— <i>incanus</i> L.
<i>Phillyrea angustifolia</i> L.	— <i>salvifolius</i> L.

Sur ces derniers poussent en abondance : *Cytinus Hypocistis* L., et sa belle variété à écailles rouges.

A une hauteur de 600 à 700 mètres, les maquis disparaissent et sont remplacés par des pacages.

Malheureusement nous voyons en même temps disparaître le soleil; un brouillard intense envahit la montagne et menace de compromettre le succès de notre herborisation.

Autour de nous, nous cueillons :

<i>Allium roseum</i> L.	<i>Cardamine hirsuta</i> L.
<i>Pinardia coronaria</i> Less.	<i>Myosotis radiata</i> L.
<i>Helianthemum aegyptiacum</i> F.	<i>Trifolium ligusticum</i> Balbis.
<i>Scorpias longipetala</i> Pollich.	— <i>stellatum</i> L.
<i>Myosotis hispida</i> Schl.	<i>Bellium bellidioides</i> L.
<i>Geranium dissectum</i> L.	<i>Polygala corsica</i> Bor.
— <i>bohemicum</i> L.	<i>Erythraea maritima</i> Pers.
<i>Cracca varia</i> G. G.	<i>Hypochaeris glabra</i> L.

De charmantes touffes d'*Arenaria balearica* L. et de *Linaria equitri-loba* Dub. tapissent avec le *Selaginella denticulata* Koch la base humide des rochers, dans les anfractuosités desquels nous trouvons :

<i>Saxifraga corsica</i> G. G.	<i>Galium corrudifolium</i> Vill.
— <i>tridactylites</i> L.	<i>Cerastium Boissieri</i> Gren.
<i>Galium vernum</i> Scop.	<i>Sedum brevifolium</i> DC.

Dans les éboulis poussent :

<i>Helichrysum angustifolium</i> DC.	<i>Scrofularia trifoliata</i> L.
<i>Cyclamen repandum</i> Sibth. et Sm.	<i>Seriola ætensis</i> L.
<i>Allium triquetrum</i> L.	<i>Lamium bifidum</i> Cyr.
<i>Aristolochia Pistolochia</i> L.	<i>Rosa Serafini</i> Viv.
<i>Geranium bohemicum</i> L.	<i>Aquilegia dumeticola</i> Jord.
<i>Santolina Chamæcyparissus</i> L.	<i>Sanicula europæa</i> L.
<i>Ranunculus bulbosus</i> L.	<i>Orchis maculata</i> L.
— <i>lanuginosus</i> L.	<i>Polygala corsica</i> Bor.
<i>Arabis hirsuta</i> L.	<i>Geranium purpureum</i> Vill.

Arrivés à la glacière de Bastia (850 mètres), le brouillard est devenu tellement épais, que nous jugeons prudent de nous arrêter pour nous compter. On ne voit pas à vingt pas devant soi.

Ce fâcheux contre-temps, en nous mettant dans l'obligation de ne pas trop nous éloigner du guide, nous prive de la meilleure partie de notre récolte.

Nous continuons notre ascension en récoltant :

<i>Euphorbia spinosa</i> L.	<i>Cardamine Plumieri</i> Vill.
<i>Bunium alpinum</i> W. K.	<i>Helichrysum angustifolium</i> DC.
<i>Viola Bertolonii</i> Salis.	<i>Cachrys lævigata</i> Lam.
<i>Sagina subulata</i> Wimm.	<i>Thymus Herba-Barona</i> Lois.

Enfin, à deux heures, nous arrivons au sommet du Pigno (1440 mètres). Le soleil perce pendant un instant le brouillard et vient éclairer le beau paysage qui se déroule autour de nous.

Les hauts sommets du cap Corse se dressent en face, encadrés à droite par les flots bleus de la Méditerranée, sur laquelle semblent se balancer les îles d'Elbe et de Monte-Cristo. A l'horizon, la côte d'Italie. A gauche, le beau golfe de Saint-Florent s'avance presque jusqu'à nos pieds. Du côté de l'intérieur, de charmantes vallées courent en tous sens jusqu'au pied des monts Grosso et Cinto, dont les cimes neigeuses se dessinent au loin.

Il ne devait pas nous être donné d'admirer longtemps ce beau panorama ; le soleil disparaît presque aussitôt, et nous nous retrouvons enveloppés dans le brouillard. Il nous faut songer à la descente, si nous voulons déjeuner.

Les rochers de la fontaine du Pigno nous permettent de récolter de nouveau :

<i>Arenaria balearica</i> L.	<i>Selaginella denticulata</i> Koch.
<i>Sedum brevifolium</i> DC.	<i>Saxifraga corsica</i> G. G.
<i>Cerastium Soleirolii</i> Duby.	<i>Galium corrudifolium</i> Vill.

Aux environs des bergeries croissent de nombreux pieds de :

Panercium illyricum L.
Serapias lingua L.
 — *longipetala* Pollich.
Polygala corsica Bor.
 — *vulgaris* L.
Zacintha verrucosa Gærtn.

Asphodelus fistulosus L.
Allium triquetrum L.
Hyacinthus fastigiatus L. (1).
Trifolium stellatum L.
Digitalis purpurea L.
Cyclamen repandum L.

Nous rentrons de nouveau dans la région des maquis, où nous retrouvons les mêmes arbrisseaux que le matin. Puis plus bas nous cueillons :

Melissa Melissophyllum L.
Limodorum abortivum Swartz.
Convolvulus cantabrica L.
Orobanche cruenta Bertol.
Boujeanea hirsuta Rehb.

Orchis pyramidalis L.
Specularia falcata A. DC.
Teucrium Marum L.
Ophrys bombyliflora Link.
Stachys glutinosa L.

A quatre heures, nous arrivons au point culminant de la route de Bastia, au col de Tighime (538 mètres), où nous attendent nos voitures et le déjeuner.

Après avoir réparé nos forces et donné à nos estomacs fatigués une satisfaction qu'ils réclamaient depuis plusieurs heures, nous reprenons la route de Saint-Florent, où nous arrivons à sept heures et demie.

M. Valentini, adjoint, faisant fonctions de maire, et M. de Moretti, propriétaire, nous souhaitent la bienvenue.

A défaut d'hôtel, nous trouvons chez les habitants, grâce aux mesures prises par ces messieurs, la plus cordiale hospitalité.

Notre sympathique président, M. Doumet-Adanson, remercie vivement M. Valentini de l'accueil bienveillant que la ville de Saint-Florent veut bien faire à la Société botanique de France ; il ajoute que cette réception hospitalière restera un des meilleurs souvenirs de la session.

Après dîner, quelques renseignements nous sont donnés par M. de Moretti sur le pays et ses environs. Il est ensuite décidé que le retour à Bastia aura lieu par Oletta et Olmetta di Tuda.

Une petite excursion faite le lendemain matin aux environs de Saint-Florent donne peu de résultats au point de vue botanique. Citons cependant :

Euphorbia dendroïdes L.
Erythraea maritima Pers.
 — *Centaurium* Pers.
Serapias cordigera L.
Convolvulus cantabrica L.
Tamarix africana Poir.
Trifolium Molinerii Balb.
Specularia pentagona A. DC.

Aira provincialis Jord.
Linum gallicum L.
Rumex Acetosella L.
Asphodelus fistulosus L.
Silene sericea All.
Campanula Erinus L.
Anthemis maritima L.

(1) M. de Marsilly signale dans son catalogue la tendance que possède cette plante à se couvrir de bulbilles dans l'herbier, lorsque la dessiccation n'a pas été très-énergique. Ce fait n'a rien d'étonnant, car les pieds d'*Hyacinthus* que nous avons récoltés au Pigno avaient déjà toutes leurs feuilles garnies de nombreux bulbilles.

Nous nous dédommageons en visitant la cathédrale de Sainte-Marie, située à un kilomètre de la ville. Cette vieille église, avec quelques ruines de l'évêché, est actuellement tout ce qui reste de l'antique ville du *Nebbio*.

La nouvelle route que nous allons suivre traverse pendant 7 kilomètres un terrain plat formé par les alluvions de l'Aliso, puis elle s'élève graduellement à partir d'Oletta.

A droite et à gauche, de très-gros Oliviers ombragent de fraîches prairies, où nous cueillons :

Echium italicum L.
Acanthus mollis L.
Quercus sessiliflora Sm.

Rumex bucephalophorus L.
Silene pauciflora Salzm.
Quercus Suber L.

et les nombreuses formes du *Quercus Ilex* L.

Partis de Saint-Florent à onze heures, nous arrivons à deux heures et demie sous les beaux ormeaux qui ont donné leur nom au bourg d'Olmetta.

L'un d'eux est remarquable par sa taille (il mesure 3^m,50 à hauteur d'homme) ; mais notre attention est surtout attirée par les brindilles feuillées qui entourent complètement les maitresses branches, dont l'écorce est littéralement cachée sous ce manteau de verdure.

Ce bel arbre est connu dans le pays sous le nom d'Ormeau du roi de Rome. Un habitant nous apprend qu'il a été planté en 1811, année de la naissance du fils de Napoléon I^{er}, par le maréchal Sebastiani, dont le château est à 100 mètres à peine.

D'Olmetta à Bastia, la route, qui est pendant plusieurs kilomètres assise sur le flanc d'un ravin à pic, descend par une pente à peu près uniforme :

La végétation est presque nulle par suite du manque d'eau. Quelques anfractuosités de rochers, moins exposées au soleil, nous permettent de récolter encore :

Stachys glutinosa L.
Tyrimnus leucographus Cass.
Silene pauciflora Salzm.
Phagnalon saxatile Cass.
— *sordidum* DC.
Bonjeanea hirsuta Rchb.

Teucrium Marum L.
Plantago Bellardi All.
Rumex bucephalophorus L.
Notochlaena Marantæ R. Br.
Anthyllis rubriflora DC.

puis, après avoir admiré en passant une belle plantation de Cédraiers, nous rejoignons à Biguglia la route de Corte, et une heure après nous rentrons à Bastia.

Notre récolte botanique s'était vivement ressentie de l'inclémence du temps, mais la vue du pays pittoresque que nous venions de traverser avait adouci un peu notre amertume, et c'est avec l'espoir de nous rattraper bientôt que nous regagnons nos logements respectifs.