Beobachtungen von Sonnenflecken 1851 und der totalen Mondfinsterniss 1852 Januar 6 auf der Berner Sternwarte.

Hier einige Mittheilungen für die Astronomischen Nachrichten.

1) Auch im Jahre 1851 verfolgte ich regelmässig die Beschaffenheit der Sonnenoberfläche, und zwar fand ich für

	Beobachtungstage.	Mittl. Fleckenstand.
Januar	16	9
Februar	21	10
März	28	7
April	27	6
Mai	28	7
Juni	28	6
Juli	25	3
August	31	6
September	19	7
October	22	6
November	19	6
December	22	7
	286	80

wo ich (wie bei der in Nr. 756 der Astron. Nachrichten aufgenommenen Notiz über meine Sonnenflecken-Beobachtungen in den Jahren 1849 und 1850) unter mittlern Fleckenstand die Zahl verstehe, die hervorgeht, wenn ich für jeden hellen Beobachtungstag die Anzahl der Gruppen und $\frac{1}{16}$ der Anzahl der Flecken in Rechnung bringe und durch die Anzahl der Tage dividire. Es hat somit auch in diesem Jahre, obschon die Sonne nie ganz fleckenfrei erschien, eine Abnahme des Fleckenstandes stattgehabt, obschon eine schwächere, als die *Schwabe'sche* Periode erwarten liess. Für das Detail der Beobachtungen verweise ich auf das nächste Heft der Mittheilungen der naturforschenden Gesellschaft in Bern.

2) Zu weiterem Studium des veränderlichen Fleckenstandes stellte ich meine Beobachtungen der drei Jahre 1849, 1850 und 1851 graphisch dar, die Anzahl der verflossenen Tage als Abscisse, den relativen Fleckenstand als Ordinate auftragend. Die so erhaltenen Punkte bestimmten mir eine auf- und absteigende Linie, die man sich in (den Lichtcurven der Veränderlichen analoge) Wellenlinien abgetheilt, denken kann,

deren Länge etwa zwischen 20 und 30 schwankt, und deren Höhe in einem directen Verhältniss zur Länge zu stehen scheint. Einige der am schönsten ausgebildeten Wellen stimmen in ihrer Länge ziemlich genau mit der Zahl 27,3 zusammen, welche die Tage bezeichnet, in denen die Sonne in Beziehung auf die Erde eine Axendrehung vollendet, und werden im Mittel durch die Curve

0	3,0	7	7,5	14	11,0	21	8,0
1	4,5	8	9,4	15	9,2	22	6,0
2	4,7	9	10,7	16	9,2	23	5,7
3	5,5	10	11,0	17	8,5	24	5,0
4	6,0	11	10,0	18	8,0	25	4,0
5	6,0	12	10,5	19	8,0	26	4,0
6	7,0	13	13,3	20	8,0	27	3,0

dargestellt, die zwei durch einen tiefen Einschnitt getrennte Maxima hat. Jedoch scheint diese Wellenlänge nicht eine sehr überwiegende zu sein, — spätere Beobachtungen mögen übrigens entscheiden, — jetzt genüge es, das Vorhandensein einer kürzeren Fleckenperiode wahrscheinlich gemacht zu haben.

3) Den Anfang der totalen Mondfinsterniss vom 6ten Janr. 1852 beobachtete ich bei -10° C um $17^h 49' 33''$ mittl. Zt., das Ende der Finsterniss hatte für mich um $19^h 9'$ statt, wo der Mond in den am Horizont lagernden Nebel versank. Die rothe Färbung des verdunkelten Theiles, und zur Zeit der ganzen Scheibe, war sehr intensiv. Nach Eintritt der totalen Finsterniss bemerkte ich am Westrande während einiger Zeit und durch verschiedene Fernröhre einen schmalen, weisslichen Schimmer, was mir in Zusammenstellung mit der am 19ten März 1848 gemachten Beobachtung von einiger Bedeutung zu sein scheint. (Vergl. Nr. 127 der Mitth. der Berner Naturforschenden Gesellschaft).

Bern 1852. Januar 10.

R. Wolf.

Beobachtungen des *Encke'schen* Cometen auf der Sternwarte in Kremsmünster.

Anbei die wenigen Beobachtungen des *Encke'schen* Cometen, welche mir gelungen sind. Leider war während der ganzen Dauer seiner Sichtbarkeit der Himmel in unserer Gegend wenig günstig. Die Beobachtungen sind wie gewöhnlich nur vom Einflusse der Refraction und der Instrumentalfehler befreit.

	M. Zt. Kremsm.	AR. ☾	Decl. ☾	Vergleichstern.
1852 Janr. 12	6 ^h 34' 46 ^m 25	23 ^h 5' 10 ^m 7	+4 ^u 2' 10 ^m 6	Weisse 23 ^h Nr. 111
		10,3	22,4	4 β Piscium A.S.C.
13	6 38 22,77	23 6 20,3	4 7 46,0	Weisse 23 ^h Nr. 111.
20	6 44 35,34	23 15 7,0	4 49 49,7	Nr. 340.
		7,3	56,0	10 θ Piscium A.S.C.
24	7 2 1,04	23 20 43,4	5 16 56,9	
Febr. 8	7 19 44,86	23 44 51,6	7 17 47,8	8315 Piscium A.S.C.
		52,7	33,6	32 c^2 ———
9	6 54 24,31	23 46 37,3	7 25 57,0	8315 ———
		37,6	43,5	32 c^2 ———
—	7 21 21,73	38,8	7 26 19,2	8315 ———
		39,7	5,9	32 c^2 ———
10	7 18 50,46	23 48 28,5	7 34 37,2	32 c^2 ———
—	7 48 13,96	30,2	56,2	32 c^2 ———
		30,9	55,8	8315 ———
21	7 9 29,00	0 9 20,3	9 0 18,5	204 Ceti ———
		19,2	20,1	Weisse 1 ^h Nr. 179.
24	7 13 25,00	0 15 2,0	9 15 15,2	Nr. 340.
		2,3	9,6	137 Piscium A.S.C.
25	7 0 31,24	0 16 51,7	9 18 26,1	Weisse 1 ^h Nr. 340.
		51,4	18,9	137 Piscium A.S.C.
—	7 15 8,50	52,4	18 22,6	Weisse 1 ^h Nr. 340.
März 7	6 57 31,65	0 29 10,0	7 39 32,3	Rümker A. N. Nr. 795.
		10,1	34,5	Weisse 1 ^h Nr. 491.
—	7 14 42,83	10,3	39 1,5	Rümker A. N. Nr. 795.
		10,5	0,1	W. 1 ^h Nr. 491.
		10,4	10,2	177 Piscium A.S.C.
8	7 7 37,98	0 28 38,5	+7 7 19,5	Rümker 1. A. N. Nr. 795.
		37,3	28,5	2. ———
		38,1	25,2	286 Piscium A.S.C.

Die Positionen der Vergleichsterne waren:

		$\alpha. =$	$\delta. =$
Jan. 12	4 β Piscium A.S.C.	22 ^h 56' 19 ^m 29	3 ^u 1' 25 ^m 42
	12&13 W. 23 ^h Nr. 111.	23 6 28,29	4 11 33,09
20	10 θ Piscium A.S.C.	23 20 26,24	5 33 53,79
	W. 23 ^h Nr. 340.	23 16 48,76	5 22 18,79
24	10 θ Piscium A.S.C.	23 20 26,21	5 33 53,45
Febr. 8	8315 Piscium A.S.C.	23 48 2,26	7 23 54,76
	32 c^2 ———	23 54 54,53	7 39 41,20
10	8315 ———	23 48 2,23	7 23 54,59
	32 c^2 ———	23 54 54,51	7 39 41,03
21	204 Ceti ———	0 37 32,32	-0 33 34,07
	W. 1 ^h Nr. 179	0 10 31,44	2 58 18,69
24&25	— Nr. 340	0 20 39,85	9 22 41,59
	137 Piscium A.S.C.	0 26 29,32	9 29 7,28
März 7	Rümker A.N. Nr. 795, 8.Gr.	0 32 1,62	7 18 24,99
	177 Piscium A.S.C.	0 33 32,05	8 32 40,71
	W. 1 ^h Nr. 491.	0 28 43,72	8 3 22,27
8	Rümker A.N. Nr. 795 1)	0 32 1,62	7 18 24,99
	2)	0 24 44,15	6 8 4,52
	286 Piscium A.S.C.	0 54 46,32	8 1 22,32

Der Comet war am 12^{ten} Jan. bei der Auffindung sehr schwach (A. N. Nr. 792). Am 20^{sten} Jan. etwas kenntlicher, jedoch noch sehr lichtschwach. Jan. 24. Comet sehr nahe einem Sternchen 8. Gr., Beobachtung nur auf's Gerathewohl auszuführen. Jan. 31. Comet wegen Mondhelle nicht zu sehen. Febr. 8. Comet bedeutend lichtheller geworden. Febr. 9 u. 10 Himmel nicht ganz rein, Comet undeutlich. Febr. 21. Himmel nur auf Augenblicke heiter. Febr. 24. Comet bei ganz heiterem Himmel sehr hell, mit gutem Kerne ohne merkbaren Schweif. März 7. Comet zeigt in der Mitte bedeutende Helligkeit; Nebelausbreitung nur geringe, ein schwacher von der Sonne abgewendeter Schweif gut erkennbar. Stände der Comet nicht so tief am Horizonte, so würde sein Ansehen sehr schön, er vielleicht mit freiem Auge wahrzunehmen sein. Am 12^{ten} und 13^{ten} März Comet wegen Tageshelle nicht mehr aufzufinden.

Kremsmünster am 23^{sten} März 1852.

Aug. Reslhuber.