1826.		Sid. time.
		^h ['] ^{''}
July 16	2. 39 Ophiuchi	17 7 28,50
	42 θ ———	17 11 24,13
	Moon 1 L.	17 24 38,77
	2 Sagitt.	17 28 21,97
19	2 ξ Capricorni	20 2 48,00
	2 α ———	20 8 27,92
	β ———	20 11 17,74
	Moon 2 L.	20 31 23,46

1826.		Sid. time.
		^h ['] ^{''}
July 25	Moon 2 L.	1 31 32,47
	β Arietis	1 45 5,70
	α ———	1 57 26,00
26	β Arietis	1 45 5,84
	α ———	1 57 26,08
	Moon 2 L.	2 20 13,93

Sternbedeckungen vom Monde und Jupiters-Trabantenverfinsterungen.

Prag 1826. August 13.

1826. 11 May.	Eintr. *7-8	^h 9 ['] 58 ^{''} 58,8	m. Z. in Prag.
15 May.	Eintr. *6-7	9 25 54,4	— —
10 Juny.	Eintr. *8	10 3 22,0	— —
16 Juny.	Eintr. I.	10 15 10,6	— —
2 July.	Eintr. I.	8 33 20,8	— —

Alle übrigen Beobachtungen vereitelte trübe Atmosphäre. Die größte Lufttemperatur war am 4^{ten} Aug. + 27°, 8 R.; in der Sonne beobachtete ich an dem nämlichen Tage um

12 Uhr Mittags + 35°, 3 R.; um 2 Uhr Nachmittags + 44°, 8 R. und um 3 Uhr Nachmittags + 46°, 4 R.; um 10 Uhr Nachts zeigte noch das der freyen Luft ausgesetzte Reaumursche Thermometer + 22°, 7, worauf am 5^{ten} Aug. in den Morgenstunden ein Hochgewitter und sanfter Regen erfolgte. Der Nordwestwind war heftiger, als gewöhnlich. Wir haben in unsern Gegenden einen heißen, und sehr trocknen Sommer, der vielen Gewächsen merklich schädlich wird.

Hallaschka.

Ueber die Berechnung der Bedeckungen der Saturnsringe vom Monde.

Die Berechnung dieser Bedeckungen weicht nur darin ab, daß bei der Auflösung des Conjunctionsdreiecks auf die elliptische Figur der Ringe Rücksicht genommen werden muß. Die Formel die ich hiefür gebe, läßt sich ebenfalls auf Bedeckungen des Jupiters anwenden; welches wohl nicht überflüssig seyn dürfte, da der größte und kleinste Halbmesser desselben etwa anderthalb Secunden unterschieden sind.

Es sei in der bedeckten elliptischen Figur:

a der größte Halbmesser,

b der kleinste ——— = $a\sqrt{1-e^2}$

die Axe der x' a , und der Anfangspunct der Coordinaten im Mittelpuncte der Figur, dann hat man:

$$\frac{x'^2}{a^2} + \frac{y'^2}{b^2} = 1 \quad (1)$$

Sei ferner Winkel der Normale mit der Axe $\alpha \dots \varphi$; so ist, wenn ds ein Element der Curve ist

$$\left. \begin{aligned} dx' &= ds \cdot \cos(\varphi + 90^\circ) \\ dy' &= ds \cdot \sin(\varphi + 90^\circ) \end{aligned} \right\} \quad (2)$$

Durch Differentiation der Gleichung (1) erhält man:

$$\frac{x'}{a^2} dx' + \frac{y'}{b^2} dy' = 0$$

und durch Substitution der Gleichungen (2)

$$\frac{x'}{a^2} \sin \varphi - \frac{y'}{b^2} \cos \varphi = 0 \text{ mithin}$$

$$\frac{x'^2}{a^2} \sin^2 \varphi - \frac{y'^2}{b^2} \cos^2 \varphi = 0$$

woraus in Verbindung mit (1) folgt:

$$\left. \begin{aligned} x' &= \frac{a^2 \cos \varphi}{\sqrt{[a^2 \cos^2 \varphi + b^2 \sin^2 \varphi]}} \\ y' &= \frac{b^2 \sin \varphi}{\sqrt{[a^2 \cos^2 \varphi + b^2 \sin^2 \varphi]}} \end{aligned} \right\} \quad (3)$$

Sei jetzt die Länge des Mittelpuncts der Ellipse $\dots \lambda$, Breite $\dots \varepsilon$, Länge des vom Mondrande tangirten Puncts der Ellipse $\dots \lambda + \Delta \lambda$, Breite $\dots \varepsilon + \Delta \varepsilon$, Neigung der von diesem Puncte gezogenen Normale gegen die Axe $\alpha \dots \varphi$, Neigung der Axe α gegen den Parallelkreis $\dots \theta$; so hat man

$$\cos \epsilon \Delta \lambda = x' \cos \theta - y' \sin \theta$$

$$\Delta \epsilon = x' \sin \theta + y' \cos \theta$$

und nach Substitution obiger Werthe von x' und y'

$$\cos \epsilon \Delta \lambda = \frac{a^2 \cos \varphi \cos \theta - b^2 \sin \varphi \sin \theta}{\sqrt{[a^2 \cos \varphi^2 + b^2 \sin \varphi^2]}}$$

$$\Delta \epsilon = \frac{a^2 \cos \varphi \sin \theta + b^2 \sin \varphi \cos \theta}{\sqrt{[a^2 \cos \varphi^2 + b^2 \sin \varphi^2]}}$$

oder wenn man $\varphi + \theta = \psi$, und für b^2 seinen Werth $a^2 (1 - e^2)$ setzt

$$\left. \begin{aligned} \cos \epsilon \Delta \lambda &= a \cdot \frac{\cos \psi + e^2 \sin \theta \sin (\psi - \theta)}{\sqrt{[1 - e^2 \sin (\psi - \theta)^2]}} \\ \Delta \epsilon &= a \cdot \frac{\sin \psi - e^2 \cos \theta \sin (\psi - \theta)}{\sqrt{[1 - e^2 \sin (\psi - \theta)^2]}} \end{aligned} \right\} \dots (4)$$

Die Verlängerung des Mondhalbmessers muß ebenso wie die Normale der Ellipse mit dem Parallelkreise am Berührungspuncte den Winkel ψ , oder $180 + \psi$ bilden;

$$\left. \begin{aligned} B - \epsilon &= \pm D \sqrt{\left(\frac{\cos \epsilon}{\cos B}\right)} \cdot \sin \psi + a \cdot \frac{\sin \psi - e^2 \cos \theta \sin (\psi - \theta)}{\sqrt{[1 - e^2 \sin (\psi - \theta)^2]}} \\ L - \lambda &= \pm \frac{D}{\cos B} \cdot \cos \psi + \frac{a}{\cos \epsilon} \cdot \frac{\cos \psi + e^2 \sin \theta \sin (\psi - \theta)}{\sqrt{[1 - e^2 \sin (\psi - \theta)^2]}} \end{aligned} \right\} \dots (7)$$

ϵ und B sind gegeben, man sucht demnach aus der ersten Gleichung ψ , und dann durch die zweite $\lambda - L$. Einen genäherten Werth von ψ erhält man durch Vernachlässigung von a ; berechnet man damit das von a abhängige Glied, und sucht dann wieder ψ ; so wird man dafür einen hinlänglich genauen Werth finden. Oder,

da $\sin \psi$ zwischen den Gränzen $\frac{B - \epsilon}{D}$ und $\frac{B - \epsilon \pm a}{D}$

liegt; so kann man für diese beiden Werthe durch die Gleichung $B - \epsilon$ berechnen und dazwischen einschalten.

Da es einige Ueberlegung erfordert, um zu entscheiden, in welchem Quadranten des Kreises ψ genommen werden muß; so setze ich die verschiedenen Fälle hierher.

$$\left. \begin{aligned} e \cos \theta &= \sin (\lambda - \Omega_0) \sin i \sin \epsilon + \cos i \cos \epsilon \\ e \sin \theta &= \cos (\lambda - \Omega_0) \sin i \end{aligned} \right\} \dots (8)$$

der erste Fall findet bei äussern Berührungen, der zweite bei innern, statt. Ist nun Länge und Breite des Mondmittelpuncts L, B , Halbmesser D , $\lambda + \Delta \lambda = \lambda'$, $\epsilon + \Delta \epsilon = \epsilon'$, so findet sich:

$$\left. \begin{aligned} \cos B \sin (\lambda' - L) &= \mp \sin D \cos \psi \\ \sin B &= \pm \sin D \sin \psi \cos \epsilon' + \cos D \sin \epsilon' \end{aligned} \right\} (5)$$

Das obere Zeichen gilt immer für äussere, das untere für innere Berührungen. Man kann hier, bloß mit Vernachlässigung von wenigen Hunderttheilen einer Secunde $\cos D = 1$, $\sin D = D$, $\sin (\lambda' - L) = \lambda' - L$, setzen. In dieser Voraussetzung folgt:

$$\left. \begin{aligned} \epsilon' - B &= \mp D \sqrt{\left(\frac{\cos \epsilon'}{\cos B}\right)} \cdot \sin \psi \\ \lambda' - L &= \mp \frac{D}{\cos B} \cdot \cos \psi \end{aligned} \right\} \dots (6)$$

und nach Substitution der Gleichungen (4)

Die Ellipse ist vom Mondmittelpunct:

	Nördlich.	Südlich.
Eintritt erster Rand	III	II
— zweiter —	I	IV
Austritt erster —	II	III
— zweiter —	IV	I

Für die Saturnsringe findet man e und θ folgendermaßen: Der Pol der Ringe, der Pol der Ecliptik und der geocentrische Ort des Saturns bilden die Ecken eines sphärischen Dreyecks. Der Sinus der Seite zwischen dem Pol der Ringe und Saturn ist $= e$; und der Winkel am Saturn $= \theta$. Folglich, wenn Ω die Länge des aufsteigenden Knotens der Ringe auf der Ecliptik, i ihre Neigung ist

Th. Clausen.

Reduction der von Herrn *Inghirami* angestellten Beobachtungen des Cometen im Eridan.

1) Beobachtungen in Nr. 91 und Nr. 92 der Astr. Nachr. abgedruckt.

Scheinbare Oerter der verglichenen Sterne.

	AR.	δ	
1825 Dec. 30 15 Erid.	47 40 39,8	— 23 9 12,4	Piazzi
— 31 15 Erid.	47 40 39,7	23 9 12,5	—

		AR.	δ	
1825 Dec. 31	Stella 1	47 25 21,7	— 24 10 2,4	H. C. p. 563
	Stella 2	48 27 44,4	24 16 0,5	—
1826 Jan. 1	Stella 1	47 25 21,5	24 10 2,5	—