Dieser Körper war phosphorhaltig und muss entweder für sich oder mittelst eines seiner Spaltungsprodukte eine in Alkohol unter gewissen Umständen unlösliche Zinkverbindung eingegangen sein. Hoppe-Seyler vermuthet, dass dieser Körper Lecithin gewesen, der entweder schon ursprünglich im Harn enthalten war oder, was wahrscheinlicher, bei der Gährung aus der Hefe in denselben übergegangen ist.

Auffindung der Gallensäuren im Harn. Dragendorff*) hat von dem in dieser Zeitschrift Bd. 8, pag. 106. angegebenen Verhaltens des Amylalkohols gegen Gallensäuren für die Nachweisung dieser Vortheil zu ziehen gesucht und recht befriedigende Resultate erhalten. Schüttelt man 25 CC. eines Harns, dem man 0,25 CC. Rindsgalle zugesetzt hat, nachdem er mit Schwefelsäure angesäuert worden ist, zunächst mit Benzin aus, so nimmt dieses nur einen Theil des Farbstoffs fort. Behandelt man dann nach dem Abheben des Benzins die wässrige Flüssigkeit mit Amylalkohol, so nimmt dieser die Gallensäuren auf. Da in letztere Lösung auch ein Theil der Schwefelsäure übergeht, die bei der Verdunstung des Amylalkohols auf die Gallensäuren zersetzend einwirken könnte, so ist es rathsam, den Auszug zuvor mit Ammon zu sättigen. Der Verdunstungsrückstand gibt meist schon ohne weitere Reinigung mit Schwefelsäure und Zucker die schönste Gallensäurereaction. Sollte aber zuweilen noch viel Farbstoff zugegen sein, so kann man den völlig trockenen Rückstand mit möglichst wenig Wasser behandeln, welches vorzugsweise nur die Gallensäuren löst. Setzt man der so erhaltenen Flüssigkeit ein Körnchen Zucker zu, und überschichtet damit conc. reine Schwefelsäure, so wird an der Berührungsstelle bald die charakteristische Rothfärbung eintreten. Stellt man den Versuch in angegebener Weise in einem Reagensglase an, so dringt die Färbung sehr allmählich durch die Lösung vor, so dass sie noch nach 24 Stunden deutlich wahrzunehmen ist.

Dragendorff hat den Versuch mit einem Gemisch von Harn und Galle, in dem etwa 0,08 Proc. Gallensäuren enthalten waren, oft wiederholt und ist über das Resultat nie im Zweifel geblieben. Auch im tiefbraunen Harn eines Hundes, welchem Galle ins Blut injicirt war, hat D. die Gallensäure leicht so darthun können. Nur in seltenen Fällen wird zugleich vorhandener Farbstoff den Ausfall unsicher machen.

*) Repert. f. Pharm. Bd. 17. p. 657.

Die Schwefelsäurelösung der letzteren ist wohl rein braun, aber nicht in der bekannten Weise roth gefärbt. Da auch Chloroform beim Ausschütteln Gallensäuren aufnimmt, kann mitunter die Aufsuchung dieser mit der bekannten Ermittlung der Gallenfarbstoffe vereinigt werden; man theilt nach dem Ausschütteln die Chloroformlösung in 2 Theile, von denen man einen auf Gallensäuren, den andern auf Gallenfarbstoffe prüft. Uebrigens gehen Gallenfarbstoffe auch in Amylalkohol über.

3. Auf gerichtliche Chemie bezügliche Methoden.

Von

C. Neubauer.

Beiträge für den gerichtlich-chemischen Nachweis des Morphins in thierischen Flüssigkeiten und Geweben. Th. Kanzmann*) benutzte zur Auffindung des Morphins die folgende Methode: Die fragliche Substanz wird nach gehöriger Zerkleinerung mit Wasser und so viel Schwefelsäure, dass das Gemenge deutlich sauer reagirt, angetührt und etwa 12 bis 24 Stunden lang einer Temperatur von 60—80° C. ausgesetzt. Dann wird colirt, ausgepresst und der auf dem Colatorium gebliebene Rückstand nochmals wie oben mit säurehaltigem Wasser ausgezogen. Die vereinigten Colaturen werden, nachdem die Säure durch Ammon möglichst abgestumpft worden ist, auf dem Wasserbade auf ein kleines Volum (1—4 Unzen) gebracht und dann mit dem 3- bis 4fachen Volum Alkohol versetzt. Nach 24stündigem Stehen wird der durch den Alkohol-Zusatz bewirkte Niederschlag von der Flüssigkeit durch Filtriren getrennt und von dem Filtrat im Dampfbade der Alkohol abdestillirt. Die zurückbleibende Flüssigkeit wird nach dem Erkalten, wobei sich meist Fette und andere unlösliche Substanzen abgeschieden haben, durch ein mit Wasser benetztes Filter filtrirt und noch sauer mit $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ Volum Amylalkohol tüchtig geschüttelt. Nachdem die Sonderung beider Flüssigkeiten vollständig eingetreten ist (eine Temperatur von 60—80° C. beschleunigt diesen Process), wird die obenstehende, jetzt stark gefärbte Amylalkoholschichte mittelst eines

*) Aus dessen Dissertation von Dragendorff mitgetheilt im Repert. f. Pharm. Bd. 17. p. 641.