	Mittl. Berl. Zt.	AR. Com.	Decl. Com.	Anz. der Vergl.
Oct. 11	10 ^h 44' 41"	188°43' 19",4	+62° 0' 38",1	6
14	7 29 43	232 16 56,7	40 14 51,1	1
—	9 19 0	232 52 46,3	39 35 23,2	1
15	7 53 26	239 2 53,5	31 52 52,4	2
20	7 2 58	* + 21 27,0	—	1
22	7 31 36	* + 56 1,5	* — 0 16,5	1
24	6 19 21	* — 53 16,5	* + 0 51,2	2
26	7 6 35	257 40 38,1	— 4 4 27,1	5
30	6 23 12	258 46 31,9	7 52 28,8	5
Nov. 2	6 0 24	259 3 49,8	9 54 27,7	5
3	6 17 40	259 5 12,7	10 29 30,0	5
6	6 10 53	258 58 0,0	11 59 57,8	2
13	5 16 26	257 51 17,2	14 40 20,0	5
14	5 0 43	—	14 59 13,2	5
15	5 8 30	257 22 52,3	15 17 52,1	5
16	4 59 33	257 7 40,4	15 35 32,6	5

Die scheinbaren Oerter der benutzten Sterne sind für:

Oct. 3	104°51' 45",7	+43° 2' 55",8	Bessel Z. 516. 7 ^h 0' 1"03
4	107 20 16,0	45 31 20,3	Hist. c. p. 384. 7 5 47,0
11	188 56 47,1	62 3 25,3	Altonaer Bestimmung.
14	232 32 38,7	40 21 2,9	Bessel Z. 417. 15 30 37,0
—	232 17 47,8	39 33 54,6	6 γ Coronae Piazzii.
15	239 2 53,5	31 52 52,4	Bessel Z. 368. 15 52 56,36
			370. 15 52 54,58
26	257 39 41,5	— 4 1 31,9	251. 17 10 34,96
30	257 45 57,1	7 50 12,4	255. 17 11 23,23
Nov. 2	260 2 46,4	9 51 8,1	256. 17 20 31,20
3	257 56 13,9	10 31 21,1	256. 17 12 4,16
6	257 59 56,3	11 52 50,8	257. 17 12 18,69

Für die folgenden Abende wurden Piazzii XVII. 129, ξ Serpentis und η Ophiuchi zur Ermittlung der Correction des Instrumentes benutzt.

Nach dem Durchgange durch das Perihel habe ich den Cometen nur selten sehen können. Der bei dem neuen Gebäude um so nachtheiliger wechselnde Winter hindert den Gebrauch des Refractors so sehr, daß ich die Freude den Cometen eifrig zu verfolgen aufgeben mußte. Zuletzt verglich ich ihn am 18^{ten} und 19^{ten} März mit 3 Sternen 8.9^r Gr. mittelst des schwächsten Okulars von 65mal. Vergr. mit einem Doppelkreismikrometer. Ich habe sie aber in keinem Cataloge auffinden können.

März 18.	13 ^h 23' 17"	Comet AR. = * ⁽¹⁾ —25' 50",2
		Decl. = * ⁽¹⁾ — 8 3,2
19.	12 13 31	Comet AR. = * ⁽²⁾ + 6 21,0
		Decl. = * ⁽²⁾ + 1 54,6
—	12 33 35	Comet AR. = * ⁽³⁾ +12 9,4
		Decl. = * ⁽³⁾ — 9 38,0

Die Reductionen wurden mittelst der Ephemeride von *Stratford* gemacht und mittelst derselben auch die Sterne aufgesucht. Es scheint indessen, daß *Rosenbergers* neueste Ephemeride sich merklich besser dem Ganzen der Beobachtungen anschließt. Eine genaue Vergleichung hat die Unterschiede gegeben von *Rosenbergers* Ephemeride:

Sept. 17	$\Delta\alpha$ +11",2	$\Delta\delta$ — 8,5	Heliom. 4 Vergl.
19	+ 9,0	+ 4,6	— 6 —
20	+ 8,4	+ 2,4	— 4 —
22	— 1,2	— 8,2	— 6 —
Oct. 3	— 1,9	+17,7	Refr. 3 —
4	+28,9	+11,2	— 3 —
8	— 8,5	+ 2,9	Heliom. 4 —
11	+ 5,8	+13,5	Refr. 6 —
14	—16,5	+26,1	— 1 —
—	+ 7,0	+15,0	— 1 —
15	— 8,4	+12,4	— 2 —
26	+ 1,6	+13,0	— 5 —
30	+ 1,2	+14,2	— 5 —
Nov. 2	+16,1	+18,5	— 5 —
3	+11,8	+ 6,4	— 5 —
6	+ 1,9	+14,6	— 2 —
13	+ 5,5	+15,8	— 5 —
14	—	+ 4,4	— 5 —
15	+ 6,2	+ 0,1	— 5 —
16	+ 4,0	+10,7	— 5 —

Von diesen Unterschieden mögen ein Paar der größeren vielleicht mit den gewählten Sternen zur Last fallen. Im Ganzen hätte die Anzahl von Vergleichungen vermehrt werden müssen, etwas was freilich an den Tagen, wo nur einzelne oder zwei Vergleichungen vorkommen, durch die ungünstige Witterung verhindert ward. Der Gang der Fehler schließt sich den Vergleichungen von *Nicolai* sehr nahe an, und zeigt, daß bis zum Durchgange durch das Perihel nur ein geringer positiver Unterschied in AR. und Declination zurückblieb.

Encke.

Reliquie von Tobias Mayer.

Von Herrn *J. W. Lahmeyer* in Hannover erhielt ich ein Blatt, auf dem der berühmte *J. T. Mayer* die hier folgende Aufgabe notirt hatte. Herr *Lahmeyer* hat es in dem Exemplar der *Lalande'schen* Astronomie das unser großer Astronom besessen hatte gefunden. Ich hoffe es wird den Lesern dieser Blätter wenigstens als geschichtliche Merkwürdigkeit angenehm seyn.

Problème.

Déterminer le rapport du diamètre de l'équateur à l'axe

de la terre sans le secours des mesures actuelles de quelque degré de méridien, par une manière qui se puisse exécuter dans une seule Contrée de la terre.

Soit aln le sphéroïde de la terre, et supposons que le point l se trouve au bout d'une grande plaine, et d'abord il faut qu'on y observe la hauteur du pôle, il suffit qu'on la sache à une minute près; mais il est nécessaire qu'on y observe très-exactement la distance

de quelques étoiles fixes au zénith, au tems de leur culmination. Soit donc λ = hauteur du pôle au point l . Qu'on parte ensuite du point l selon une route, qui fasse un angle oblique avec la méridienne, mais qu'on mesure le plus exactement qu'il est possible cet angle alm que fait le commencement de la route avec la méridienne en l . Qu'on poursuive alors la même route, en fixant perpendiculairement des piques en sorte qu'elles paroissent toutes disposées en ligne droite et qu'on continue cette ligne, qui semblera droite, aussi loin que le terrain le permettra. Il serait bon qu'on puisse pousser cette opération par une étendue de plusieurs milles. Cependant il ne sera pas nécessaire de mesurer la longueur de la route lm , mais seulement qu'on aie la direction de cette route. Soit donc l'angle que fait cette route lm avec la méridienne al , ou l'angle $alm = \zeta$. Ayant poursuivi la route jusqu'en m , qu'on observe en m le plus soigneusement qu'il sera possible, les distances des mêmes étoiles fixes au zénith de m à leur passage par le Merid. afin qu'on en puisse exactement conclure la différence de latitudes en l et m , ce qui se pourra exécuter à quelques secondes près, soit donc ϕ l'élévation du pôle en m . Qu'on mesure aussi l'angle aml que fait la route avec la méridienne en m ; et qu'on nomme cet angle $= \vartheta$. Ce sont les opérations, qu'on

aura à faire pour connoître le rapport entre le demiaxe $= a$, et le demidiámetro de l'équateur $= e$; car posant $\frac{ee-aa}{ee+aa} = \delta$, ou $\frac{e}{a} = 1 + \delta$, nous aurons par les règles de la trigonométrie elliptique pour le triangle alm à résoudre cette équation

$$\sin \vartheta \cos \phi \sqrt{1 + \delta \cos 2\lambda} = \sin \zeta \cos \lambda \sqrt{1 + \delta \cos 2\phi}$$

ou les quatre angles $\vartheta, \phi, \lambda, \zeta$ étant donnés on en tire

$$\delta = \frac{\sin \zeta^2 \cos \lambda^2 - \sin \vartheta^2 \cos \phi^2}{\sin \vartheta^2 \cos \phi^2 \cos 2\lambda - \sin \zeta^2 \cos \lambda^2 \cos 2\phi}$$

et

$$\frac{ee}{aa} = 1 + \frac{\sin \zeta^2 \cos \lambda^2 - \sin \vartheta^2 \cos \phi^2}{\cos \lambda^2 \cos \phi^2 (\sin \vartheta^2 - \sin \zeta^2)}$$

Cependant cette méthode a bien des difficultés dans la pratique, à cause de l'extrême exactitude, avec laquelle il faut mesurer les angles, $\vartheta, \phi, \zeta, \lambda$. Car il faudra avoir ces angles à des secondes exactement parcequ'un erreur d'une ou de deux secondes introduiroit un erreur bien considérable dans la détermination de l'applatissment. Par consequent on ne pourra exécuter cette méthode, que par des instrumens d'une grandeur suffisante, et d'une exactitude bien éprouvée et connue auparavant.

T. Mayer.

Gerade Aufsteigungen des Mondes und benachbarter Sterne in den Jahren 1834 und 1835 auf der Dorpater Sternwarte mit dem achtfüßigen Mittagsrohr von Dollond beobachtet von G. Sabler.

1834.	Fäden.	Name.	AR.	Sternzeit.
Febr. 13.	7	Mond IRd.	1 ^h 11' 21" 22	— 0" 41
— 15	5	μ Ceti	2 35 57,72	
	7	Mond IRd.	43 7,51	— 0,16
	7	α Ceti	53 35,72	
	7	δ Arietis	3 2 8,00	
	7	ξ Tauri	18 10,01	
— 22	7	δ Cancr.	8 35 14,99	
	7	ξ Cancr.	59 48,86	
	7	λ Leonis	9 22 14,86	
	7	σ Leonis	32 17,81	
	1	Mond IRd.	33 36,76	— 0,18
	7	α Leonis	59 32,19	
— 24	7	χ Leonis	10 56 27,55	
	7	σ Leonis	11 12 34,96	
	7	ι Leonis	15 16,60	
	7	τ Leonis	19 24,60	
	5	Mond IRd. *)	38 38,47	— 0,40
März 17	7	α Tauri	4 26 23,28	
	7	Mond IRd.	58 44,66	+ 0,24
	7	β Tauri	5 15 47,57	
	7	ζ Tauri	27 43,15	
	7	136 CTauri	42 53,34	
— 18	7	β Tauri	5 15 47,52	
	7	ζ Tauri	27 43,05	

*) Wolken unterbrachen die Beobachtung.

1834.	Fäden.	Name.	AR.	Sternzeit.
März 18	5	136 CTauri	5 ^h 42' 53" 15	
	7	Mond IRd.	55 51,68	+ 0" 27
	7	μ Geminor.	6 12 54,65	
	4	ε Geminor.	33 42,78	
— 19	7	μ Geminor.	6 12 54,60	
	7	γ Geminor.	28 6,97	
	7	ε Geminor.	33 42,56	
	4	Mond IRd. *)	56 0,93	+ 0,28
— 20	7	α Canis min.	7 30 36,55	
	7	β Geminor.	35 8,98	
	7	Mond IRd.	58 11,30	+ 0,14
	7	δ Cancr.	8 35 14,85	
	7	ξ Cancr.	59 48,64	
— 21	7	δ Cancr.	8 35 14,95	
	7	Mond IRd.	9 0 59,08	+ 0,15
	7	λ Leonis	22 14,85	
	7	σ Leonis	32 17,76	
	7	ε Leonis	36 25,57	
	5	ν Leonis	49 17,86	
	7	α Leonis	59 32,13	
	7	γ Leonis med.	10 10 49,35	
— 22	7	λ Leonis	9 22 14,73	
	7	σ Leonis	32 17,63	
	7	ε Leonis	36 25,52	

*) Durch Wolken.