Isolierung von Aminosäuren aus Blut.

Von

Emil Abderhalden.

(Aus dem physiologischen Institut der Universität Halle a. S.)
Ausgeführt mit Mitteln der Kaiser Wilhelm-Gesellschaft zur Förderung der
Wissenschaften.

(Der Redaktion zugegangen am 23. März 1921.)

Nachdem beobachtet worden war, daß im Darmkanal Aminosäuren anzutreffen sind, lag die Vermutung nahe, daß solche zur Resorption kommen und dann auch im Blute nachweisbar sind. Lange Zeit blieb der Versuch, Aminosäuren aus Blut zu isolieren, vergeblich. Erst in den letzten Jahren sind Befunde mitgeteilt worden, die das Vorkommen von Eiweißbausteinen im Blutplasma sicherstellen¹⁾. Es war von Interesse, der Frage nachzugehen, ob sämtliche bis jetzt bekannten Aminosäuren sich aus dem Blute isolieren lassen. Besonders wertvoll wäre es, wenn man sichere Anhaltspunkte über die Mengenverhältnisse, in denen sie unter verschiedenen Bedingungen — Hunger, während der Verdauung usw. — anzutreffen sind, hätte. Von besonderer Bedeutung wären im Anschluß an solche Forschungen Bestimmungen des Gehaltes des Blutes an bestimmten Eiweißbausteinen vor seinem Eintritt in bestimmte Organe, und nachdem es diese verlassen hat. Vielleicht ergeben solche Untersuchungen Anhaltspunkte über Beziehungen bestimmter Aminosäuren zu gewissen Inkretstoffen. Leider sind unsere Methoden zum Nachweis von

¹⁾ Vgl. die Literatur: Emil Abderhalden, Lehrbuch der physiol. Chemie 4. Aufl. Bd. 1, S. 575 ff.

Aminosäuren noch nicht so weit durchgebildet, daß es möglich wäre, Spuren davon zu folgen, noch viel weniger vermögen sie quantitative Bestimmungen zu vermitteln. Das ist der Grund, weshalb wir trotz vieler Anstrengungen noch keine ausreichenden Kenntnisse über die Verwertung der einzelnen Aminosäuren im Stoffwechsel haben.

Aufgabe der vorliegenden Untersuchung war, festzustellen, welche Aminosäuren aus Blutplasma bzw. -serum gewonnen werden können. Ihre Durchführung war sehr mühsam und zeitraubend. Es galt eine Methode anzuwenden, welche mit absoluter Sicherheit die sekundäre Entstehung von Aminosäuren aus Eiweiß und Eiweißabkömmlingen (Peptonen, Polypeptiden) ausschloß. Alle Methoden der Enteiweißung mittels Hitzekoagulation kamen nicht in Frage. Sie schließen nicht aus, daß Hydrolysen stattfinden. Es mußte mit der Möglichkeit gerechnet werden, daß im Blutplasma bzw. -serum Substanzen vorhanden sind, die leicht spaltbar sind. Dazu kommt, daß es sehr schwer ist, große Serummengen vollständig zu enteiweißen. Hinzu kommt noch, daß die großen Eiweißmassen schwer auszuwaschen sind. Auch die Methoden der Ausflockung (etwa durch Aussalzen usw.) kamen nicht in Frage. Es blieb als beste Methode die Dialyse. Praktisch erwies sie sich als recht schwer durchführbar. Vielleicht wird man später die Ultrafiltration verwenden. Einstweilen kam sie nicht in Frage, weil die Verarbeitung großer Serummengen zu zeitraubend ist.

Die Dialyse bot deshalb große Schwierigkeiten, weil es nicht leicht war, Pergamentschläuche ausfindig zu machen, die wirklich eiweißundurchlässig waren. Immer wieder ergab die sorgfältige Prüfung der Schläuche, daß sie nicht dicht waren. In anderen Fällen waren sie zwar dicht, jedoch ließ die Durchlässigkeit für nichtkolloide Stoffe zu wünschen übrig. Die Prüfung der Schläuche erfolgte in der gleichen Weise, wie ich es für das Dialysierverfahren zum Nachweis von Abwehrfermenten angegeben habe. Die Dialyse erfolgte zum Teil im strömenden Wasser, zum Teil wurde die Außenflüssigkeit oft gewechselt. Im letzteren Falle wurde die Außen-

flüssigkeit mittels einer Turbine in ständiger Bewegung gehalten. Um Bakterienwirkung fernzuhalten, wurden alle Gefäße in sterilisiertem Zustande angewandt. Die Dialysierschläuche wurden vor Gebrauch, nachdem sie auf Eiweiß- undurchlässigkeit und gute Durchlässigkeit für Seidenpepton geprüft waren, in Chloroformwasser, das mit Toluol überschichtet war, aufbewahrt. Während der Dialyse wurde der Schlauchinhalt mit viel Toluol überschichtet. Der Außenflüssigkeit wurden Chloroform und Toluol zugefügt. Eine erschöpfende Dialyse war nicht durchführbar, ohne die Gefahr des Eiweißabbaues durch Bakterientätigkeit heraufzubeschwören. Zahlreiche Versuche ergaben, daß es wohl möglich ist, 2—3 Tage wenigstens praktisch „steril“ zu dialysieren. Für noch längere Zeit konnte eine Gewähr für Sterilität nicht übernommen werden. Es besteht kein Zweifel, daß es durch besondere Maßnahmen, wie z. B. Arbeiten bei tiefen Temperaturen, Schaffung besonderer, abschließbarer Apparate, sich ermöglichen läßt, beliebig lange Zeiten ohne die Gefahr einer Infektion zu dialysieren. Es bestand für uns keine Möglichkeit, diese Bedingungen zu schaffen, infolgedessen mußten wir uns mit einer kurzfristigen Dialyse begnügen.

Was nun die Versuche selbst anbetrifft, so ist noch folgendes hervorzuheben. Das Blut stammte zum Teil von Pferden, zum Teil von Rindern. Es wurde auf dem Schlachthof unter Kontrolle direkt aus der Karotis aufgefangen und geschlagen oder aber mit Fluornatriumzusatz geschüttelt. Die meisten Versuche sind mit Serum und nicht mit Plasma durchgeführt worden. Bei der Verwendung von Plasma ereignete es sich wiederholt, daß nachträglich Gerinnung eintrat und dabei auch die Durchlässigkeit des Dialysierschlauches litt. Bei Verwendung von Plasma war der Außenflüssigkeit auch Fluornatrium zugefügt worden. Trotzdem kam es zur Gerinnung. Das Blut wurde sofort zentrifugiert. Das Plasma oder Serum wurde dann in den Dialysierschlauch eingefüllt und dieser nach erfolgtem sicherem Abschluß mittels Klemmen und Bindfaden ganz in die Außenflüssigkeit versenkt. Läßt man den Schlauch aus dieser herausragen, dann lassen sich In-

fektionen nicht vermeiden. Im Durchschnitt wurde 1 l Serum gegen 50 l Wasser dialysiert¹⁾.

Es sind im ganzen 10 l Blutplasma vom Rind dialysiert worden und 5 l vom Pferde, ferner 50 l Pferdeserum und 500 l Rinderserum. Die Versuche erstreckten sich über 6 Jahre. Das Dialysat wurde jeweilen sofort unter vermindertem Druck bei etwa 40—50 Grad zur Trockene verdampft. Es waren gewaltige Flüssigkeitsmengen zu bewältigen.

Die Verarbeitung des bei dem Eindampfen verbleibenden Rückstandes erfolgte in verschiedener Weise. Zunächst sei hervorgehoben, daß wir in keinem Falle Produkte nachweisen konnten, die Biuretreaktion zeigten. Peptone bzw. diese Reaktion gebende Polypeptide waren somit ausgeschlossen. Es blieb noch die Möglichkeit, daß im Blutplasma bzw. -serum Produkte vorhanden sind, die zwar die Biuretreaktion nicht geben, jedoch aus mehr als einer Aminosäure bestehen. Das Auffinden solcher Verbindungen wäre von großer Bedeutung. Wir suchten ihrer durch Extraktionsmittel (Methylalkohol, Aceton usw.) habhaft zu werden und ferner durch Fällungsmittel (Quecksilbersulfat, -chlorid, -acetat, Silbernitrat, Phosphorwolframsäure). Ein bestimmter Erfolg war nicht zu verzeichnen.

Die Diaminosäuren wurden in gewohnter Weise nach der Methode von Kossel und Kutscher nachgewiesen. Zur Gewinnung der Monoaminosäuren wurden zwei Wege eingeschlagen. Einmal kam die Estermethode von Emil Fischer zur Anwendung, und dann versuchten wir auch die einzelnen Aminosäuren durch direkte Kristallisation bzw. durch Überführung in Derivate (Kupfersalze, Phenylisocyanat-, β -Naphthalinsulfoverbindung) zu gewinnen.

Die einzelnen Aminosäuren wurden alle nach ihren Eigenschaften (Aussehen der Kristalle, Löslichkeit, Drehungsvermögen), ihrem Stickstoffgehalt und zumeist auch durch den Gehalt an Aminostickstoff identifiziert. Ferner wurden, falls solche bekannt waren, besondere Reaktionen ausgeführt

¹⁾ Aus äußeren Gründen mußte die Dialyse wiederholt nach 8 Stunden abgebrochen werden, meistens wurde sie zweimal in 10 Stunden durchgeführt.

(Xanthoproteinprobe, Millon, Glyoxylsäureprobe, Schwefelbleiprobe), und endlich wurden fast durchweg noch Derivate dargestellt und untersucht¹⁾.

Das Ergebnis der Untersuchung ist: Im Blutplasma bezw. -serum lassen sich alle bis jetzt bekannten Aminosäuren nachweisen. Über die Mengenverhältnisse, in denen sie vorhanden sind, können keine bestimmten Angaben gemacht werden, einmal, weil die Dialyse nicht erschöpfend durchgeführt wurde, und dann wurde der Verdampfungsrückstand des Dialysates nach mehreren Methoden untersucht. Es wurde auch noch auf Amine und ferner auf etwaige neben Traubenzucker vorkommende Kohlehydrate, auf Abkömmlinge von Nukleinsäuren und solche der Fette und Phosphatide geprüft. Die Ergebnisse dieser Versuche sind noch nicht spruchreif. Die Mengen der isolierten Aminosäuren waren ganz beträchtlich. Die Gesamtmenge der Aminosäuren, die zur Untersuchung kamen, betrug im reinen Zustand etwas über 100 Gramm.

¹⁾ Von der Mitteilung der zahlreichen Belege muß im Interesse des Raumes Abstand genommen werden.