XXX. *A Description of several New Species of Plants from New Holland.* By Edward Rudge, Esq. F.R.S. A.S. and L.S.

Read February 19, 1811.

DODONÆA CUNEATA.

Octandria monogynia.

Tab. XIX.

DODONÆA caule parum angulato, foliis late obcuneatis, acuminulatis.

Frutex erectus: *Rami* teretiusculi, glabri.

Folia alterna, late obcuneata, apice retusa cum parvo acumine, basi in petiolum brevissimum attenuata.

Paniculæ terminales, et ex axillis supremis, erectæ, multifloræ, ramis ramulisque divaricatis.

Flores numerosi.

Calyx tetraphyllus, utrinque tomentosus, foliolis ovatis, patentibus.

Corolla nulla.

Stamina octo. *Filamenta* brevissima, basi germinis inserta. *Antheræ* bilobæ, ovatæ, parum incurvæ, sulcatæ, calyce paulo longiores.

Pistillum: *Germen* triquetrum, basi villosum. *Stylus* crassus.

Stigma simplex.

Habitat prope Port Jackson in Novâ Hollandiâ.

TAB.

Dodonaea cuneata.

Dodonaea asplenifolia.

TAB. XIX. Planta magnitudine naturali.

- a.* Flos integer.
- b.* Calyx cum Pistillo.
- c.* Antheræ fronte et latere visæ.
- d.* Pistillum.

DODONÆA ASPLENIFOLIA.

Tab. XX.

D. foliis oblanceolatis, basi in petiolum attenuatis, apice tridentatis; floribus terminalibus axillaribusque; ramis triquetris.

Frutex erectus, caule ramisque acute angulatis.

Folia sesqui ad duos et dimidium pollices longa, oblanceolata, apice sæpius tridentata, valde gummosa, uninervia.

Flores numerosi, paniculati, in axillis supremis terminalibusque erecti.

Calyx tetraphyllus, extus dense pubescens, foliolis ovatis, patentibus.

Corolla nulla.

Stamina octo, interdum novem. *Filamenta* brevia, crassa, basi germinis inserta. *Antheræ* oblongæ, bilobæ, arcuatæ, sulcatæ, apice acuminatæ, conniventes.

Pistillum: *Germen* trilobum, hispidum. *Stylus* triqueter.

Habitat prope Port Jackson in Novâ Hollandiâ.

TAB. XX. Planta magnitudine naturali.

- a.* Flos integer.
- b.* Calyx cum Pistillo.
- c.* Antheræ fronte, dorso et latere visæ.
- d.* Pistillum.

PHILO-

PHILOTHECA.

CHARACTER GENERIS. Omnia ut in Eriostemone, sed Habitus longe alius ericoideus ramis cicatrizatis; Flores terminales et Filamenta inferne dilatata in Thecam nudam, unde nomen.

PHILOTHECA AUSTRALIS.

Monadelphica decandria.

Tab. XXI.

P. foliis linearibus, obtusis; floribus terminalibus.

Eriostemon salsolifolia, *Smith in Rees Cycl.*

Frutex erectus, ramosus.

Caulis teres.

Rami longi, oppositi, divergentes, angulati, inferne cicatricibus scabri.

Folia numerosissima, fere imbricata, brevissime petiolata, linearia, carnosa, obtusa, supra plana, subtus convexa, glandulis parvis aspersa.

Flores terminales, pedunculati, pedunculis basi minute bracteatis.

Calyx quinquefidus, laciniis ovatis.

Petala quinque, sessilia, patentia, recurva.

Stamina: *Filamenta* decem, quinque longiora, inferne in thecam fere glabram connata, inde villosa. *Antheræ* ellipticæ, apice obtuso.

Pistillum: *Germen* quinquelobum. *Stylus* staminibus brevior, villosus. *Stigma* obtusum.

Capsulæ duæ vel tres perfectæ, ovatæ, compressiusculæ, acuminatæ, rugosæ, introrsum dehiscentes.

Semina solitaria, reniformia, arillata, atra.

Habitat prope Port Jackson in Novâ Hollandiâ.

TAB.

Philotheca australis

TAB. XXI. Planta magnitudine naturali.

- a.* Flos integer magnitudine auctus.
- b.* Stamina, petalis demptis.
- c.* Pistillum auctius.
- d.* Filamenta cum antheris.
- e.* Anthera cum filamento.
- f.* Capsulæ.
- g.* Capsula antice et postice visa.
- h.* Capsula dehiscens.
- i.* Semen cum arillo.
- k.* Idem arillo dempto.

DARWINIA.

Decandria monogynia.

Character Generis.

Calyx nullus.

Corolla monopetala, infundibuliformis: *tubus* sub apice ventricosus, ad faucem parum coarctatus: *limbus* quinquepartitus, laciniis ovatis, acutis, imbricatis.

Staminum Filamenta decem, brevia, prope tubi apicem duabus seriebus inserta; harum quinque laciniis opposita, deinde corollæ tubo adnata: *Antheræ* reniformes.

Germen superum parum unilaterale, compressum. *Stylus* corollâ plusquam duplo longior. *Stigma* simplex.

DARWINIA FASCICULARIS.

Tab. XXII.

D. foliis linearibus, fasciculatis; capitulis terminalibus.

Frutex ramosissimus, ramis teretibus.

Caulis erectus, fruticosus, valde ramosus, ramis scabris.

Folia numerosissima, linearia, apice subulata, densissime fasciculata, undique punctulis numerosis extantibus glanduloso-punctata subincurva.

Flores terminales, glabri, in capitulis densissime congesti.

Calyx nullus.

Corolla monopetala, infundibuliformis : *tubus* sub apice ventricosus, versus faucem ampliatus et infra parum coarctatus : *limbus* quinquepartitus, laciniae ovatae, apice acutae.

Stamina : *Filamenta* decem, brevia, fauce tubi inserta.

Pistillum : *Germen* laeve *Stylus* filiformis, plusquam duplo corollâ longior. *Stigma* simplex.

Fructum non vidi.

Habitat prope Port Jackson in Novâ Hollandiâ.

I have named this Genus in honour of the late Erasmus Darwin, M.D. of Litchfield, Author of *The Botanic Garden*, *Zoönomia*, and a Translation of the *Systema Vegetabilium* of Linnæus, by a Botanical Society at Litchfield.

Tab. XXII. Planta magnitudine naturali.

- a. Flos integer magnitudine ampliatus.
- b. Corolla aperta.
- c. Anthera dorso et fronte visa.
- d. Pistillum.

PULTENÆA FERRUGINEA.

Decandria monogynia.

Tab. XXIII.

P. foliis obovatis ob curvaturam quasi emarginatis, pilosis ; floribus axillaribus terminalibusque.

Frutex

Darninia fascicularis.

Pultenaea ferruginea.

Frutex ramosissimus.

Caulis teres, pilo albo densissime tecta.

Folia numerosa, alterna, ovata, sub lente punctata, utrinque pilosa.

Stipulae ad basin foliorum duæ, subulatæ, in membranam adeo dilatatæ, ut fere contiguæ.

Flores axillares et terminales, pedunculo brevi tereti piloso.

Bractea duæ, calyce insertæ, laciniæ duas exteriores ejusdem simulantes.

Calyx quinquepartitus, pilosus, laciniis inæqualibus acutis, superioribus duabus approximatis.

Corolla papilionacea, pentapetala, imo calyce inserta, petalis unguiculatis, vexillum subrotundum, alæ oblongæ, carina alarum longitudine, monopetala unguibus distinctis.

Stamina: Filamenta decem, distincta, filiformia, incurva, sub petalis inserta. *Antheræ* biloculares.

Pistillum: Germen ovatum, pilosum. *Stylus* filiformis staminum longitudine. *Stigma* simplex recurvatum.

Habitat prope Port Jackson in Novâ Hollandiâ.

TAB. XXIII. Planta magnitudine naturali.

a. Flos integer magnitudine ampliatus.

b. Petala.

c. Calyx apertus et parte exteriori visus, cum bracteis duabus adnatis.

d. Stamina.

e. Pistillum.

f. Filamentum cum Antherâ.

g. Folium dorso et fronte visum.

PULTENÆA ELLIPTICA.

Tab. XXIV.

P. foliis ellipticis, subtus rare sericeis, concavis, dense imbricatis: stipulis sericeis; floribus axillaribus, terminalibusque.

Pultenæa elliptica, *Smith, Linn. Tr. vol. 9. p. 246.*

Frutex ramosissimus.

Caulis villis albis sericeus.

Folia numerosissima, dense imbricata, elliptica, concava, petiolata; supra glabra; subtus rarè sericea, et punctis numerosis minutissimis tuberculata.

Stipulæ cauli adpressæ, subintrafoliaceæ, villis albis longis sericeæ, sulcatæ.

Flores numerosi, axillares et terminales, pedunculo brevissimo.

Calyx monophyllus, quinquefidus, villosus; laciniis inæqualibus acutis; duabus superioribus latioribus, et brevioribus.

Corolla papilionacea, tetrapetala: *Vexillum* subrotundum, erectum; *Alæ* oblongæ; *Carina* monopetala, alarum longitudine, unguiculata.

Stamina: *Filamenta* decem, distincta, filiformia, incurva, receptaculo inserta. *Antheræ* biloculares.

Pistillum: *Germen* ovatum, pilosum. *Stylus* filiformis, incurvatus, staminum longitudine. *Stigma* simplex.

Habitat prope Port Jackson in Novâ Hollandiâ.

TAB. XXIV. Planta magnitudine naturali.

a. Flos integer parum ampliatus.

b. Petala.

c. Calyx apertus.

d. Pistillum.

e. Filamentum cum Antherâ.

PULTE-

Pultenaea elliptica.

Pultenaea polygalifolia.

PULTENÆA POLYGALIFOLIA.

Tab. XXV.

P. foliis oblongis, obtuse mucronulatis; floribus axillaribus terminalibusque.

Frutex erectus, ramosus, ferrugineus.

Caulis teres, pubescens; rami ramulosi, alterni, erecti, patentés.

Folia alterna, oblonga, breviter petiolata, uninervia, patentia, integerrima, obtuse mucronulata, inferne attenuata, ferruginea; petioli purpurascens.

Stipulæ geminæ, oppositæ ad basin foliorum, subulatæ.

Flores sparsi, axillares et terminales, pedunculati.

Calyx monophyllus, quinquepartitus, laciniis ovatis, subæqualibus, acutis.

Corolla papilionacea, glabra, tetrapetala: *Vexillum* subrotundum, limbo erecto, emarginato, inferne in unguem attenuatum: *Alæ* vexillo longiores, oblongæ: *Carina* monopetala, alarum longitudine, unguiculata.

Stamina: *Filamenta* decem, libera, filiformia, receptaculo inserta.

Antheræ subrotundæ, biloculares.

Pistillum: *Germen* ovatum, pilosum. *Stylus* directione et longitudine staminum, subulatus. *Stigma* simplex, acutum.

Legumen parvum, subrotundum, gibbum, acuminatum, compressiusculum, uniloculare, seminibus duobus reniformibus.

Habitat prope Port Jackson in Novâ Hollandiâ.

Tab. XXV. Planta magnitudine naturali.

a. Flos integer magnitudine auctus.

b. Petala.

c. Calyx.

d. Pistillum.

- d. Pistillum.
- e. Filamentum.
- f. Legumen.
- g. Idem valvulis expansis, seminibus conspicuis.

ERIOSTEMON SALICIFOLIA.

Decandria monogynia.

Tab. XXVI.

E. foliis alternis, spatulatis; floribus solitariis, axillaribus.

Eriostemon Salicifolia, *Smith in Rees's Cyclop.*

Frutex ramis patentibus, ramulis angulatis.

Caulis rectus, angulatus, minute hirtus.

Rami longi alterni, divergentes.

Folia alterna, sessilia, spatulata, apice obtusa, subtus glandulis parvis punctata, avenia, nervo autem sæpe juxta marginem conspicuo.

Flores solitarii, axillares, brevissime pedunculati.

Pedunculi bracteati.

Bracteæ tres vel quatuor, ovales, margine membranaceæ.

Calyx quinquefidus: laciniis obovatis, margine fimbriatis.

Petala quinque, sessilia, patentia, ovato-lanceolata, margine subciliata, germinis basin arcte cingentia.

Stamina: Filamenta decem, quinque longiora, subulata, sub disco inserta, ad basin villosa. *Antheræ* medio filamentorum adnatæ, ovatæ, biloculares.

Pistillum: Germen superum, subrotundum, sulcatum, toro repando cinctum. *Stylus* brevis, villosus. *Stigma* obtusum.

Variat foliis duplo latioribus quam in *Icone* nostrâ.

Habitat prope Port Jackson in Novâ Hollandiâ.

TAB.

Eriostemon salicifolia.

TAB. XXVI. Planta magnitudine naturali.

- a.* Flos integer magnitudine naturali.
- b.* Calyx cum staminibus.
- c.* Idem magnitudine auctus.
- d.* Filamentum et Anthera.
- e.* Pistillum.