Bekämpfung des Kiefernshüttepilzes.

Von Forstassessor Möller in Helldburg.

Angeregt durch den Artikel des Regierungsforstassessors Weber im 12. Heft, Jahrgang 1899, des Forstwissenschaftlichen Centralblattes „Die Bekämpfung der Kiefernshütte im Regierungsbezirk der Pfalz“, und besonders, da sich meine Versuche im Gegensatz zu denen Weber's nur auf Kampaaten beziehen, ferner, weil ich mich mit einzelnen Schlüssen Weber's nicht einverstanden erklären kann, veröffentliche ich meine Versuche und Ansichten über die Bekämpfung des Kiefernshüttepilzes.

Als Mittel zur Bekämpfung verwandte ich im Sommer 1899 das Bespritzen der Nadeln mit der sogenannten Bordelaiser Brühe. Diese Brühe ließ ich genau nach den Angaben des Forstmeisters Friedrich Osterheld herstellen: in einem hölzernen Fasse wurden 2 kg Kupfervitriol in 40 l kochendem Wasser, in einem anderen Fasse gleichfalls in 40 l Wasser 1 kg frisch gebrannter Kalk aufgelöst, nachdem diese Lösungen erkaltet, wurde die Kalklösung in die Kupfervitriollösung gegossen und diese Mischung sodann durch Zugießen von Wasser auf 100 l verdünnt. Mittelfst einer Rebspitze, die einen doppelten Zerstäuber hatte, wurden mit der Brühe unter meiner Leitung folgende Kiefern- und Kampaaten bespritzt:

am 17. Juli im Helldburger Stadtwalde eine 3 a große 1jährige Saat, welche bereits im Frühjahr zum Teil von dem Shüttepilz heimge sucht war,

ferner in einem anderen Kampe 1 Beet diesjährige kräftige Saat;

am 18. Juli in der Lindenauer Gemeindewaldung eine 4 a große, 1 jährige, im Frühjahr bereits ziemlich stark verschüttet gewesene Saat, sowie 2 a diesjährige schwächliche Saat;

am 21. Juli im Helldburger Stadtwalde 2 a 1jährige, noch nicht verschüttet gewesene Saat. Da anhaltend trockene Witterung herrschte, wurde die für letztere Saat bestimmte Brühe um 20 pCt. verdünnt. Bei allen 1jährigen, leider nicht auch bei den diesjährigen, Saaten blieb ein in der Mitte gelegenes Stück unbespritzt und wurde durch eingestechte Reiser kenntlich gemacht. Vom 15. bis 19. August wurden sämtliche angeführten Saaten zum zweitenmale bespritzt.

Der Erfolg trat bereits im Januar am deutlichsten bei der zur Zeit der Bespritzung 1jährigen Saat in der Lindenauer Gemeindewaldung hervor, denn das unbespritzt gebliebene Stück war stark verschüttet und hob sich durch eine braunrote Farbe der Nadeln scharf von den be-

spriigten, noch grünen Nadeln ab. In den übrigen bespriigten Saaten — mit einziger Ausnahme der als schwächlich bezeichneten Saat der Bindenauer Gemeindewaldung, in welcher ein großer Teil der Pflanzen einging, — zeigte sich ungefähr einen Monat später der gleiche Erfolg. Schon hoffte ich, den Pilz für dieses Jahr aus sämtlichen bespriigten Saaten gebannt zu haben, da — vom März ab verfärbten sich auch in den bespriigten, im vorigen Frühjahr bereits verschüttet gewesenen Saaten fast $\frac{3}{4}$ aller Nadeln, und die nähere Untersuchung bestätigte, daß dieselben von dem Schütteilz befallen waren. Die vor der Bespriigung noch nicht verschüttet gewesenen Saaten hingegen blieben bis auf das unbespriigte Stück, welches keine einzige grüne Nadel mehr zeigte, gänzlich schütteilfrei. Aber auch bei den vom März ab noch verschütteten Pflanzen blieb der Erfolg nicht aus, indem einzelne Nadeln mehr oder weniger grün blieben und vor allem die meisten eine kräftige Gipfelknospe, die Bedingung zu weiterem Gedeihen, angelegt hatten, während die Pflanzen der unbespriigten Stücke bis auf höchstens 5pCt. abstarben. Die bespriigten Pflanzen konnten so fast sämtlich zum Versehen benutzt werden und machten sich hierdurch die Kosten der Bespriigung, welche nur gering waren, vielfach bezahlt.

Aus diesen Versuchen lassen sich wohl mit Recht folgende, für die Bekämpfung des Kiefernshütteilzes wichtige Schlüsse ziehen:

1. Die Vordelaifer Brühe ist bei richtiger Anwendung ein wirksames Bekämpfungsmittel des Kiefernshütteilzes.

2. Unbedingt wirkt die Brühe bei noch nicht von dem Schütteilz befallen gewesenen kräftigen Pflanzen.

3. Bei bereits verschüttet gewesenen Pflanzen ist die Wirkung zwar keine vollständige, immerhin ist sie derart, daß die meisten Pflanzen zum Versehen verwandt werden können.

4. Schwächliche diesjährige Pflanzen sind entweder nicht zu bespriigen oder die Lösung ist bedeutend zu verdünnen. —

Allgemein möchte ich im Anschluß hieran die wichtigsten Mittel zur erfolgreichen Bekämpfung des Kiefernshütteilzes kurz dahin zusammenfassen: Auf alle Fälle Vermeidung der Bestandesfaat, welche durch ihren dichten Pflanzenstand und die im Verhältnis zur Pflanzung meist schwächlichen Pflanzen dem Schütteilz günstige Lebensbedingungen bieten, und Anwendung der Pflanzung kräftiger Saatbeet- oder Schulpflanzen, von welchen der Schütteilz durch Bespriigung mit Vordelaifer Brühe ganz oder teilweise ferngehalten worden ist. Erziehung des Pflanzmaterials in dünnen Kampaaten auf kräftigem, möglichst mit Komposterde durch-

mentem, mürbem¹⁾ Boden. Anlage der Kämpfe möglichst an Orten, wo der Schüttepilz noch nicht wahrgenommen, und die nicht in der Hauptwindrichtung naher verschütteter Orte liegen. Wenn ich eingangs erwähnte, daß mich die Nichtübereinstimmung mit einzelnen Schlüssen des Regierungsforstassessors Weber mit zur Veröffentlichung meiner Versuche und Ansichten über die Bekämpfung des Kiefernshüttepilzes bewogen, so bezieht sich dies zunächst darauf, daß Weber die Beschützung der Bestandessaaten empfiehlt, da die ihm mitgeteilten Versuche über Bespritzung der Saatbeete bis auf eine Ausnahme ungünstig lauteten. Warum sollte die Wirkung des Bespritzens im Saatbeete eine weniger gute sein als in Freisaaten? In Saatbeeten mit ihren 1—2jährigen, meist sehr gleichmäßig in Reihen stehenden Pflanzen muß sie doch eine bedeutend bessere sein als in 3—6jährigen Bestandessaaten, da viel eher die Möglichkeit gegeben ist, alle Nadeln mit der schützenden Flüssigkeit zu betauen wie z. B. in 6jährigen, meist sperrig gewachsenen Bestandessaaten. Wahrscheinlich lag die Ursache der Mißerfolge nur darin, daß man diesjährige schwächliche Pflanzen bespritzte, während der Versuch im Forstamt Langenberg, wo die Sämlinge seit einer Reihe von Jahren zum erstenmal schüttefrei blieben, man es leider aber unterlassen hatte, ein Vergleichsbeet unbespritzt zu lassen, jedenfalls — gleich den meinen — einen entschiedenen Erfolg der Bespritzung bedeutet. Sodann kann ich mich mit dem Vorschlag Weber's, die Kultur alljährlich und so lange zu bespritzen, bis dieselbe eine der Schütte unzugängliche Höhe erreicht, ganz und gar nicht einverstanden erklären. Weber berechnet die Kosten der Bespritzung von Bestandessaaten pro Hektar und Jahr auf rund 20 M. Je älter die Kulturen werden, also je mehr Nadeln bespritzt werden müssen, um so höher werden die Kosten sich stellen; werden demnach die Kulturen, wie es nach den aus der Pfalz mitgeteilten Versuchen meist geschehen mußte, bis zum 6. Jahre bespritzt, so stellt die Bespritzung ein Kapital von über 120 M dar, mit dem der Bestand bis zu seinem Abtrieb belastet wird. Ein teurerer Schutz! Wie viel billiger hiergegen ist die ein- oder zweimalige Bespritzung im Saatbeete und die sodannige Verpflanzung der schüttefreien Pflanzen ins Freie! Stellt sich später in den Pflanzungen die Schütte wieder ein, so ist der verursacht werdende Schaden nicht erheblich, denn ich habe in allen Pflanzungen, selbst wenn die Pflanzen bei ihrer Verpflanzung schon etwas verschüttet waren, ein Eingehen der Pflanzen durch die Schütte allein, wie es

¹⁾ Sehr bindige Böden daher erst, nachdem sie mindestens ein Jahr gelegen und öfters durchhackt, zu besäen.

meine Versuche in den Saatbeeten gezeigt haben — niemals wahrgenommen. Meist sind in den Pflanzungen, besonders in den 3—6 jährigen, nur die Nadeln der unteren Zweige befallen, hier und da wohl auch sämtliche Nadeln, allein infolge des Einzelstandes und dadurch kräftigeren Wuchses haben sich stets wieder Knospen gebildet. Darauf, daß die Pflanzung bei weitem früher „eine der Schütte unzugängliche Höhe“ erreicht als die Saat, brauche ich wohl nicht besonders einzugehen.

Mögen diese meine Versuche und Ansichten den Zweck ihrer Veröffentlichung erfüllen, mit dazu beizutragen, daß dem Kiefernschüttepilz überall erfolgreich, doch nicht mit zu großen Kosten, entgegengewirkt wird!

II. Mitteilungen.

Forstliche Studienreise des österr. Reichsforstvereins in den Schwarzwald und die Vogesen.

Der österreichische Reichsforstverein hat in diesem Jahre anlässlich seiner Studienreise, einen weiten Ausflug unternommen, und hat den württembergischen und badischen Schwarzwald durchquert; darnach ging die Reise nach Straßburg im Elsaß, von wo aus sternförmig mehrere Ausflüge in die Umgebung unternommen wurden, der weiteste darunter in die Gegend von Bittsch in Lothringen. Außer einigen kleinen unvermeidlichen Abänderungen wurde das Programm vollinhaltlich absolviert. — Es waren circa 100 Teilnehmer, fast aus allen Gauen der österreichischen Monarchie erschienen und diesen haben sich schon in Freudenstadt mehrere deutsche Fachgenossen aus der Umgebung der durchwanderten Orte angeschlossen. Besonders ehrend für die Versammlung war die Anwesenheit illustrier Persönlichkeiten, so der Professoren Dr. L. Lorey-Tübingen, Geheimrat Dr. R. Geß aus Gießen, Oberforsttrat Dr. Graner, Oberforsttrat Prof. Dr. Siefert, Oberforstmeister Key u. a. m. Die Führung übernahm der Vizepräsident des österreichischen Forstvereines Wilhelm Freiherr v. Berg und Hofrat Prof. Adolf Ritter von Guttenberg.

In Württemberg selbst währte der forstliche Ausflug fast 2 Tage und übernahm Herr Oberforsttrat Dr. Graner die Leitung; während im badischen Schwarzwalde, wo ein Tag zugebracht wurde, Herr Oberforsttrat Prof. Siefert die Führung innehatte. — Am 23. Mai um 8 Uhr morgens wurde durch das romantische Wolfsthal die Wagenfahrt nach Wolfach angetreten und von hier ging die Reise per Bahn, durch das Kinzigthal nach Straßburg. —