Jahr, aber anscheinend nicht constant ist. In den ersten drei Jahren hat sich der Lichtwechsel in etwas weniger, in den letzten in etwas mehr als einem Jahr vollzogen. Es lässt sich demnach auch für die nächsten Jahre nicht viel mehr folgern, als was in den letzten beobachtet worden ist, nämlich dass das grösste Licht schon im October erwartet, aber wahrscheinlich erst im November beobachtet werden kann. Die grösste bisher beobachtete Helligkeit (im November) war 8^m , die kleinste (im April) $10^m.3$.

3) Ch. 7260. Z Aquilae.

Von diesem Stern, dessen Veränderlichkeit Herr Dr. L. de Ball in A. N. 3269 angezeigt hat, konnten im Jahre 1895 zwei Maxima beobachtet werden, aus denen sich die Periode zu nahe 130 Tagen ergibt. Der Stern wurde im 6 zölligen Refractor zum ersten Mal vom 27. Mai bis zum 18. August, zum zweiten Mal vom 10. October an gesehen; am 9. December hatte er bei abnehmendem Licht die immer noch ansehnliche Helligkeit $9^m.7$, weiter aber konnte er trüben Wetters und dann des Mondscheins wegen nicht verfolgt werden.

Das erste Maximum war nach meinen Beobachtungen am 30. Juni mit einer Unsicherheit von etwa 2 Tagen, wobei die Helligkeit des Veränderlichen zwischen der von BD. $-6^{\circ}5420$ ($9^m.2$) und 5421 ($8^m.5$), aber etwas näher der grösseren, somit $8^m.8$ war. Das zweite Maximum kann auf den 7. November verlegt werden, wozu aber bemerkt werden muss, dass der Stern zwischen dem 2. und 12. November trüben Wetters wegen nicht beobachtet worden ist; die grösste hier beobachtete Helligkeit war $9^m.0$, nämlich bedeutender als die des Sterns $9^m.2$ um etwa $\frac{1}{3}$ der Differenz zwischen diesem Stern und dem Stern $8^m.5$.

Wien 1896 Febr. 3.

Nachtrag vom 10. April. T Aurigae erscheint gegenwärtig schon um eine volle Grössenklasse schwächer als der Nachbarstern F. Der Stern bei $8^h 5^m 23^s +44^{\circ} 24'6''$ (1855.0) hat sich auch jetzt noch nicht merklich verändert; er ist noch immer um etwa $0^m.3$ schwächer als der Stern $8^m.4$ AG. Bonn 6478, somit $8^m.7$.

J. H.

Durch die hier gefundene Periode von 130 Tagen lassen sich mit diesen beiden Erscheinungen auch die in A. N. 3269 mitgetheilten Beobachtungen vom Jahre 1894 vereinigen.

4) Ch. 7909. S Piscis austrini.

Seit 1893 sind zwei Maxima beobachtet worden, nämlich 1893 Sept. 2 und 1895 Nov. 25, und zwar jedesmal mit einer Unsicherheit von etwa 2 Tagen. Beim ersten war der Veränderliche um 2 Stufen heller als der Stern $8^m.5$ Cord. DM. $-28^{\circ}17554$, und um 4 bis 5 Stufen heller als der hier zu $8^m.8$ geschätzte Stern Cord. DM. $-28^{\circ}17587$ ($8^m.6$), somit $8^m.3$; beim zweiten um 2 Stufen heller als der Stern $8^m.8$ und etwas schwächer als der Stern $8^m.5$, somit nahe an $8^m.6$. Eine Aenderung der in A. N. 3173 gefundenen Periode von 272 Tagen erscheint auf Grund dieser neueren Beobachtungen nicht nöthig.

5) Bei dieser Gelegenheit sei auch mitgetheilt, dass ich den in der Nähe des von Prof. E. Becker (A. N. 3281) vermissten Sterns BD. $+22^{\circ}3272$ befindlichen, dem Stern BD. $+22^{\circ}3274$ (AG. Berlin 6299) um 12^s vorangehenden Stern mit dem 6 zölligen Refractor, für welchen er an der Grenze der Sichtbarkeit steht, seit 30. April 1895 wiederholt angesehen, aber an ihm keine Helligkeitsänderungen bemerkt habe, die nicht auf Verschiedenheiten im Zustand der Luft zurückgeführt werden könnten.

6) Der Stern im Luchs bei $8^h 5^m 23^s +44^{\circ} 24'6''$ (1855.0), auf den ich in A. N. 3332 aufmerksam gemacht habe, erscheint mir jetzt noch immer nahe so hell wie am 10. Januar, so dass auf eine Veränderlichkeit vorläufig nicht geschlossen werden kann.

J. Holetschek.

New Variable Stars.

By E. C. Pickering.

An examination of the Henry Draper Memorial photographs of stellar spectra by Mrs. Fleming has led to the discovery of fourteen new variable stars of long period, in addition to those previously announced. The spectrum of the fifth star in the following list is of the fourth type. All of the others have spectra of the third type, having also the hydrogen lines bright, and it was this peculiarity which led to their discovery. The variability has been shown by comparison of a large number of photographs, and the variation has been confirmed in each case by the writer. The following table gives the constellation, the catalogue designation of the star, the approximate right ascension and declination for 1900, the number of plates examined,

the photographic magnitude, when brightest and faintest as derived from these plates, and the epoch and period as obtained from the material now available. The epoch is expressed in Julian Days omitting the constant 2410000. It is needless to caution astronomers that these elements cannot safely be used to predict future maxima with accuracy. They generally represent the photographic magnitudes during the last eight years, with an average deviation of one or two tenths of a unit. As, however, the periods and light curves in many cases change, the true law can be determined only from long series of observations. The date of the next maximum, as indicated by the formula, is given in the final column.

Constellation	Designation	RA. 1900	Decl. 1900	No. Plates	Magn.		Epoch	Period	Maximum 1896
					Br.	Ft.			
Sculptor	Cord. DM. — 39°16	0 ^h 3 ^m 6	— 39° 47'	43	8.9	< 12.1	165	295	May 25
Columba	Cord. GC. 6135	5 15.6	— 33 48	24	7.6	11.3	134	225	June 23
Canis Minor	—	7 1.5	+ 9 1	40	10.3	< 13.7	174	364	Sept. 11
Virgo	BD. + 5°2708	12 57.6	+ 5 43	51	8.8	9.7	—	—	—
Apus	—	14 59.3	— 71 40	58	9.0	< 11.4	—	—	—
Sagittarius	Cord. DM. — 33°13234	18 21.4	— 33 23	48	8.2	12.3	267	316	July 2
Sagittarius	BD. — 19°5347	19 8.1	— 19 2	47	9.7	11.1	—	—	—
Sagittarius	—	19 8.7	— 18 59	48	9.9	< 13.3	—	—	—
Pavo	—	19 39.5	— 72 1	66	7.6	12.1	156	243	Aug. 29
Microscopium	Cord. GC. 28038	20 21.8	— 28 35	49	7.4	8.4	—	—	—
Pavo	—	20 47.2	— 63 5	43	9.6	< 12.3	—	—	—
Grus	Cord. DM. — 38°15044	22 19.9	— 38 4	57	8.6	11.0	—	—	—
Grus	—	22 19.9	— 48 57	48	7.2	12.3	90	490	May 10
Aquarius	BD. — 16°6379	23 47.1	— 16 25	42	8.2	9.3	—	—	—

The third of these stars is near the border of Monoceros.

Cord. DM. — 33°13234 was suspected of variability by Dr. Thome (Annals Cord. Observ., Vol. XVII p. XIII).

Cord. GC. 28038 is in Sagittarius according to the Uranometria Nova and Heis.

Harvard College Observatory, March 10, 1896.

Edward C. Pickering.

Zu den Venus-Beobachtungen der Herren Mascari und Cerulli in A. N. 3329 u. 3331.

So interessant auch die in A. N. 3329 und 3331 veröffentlichten Beobachtungen der Herren Mascari und Cerulli an sich sind, so vermögen sie dennoch nicht, mich in meiner Ueberzeugung, dass die Rotation der Venus jener unserer Erde nahezu gleichkommt, zu erschüttern. An demselben Tage, an welchem Herr Mascari seine Figur 19 anfertigte, nahm ich fünf Zeichnungen auf (von 4–23¹/₂^h M. E. Z.), aus denen ich mit Sicherheit das Weiterücken der Flecke festzustellen vermochte. Alle jene Flecke, welche Herr Mascari während 11 Tagen sah und in seiner Figur 20 zusammenstellte, finden sich auch in meinen in dem gleichen Zeitraum aufgenommenen 13 Zeichnungen vertheilt und zwar zeigen auch diese klar und deutlich eine Vorwärtsbewegung der Flecke, welche einer 24 stündigen Rotation entsprechen würde. Auch meine 13 nach der unteren Conjunction aufgenommenen Zeichnungen, welche theilweise wunderbar scharf sichtbar gewesene Flecke enthalten, haben die von mir berechnete 24 stündige Rotation nur zu bestätigen vermocht.

Was die Zeichnung des Herrn Cerulli anbelangt, so freut es mich feststellen zu können, dass alle auf ihr sichtbaren Gebilde sich auf meinen Zeichnungen vom November vorfinden, und zwar noch detaillirter und zahlreicher, wie aus den 8 in Nr. 1602 der »English Mechanic« veröffentlichten Zeichnungen hervorgeht. Mit Herrn Cerulli stimme ich auch damit überein, dass die Flecke im November mit

wunderbarer Deutlichkeit zu sehen waren. Dagegen gelange ich trotzdem zu ganz anderen Schlüssen, wie ich in meiner im Herbst zu veröffentlichenden Abhandlung über die Venusrotation nachweisen werde.

Für ungerechtfertigt halte ich Herrn Cerulli's Vermuthung, ich sei dadurch getäuscht worden, dass mein Fernrohr nicht im Stande sei, schwächere Flecke beständig zu zeigen, weil diese in seinem auf 7 Zoll abgeblendeten Fernrohre verschwanden. Dass die Leistungsfähigkeit eines Fernrohrs in Bezug auf feines Planetendetail nicht von der Grösse des Objectivs abhängt, dürfte wohl durch meine zahlreichen Entdeckungen von in den grössten Fernrohren unsichtbaren, feinen Mondrillen (über 200 bisher) und Kraterlöchern erwiesen sein, sowie durch die 67 Marscanäle, welche unser siebenzölliger Reinfeld der Refractor zeigte, während gleichzeitig grössere Fernrohre keinen einzigen darzustellen vermochten.

Und was endlich die Rotationsfrage betrifft, so kann ich nur wiederholen, dass ich die Weiterbewegung der Flecke mit eigenen Augen gesehen habe, nicht nur einmal, sondern sehr oft, und nicht nur ich, sondern auch viele andere geschulte Beobachter, welche alle gleich mir zu der Annahme einer etwa 24 stündigen Rotation gelangten: Trouvelot, Stanley Williams, Lohse, Niesten, Stuyvaert etc. durch directe Beobachtung, Flammarion auf Grund der Polarflecke.

Manora-Sternwarte, Lussinpiccolo, 1896 Febr. 11.

L. Brenner.

Inhalt zu Nr. 3347. O. Jese. Die Höhe der leuchtenden Nachtwolken. 161. — Ph. Fauth. Ueber das Aussehen des Planeten Jupiter. 167. — E. Hartwig. Beobachtung eines dunklen Flecks auf Jupiter. 167. — E. Lamp. Mikrometrische Messungen auf Jupiter. 169. — El bolido del 10 de Febrero de 1896. 169. — M. Merino. Zusatz hierzu. 169. — J. Holetschek. Beobachtungen von veränderlichen Sternen. 171. — E. C. Pickering. New Variable Stars. 173. — L. Brenner. Zu den Venus-Beobachtungen der Herren Mascari und Cerulli in A. N. 3329 u. 3331. 175.