ASTRONOMISCHE NACHRICHTEN.

№ 1379.

Allgemeine Jupiterstörungen der Pomona, von Herrn Dr. O. Lesser.

Für die Pomona habe ich bisher die Ephemeriden geliefert. Da nun die aus 5 Oppositionen abgeleiteten Elemente sich in der letzten Erscheinung sehr gut bewährt haben, so schien es mir vortheilhaft, auch die allgemeinen Störungen zu entwickeln. Ich gebe hier zwar nur die Jupiterstörungen erster Ordnung, habe indessen die Berechnung der Glieder zweiter Ordnung schon vorbereitet, deren Berücksichtigung sich sogar nach den folgenden Resultaten als nothwendig erweist. — Die der Ableitung der Elemente zu Grunde liegenden Normalörter sind:

	Mittl. Berl. Zt.	α	δ	Beob.
1)	1854 Nov. 11,0	33° 9' 52"7	+13° 27' 0"6	19
2)	1855 Jan. 14,0	30 56 3,7	+11 7 28,7	12
3)	1856 März 3,0	143 33 38,3	+ 5 30 59,5	14
4)	1857 Juli 15,0	280 34 32,9	-14 59 39,2	19
5)	1858 Oct. 27,0	18 4 36,0	+10 8 0,5	4
6)	1860 Jan. 29,0	126 37 35,2	+ 9 54 29,3	10

Mit Benutzung von neu berechneten speciellen Jupiter- und Saturnstörungen haben sich nun folgende Elemente ergeben:

	1855 Jan. 5,0 m. Berl. Zt.	
M	= 223° 13' 31"63	
π	= 194 25 42,48	Mittl. Äquin. 1860,0
Ω	= 220 52 42,94	
i	= 5 29 3,39	
ϕ	= 4 43 43,74	
$\log a$	= 0,4127627	
μ	= 852"82990	

welche die Normalörter so darstellen:

	R—B.	
	$\Delta \alpha$	$\Delta \delta$
1)	+1"0	-1,1
2)	-1,7	+0,3
3)	-0,4	-2,3
4)	0,0	-1,4
5)	+0,8	-0,6
6)	-0,2	+0,7

Nach 3 Berliner Beobachtungen vom Juni 1861 war der Fehler der Ephemeride ungefähr +4"5 in α und -1"5 in δ , im Sinne R—B. genommen, eine bei den ungewöhnlich grossen Störungen sehr befriedigende Übereinstimmung. Die vorstehenden Elemente liegen nun den Störungsrechnungen zu Grunde, nachdem sie aber erst auf die Epoche 1855 Jan. 5,0 reducirt worden sind.

Bezeichnet man die Störung der mittleren Anomalie mit $\mu \delta z$, die des Logarithmus des Radiusvectors mit $\log(1+\nu)$ und die der Breite mit $\frac{r \delta s}{a \cos i}$, so erhält man nach Hansen's Methode folgende Werthe:

i, i'	$\mu \delta z$		ν		$\frac{r \delta s}{a \cos i}$	
	$\cos$	$\sin$	$\cos$	$\sin$	$\cos$	$\sin$
0,0			C		-1"014	
0,0	-33"3010 μt		+ 0"0109 μt		- 0,2241 μt	
1,0	- 0,40	+ 11"79	- 2,69	- 0"13	+ 1,13	- 1"36
1,0	- 6,7917 μt	- 0,2633,4 μt	+ 0,1321 μt	- 3,39585 μt	+ 2,7182 μt	+ 2,2118 μt
2,0	- 0,40	- 0,15	- 0,12	- 0,32	+ 0,19	- 0,25
2,0	+ 0,1400 μt	+ 0,0054,5 μt				
3,0	+ 0,03	- 0,01	+ 0,01	+ 0,02	- 0,02	+ 0,01
-2-1	- 0,09	- 0,07	- 0,03	+ 0,05	+ 0,05	+ 0,04
-1-1	+ 1,40	+ 1,58	+ 1,29	- 0,90	- 1,48	- 1,74
0-1	+ 1,68	+ 39,85	+ 3,05	- 0,23	- 3,87	- 3,73,5
1-1	+ 6,32	+ 169,99	- 59,00	+ 2,16	+ 3,10	- 0,74
2-1	- 0,44	- 1,63	- 0,93	- 0,21	+ 1,47	- 2,01
3-1	+ 0,14	- 0,10	+ 0,07	+ 0,12	- 0,07	+ 0,09
4-1	- 0,01	+ 0,01		- 0,01	+ 0,01	

i, i'	$\mu \delta z$		ν		$\frac{r \delta s}{a \cos i}$	
	$\cos$	$\sin$	$\cos$	$\sin$	$\cos$	$\sin$
-2-2	- 0,01			+ 0,01	+ 0,01	+ 0,005
-1-2	+ 0,11	+ 0,07	+ 0,09	- 0,14	- 0,21	- 0,19
0-2	+ 3,74	+ 6,57	- 0,78	- 1,09	- 3,785	- 4,06
1-2	+ 24,18	+ 310,08	- 71,08	+ 5,48	+ 5,38	+ 5,69
2-2	+ 20,60	+ 259,72	- 155,45	+ 12,33	+ 2,08	- 1,00
3-2	- 0,35	- 6,07	- 0,06	+ 0,10	- 0,315	+ 0,48
4-2	- 0,05	+ 0,02	- 0,02	- 0,05	+ 0,02	- 0,02
<hr/>						
-1-3	+ 0,10	- 0,02	+ 0,01	- 0,02	- 0,03	- 0,02
0-3	- 4,37	- 3,33	+ 0,41	+ 2,00	+ 5,38	+ 4,99
1-3	+ 241,49	+ 1491,19	+ 87,83	- 12,02	+ 3,94	+ 3,63
2-3	- 90,83	- 900,13	+ 438,01	- 44,33	- 31,025	- 26,76
3-3	- 1,15	- 7,08	+ 18,39	- 2,18	- 0,30	+ 0,27
4-3	+ 0,01	+ 0,50	+ 0,16	- 0,06	+ 0,09	- 0,15
5-3	+ 0,02	- 0,01	+ 0,01	+ 0,02	- 0,005	+ 0,01
<hr/>						
-1-4					- 0,01	
0-4	- 0,09	- 0,04		+ 0,07	+ 0,16	+ 0,11
1-4	+ 0,14	+ 3,10	+ 2,46	- 0,38	+ 0,855	+ 0,76
2-4	- 11,65	- 67,69	+ 24,71	- 4,15	- 2,22	- 2,03
3-4	- 3,50	- 25,19	+ 16,90	- 2,36	- 1,22	- 0,85
4-4	+ 0,93	+ 6,00	- 4,34	+ 0,68	+ 0,08	- 0,11
5-4	+ 0,02	- 0,05	- 0,10	+ 0,04	- 0,03	+ 0,05
6-4	- 0,01		- 0,01	- 0,01		
<hr/>						
0-5	- 0,01	- 0,01		+ 0,01	+ 0,02	+ 0,01
1-5	- 0,22	+ 0,13	+ 0,41	- 0,02	+ 0,43	+ 0,32
2-5	- 11,80	- 42,37	+ 8,13	- 2,10	- 0,41	- 0,34
3-5	- 5,86	- 29,71	+ 16,92	- 3,37	- 1,94	- 1,55
4-5	+ 1,06	+ 5,84	- 3,82	+ 0,69	+ 0,27	+ 0,14
5-5	- 0,31	- 1,60	+ 1,26	- 0,25	- 0,025	+ 0,045
6-5	- 0,01	- 0,01	+ 0,05	- 0,02	+ 0,01	- 0,02
<hr/>						
+1-6	+ 0,11	- 0,01	- 0,08	- 0,04	- 0,21	- 0,12
2-6	- 11,14	- 29,81	- 3,31	+ 1,15	- 0,31	- 0,23
3-6	+ 9,39	+ 32,29	- 15,30	+ 4,43	+ 2,09	+ 1,59
4-6	+ 0,62	+ 2,87	- 2,37	+ 0,55	+ 0,28	+ 0,19
5-6	- 0,35	- 1,60	+ 1,21	- 0,26	- 0,08	- 0,03
6-6	+ 0,11	+ 0,49	- 0,40	+ 0,09	+ 0,01	- 0,02
7-6	+ 0,01	+ 0,01	- 0,03	+ 0,01		+ 0,01
<hr/>						
+1-7					- 0,01	
2-7	- 0,07	- 0,26	- 0,17	+ 0,06	- 0,07	- 0,04
3-7	+ 1,74	+ 4,21	- 1,48	+ 0,59	+ 0,18	+ 0,12
4-7	+ 0,71	+ 2,32	- 1,47	+ 0,46	+ 0,23	+ 0,16
5-7	- 0,28	- 1,04	+ 0,73	- 0,20	- 0,085	- 0,05
6-7	+ 0,14	+ 0,54	- 0,44	+ 0,11	+ 0,03	+ 0,01
7-7	- 0,04	- 0,16	+ 0,14	- 0,04		+ 0,01
8-7		- 0,01	+ 0,01	- 0,01		
<hr/>						
+2-8	+ 0,01	- 0,03	- 0,03	+ 0,01	- 0,04	- 0,015
3-8	+ 2,05	+ 3,62	- 0,58	+ 0,31	+ 0,025	+ 0,01
4-8	+ 1,10	+ 2,65	- 1,46	+ 0,62	+ 0,27	+ 0,17
5-8	- 0,20	- 0,60	+ 0,38	- 0,13	- 0,06	- 0,04
6-8	+ 0,11	+ 0,36	- 0,28	+ 0,08	+ 0,03	+ 0,01
7-8	- 0,06	- 0,20	+ 0,17	- 0,05	- 0,01	
8-8	+ 0,02	+ 0,06	- 0,05	+ 0,01		
9-8			- 0,01			

i, i'	$\mu \delta z$		ν		$\frac{r \delta s}{a \cos i}$	
	$\cos$	$\sin$	$\cos$	$\sin$	$\cos$	$\sin$
+2-9	-0,01				+0,01	
3-9	+0,55	+0,73	+0,13	-0,09	+0,02	+0,01
4-9	-0,78	-1,41	+0,65	-0,36	-0,13	-0,01
5-9	-0,11	-0,26	+0,19	-0,08	-0,04	-0,02
6-9	+0,07	+0,19	-0,14	+0,05	+0,02	+0,01
7-9	-0,05	-0,14	+0,11	-0,04	-0,01	-0,01
8-9	+0,03	+0,08	-0,07	+0,02		
9-9	-0,01	-0,02	+0,02	-0,01		
<hr/>						
+3-10		+0,01	+0,01		+0,01	
4-10	-0,20	-0,25	+0,08	-0,06	-0,01	-0,01
5-10	-0,10	-0,17	+0,11	-0,06	-0,03	-0,01
6-10	+0,04	+0,09	-0,06	+0,03	+0,01	+0,01
7-10	-0,03	-0,08	+0,06	-0,02	-0,01	-0,01
8-10	+0,02	+0,06	-0,05	+0,02		
9-10	-0,01	-0,03	+0,03	-0,01		
10-10		+0,01	-0,01			
<hr/>						
+3-11	-0,01					
4-11	-0,37	-0,29	+0,04	-0,04		
5-11	-0,17	-0,23	+0,12	-0,09		
6-11	+0,03	+0,05	-0,03	+0,02		
7-11	-0,02	-0,04	+0,03	-0,01		
8-11	+0,01	+0,03	-0,03	+0,01		
9-11	-0,01	-0,03	+0,02	-0,01		
10-11	+0,01	+0,01	-0,01			
<hr/>						
+4-12	+0,02	+0,02				
5-12	+0,08	+0,07	-0,03	+0,03		
6-12	+0,01	+0,02	-0,01	+0,01		
7-12	-0,01	-0,02	+0,01	-0,01		
8-12	+0,01	+0,02	-0,01	+0,01		
9-12	-0,01	-0,02	+0,01	-0,01		
10-12	+0,01	+0,01	-0,01	+0,01		
11-12		-0,01	+0,01			

Die Form der Argumente ist bekanntlich: $i E - i' \left(M_0' + \frac{\mu'}{\mu} (E - M_0) \right)$.

Interessant sind diese Störungen durch einige grosse Coefficienten; das grösste Glied ist $= +1491''19$, das nächstfolgende $= -900''13$. Von den bis jetzt berechneten Planeten hat demnach Pomona nächst Lutetia die grössten Störungen. Die Ursache dieser Grösse ist leicht zu finden, sie liegt wieder in einem kleinen Integrationsdivisor. Dieser Fall kann, beiläufig bemerkt, bei der Thetis und Hestia ganz ausserordentliche Coefficienten erzeugen. Nach den im Berliner Jahrbuch für 1864 gegebenen Elementen wird z. B. für die Thetis $1 - 3 \frac{\mu'}{\mu} = +0,016255$, für die Hestia $1 - 3 \frac{\mu'}{\mu} = -0,015455$, wo μ' die mittlere Bewegung Jupiters bezeichnet. Ist nun bei der Hestia eins der zu dem Argument $\left\{ \left(1 - 3 \frac{\mu'}{\mu} \right) E - i' A \right\}$ gehörenden Glieder der sogenannten Störungfunction nur $0''5$ gross, so kann in $\mu \delta z$ ein Coefficient von $6000''$ entstehen.

Es kann zuweilen von Nutzen sein, die nur durch die Integration merklich werdenden Störungsglieder approximativ aus der Störungfunction und deren Differentialquotienten zu ermitteln. Zu den fraglichen Gliedern gehören erstens diejenigen, welche das Quadrat eines kleinen Divisors erhalten, und zweitens die, welche bloss mit der ersten Potenz derselben verbunden sind, aber nicht durch Multiplication mit der Excentricität wieder in ihrem Betrage reducirt werden.

Die Störung der wahren Länge wird ausgedrückt durch:

$$\delta v = \delta \pi + \left(\frac{a}{r} \right)^2 \cos \varphi \delta M + (2 - e \cos E - e^2) \left(\frac{a}{r} \right)^2 \sin E \delta \varphi.$$

Wirft man die Störung auf die mittlere Länge, so hat man mit $\frac{dM}{dv} = \left(\frac{r}{a} \right)^2 \frac{1}{\cos \varphi}$ zu multipliciren, und es folgt so:

$$\mu \delta z = \left(\frac{r}{a} \right)^2 \frac{\delta \pi}{\cos \varphi} + \delta M + (2 - e \cos E - e^2) \frac{\sin E}{\cos \varphi} \delta \varphi.$$

Bezeichnet man aber die mittlere Länge für die Epoche mit L , so ist $\frac{dM}{dt} = \frac{dL}{dt} - \frac{d\pi}{dt} + \mu + \frac{d\mu}{dt}t$. Substituiert man nun die bekannten Ausdrücke für die Variationen der Elemente, so lässt sich leicht $\mu \delta z$ in einer zum vorliegenden Zweck passenden Form darstellen. Setzt man nach gebräuchlicher Bezeichnung

$$\Omega = \frac{m'}{1+m} \left\{ \frac{1}{\sqrt{(x-x')^2 + (y-y')^2 + (z-z')^2}} - \frac{xx' + yy' + zz'}{r^3} \right\},$$

so wird nach *Lagrange*:

$$\frac{d\delta a}{dt} = 2a^2 \mu \left(\frac{d\Omega}{dL} \right), \text{ oder vermöge der Gleichung}$$

$$\frac{d\mu}{\mu} = -\frac{3}{2} \frac{da}{a}, \quad \frac{d\delta \mu}{dt} = -3a\mu^2 \left(\frac{d\Omega}{dL} \right), \text{ ferner}$$

$$\frac{d\delta L}{dt} = 2 \sin \frac{1}{2} \varphi^2 \frac{d\delta \pi}{dt} - 2a^2 \mu \left(\frac{d\Omega}{da} \right),$$

$$\frac{d\delta e}{dt} = -2 \sin \frac{1}{2} \varphi^2 \cdot \cotg \varphi \cdot a\mu \left(\frac{d\Omega}{dL} \right) - a\mu \cotg \varphi \left(\frac{d\Omega}{d\pi} \right) \text{ und}$$

$$\frac{d\delta \pi}{dt} = a\mu \cotg \varphi \left(\frac{d\Omega}{de} \right).$$

$$\mu \delta z = \left\{ \left(\frac{r}{a} \right)^2 \frac{1}{\cos \varphi} - 1 + 2 \sin \frac{1}{2} \varphi^2 \right\} \delta \pi - 2a\mu \int \left(\frac{d\Omega}{dr} \right) r dt + \int dt \int \frac{d\mu}{dt} + (2 - e \cos E - e^2) \frac{\sin E}{\cos \varphi} \cdot \delta \varphi.$$

Dieser Ausdruck reducirt sich beträchtlich, wenn man der Annahme zufolge bei den Factoren von $\delta \varphi$ und $e \delta \pi$ nur die von der Excentricität unabhängigen Grössen berücksich-

Bei Anwendung dieser Formeln auf die *Hansen'sche* Form hat man zunächst die partiellen Differentialquotienten nach a , L etc. durch $\left(\frac{d\Omega}{dr} \right)$ und $\left(\frac{d\Omega}{dv} \right)$, oder durch $\left(\frac{d\Omega}{dr} \right)$ und $\left(\frac{d\Omega}{dE} \right)$ auszudrücken, wobei aber $\left(\frac{d\Omega}{dE} \right)$ so genommen werden muss, dass es Function von $\left(\frac{d\Omega}{dr} \right)$ und $\left(\frac{d\Omega}{dv} \right)$ wird. Beachtet man, dass L nur mit M verbunden ist, abstrahirt man ferner bei der Differentiation nach a von dem Zusammenhange zwischen a und μ , wodurch bekanntlich das Glied $t \frac{d\mu}{dt}$ im Ausdrucke für δM eliminirt wird, so folgt:

$$\frac{d\delta \mu}{dt} = -3a\mu^2 \left(\frac{d\Omega}{dM} \right) = -3a\mu^2 \left(\frac{d\Omega}{dE} \right) \frac{dE}{dM}, \text{ oder}$$

$$\frac{d\delta \mu}{dE} = -3a\mu \left(\frac{d\Omega}{dE} \right); \text{ ferner}$$

$$\left(\frac{d\Omega}{da} \right) = \left(\frac{d\Omega}{dr} \right) \frac{dr}{da} = \left(\frac{d\Omega}{dr} \right) \frac{r}{a}, \text{ und es wird mithin}$$

tigt, und es entsteht so, wenn zugleich dt durch $\frac{r dE}{a\mu}$ ersetzt wird:

$$\mu \delta z = -2e \cos E \delta \pi + 2 \sin E \delta e - 2 \int ar \left(\frac{d\Omega}{dr} \right) \frac{r}{a} dE - 3 \int \frac{r}{a} dE \int a \left(\frac{d\Omega}{dE} \right) dE.$$

Drückt man $\left(\frac{d\Omega}{d\pi} \right)$ und $\left(\frac{d\Omega}{de} \right)$ gleichfalls durch $\left(\frac{d\Omega}{dr} \right)$ und $\left(\frac{d\Omega}{dE} \right)$ aus, so ist genähert:

$$e \frac{d\delta \pi}{dE} = 2a \left(\frac{d\Omega}{dE} \right) \sin E - ar \left(\frac{d\Omega}{dr} \right) \cos E,$$

$$\frac{d\delta e}{dE} = 2a \left(\frac{d\Omega}{dE} \right) \cos E + ar \left(\frac{d\Omega}{dr} \right) \sin E.$$

M. s. Berliner Jahrbuch für 1855, S. 361.

Aus diesen Formeln sieht man sofort, dass die mit dem Quadrat eines kleinen Divisors versehenen Glieder nur aus $-3 \int (1 - e \cos E) dE \int a \left(\frac{d\Omega}{dE} \right) dE$ entspringen.

Sind nun $a \left(\frac{d\Omega}{dE} \right)$ und $ar \left(\frac{d\Omega}{dr} \right)$ in der Form:

$$a \left(\frac{d\Omega}{dE} \right) = \sum \beta(i, i', c) \cos(p_i \cdot E - i' A) + \sum \beta(i, i', s) \sin(p_i \cdot E - i' A),$$

$$ar \left(\frac{d\Omega}{dr} \right) = \sum c(i, i', c) \cos(p_i \cdot E - i' A) + \sum c(i, i', s) \sin(p_i \cdot E - i' A)$$

entwickelt, wobei A constant, p_i aber $= (i - i' \frac{\mu}{\mu})$ ist, so wird das durch die Variation der mittleren Bewegung in $\mu \delta z$ erzeugte Hauptglied

$$= 3 \frac{\beta(i, i', s)}{p_i i'} \sin(p_i \cdot E - i' A) + 3 \frac{\beta(i, i', c)}{p_i i'} \cos(p_i \cdot E - i' A),$$

das der Änderung der Epoche entsprechende Glied

$$= -2 \frac{c(i, i', c)}{p_i i'} \sin(p_i \cdot E - i' A) + 2 \frac{c(i, i', s)}{p_i i'} \cos(p_i \cdot E - i' A).$$

Integriert man ebenso $e \frac{d\delta \pi}{dE}$ und $\frac{d\delta e}{dE}$, multiplicirt dann beziehungsweise mit $-2 \cos E$ und $+2 \sin E$, so erhält man Endwerthe mit dem Integrationsdivisoren $p_i i' \pm 1$. Ist also irgend ein $p_i i'$ sehr klein, so können dann die diesem Argument um 1 vorhergehenden und nachfolgenden Reihen-coefficienten durch die Integration bedeutend anwachsen. Fügt man diese Glieder zu den vorstehenden, so wird endlich

$$\mu \delta z = \Sigma \left\{ +3 \frac{\beta(i, i', s)}{p_{i, i'}^2} + 2 \frac{\beta(i, i', s)}{p_{i, i'} + 1} - 2 \frac{\beta(i, i', s)}{p_{i, i'} - 1} - 2 \frac{c(i, i', c)}{p_{i, i'}} + \frac{c(i, i', c)}{p_{i, i'} + 1} + \frac{c(i, i', c)}{p_{i, i'} - 1} \right\} \sin(p_{i, i'} \cdot E - i' A) \\ + \Sigma \left\{ +3 \frac{\beta(i, i', c)}{p_{i, i'}^2} + 2 \frac{\beta(i, i', c)}{p_{i, i'} + 1} - 2 \frac{\beta(i, i', c)}{p_{i, i'} - 1} + 2 \frac{c(i, i', s)}{p_{i, i'}} - \frac{c(i, i', s)}{p_{i, i'} + 1} - \frac{c(i, i', s)}{p_{i, i'} - 1} \right\} \cos(p_{i, i'} \cdot E - i' A).$$

Die mit dem Quadrat des Divisors versehenen Glieder sind vollständig genau, die übrigen aber nur der obigen Annahme gemäss. Will man die analogen Glieder in ν be-

stimmen, so dient hierzu die Gleichung: $2\nu + \frac{d\delta z}{dt} =$

$$\frac{a\mu}{\cos\varphi} \int \left(\frac{d\Omega}{dv} \right) dt, \text{ oder wieder genähert:}$$

$$2\nu = -\frac{d\mu\delta z}{dE} + \int a \left(\frac{d\Omega}{dE} \right) dE.$$

Man sieht hieraus auch, dass in ν keine Glieder vorkommen, welche das Quadrat eines Divisors enthalten.

Diese gesonderte Darstellung der durch die Integration merklich werdenden Glieder kann practisch von Vortheil sein, wenn nämlich die nahe Commensurabilität für die höheren Vielfachen der Anomalien eintritt. In diesem Falle sind die Coefficienten der Componenten sehr klein, und es ist daher auch die Vernachlässigung der bei der Integration mit e multiplicirten Glieder ohne erheblichen Einfluss; andererseits erkennt man aber aus obiger Formel auch die wenigen Glieder, auf welche man die Entwicklung der störenden Kräfte beschränken kann.

Bei den Pomonastörungen wird für $i = 1$, und $i' = 3 \dots i - \frac{\mu}{\mu} = -0,0522446$. Die zu diesem Argument gehörenden Coefficienten sind aber:

$$\beta(i, i', c) = +0,24661, \quad \beta(i, i', s) = +1,47602,$$

$$c(i, i', c) = -3,5073, \quad c(i, i', s) = +0,7861.$$

Die dem Argument $\left\{ \left(1 - 3 \frac{\mu}{\mu} \right) E - i' A \right\}$ entsprechenden Endwerthe in $\mu \delta z$ sind daher, insofern sie von kleinen Divisoren abhängen: $\{ +1622''30 - 134''27 \}$ und $\{ +271''05 - 30''09 \}$, d. h. es ist $\Delta \mu \delta z =$

$$+1488''03 \sin \left\{ \left(1 - 3 \frac{\mu}{\mu} \right) E - i' A \right\} + 240''96 \cos \left\{ \left(1 - 3 \frac{\mu}{\mu} \right) E - i' A \right\},$$

während nach der obigen Tafel die strengen Coefficienten beziehungsweise $+1491''19$ und $+241''49$ sind.

Ephemeride der Pomona.

Mittl. Berl. Zt.	α	δ	$\log \Delta$
1862 Sept. 9,0	0 ^h 38 ^m 33 ^s 13	+9° 36' 24" 1	0,26831
10,0	37 53,64	9 31 41,3	0,26703
11,0	37 13,19	9 26 49,2	0,26581
12,0	36 31,82	9 21 47,9	0,26464
13,0	35 49,57	9 16 37,7	0,26353
14,0	35 6,48	9 11 18,7	0,26247
15,0	34 22,58	9 5 51,2	0,26148
16,0	33 37,93	9 0 15,3	0,26054
17,0	32 52,56	8 54 31,4	0,25966
18,0	32 6,53	8 48 39,6	0,25885
19,0	31 19,88	8 42 40,4	0,25810
20,0	30 32,67	8 36 34,0	0,25741
21,0	29 44,96	8 30 20,7	0,25679
22,0	28 56,80	8 24 0,9	0,25624
23,0	28 8,24	8 17 35,0	0,25575
24,0	27 19,35	8 11 3,4	0,25533
25,0	26 30,18	8 4 26,4	0,25497
26,0	25 40,79	7 57 44,4	0,25469
27,0	24 51,23	7 50 57,8	0,25447
28,0	24 1,57	7 44 7,1	0,25432
29,0	23 11,87	7 37 12,7	0,25424
30,0	22 22,19	7 30 14,9	0,25423
Oct. 1,0	21 32,59	7 23 14,1	0,25429
2,0	20 43,12	7 16 10,9	0,25442
3,0	19 53,84	7 9 5,7	0,25462
4,0	19 4,81	7 1 58,9	0,25489
5,0	18 16,09	6 54 50,9	0,25523
6,0	17 27,72	6 47 42,2	0,25564
7,0	16 39,76	6 40 33,1	0,25611
8,0	15 52,26	6 33 24,1	0,25665
9,0	15 5,27	6 26 15,7	0,25726
10,0	14 18,84	6 19 8,2	0,25794
11,0	13 33,02	6 12 2,1	0,25868
12,0	12 47,87	6 4 57,8	0,25949
13,0	12 3,42	5 57 55,6	0,26036
14,0	11 19,73	5 50 56,0	0,26129
15,0	10 36,85	5 43 59,4	0,26229
16,0	9 54,81	5 37 6,2	0,26335
17,0	9 13,67	5 30 16,8	0,26447
18,0	8 33,46	5 23 31,6	0,26564
19,0	0 7 54,23	+5 16 51,1	0,26688

Opposition: 1862 Sept. 30 21^h 14^m 8. Lichtstärke = 0,67.
Grösse = 11,4.

Marburg 1862 August 20.

O. Lesser.