chowski nicht ganz unzweifelhaft entscheiden, ob in diesem Falle beide Erkrankungsarten (Muskel und Haut) eine einheitliche Ätiologie besitzen. Bei den Boeckschen Tuberkuliden ist diese Verbindung mit Muskelerkrankung viel leichter einzunehmen, bei Lupus eryth. ist dies viel schwerer zu behaupten, da die Ätiologie dieser Dermatose nicht ganz genau bestimmt ist und die Anschauungen gehen in dieser Hinsicht noch weit auseinander. F. Krzysztalowicz (Warschau).

Therapie.

Engel, St. (Dortmund). Eine einfache Behandlungsweise der multiplen Abscesse (Furunkel) im Säuglingsalter. Berl. klin. Wochenschr. Nr. 26. 28. Juni 1920. p. 611.

Lewandowski fand, daß die Furunkel durch Staphylokokkeninfektion der Schweißdrüsen entstehen und empfahl daher Schwitzpackungen (zur Ausschwemmung) und danach Sublimatbäder zur Abtötung der Staphylokokken). Engel fand überraschende Erfolge lediglich durch Anwendung heißer Bäder, die durch Zugießen auf 42° (bei Kindern bis zu einem Vierteljahr nur auf 40°) gebracht werden; Dauer 10 Minuten; Wiederholung, anfangs täglich, bis zur Heilung. Die kleineren Furunkel bilden sich zurück, die größeren erweichen, gehen von selbst auf und heilen ab; die Mehrzahl schon nach 3—4 Bädern. Keinerlei ernstere Zufälle. Die Körperwärme steigt nach dem Bade um 2—3°, kehrt aber nach einer Stunde zur Norm zurück.

Krakauer (Breslau).

Nagelschmidt, Franz. Über monochromatische Lichtbehandlung. Berl. klin. Wochenschr. Nr. 33. 16. August 1920. p. 783.

Ätherwellen bringen je nach ihrer Schwingungszahl ganz heterogene bzw. antagonistische biologische Wirkungen hervor. Die antagonistisch wirkenden Strahlengebiete der gleichen Strahlenquelle können sich gegenseitig aufheben. Daher wurden Apparate konstruiert, die ihr Energiemaximum in dem gewünschten Strahlenteil besitzen, z. B. die Neonlampe, die nur rote und gelbe Strahlen, ohne Beimischung der ultraroten Wärmestrahlen, d. h. also ein hellrotes, ganz kaltes Licht liefert. Wegen der Kälte kann man ganz bestrahlen. Blendung tritt nicht ein. Die Wirkung auf entzündete Haut ist sehr deutlich sedativ: Abschwellen, Abblassen, Eintrocknen von Sekreten, Besserung von Eiterungen. Daneben Jucklinderung, sehr deutliche Schmerzstillung, häufig Beeinflussung von Parästhesien. Daher sehr gute Erfahrungen bei generalisierter Vaccine, rheumatischen Schwellungen und Beschwerden, Polyneuritis, Furunkulose, Arthritiden verschiedener Ursache, Lungenspitzenkatarrh, Steckschüssen und anderen Schüssen. Der Schmerz wird regelmäßig gut beeinflusst, zum Teil dauernd. Sehr gute Wirkung ferner bei Follikulitiden der behaarten Kopfhaut. Technik: bei möglicherster Annähe-

rung Sitzungen von 20—60 Minuten, täglich oder 2tägig. Bei Hautaffektionen Ausschaltung der Lichtstrahlen (Schutzverband).

Krakauer (Breslau).

Hauschting. Erythemdosis und Carcinomdosis der Radiumstrahlen. Arch. f. Gynäkol. 1920. Bd. CXIII. p. 1.

1. Als Dosierungseinheit der Radiumstrahlen ist die Erythemdosis einzuführen. Die Präparate sind mit der üblichen Filtrierung auf der Haut auszuwerten und in ihrer Tiefenwirkung zu bestimmen. Eine Radiumdosis ist ausreichend bezeichnet durch die Zahl der verabfolgten Erythemdosen, Tiefenwirkungszahl für 1,2 und 3 cm, Ort und Tag der Bestrahlung.

2. Die Carcinomdosis ist ungefähr gleich groß wie die Erythemdosis.

3. Es ist möglichst nur eine einmalige starke Dosis zu verabfolgen statt der verzettelten kleinen Dosen.

4. Man vermeide ungünstige Über- und Unterbestrahlungen durch wahllos nebeneinander gelegte Radiumpräparate.

5. Die Cervixmuskulatur verträgt 40, die Corpusmuskulatur 30 und die Scheidenschleimhaut 5—6 Erythemdosen, ohne sichtbar geschädigt zu werden.

6. Darm- und Blasenschleimhaut vertragen nur eine Erythemdosis.

Martin Friedmann (Mannheim).

Nürnberg. Röntgenstrahlen und Eugenik. Monatsschr. f. Gynäkol. 1920. Bd. LIII. p. 101.

Am Tiermaterial (weiße Mäuse, Meerschweinchen, Kaninchen) ist es bei Versuchen an 400 Objekten (teils Bestrahlung der Weibchen, teils der Männchen, teils beider) in keinem Falle gelungen, den geringsten Anhaltspunkt auch nur für den Verdacht einer Strahlenschädigung der Nachkommenschaft zu gewinnen. Selbst die, nach Regeneration der Keimdrüsen von einer temporären Sterilität, erzeugten Jungen waren normal; ebenso die Nachkommen dieser Tiere.

Beim Menschen: An einem Materiale von mehr als 50 Kindern, die nach vorausgegangener Bestrahlung der elterlichen Keimdrüsen erzeugt wurden, konnten keine Abnormitäten festgestellt werden.

Die Furcht vor einer Schädigung der Nachkommenschaft durch die Bestrahlung der Keimdrüsen ist unbegründet.

Martin Friedmann (Mannheim).

Ehrenberg, Charlotte. Über einen Fall von essentieller Thrombopenie (Frank) und seine Behandlung durch Milzexstirpation. Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynäkol. 1920. Bd. LI. p. 99.

Bei einem 19jährigen Mädchen mit essentieller Thrombopenie (Fehlen der Blutplättchen, starke Verlängerung der Blutungszeit bis zu 2 Stunden, verlängerter Gerinnungszeit bis 13 Minuten) traten meist 8—10 Tage vor Eintritt der Menses Purpura, subcutane Blu-

tungen an Injektionsstellen der Haut und Epistaxis auf und dauerten bis Schluß derselben.

Stauungsversuche und Fingerdruck hatten stets positive Resultate. Die Menses selbst brachten die Patientin oft in Gefahr des Verblutens. Koagulininjektionen coupierten die Blutungen, ohne jedoch Heilung zu bringen; desgleichen intravenöse Injektion von 10 proz. NaCl-Lösung. Unmittelbar nach der Milzexstirpation traten zahlreiche Blutplättchen im Blute auf, die sich anfangs rasch vermehrten, bald aber wieder an Zahl zurückgingen und zum Teil recht niedrige Werte erreichten, aber dauernd höher blieben als vor der Operation. Die Blutungsneigung schwand vollkommen. Purpura trat nicht mehr auf. Eine Stauungspurpura war anfangs nicht mehr zu erzeugen, später in ganz geringem Grade. Verschiedene Beobachtungen lassen vermuten, daß vielleicht bei der essentiellen Thrombopenie eine Dysfunktion der Keimdrüsen ätiologisch eine Rolle spielen könnten.

Martin Friedmann (Mannheim).

Blaschko, A. Die Behandlung von Haarerkrankungen mit löslichen Hornpräparaten. Dtsch. med. Wochenschr. Nr. 19. 1920.

Bei den 60—80 Fällen von Haarausfall, welche Blaschko mit löslichen Hornpräparaten behandelte, waren zum Teil erfolglos andere Methoden, auch Bestrahlungen angewandt worden. Andere Patienten bestrahlte Verf. selbst während der inneren Behandlung. Dreimal täglich 3 Pillen des Zumtzenschen Hornpräparates werden gut vertragen. Der Heilerfolg erschien in einigen Fällen in völliger Wiederherstellung, versagte in anderen und war am auffälligsten bei der Kombination von innerer Darreichung und Bestrahlungen. Trotzdem es bei Haarausfall immer schwer festzustellen ist, ob das neue Wachstum einen spontanen oder durch Therapie erzeugten Heilprozeß darstellt, glaubte Verf. nach sorgfältigster Beobachtung doch einen Zusammenhang zwischen der Hornbehandlung und dem Heilprozeß zu erkennen. Besonders gute Resultate wurden bei Trichorrhexis und schwerer trophischer Nagelerkrankung erzielt. Die örtliche Applikation von gelösten Hornsubstanzen bei Ekzemen scheiterte an der starken Reizung, die durch Salze entstand, welche sich bei der Aufschließung des Horns bilden.

Max Joseph (Berlin).

Meyer, Fritz. Die Röntgenbehandlung des Frauenbarts. Dtsch. med. Wochenschr. 1920. Nr. 11.

Bei der Röntgenbestrahlung des Frauenbarts teilte Meyer Wange, Kinn und Lippen in sechs Felder ein und bestrahlte jedes Feld in der einzelnen Sitzung mit drei Volldosen einer 12 Wehnelt harten, durch 4 mm Aluminium filtrierten Strahlung. Die einzelne Sitzung wurde nach 6 Wochen und, wenn keine Schädigung eintrat, wiederum nach 8 Wochen wiederholt. Eine sorgfältige Abdeckung der benachbarten Hautpartien und Schutz der Schleimhäute und Zähne durch mit Seidenpapier umwickeltem Bleigummi ist not-

wendig. Wo noch mehr Sitzungen erforderlich waren, wurde nach einer Pause von 10 Wochen mit $2\frac{1}{2}$ Volldosis bestrahlt. Während der Behandlung soll weder epiliert noch rasiert, noch viel Seife benutzt, sondern die Haut mit lauwarmem Öl gereinigt werden. Nach der Bestrahlung kann es meist zu vorübergehender Schwellung und Rötung, Trockenheit im Munde und Appetitlosigkeit. Nur selten traten Erytheme, nur einmal Blutungen der Schleimhaut auf. Zurückbleibende Sprödigkeit der Haut ist leicht durch Einfetten zu beseitigen. Dauernde Schädigungen entstanden niemals, und das nennt Verf. mit Recht den großen Vorzug dieser Geduld erfordernden Methode.

Max Joseph (Berlin).

Kuhn, F. Thigenol im Kampfe gegen die Furunkulose. Therap. Halbmonatsh. 1920. p. 264.

Verf. empfiehlt Thigenol besonders als Prophylaktikum gegen die Weiterverbreitung und Weiterentwicklung der multiplen Furunkulose und des Karbunkels. Technik: Anstrich und Aufstrich des Thigenols in der Umgebung des Furunkels.

Martenstein (Breslau).

Borchardt. Organotherapie. Ergn. d. inn. Med. u. Kinderheilk. 1920. Bd. XVIII.

In dem speziellen Teil zusammenfassende Übersicht der hauptsächlichsten bis jetzt erschienenen Arbeiten über die Beeinflussung von Haut und Schleimhäuten durch Organpräparate.

L. Kleeberg (Breslau).

Bormann, Hildegart. Das Blutbild unter Radium- und Röntgenstrahlen. Arch. f. Gynäkol. 1919. Bd. CXI. p. 139.

Nach Besprechung der Literatur berichtet Verf. über eine an der Berliner Universitätsfrauenklinik gemachte Beobachtung, daß carcinomkranke Frauen das Bild einer mehr oder minder schweren Anämie darboten, wenn sie etwa 100 mg Radium für ungefähr 24 Stunden vor das Carcinom eingelegt erhielten und gleichzeitig für mehrere Stunden abdominal geröntgent wurden.

Der Blutstatus wurde an 28 so behandelten Fällen einige Wochen lang genau verfolgt. Es ergab sich:

1. daß der schädigende Einfluß der Strahlenbehandlung ausgeglichen wird, wenn die Strahlenmenge ausreichend war, um das Carcinom zu zerstören;

2. daß dieser Ausgleich sich dauernd erhält, wenn neue Schädigungen ausbleiben;

3. daß aber ein fortschreitendes Carcinom das Blutbild in zunehmendem Maße trübt.

Bei Frauen, die nach Behandlung eines Carcinoms mit Röntgenstrahlen seit Jahren klinisch als geheilt anzusehen waren, boten bei Nachuntersuchungen ein normales Blutbild. Verf. nimmt nun an, daß eine Änderung des Blutbildes ein drohendes Carcinomrezidiv erkennen läßt.

Martin Friedmann (Mannheim).

Dessauer, Fr. Grundlagen und Meßmethoden der Tiefentherapie mit Röntgenstrahlen. Arch. f. Gynäkol. 1919. Bd. CXI. p. 209.

Zum kurzen Referat nicht geeignet.

Martin Friedmann (Mannheim).

Cassel. Zur Behandlung der Furunkulose der Säuglinge (nebst Bemerkungen zur Hautpflege des Säuglings). Berl. klin. Wochenschr. Nr. 36. 9. September 1920. p. 849.

Hinweis auf die Notwendigkeit, die Staphylokokken durch gründliches Auskochen der Wäsche wirklich zu vernichten und auf die Schädlichkeit der Gummieinwicklung (nicht Gummiunterlagen) bzw. Gummiwindelhosen.

Krakauer (Breslau).

Merz, H. Nachtrag zu „Fortschritte in der Behandlung der Seborrhoea capillitii“. Schweiz. med. Wochenschr. 1920. Nr. 40. p. 891.

Verf. macht darauf aufmerksam, daß, wo seine Behandlung der Seborrhoe sich als ungenügend erwies, es sich um die Komplikation eines seborrhoischen Ekzems gehandelt habe. Letzteres erfordere eine spezielle Salbenbehandlung. Erst nach Behandlung des Ekzems könne die Dauerbehandlung mit Schwefelschnee (Aronal-Creme) durchgeführt werden. Es empfehle sich daher gleich zu Beginn jeder Seborrhoebehandlung mit einem verstärkten Schwefelschnee einzusetzen. Rezept: Phenoli 0,1, Hydrarg. praecipitat. albi 2,0, Sulfur. praecipit. 1,0, Aronal simpl. 20,0. Dieser Schnee müsse 2—4 mal pro Woche eingerieben werden. Dazu einmal wöchentlich der Aronal-Shampoo. Nach 4 Wochen sei in der Mehrzahl der Fälle das Ekzem geheilt, doch könne die Kur mit der gewöhnlichen Aronal-Creme fortgesetzt werden.

Max Winkler (Luzern).

Kach, Friedrich. Über gelegentliche Gefahren kosmetischer Paraffininjektionen. Münch. med. Wochenschr. 1919. Nr. 34. p. 965.

Kach teilt die Krankengeschichte einer Patientin mit, der aus kosmetischen Gründen Paraffininjektionen in beide Brüste gemacht worden waren. Sie bekam im Anschluß an die Operation Druckschmerzen der Brüste, gegen welche Bogenlampenbestrahlungen angewendet wurden. In dieser Zeit öffneten sich die Einstichstellen, schlossen sich seitdem nicht wieder und entleerten dauernd flüssiges Paraffin, kleine Paraffinstückchen und Eiter. Später kam es zu pyloarthritischen Erscheinungen und psychischen Störungen. Die Amputation beider Brüste war von völliger Ausheilung gefolgt.

Fritz Juliusberg (Braunschweig).

Rohrbach, Richard. Die Behandlung einiger der häufigsten Hautkrankheiten in der allgemeinen Praxis. Münch. med. Wochenschr. 1919. Nr. 30. p. 841.

Die Darstellung Rohrbachs der Behandlung der häufigsten Dermatosen durch den praktischen Arzt scheint dem Referenten

seiner Aufgabe ganz zu entsprechen. Der Verf. beschäftigt sich mit der Behandlung der Ekzeme, der häufigsten Pilzkrankungen und des Ulcus cruris. Die flüssige Darstellung rät eine gut bewährte, leicht ausführbare Therapie an und trägt auch der Technik der Behandlung genügend Rechnung. Zum kurzen Referate sind Rohrbachs Ausführungen entsprechend der Wahl seines Themas nicht geeignet.

Fritz Juliusberg (Braunschweig).

Bach, Hugo. Beitrag zur Wirkung der künstlichen Höhensonne auf die Haut und ihre Funktionen. Münch. med. Wochenschr. 1919. Nr. 22. p. 593.

An der Hand eigener Beobachtungen und unter Berücksichtigung der einschlägigen Literatur behandelt Bach die Frage der ultravioletten Strahlen auf die verschiedenen Funktionen der Haut. Es ist nicht zu bezweifeln, daß die Strahlen der künstlichen Höhensonne die Hautausscheidung und die Wärmeabgabe beeinflussen. Es ist auch nicht zu bezweifeln, daß diese Einwirkungen auf den Gesamtorganismus zurückwirken.

Fritz Juliusberg (Braunschweig).

Lewitt, M. Furunkelbehandlung. Münch. med. Wochenschrift 1919. Nr. 15. p. 430.

Lewitt bestätigt die Angaben Pürckhauers über die Brauchbarkeit der Ichthyolbehandlung der Furunkel.

Fritz Juliusberg (Braunschweig).

Zirn, Camillo. Über die Behandlung der Krampfaderen, Krampfaderrübe usw. mit intravenösen Sublimatinjektionen. Münch. med. Wochenschr. 1919. Nr. 14. p. 382.

Zirn faßt die Vorteile der intravenösen Sublimatbehandlung der Krampfaderen folgendermaßen zusammen: 1. Das außerordentliche einfache Verfahren ist von jedem Arzt ohne besondere Vorkenntnisse und große Vorbereitungen leicht überall auszuführen. 2. Im Gegensatz zu den operativen Methoden ist es ambulant möglich. Es kann in der Sprechstunde oder Patientenwohnung ausgeführt werden und erübrigt den Krankenhausaufenthalt. 3. Mit Ausnahme vereinzelter Fälle gestattet es dem Patienten seine Berufsausübung. 4. Messer- und narkosescheue Patienten lassen sich leicht zur Methode veranlassen. 5. Die Behandlung ist ungefährlich und schmerzlos. 6. Wir erhalten keine schmerzhaften Schnittwunden, keine entstehende Narbe sowie nicht die bei dem Resektionsverfahren auftretende Hautmuldenbildung. 7. Zirkulationsstörungen (Ödeme) kommen nicht zur Beobachtung; denn dadurch, daß nicht mit einem Male schockartig, sondern allmählich in mehreren Sitzungen die varikösen Gefäße ausgeschaltet werden, vermag sich der Blutstrom der noch vorhandenen gesunden Hautgefäße den neuen Zirkulationsbedingungen besser anzupassen. 8. Prognostisch beurteilt, zeitigt wohl keines der operativen Verfahren, deren Dauerheilerfolge nach den verschiedenen Autoren zwischen 76,6 und 92,2% schwanken, solch günstige End-

resultate, wie sie sich durch die Thrombosierung ergeben. 9. Bei Auftreten von Rezidiven in Kollateralgefäßen besteht keinerlei Hindernis für eine erneute Behandlung nach derselben Methode.

Fritz Juliusberg (Braunschweig).

Pürckhauer. Zur Behandlung geschwüriger Prozesse der Haut mit Kohlensäurewundpuder und zur Furunkelbehandlung mit Ichthyol. Münch. med. Wochenschr. 1919. Nr. 12. p. 323.

Wie Pürckhauer hervorhebt, heilen die oberflächlichen Pyodermien rasch nach gründlicher Säuberung der Haut unter Pastenverbänden. Viel schwerer lassen sich die mit tiefem Gewebszerfall und starker Randentzündung einhergehenden Pyodermien des Gesäßes und der unteren Extremitäten beeinflussen. Nach Entfernung der Krusten und Abklingen der Randentzündung bestreut man die sezernierenden geschwürigen Stellen mit Kohlensäurewundpuder (Chemische Fabrik Klopfer-Dresden). Die aufschäumende Kohlensäure reinigt mechanisch das Geschwür und wirkt andererseits stark antiseptisch und antiphlogistisch.

Furunkel behandelt der Verf. folgendermaßen: Man bringt mittelst eines Holzstäbchens ein wenig reines Ichthyol auf den Furunkel und legt eine ganz dünne Lage weißer Watte darüber. Die Ichthyolwatteauflage wird nach 24 Stunden abgezogen, evtl. noch einmal angelegt.

Fritz Juliusberg (Braunschweig).

Nonnenbruch, Wilhelm. Über Erysipelbehandlung. Münch. med. Wochenschr. 1919. Nr. 7. p. 181.

Nonnenbruch bemerkt, daß keines der bisher bekannten Mittel ein Weiterwandern des Erysipels sicher verhüten könne, und daß die Behandlung mit Überschlügen von essigsaurer Tonerde den anderen Methoden nicht nachstehe. Diese Methode hat den Vorteil der größeren Schonung des Patienten und seiner Haut.

Fritz Juliusberg (Braunschweig).

Thedering. Über Rotlichttherapie. Versuch einer theoretischen Begründung. Münch. med. Wochenschr. 1919. Nr. 3. p. 72.

Thedering stellt die Theorie einer antagonistischen Wirkung von Rot und Violett, den Endpunkten des Spektrums, auf und nimmt an, daß die roten Strahlen im Gegensatz zu den entzündungserregenden blauen entzündungshemmende Wirkungen haben. Er empfiehlt die Rotlichtbehandlung 1. zur Nachbehandlung quarzlichtentzündeter Haut, 2. bei Erysipel, 3. zur Austrocknung akuter nässender Ekzeme, 4. bei pustulösen Hautausschlägen, 5. bei Sonnenbrand und trockenen akuten Ekzemen, 5. bei Pigmentanomalien der Haut. 6. Bei Pemphigus wäre die Methode eines Versuches wert.

Im Notfalle genügt als Instrumentarium ein rot verhangenes Fenster, eine mit rotem Papier oder Stoff umhüllte elektrische Birne.

Thederling selbst benutzt eine Heusnersche Solluxlampe, die mit einer 600kerzigen Birne aus rotem Naturglas versehen ist. Um das antagonistische Violett bei der Rotlichtbehandlung auszuschalten, muß die Behandlung im Dunkelmzimmer vorgenommen werden.

Fritz Juliusberg (Braunschweig).

Fabry, Johann. Kurze Mitteilungen über unsere Erfahrungen mit Radiumbehandlung. Münch. med. Wochenschr. 1919. Nr. 5. p. 128.

Fabry behandelte folgende Fälle mit Radium: 1. Hautcarcinome. 145 Fälle. Für einen großen Teil dieser Fälle ist die Radiumbehandlung allen anderen Methoden überlegen. Dies gilt für die Carcinome im inneren Augenwinkel und Gehörgang. Eine große Ausdehnung des Carcinoms in die Fläche ist keine Kontraindikation gegen die Radiumbehandlung, anders ist es, wenn das Carcinom sich in die Tiefe weiter entwickelt und Knochen und Periost mitergriffen hat. 2. Lupus 185 Fälle. 3. Naevi flammei und papillo-pigmentos-trichosi. 70 Fälle. Bei den Naevus erster Art war das Beobachtungsmaterial recht groß. Je jugendlicher das Individuum war, desto schneller war der Erfolg. 4. Keloide 37 Fälle. Sehr gute Erfolge. 5. Induratio penis plastica. 7 Fälle. Die Erfolge waren nicht so günstig wie bei einer Dupuytren'schen Fingercontractur, da die Geschwülste oft tief im Corpus cavernosum sitzen.

Fritz Juliusberg (Braunschweig).

Wassermann, Eugen. Über die Behandlung von Narbenkeloiden mit Pepsin-Salzsäure, Dunstverband und Pyrogallol. Dtsch. med. Wochenschr. Nr. 28. 1920.

Ausgehend von der Auflösung der Hornschicht durch Verdauungsflüssigkeiten behandelte Wassermann Narbenkeloiden nach schweren Verbrennungen mit Pepsinsalzsäureverbänden. Die Originalvorschrift von Unna wurde durch Milderung des Säurezusatzes etwas modifiziert und folgende Medikation angewendet: Pepsin 2—10, Acid. boric 8,0, Acid. hydrochlor. 0,4, Aqu. ad 200. In einem Falle wurde 10proz. Pyrogallolkollodium und darüber Pepsindunstverband gebraucht, worauf sich eine hypertrophische harte Narbe in eine weiche glatte verwandelte, im zweiten Falle trat nach Pepsinsalzsäureumschlägen die Beweglichkeit der Armmuskeln wieder ein, die durch alte Brandnarben gehindert gewesen war. Dieser Fall beweist, daß man auch ohne Pyrogallol Erfolge erzielen kann. Gebraucht man aber dies nicht indifferente Mittel, so empfiehlt sich sorgfältige Kontrolle des Urins und bei Auftreten von Hautentzündung Aussetzen des Mittels, Zinksalbe oder Zinkleimverband.

Max Joseph (Berlin).

Braun, Richard. Über Sagrotan-Zimtaldehyd als Antiscabiosum.

Nach Anwendung des Sagrotan-Zimtaldehyds bei 73 Scabieskranken kam Braun zu dem Schlusse, daß dieses neue Mittel den

altbewährten Antiscabiosa durchaus nicht überlegen sei, da es selbst bei gesteigerten Dosen und häufigeren Einreibungen nicht Rezidive verhütete und zudem heftiges Brennen hervorrief. Mit Riehl und Oppenheim ist Verf. der Meinung, daß die Wilkinsonkur oder Hardysche Schnellbehandlung noch immer die besten Heilmethoden der Krätze darstellten.

Max Joseph (Berlin).

Fries. Zur Verwendung von Kalium hypermanganicum bei Behandlung von Furunkeln und Karbunkeln. Dtsch. med. Wochenschr. 1920. Nr. 33.

Aus einer umfangreichen Praxis an einem Lazarett berichtet Fries über ausgezeichnete Erfolge mit Kalium hypermanganicum bei Furunkeln und Karbunkeln. Bei frühestem Stadium genügte Bestreichen der furunkulösen Stelle mit 10 proz. wäßriger Kaliumpermanganatlösung; ist bereits gelbliche Kuppe oder Schorf vorhanden, so müssen diese entfernt evtl. die Öffnung erweitert, mit einem Glasstab die Lösung eingeführt und auch auf die umgebende Haut gestrichen werden. Bei größeren Karbunkeln treten die chirurgischen Methoden in Kraft. Bei einem Gesichtskarbunkel wurden aus kosmetischer Rücksicht nur mehrere Durchlochungen der Haut vorgenommen und in diese mehrmals am Tage die 10 proz. wäßrige Kaliumpermanganatlösung eingeführt, hiermit auch die Umgebung reichlich durchtränkt, worauf sich die nekrotischen Pfröpfe bald lösten und Heilung mit unbedeutender Narbe erfolgte.

Max Joseph (Berlin).

Krebs, Walter. Die Beziehungen der Esophylaxie zur physikalischen Therapie. Dtsch. med. Wochenschr. Nr. 31. 1920.

Krebs gibt einen Überblick der Zusammenhänge der innersekretorischen, entgiftenden Hauttätigkeit mit hydriatischen, lichttherapeutischen und anderen physikalischen Heilmethoden. Das Erfrischungsgefühl nach Bädern, Duschen, Frottieren einerseits, das Ermüdungsgefühl nach Überanstrengungen andererseits sind subjektive Ausdrücke der Produktion von Schutzstoffen durch die Haut im ersten, der Anhäufung von Stoffwechselprodukten im letzten Falle. Die Fähigkeit der Haut bei Anregung Schutzstoffe zu bilden, erklärt die Erfolge der Wasser-, Licht- und Wärmekuren bei Infektionskrankheiten. Die gesteigerte Wirkung von Quecksilbereinreibungen in Verbindung mit Aachen-Burtscheider Bädern bei Syphilis erklärt sich zum Teil durch das bessere Eindringen der Hg-Teilchen in die vom Bade geöffneten Poren, zum Teil durch die esophylaktische Wirkung der Hauteizung. Außer den Schutzstoffen werden in der Haut auch Fermente und Hormone erzeugt. Lichtstrahlen beeinflussen daneben auch die endokrinen Drüsen. Glühlichtbäder wirken insofern stärker als Heißluftbäder, als erstere ihre Strahlen schneller in die Tiefe senden und daher die innersekretorische Hauttätigkeit schneller anregen.

Max Joseph (Berlin).

Friedländer, W. Über die Morgenrothschen Chininderivate bei der Behandlung der Pyodermien. Med. Klinik. 1920. Nr. 14. p. 347.

Friedländer betont, daß alle die Formen, die in dem Jadassohnschen Schema der Pyodermien zusammengefaßt sind, geeignete Objekte zur Prüfung und Anwendung der Morgenrothschen Chininderivate darstellen. F. verwendete mit gutem Erfolge das Eucupin als 2—5—10 proz. Salbe in reinem Vaselinum flavum, er ging unter Umständen bis zu einer 20 proz. Eucupinsalbe vor. Ferner kamen 5—10 proz. alkoholische Lösungen, Schüllemixturen und Pasten zur Anwendung. Nach der Ansicht des Verf. bedeuten das Eucupin und das Vucin in bezug auf die Abkürzung der Behandlungsdauer bei Pyodermien und zahlreichen staphylogenen und streptogenen Affektionen der Haut einen großen Fortschritt.

Fritz Juliusberg (Braunschweig).

Friedländer, W. Die Morgenrothschen Chininderivate bei der Behandlung der Pyodermien. Med. Klinik. 1920. Nr. 36. p. 924.

Friedländer weist darauf hin, daß bei den Eucupinsalben und -trockenpinselungen stets das wasserlösliche Eucupinum bihydrochloricum zu verwenden ist.

1. Eucupinsalbe: Eucupini bihydrochlorici 0,5—1,0; Aquae dest. q. s. ad solutionem; olei oliv. 2,0, Lanolini puri 10,0, Mf. exactissime terendo ung. molle.

2. Eucupintrockenpinselung: Eucupini hydrochlorici 5,0—10,0; Zinci oxyd., talci veneti, Glycerini, Aquae dest., Spiritus aa 20,0. M. D. in vitro nigro c. collo ampulle.

Fritz Juliusberg (Braunschweig).

Eitner, Ernst. Zur Hypertrichosisbehandlung. Med. Klinik. 1920. p. 369.

Eitner weist darauf hin, daß auch die mit filtrierten Röntgenstrahlen durchgeführte Behandlung der Hypertrichosis noch nicht so ausprobiert ist, daß man sie für die Praxis empfehlen könne. Man ist daher heute noch auf die elektrolytische Behandlung der Hypertrichosis angewiesen. Die Nadeln stellt man sich aus dem sog. leonischen Draht her, welche die Instrumentenmacher zum Einziehen in die Spritzenkanülen verwenden. Man arbeitet am besten so, daß man 30—50 Drähtchen einführt und den Strom durch alle zugleich durchleitet. Zu diesem Zwecke schneidet man Stücke von 5—15 cm Länge, die an einem Ende spitz abgeschnitten, am anderen durch ein angeklebtes Schrotkorn beschwert werden.

Fritz Juliusberg (Braunschweig).

Nordman, E. Das Boluphen in der Chirurgie. Med. Klinik. 1920. Nr. 26. p. 681.

Nordman empfiehlt das Boluphen als Wundstreupulver und

in Form 10—20 proz. Salben zur Behandlung granulierender Wunden.

Fritz Juliusberg (Braunschweig).

Stümpke, Gustav. Zur Therapie des Lupus erythematosus. Med. Klinik. 1920. Nr. 40. p. 1027.

Stümpke, der im akuten Stadium des Lupus erythematosus sich wie andere auf indifferente Salben beschränkt, geht später, wenn die Hyperkeratosen einsetzen, zu folgender Pyrogallusbehandlung über: Vorbehandlung mit 5 proz. Pyrogallusvaseline bis zur Abstoßung der obersten Teile, 3—8 Tage, dann Umschläge mit Borwasser, Wasserstoffsuperoxyd evtl. unter Novocainzusatz oder 10 proz. Anästhesinsalbe. Evtl. Wiederholung der Pyrogallusbehandlung. Dann Röntgenbehandlung: 5—10 X einer mittelharten Strahlung, Filtern durch $\frac{1}{2}$ oder 1 mm Aluminium, je nach der Tiefe des Prozesses. Wiederholung nach 10—14 Tagen. Nach Ausbildung umschriebener Herde Kompressionsbestrahlung mit der Quarzlampe, Sitzungen von 10—25 Minuten.

Von den sonst für den Lupus erythematosus in Betracht kommenden Methoden lobt der Verf. besonders die Lassarsche Schälpaste: Applikation von 20 Minuten Dauer unter nachheriger Entfernung mit einem indifferenten Öl, zwischendurch 3 proz. Borsalbe, allmählich steigend bis zu 2 Stunden. Fritz Juliusberg (Braunschweig).

Maier, Marcus. Behandlung von Staphylokokkenkrankungen mit übermangansaurem Kali. Münch. med. Wochenschr. 1919. Nr. 39. p. 1117.

Maier hat durch eine Reihe von Versuchen festgestellt, daß das übermangansaure Kali ein Specificum gegen Staphylokokkeninfektionen ist, zumal durch die Säureentwicklung der Staphylokokken bei ihrem Wachstum dem Kal. permang. ein besonders günstiger Boden zu seiner Wirkung bereitet wird.

Maier arbeitet in der Praxis mit einer 10 proz. Aufschwemmung des Mittels, welches sich nur im Verhältnis von 6 : 100 löst. Mit einer Pinzette wird die gelbe Kuppe des Furunkels oder der Schorf abgehoben. Verband mit in obige Aufschwemmung getauchten Kompressen.

Fritz Juliusberg (Braunschweig).

Holzknacht, G. Hyperplastische und hypersekretorische Zustände der Haut. Röntgenbehandlung. Wien. klin. Wochenschr. 1919. Nr. 48.

Holzknacht weist auf die Hypertrichosis hin, bei der die Tiefenbehandlung mit Filtration der Röntgenstrahlen großen Erfolg erzielen kann. Das Gesicht wird in große Regionen geteilt, z. B. vier Regionen, die an einem Tage bestrahlt werden können. Es werden Volldosen gegeben, dann 8 Wochen Pause. Die Haare fallen 2—3 Wochen nach der ersten Bestrahlung aus. Die Zahl der notwendigen Bestrahlungen beträgt pro Stelle 3—8, verteilt auf $\frac{3}{4}$ —1 $\frac{1}{2}$ Jahre.

Viktor Bandler (Prag).

Kautz, Friedrich. Kontraindikationen bei Bestrahlungen mit künstlicher Höhensonne. Münch. med. Wochenschr. 1918. Nr. 28. p. 765.

Kautz faßt seine Erfahrungen folgendermaßen zusammen:

1. Um die günstige Einwirkung der ultravioletten Strahlen bei entzündlichen Erkrankungen voll ausnutzen zu können, ist unter Beobachtung des lokalen Krankheitsprozesses sowohl das Einsetzen der Bestrahlung wie das Aussetzen derselben zeitlich zu begrenzen.
2. Fälle sicherer klinischer Syphilis mit oder ohne positive Wassermannsche Reaktion sind als ungeeignet von der Bestrahlung mit künstlicher Höhensonne abzuweisen. Treten bei Patienten, die unter Annahme einer nichtsyphilitischen Erkrankung bestrahlt werden, schon nach kurzer Zeit Schmerzen auf und zeigt der Krankheitsprozeß zum mindesten keine Neigung zum Stillstand resp. Rückbildung, so ist durch die Wassermannsche Reaktion die nichtsyphilitische Natur der Erkrankung zu bestätigen.
3. Bösartige Neubildungen sind in jeder Beziehung zur Höhensonnebehandlung ungeeignet. Bei Anwendung derselben pflegt bei zunehmender Verschlechterung des Allgemeinbefindens ein beschleunigtes Wachstum der Tumoren aufzutreten.

Fritz Juliusberg (Braunschweig).

Klingmüller, Victor. Über die Wirkung von Terpentineinspritzungen auf Eiterungen und Entzündungen. Münch. med. Wochenschr. 1918. Nr. 33. p. 896.

Klingmüller teilt seine weiteren Erfahrungen über die in der Dtsch. med. Wochenschr. 1917. Nr. 41 veröffentlichten Wirkungen der Terpentineinspritzungen auf entzündliche und eitrige Prozesse mit. Die Terpentineinspritzungen sind so gut wie schmerzlos zu machen, wenn man sie in die Gefäßgegend, etwa in der hinteren Achsellinie, bis tief auf den Knochen der Beckenschaufel etwa einen bis zwei Querfinger breit unterhalb ihres oberen Randes gibt. Klingmüller beginnt jetzt in der Regel mit kleineren Dosen, im allgemeinen mit $\frac{1}{4}$ ccm der 20 proz. Lösung. Er hebt günstige Erfolge bei folgenden Krankheiten hervor: Gonorrhoeische Komplikationen (zu warnen ist aber vor der Anwendung der Terpentineinspritzungen bei Gonorrhoe der hinteren Harnröhre, da es leicht zu Epididymitis und Funiculitis kommt), Furunkel, Furunkulose, Folliculitis barbae, impetiginöse Formen akuter und chronischer Ekzeme, infiltrierte Ekzeme der Handteller und Fußsohlen, Acne vulgaris, Schweißdrüsenabscesse der Achselhöhle, Pityriasis rosea, Lichen ruber, Impetigo contagiosa, Lupus erythematosus. Die Trichophytie heilt Klingmüller ausschließlich mit Terpentineinspritzungen. Unverkennbar ist auch die Wirkung auf tuberkulöse Prozesse. Am Schlusse äußert sich der Verf. über die Möglichkeiten für eine Erklärung der Wirkung der Terpentineinspritzungen. Entweder könnte es reich chemisch wirken oder durch Ablenkung der Stoffe von dem Krankheitsherd, welche die schädigenden Pilze an sich heranlocken oder nach Art der

spezifischen Vaccinen durch Anregung des Körpers zur Bildung von Gegengiften oder opsoninähnlichen Stoffen oder etwa durch Bildung von Entzündungsantikörpern. Fritz Juliusberg (Braunschweig).

Bruck. Über die Behandlung tiefer Bartflechten mit Trichon. Münch. med. Wochenschr. 1918. Nr. 13. p. 347.

Bruck berichtet über seine Erfahrungen mit dem von der chemischen Fabrik Schering hergestellten polyvalenten Trichophytin, welches als Trichon in den Handel kommt. Die jetzt von ihm verwendete Technik ist folgende: Bei scharf umschriebenen Formen erfolgen die Injektionen subcutan direkt unter den Krankheitsherd, während diffusere Formen intramuskulär in die Glutäalgegend injiziert werden. Es wurden Einspritzungen von steigenden Dosen (0,1—0,5) in 3—5tägigen Intervallen gemacht: Regelmäßig wurde eine Lokalreaktion beobachtet, an die sich ein Flacherwerden der Krankheitsherde anschloß. Fritz Juliusberg (Braunschweig).

Geiger, J. Halbflechte Verbände mit Moronal. Münch. med. Wochenschr. 1918. Nr. 8. p. 208.

Geiger empfiehlt als Ersatz für essigsäure Tonerde das von von Heyden hergestellte Moronal, ein basisches formaldehydschwefligsaures Aluminium. Seine Vorzüge bestehen vor allem darin, daß es die Haut nicht maceriert, keine Ekzeme macht, die Wundsekretion äußerst beschränkt, den Sekretabfluß nicht behindert, gute Granulationen erzeugt und rasche Epithelisierung fördert. Es wird in 2proz. Lösung verwendet, eignet sich auch als Salbenzusatz.

Fritz Juliusberg (Braunschweig).

Meltzer. Häufigkeit und Art der Chininexantheme. Münch. med. Wochenschr. 1918. Nr. 1. p. 20.

Meltzer beobachtet bei dem ihm zur Verfügung stehenden Soldatenmaterial, welches Chinin einnahm — es handelte sich um 3200 Mann — nur bei vier Soldaten, also in etwa 0,12% Chininexantheme. Es handelte sich stets um einen ziemlich lebhaft rot gefärbten großfleckigen, unregelmäßig begrenzten Ausschlag, masernähnlich, der stärker an den Gliedmaßen als am Rumpfe auftrat.

Fritz Juliusberg (Braunschweig).

Pendel. Erfahrungen mit Opsonogen. Münch. med. Wochenschr. 1919. Nr. 43. p. 1249.

Pendel empfiehlt speziell bei Hörgangsfurunkeln das Opsonogen. Es ist ratsam, bei Erwachsenen mit hohen Dosen zu beginnen (500 Millionen Einheiten), und, wenn nötig, in Abständen von 2—3 Tagen weitere 1000 Millionen als zweite und evtl. noch eine dritte Injektion folgen zu lassen. Mit kleinen Dosen wurden geringere Resultate erzielt.

Fritz Juliusberg (Braunschweig).

Pürckhauer, R. Zur Behandlung schlecht heilender Narbengeschwüre. Münch. med. Wochenschr. 1919. Nr. 45. p. 1203.

Pürckhauer empfiehlt bei schlecht heilenden Narbengeschwüren die zirkuläre Umschneidung. Nach Auskratzen des Geschwürs

mit dem scharfen Löffel wird die Umgebung im Gesunden zirkulär bis auf die Fascie und diese mit, bei stark unterliegenden Knochen, wie z. B. bei der Vorderfläche des Unterschenkels, bis auf diesen umschnitten, der Rand gegen die Unterlage etwas stumpf mobilisiert; durch Heftpflasterstreifen werden die Wundränder einander genähert.

Fitz Juliusberg (Braunschweig).

Nordmann, O. Behandlung des neuropathischen Fußgeschwürs mit Verlagerung sensibler Nerven. Med. Klinik. 1920. Nr. 31. p. 791.

Nordmann hat mit Erfolg bei 2 Fällen von Mal perforant von der Methode Heinekes Gebrauch gemacht, bei gelähmten Muskeln einen Ast eines funktionsfähigen Nerven aus der Nachbarschaft zu verlagern.

Fritz Juliusberg (Braunschweig).

Fervers, B. Die Trypaflavin-Therapie bei der „Kriegsstomatitis“. Med. Klinik. 1920. Nr. 41. p. 1056.

Fervers empfiehlt für die Behandlung der wohl besonders durch die mangelhafte Ernährung an manchen Orten sich häufenden Stomatitis das Trypaflavin. Bei leichteren Fällen genügen die Trypaflavin-Tabletten, die beste Behandlungsform ist die Tamponade mit Trypaflavingaze.

Fritz Juliusberg (Braunschweig).

Prior. Humagsolan bei Alopecia areata. Dtsch. med. Wochenschr. Nr. 40. 1920.

Bei der typischen Alopecia areata der Patientin Priors hatten Höhensonne und Salben nur vorübergehende Erfolge bewirkt. Dagegen trat nach dreimal täglicher Darreichung von zwei Pillen Humagsolan nach den Mahlzeiten und gleichzeitiger Höhensonnenbestrahlung neues Wachstum festsitzender Haare zuerst auf den kleineren, später, als das Humagsolan allein gegeben wurde, auch auf den größeren, umschriebenen, runden kahlen Stellen ein. Nach 3 Monaten war ein vollkommenes kosmetisches Resultat erzielt.

Max Joseph (Berlin).

Ladebeck, Hermann. Der Quarzspüler. Ein neues Prinzip in der Ultraviolettbehandlung. Dtsch. med. Wochenschr. 1920. Nr. 38.

Unter Benutzung der Totalreflexion suchte Ladebeck den Flüssigkeitsstrahl zum Träger der ultravioletten Lichtwellen zu machen. Der konisch gebaute Ansatz ermöglicht es, in dem Spülflüssigkeitsstrom alle dem Lampenfenster enteilenden Ultraviolettlichtwellen zu therapeutischem Zweck zu konzentrieren, auch wenn die Spülflüssigkeit die betreffende Öffnung bereits verlassen hat. Zwischenschaltung von Lichtfiltern läßt beliebig prävalierende Wellenlängen herstellen. Die Regelung des Stroms erfolgt durch Abklemmen des Quarzspülerzuflußschlauches. Die einfachste Spülflüssigkeit ist Wasser, doch wurde zum Freimachen von Gasbläschen z. B. auch Sauerstoff verwendet, und jede chemische therapeutische Komponente sowie auch der elektrische Strom kann benutzt werden.

Eine genaue Abbildung dient zur Veranschaulichung des Apparats, dessen besonderer Vorzug darin besteht, die aufblähende Spülstrahlwirkung in jeden Winkel des Körpers und zu den verborgenen Krankheitserregern bringen zu können. Max Joseph (Berlin).

Axmann. Eine neue Neon-Lampe. Dtsch. med. Wochenschrift. 1920. Nr. 38.

Axmann weist auf eine von E. Gundelach in Gehlberg (Thür.) hergestellte Neonlampe hin, die an jedem Induktor eingeschaltet werden kann und ziemlich hohe Stromstärken verträgt. In lokaler Anwendung bei Wunden und auf umschriebenen Hautstellen kann diese Lampe unmittelbar auf oder in die Wunde gelegt werden. Sie ist aseptisch konstruiert, bewirkt eine einwandfreie Desinfektion und gibt intensiv gelbes Licht in der Wellenlänge der Neonstrahlen von 740—580 μ .

Max Joseph (Berlin).

v. Rhorer. Die Sensibilisierungsfrage in der Strahlentherapie. Dtsch. med. Wochenschr. Nr. 39. 1920.

Dem 60jährigen Patienten mit inoperablem Carcinom unter dem linken Ohr und haselnußgroßen Supraclaviculardrüsen infiltrierte v. Rhorer Tumor und Drüsen mit 10 cem 30 proz. IK-Lösung und bestrahlte gleich darauf mit Lilienfeldröhre, Filter 0,1 mm Blei, Dosis 800 F den Tumor und 600 F auf die Drüsen, 5 Wochen später 700 F, nach weiteren 5 Wochen zum dritten Male 300 F. Die Geschwulst verschwand gänzlich, die Drüsen waren nicht mehr tastbar, das Körpergewicht nahm zu. Nach einem Jahre war der Patient noch völlig gesund und arbeitsfähig, d. h. rezidivfrei. Verf. weist nach, daß die aus dem Jodatom stammenden Elektronen oder β -Strahlen auch die umgebenden Eiweißmoleküle treffen und verändern sowie die aus dem Farbstoffmolekül hinausgeworfenen das Silber reduzieren. Photographien veranschaulichen den Heilungsvorgang.

Max Joseph (Berlin).

Sachs. Untersuchungen über den Einfluß des Ultraviolettlichtes auf die latente Säuglingstetanie. Jahrb. f. Kinderheilk. 1920. 93, der dritten Folge Bd. XLIII. Heft 3. p. 167.

Bei keinem der mit der Quarzlampe bestrahlten Kinder mit latenter Tetanie sah Sachs das Auftreten manifester Symptome. Sachs schließt daraus, daß die Besonnung an dem Frühlingsgipfel der Tetanie nicht beteiligt zu sein scheint. Dagegen verschwanden nach 10—20 Bestrahlungen die mechanische und die galvanische Übererregbarkeit. Sachs glaubt dies durch die Wirkung photokatalytisch entstandener Eiweißabbauprodukte auf die Drüsen mit innerer Sekretion erklären zu können.

L. Kleeberg (Breslau).

Schütze, S. (Berlin). Zahlenmäßige Bestimmung der Lichterythemdosis mittels des Fürstenau-Aktinimeters. Berl. klin. Wochenschr. Nr. 40. 4. Oktober 1920. p. 953.

Die bisherigen Angaben nach der Bestrahlungsdauer sind sehr ungenau, da die Lichtmenge sehr inkonstant ist, selbst innerhalb der

einzelnen Sitzung; die Lichtausbeute nimmt auch bei wenig benutzten Brennern prozentual ab. Die Erythemgrenze bildet übrigens eine breite Zone. Das Aktinimeter enthält wie das Fürstenau-Intensimeter für Röntgenstrahlen eine Selenzelle, deren elektrische Widerstandsänderung durch die auftreffenden Strahlen gemessen und an einer Skala abgelesen wird. Doch ist es nicht identisch mit denen für Röntgenstrahlenmessung benutzten. Krakauer (Breslau).

van Randerborgh, A. Anaphylaktische Erscheinungen bei Proteinkörpertherapie. Zentralbl. f. Gynäkol. 1920. 44. Jahrgang. p. 1128.

Bedrohliche Zustände im Anschluß an parenterale Einverleibung von Eiweiß sind in Erscheinung getreten:

1. Wenige Minuten nach der Injektion (nie jedoch nach der ersten!), bestehend in Cyanose, Atemnot, Kleinwerden des Pulses, evtl. Bewußtlosigkeit, flüchtige Ödeme, flüchtige Erytheme. Die Erscheinungen werden für den gut erkannten anaphylaktischen Shock gehalten.

2. Schüttelfrost, Fieberanstieg, Schweißausbruch wenige Stunden nach der Injektion;

3. die „proteinogene Cachexie“, welche nach enorm hoher parenteraler Zufuhr von Eiweiß hervorgerufen wird, durch überreiche Produktion proteolytischer Fermente.

Nur zu 1. werden die bisher bekannten Fälle zusammengestellt. Verf. warnt wiederholte Caseosaninjektionen intravenös zu machen.

Martin Friedmann (Mannheim).

Coerper, K. Beitrag zur Ernährung mit Eiweißmilch. Zeitschr. f. Kinderheilk. 1920. Bd. XXVI. p. 309.

Dermatologisches Interesse hat die Tatsache, daß Eiweißmilchernährung nach Finkelstein und Meyer bei exsudativen, hochgewichtigen Kindern günstige Erfolge aufweist. Auch ohne Festerwerden des Stuhles wurde die Intertrigo regelmäßig gebessert.

Martin Friedmann (Mannheim).

Aschenheim. Schädigung einer menschlichen Frucht durch Röntgenstrahlen. Arch. f. Kinderheilk. 1920. Bd. LXVIII. p. 131.

Es handelt sich um einen 3½-jährigen imbezillen — ein Urteil über die Psyche ist schwierig — Mikrocephalen mit leichten Spasmen, die am meisten an den Littleschen Typus erinnern. Die vorhandenen Krämpfe können vielleicht den Beginn einer organischen Epilepsie darstellen. Im Vordergrund steht die fast völlige Blindheit: beiderseitige Mikrophthalmie, rechts schalenförmige Linsentrübung und fast völlige Aplasie des Opticus, links Opticusatrophie, beiderseitige Chorioretinitis. Ophthalmologisch wird der Befund als Hemmungs- mißbildung beider Augen, verbunden mit einer chronischen Entzündung der Retina, gedeutet. Anamnestisch ergibt sich, daß die Mutter ungefähr vom Ende des ersten Schwangerschaftsmonats ab

wegen eines Myoms mehrmals mit Röntgentiefenstrahlen behandelt wurde.

Verf. hält seinen Fall für den ersten, in dem mit einiger Sicherheit eine Röntgenschädigung des Foetus im Mutterleibe anzunehmen ist. Für die Röntgenschädigung sprächen, wie im Tierexperiment häufig bewiesen, die konformen Feststellungen am Auge und am Nervensystem.

Martin Friedmann (Mannheim).

Fabry, Johann. Über die klinische Bedeutung des varikösen Symptomenkomplexes und die Behandlung der Varicen nach Linser. Med. Klinik. 1920. Nr. 35. 2. September. p. 889.

In Form eines klinischen Demonstrationsabends entwickelt Fabry in großen Zügen die Bedeutung der Varicen am Unterschenkel, ihrer Folgeerscheinungen, der Ekzeme und Geschwürsbildungen, der Purpura mit besonderer Berücksichtigung der Purpura teleangiectodes Majocchi. Differentialdiagnostisch in Betracht kommende andere Erkrankungen der Unterschenkel werden erwähnt und besprochen. Im zweiten therapeutischen Teile der Arbeit beschäftigt sich der Verf. nach Darstellung der sonstigen therapeutischen Maßnahmen insbesondere mit der Behandlung nach Linser, der intravenösen Injektion von Sublimatlösungen. Fabrys Erfahrungen mit dieser Methode sind außerordentlich günstige. Zum Schlusse betont er, daß sich bei älteren Leuten, die sich nicht leicht zur Ausführung operativer Eingriffe entschließen, Röntgentiefenbestrahlungen sehr gut bewährt haben.

Fritz Juliusberg (Braunschweig).

Nast, O. und Griesbach, W. Zur subcutanen Arsenmedikation. Med. Klinik. 1920. Nr. 35. p. 903.

Zur subcutanen Arsenverabreichung, bei Psoriasis, Lichen planus, bei Anämie und Chlorose empfehlen Nast und Griesbach das von Heyden in den Handel gebrachte Arsamon (Natr. monomethylarsenisii). Es gelingt mit Hilfe dieses Präparates größere Arsenmengen einzuführen, wie mit den gebräuchlichen Arsenpräparaten. 1 ccm entspricht 0,0135 Arsen. Fritz Juliusberg (Braunschweig).

Winter, Fr. Fortschritte der Röntgentechnik und Röntgentherapie durch Einführung der Glühkathodenröhren. Zeitschr. f. Gynäkol. u. Geburtsh. 1919. Bd. LXXXI, p. 339.

Die Vorzüge der Coolidge-Röhre sind folgende: Die Entladung erfolgt im höchsten praktisch erreichbaren Vakuum durch Glüh-Elektronen und ist frei von Gasdruckschwankungen. Hohe Konstanz der Strahlenmenge und ihrer Zusammensetzung. Wesentliche Vereinfachung des Betriebes und leichte Erlernbarkeit desselben. Die Intensität der Strahlung wird durch die Elektronenzahl, also durch die Temperatur der Glühspirale reguliert. Die Durchdringungsfähigkeit der Strahlung durch die Elektronengeschwindigkeit, also durch Erhöhung der Spannung. Diese beiden Größen können ziem-

lich unabhängig voneinander verändert werden. Große Strahlenausbeute von günstiger Zusammensetzung; stundenlange Beanspruchbarkeit der Röhren, große Haltbarkeit.

Martin Friedmann (Mannheim).

Spiethoff, B. und Wiesenack, Hans. Klinische und pharmakologische Beobachtungen bei intravenöser Kalkzufuhr (Afenil). Dtsch. med. Wochenschr. Nr. 44. 1920.

Mit dem Calciumpräparat Afenil erzielten Spiethoff und Wiesenack gute Heilerfolge bei Urticaria, Strophulus, flüchtigen Ödemen, Erythemen, Rosacea cum Ach, Pernionen und menstruellen Störungen. Dagegen wurden nicht beeinflusst Prurigo, Urticaria pigmentosa, reiner Pruritus, Psoriasis, Dermatitis Duhring, Akroasphyxie, und bei Ekzemen trat häufig eine Verschlimmerung ein. Allgemeine Überempfindlichkeit wurde durch Afenil mehr therapeutisch als prophylaktisch beseitigt, Hautempfindlichkeit gegen chemische und physikalische Reize merklich herabgesetzt. Bei Tuberkulose empfiehlt sich äußerste Vorsicht. Eine Vorbehandlung mit Afenil erhöht die Toleranz gegen chemische Toxine und verringert die Resorption vom Magendarmkanal aus. Die Dosierung beträgt: Jeden 3.—5. Tag eine Injektion von 10 ccm intravenös, durchschnittlich im ganzen acht, wenn notwendig mehr Injektionen. Man lasse die Flüssigkeit langsam einfließen, um das Hitzegefühl bei der Injektion zu vermindern und gebrauche dieselben Spritzen niemals zur Einführung differenter Medikamente. Max Joseph (Berlin).

Hahn, E. und Lenk, E. Enzympräparate für die Wundbehandlung. Med. Klinik. 1920. Nr. 47. p. 1210.

Hahn und Lenk berichten über ihre Erfahrungen mit einem aus Pankreas hergestellten Enzympräparate (von Röhm und Haas, Darmstadt, in den Handel gebrachte Wundsalbe und Wundstreu-pulver) bei Furunkeln, eiternden Wunden usw. Die Enzymbehandlung bewirkt ein schnelles Verschwinden des Eiters und eine Beschleunigung der Granulationsbildung. Besonders eklatant sind die Erfolge bei Furunkulose. Fritz Juliusberg (Braunschweig).

Baumann. Über Veränderung der weißen Blutzellen nach Bestrahlung mit künstlicher Höhensonne. Zeitschr. f. exp. Pathol. u. Therap. Bd. XXI. p. 409.

Bei Bestrahlungsreihen am Menschen fand sich nach der Bestrahlung inkonstant eine Polynucleose zuungunsten der Lymphocyten. Wiederholte Untersuchungen innerhalb der ersten 24 Stunden ergaben ein auffälliges Schwanken der relativen und absoluten Zahlen des weißen Blutbildes.

Beim Meerschweinchen: Während der Bestrahlung Sinken, nach 5—6 Stunden Anstieg der Leukocytenzahl, nach 24 Stunden Rückkehr zur Norm. Die Erhöhung durch Polynucleose bedingt. Injektion von Milzbrei bestrahlter Tiere ruft bei andern Meerschweinchen starke

Vermehrung der Polynucleären und Lymphocytensenkung hervor. An Tieren, die während oder bald nach der Bestrahlung starben, schwere Milz- und Knochenmarkveränderungen. Diese und damit die Veränderungen des weißen Blutbildes können durch photodynamische Wirkung des Hämoglobins bedingt sein.

Rudolf Spitzer (Breslau).

v. Rohden. Über den Einfluß des Quecksilberquarzlampenlichts auf die Resistenz der roten Blutkörperchen gegen hypotonische Kochsalzlösungen. Zeitschr. f. exp. Pathol. u. Therap. Bd. XXI. p. 444.

Untersuchungen nach der Methode Hamburger ergaben bei 17 Gesunden und Kranken eine Resistenzerhöhung nach der vierten Bestrahlung. Im Tierversuch keine Veränderungen.

Rudolf Spitzer (Breslau).

Hahn, Adolf. Die Behandlung torpider Narbengeschwüre mit Vuzin. Berl. klin. Wochenschr. Nr. 48. 29. November 1920. p. 1151.

Ausgiebige Um- und Unterspritzung, insbesondere auch mit Imbibition des harten Narbengewebes, mit Vuzin 1 : 2000 mit $\frac{1}{2}$ % Novocain — ein oder mehrere Male, auch noch öfter. Später trockene oder Salbenverbände, Argentumätzung, Schwarzsalbe. Sehr bald völlige Umstimmung des Gewebes; anfangs stärkere Sekretion, zerfallende Granulationen, nach einigen Tagen frischrote Granulationen, die dann abblaßten, trockneten; dann gute Epithelialisierungen. Keine neue Nekrosenbildung. Die Wirkung beruht offenbar weniger auf der keimtötenden Kraft des Vuzins als der Auflockerung des harten Narbengewebes, wodurch günstigere Zirkulation entsteht und die harten Narbenmassen einschmelzen. Günstig ist auch, daß die vorher sehr empfindlichen Narben schmerzfrei werden.

Krakauer (Breslau).

Karger. Erfahrungen und Indikationen bei der Röntgentiefentherapie im Kindesalter. Jahrb. f. Kinderheilk. 1920. p. 295.

Bericht über die Röntgenbehandlung von 100 Fällen (tuberkulöse Lymphome, Hodgkinsche Granulome, Leukämie, Thymushyperplasie, Arthritis deformans, Knochen mit Abdominaltuberkulose). Bei den Bestrahlungen der Bauchhaut hatte man nach den Erfahrungen der Czernyschen Klinik den Eindruck, daß die kindliche Bauchhaut empfindlicher ist als die des Halses, vor allem leichter pigmentiert wird. Bei der Röntgentiefenbestrahlung der Abdominaltuberkulose muß man immer berücksichtigen, welchen Einfluß die Röntgenstrahlen bei Mädchen nahe der Pubertät auf die im Wachstum begriffenen Ovarien haben. Das Auftreten eines Röntgenkaters wurde fast immer bei neuropathischen Kindern beobachtet — um so seltener, je jünger das Kind war.

L. Kleeberg (Breslau).

Schlichtegroll. Die Dumexsalbe und ihre Heilwirkung. Med. Klinik. 1920. Nr. 45. p. 1164.

Wie Schlichtegroll mitteilt, bewirkt die in Seylers Laboratorium (Berlin) hergestellte Dumexsalbe bei Verbrennungen, Ekzemen, Decubitus gute Heilerfolge. Besondere Erfolge erreichte er mit ihr bei *Ulcera cruris*. Die Salbe enthält Campher. Wo durch diesen Camphergehalt Jucken auftritt, empfiehlt sich die reizlose Dumexsalbe „Neutral“. Fritz Juliusberg (Braunschweig).

Pulay, Erwin. Zur Behandlung des Haarausfalles mit „Humagsolan“. Med. Klinik. 1920. Nr. 48. p. 1242.

Pulay sucht unter Hinweis auf die sich widersprechenden Mitteilungen von Blaschke und Fuhs über die Wirkungen des nach den Angaben von Zuntz von den Scheidemantelwerken hergestellten Humagsolans die Bedeutung dieses Präparates zu entscheiden, indem er die Fragestellung so formuliert, daß er auf der einen Seite die Frage aufwirft, ob das Humagsolan gegen den Haarausfall wirkt, auf der anderen Seite, ob es auf den Haarwuchs Einfluß ausübt. Während er die erste Frage verneint, meint er die zweite Frage so beantworten zu können, daß das Humagsolan bei gleichzeitiger lokaler Therapie wohl das Haarwachstum zu fördern imstande ist dadurch, daß es das Längen- und Dickenwachstum der Haare beschleunigt. Es stellt einen Ernährungsfaktor, vielleicht im Sinne eines Vitamins, dar.

Fritz Juliusberg (Braunschweig).

Jost, E. Die Behandlung der Frostbeulen mit Quecksilber-Quarzlicht. Schweiz. med. Wochenschr. 1920. Nr. 52. p. 1192.

Verf. hat gute Resultate erzielt mit der Behandlung der Perionen — namentlich der ulcerierten — mit der künstlichen Höhensonne. Als Distanz zwischen Haut und Brenner werden 30—50 cm angegeben. Dauer der ersten Sitzung 5 Minuten. Die zweite am folgenden Tag. Die nächsten Sitzungen sollen nur jeden 2. Tag verabfolgt werden. Nach fünf bis sechs Sitzungen gewöhnlich Heilung. Eine Linderung der Schmerzen und des Juckens soll schon nach der ersten Sitzung eintreten. Bei jeder Sitzung wird die Zeitdauer der Bestrahlung um 5 Minuten verlängert. Max Winkler (Luzern).

Laqueur, A. Die Höhensonne im Dienste des praktischen Arztes. Zeitschr. f. ärztl. Fortbild. 1920. Nr. 23/24.

Zusammenfassender, zum eingehenden Referat nicht geeigneter Aufsatz über Wirkungsweise und Indikationen der künstlichen Höhensonne. Dermatologisch interessant sind die günstigen Erfahrungen bei Hauttuberkulose mit Allgemeinbestrahlung, bei Furunkulose, Acne, Haarausfall, besonders Alopezia areata und Psoriasis. Bei letzterer soll die Bestrahlung der Behandlung mit Chrysarobin gleichzusetzen sein. Kurt Wiener (Breslau).

Billigheimer. Über einen Antagonismus zwischen Pilocarpin und Adrenalin. Beitrag zur Innervation der

Schweißdrüsen. Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmakol. Bd. LXXXIII. p. 172.

Adrenalin wirkt reizend auf die Elemente, die den Spontanschweiß unterdrücken. Es hält auch den Ausbruch des Pilocarpinschweißes um eine stets meßbare Zeit von 2—20 Minuten zurück. Daß es sich dabei nicht um eine Hemmung der Pilocarpinresorption durch die vorausgegangene Adrenalininjektion handelt, wird durch das Studium der Morphiummiosis wahrscheinlich gemacht, welche durch vorhergehende Adrenalininjektion nicht beeinflusst wird. Es handelt sich also um einen wahren Antagonismus von Adrenalin und Pilocarpin bei ihrer Wirkung auf die Schweißdrüsen.

Rudolf Spitzer (Breslau).

Colmers. Beobachtungsergebnisse bei der Behandlung von Sarkomen mit Röntgentiefentherapie. Langenbecks Archiv Bd. CXIV. Heft 3.

Auf Grund der Beobachtung von 9 Fällen in einem Zeitraum von etwas über 2 Jahren läßt sich sagen, daß es mit der Röntgentiefentherapie, wie sie in der Erlanger Frauenklinik geübt wird, gelingt, auch große sarkomatöse Tumoren zum vollständigen Verschwinden zu bringen und inoperable Fälle mehrere Jahre zu erhalten, wenn nicht bereits eine Metastasierung im Körper stattgefunden hat. Für die Indikation zum chirurgischen Eingriff können allgemeine Regeln nicht aufgestellt werden, sie ist abhängig von dem Erfolge der Röntgenbehandlung und dem örtlichen Befunde. Jeder chirurgische Eingriff, auch jede Probeexcision, soll vor der Bestrahlung unterlassen werden. Die Kranken sollen nach Abschluß der Behandlung alle 3 Monate regelmäßig nachuntersucht werden.

Breitkopf (Breslau).

Jüngling. Zur Röntgenbehandlung der Actinomykose. Bruns' Beitr. z. klin. Chirurg. Bd. CXVIII. Heft 1.

Verf. hat 12 Fälle von Actinomykose der Kopf- und Halsgegend mit durch 3 mm Al oder 0,5 Zn gefilterter Strahlung je nach der Tiefe des Prozesses behandelt und gleichzeitig Jodkali bis zu einer Gesamtmenge von 100 g verabreicht. Der Erfolg der Strahlenbehandlung ist besonders vom kosmetischen Standpunkt aus ganz vorzüglich. Von den 12 Fällen sind mit Ausnahme eines Falles alle geheilt, zum Teil mit völliger Restitutio ad integrum. Das Messer soll nur zur diagnostischen Probeexcision bzw. zur Entleerung subcutaner Abscesse durch Stichincision dienen. Von Auskratzungen der Fisteln ist ganz abzusehen.

Breitkopf (Breslau).

Moll. Erfolge der Röntgentiefentherapie bei chirurgischer Tuberkulose. Bruns' Beitr. z. klin. Chirurg. Bd. CXVIII. Heft 2.

Verf. berichtet aus der Freiburger chirurgischen Klinik über sehr gute Erfolge bei allen Formen chirurgischer Tuberkulose, die in den Jahren 1914 bis 1918 zur Behandlung kamen. Besonders gut rea-

gierten die Lymphome, sowohl geschlossene als auch fistelnde. Neben Knochen- und Gelenktuberkulose wurden auch einige Fälle von Schnenscheidentuberkulose, tuberkulöser Peritonitis, Mastdarmfisteln, Hodentuberkulose mit gutem Erfolge bestrahlt. Operative Eingriffe wurden nur bei besonderer Indikation vorgenommen, so wurden Knochensequester entfernt, abgegrenzte tuberkulöse Herde in der Nähe von Gelenken vor der Bestrahlung ausgekratzt, kalte Abscesse wurden regelmäßig punktiert und Jodoformglycerin injiziert. Technik: Auf jedes Feld eine Dosis bis 25 X (Kienböck) mit 3 mm Al-Filter, 18–20 cm Fokushautdistanz bei 2–3 M.A. Belastung, nach Möglichkeit Bestrahlung von mehreren Einfallspforten. Die Bestrahlungen erfolgten zunächst alle 2–3 Wochen, später alle 4–5 Wochen. Leider ist über die Dauer der Beobachtung der Fälle wenig mitgeteilt.

Breitkopf (Breslau).

Löwen und Hesse. Einige Beobachtungen über Vaccineinspritzungen bei Schußverletzten zu prophylaktischen und therapeutischen Zwecken. Dtsch. Zeitschr. f. Chirurg. Bd. CLI. Heft 5/6.

Über die an 6 Fällen therapeutisch vorgenommenen Auto-vaccineinspritzungen ist zu sagen, daß ein Urteil über den Behandlungserfolg schwer abzugeben ist. Alle Fälle konnten auch ohne Vaccinierung in der gleichen Weise verlaufen; die Vaccinierung kann nur ergänzend zu der restlos durchzuführenden chirurgischen Behandlung treten. Prophylaktisch wurde eine Vaccine aus Strepto- und Staphylokokkenstämmen wenige Stunden nach der Verwundung unmittelbar nach oder vor der operativen Wundversorgung zum ersten Mal injiziert und die Injektion nach einem Intervall von 8 Tagen noch ein- oder zweimal wiederholt. Die Einspritzungen waren im allgemeinen ohne Einfluß auf Temperatur und Puls und insbesondere auch auf den Wundverlauf. Breitkopf (Breslau).

Goergens. Die Bekämpfung der Wundinfektion in der Kriegs- und Unfallchirurgie durch die operativ-antiseptische Behandlung mit Ausschneidung und Vuzineinspritzung. Dtsch. Zeitschr. f. Chirurg. Bd. CLIII. Heft 1/2.

An Hand der Erfahrungen mit 123 Weichteilwunden, 80 komplizierten Frakturen, 40 Gelenkeröffnungen, 11 Gehirnverletzungen, 21 primären Amputationen und 12 Gasbrandinfektionen kommt Verf. zu dem Resultat, daß er jene schweren, unaufhaltsam fortschreitenden und schließlich mit Septikämie endenden Eiterungen, die immer häufig mehr oder weniger große Eingriffe erfordern, vermeiden konnte. Seine Behandlung besteht in der Entfernung des beschmutzten und zertrümmerten Gewebes und aller Fremdkörper und der vor- und nachherigen ausgiebigen Durchspritzung des Wundgebietes mit Vuzin in der Lösung 1 : 10 000 bis 1 : 2000.

Breitkopf (Breslau).

Specht. Über die therapeutische Anwendung des Vuzins in der Friedenschirurgie. Bruns Beitr. z. klin. Chirurg. Bd. CXIX. Heft 1.

Die lokale Vuzintherapie leistet bei geschlossenen Abscessen, umschriebenen Phlegmonen, Karbunkeln wohl Gutes, ist aber nicht geeignet, die bisher bei diesen Erkrankungen üblichen Behandlungsmethoden zu verdrängen, bei fortschreitenden Phlegmonen und Sehnenscheideneiterungen hat sie fast stets versagt. Mit der allgemeinen intravenösen Vuzinierung bei bakteriellen Allgemeininfektionen ließen sich bisher keine sicheren günstigen Resultate erzielen. Dabei wurden schwere lokale Gefäßschädigungen und bedrohliche Allgemeinzustände beobachtet. Breitkopf (Breslau).

Burkhard und Dorn. Bakteriologische und klinische Untersuchungen über das Trypaflavin. Bruns Beitr. z. klin. Chirurg. Bd. CXIX. Heft 3.

Das Trypaflavin beeinflusst in vielen Fällen den Wundverlauf eitriger Prozesse besser als Wasserstoffsuperoxyd, essigsäure Tonerde, Jodofomgaze und führt oft eine schnelle Wundreinigung herbei. Bei wiederholter Einwirkung traten manchmal gelbliche, fest auf den Granulationen haftende Beläge auf, die eine weitere Anwendung nicht vorteilhaft erscheinen ließen. Eine völlige Keimabtötung wird nicht erzielt, seine Wirkung ist vielmehr in einer Hemmung des Bakterienwachstums zu suchen. Das Trypaflavin ist nicht als ideales Mittel in der antiseptischen Wundbehandlung zu bezeichnen, aber doch in der Reihe der Wundantiseptica ernster Beachtung wert.

Breitkopf (Breslau).

Cordua. Über die Umwandlung des Morbus Basedowii in Myxödem durch die Röntgenbehandlung. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chirurg. Bd. XXXII. Heft 2.

Bei einem ziemlich akut aufgetretenen Morbus Basedow, der in 9 Monaten alle 4 Wochen eine Röntgentiefenbestrahlung auf die Struma erhalten hatte, bildete sich bald nach Aussetzen der Bestrahlungsbehandlung ein Myxödem aus, das Verf. auf die Strahlenwirkung zurückführt. Die Gesamtdosis der Röntgenstrahlen war hier zu groß, die ärztliche Kontrolle nicht genügend. Es dürfte sich prinzipiell empfehlen, nach zwei bis vier energischen Bestrahlungen die Röntgenbehandlung auf 5—6 Wochen zu unterbrechen, um den Erfolg zu beobachten und den etwaigen Eintritt eines Hypothyreoidismus rechtzeitig zu erkennen. Breitkopf (Breslau).

Dautwitz. Beiträge zur Radiumbestrahlung. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chirurg. Bd. XXXII. Heft 2.

Verf. teilt seine seit dem Erscheinen seiner letzten Arbeit im Jahre 1915 gemachten Erfahrungen mit und kommt zu dem Resultat, daß die Radiumbehandlung inoperabler bösartiger Neubildungen in den meisten Fällen ein Kleinerwerden und eine Wachstumshe-mung der Geschwulst zur Folge hat, eine Linderung der Beschwerden

und eine Verlängerung der Lebenszeit des Kranken wie keine andere therapeutische Maßnahme herbeizuführen vermag, ja in manchen Fällen es berechtigt ist, von einer vorläufigen Heilung solcher Kranken zu sprechen. Bei der Behandlung des Krebses ist die meiste Aussicht auf Erfolg dann zu erhoffen, wenn sich der rechtzeitig ausgeführten Operation eine systematische Nachbehandlung mit Radiumbestrahlung anschließt.

Breitkopf (Breslau).

Sacken. Über Wundbehandlung im Wasserbette. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chirurg. Bd. XXXII. Heft 3.

Die Wasserbettbehandlung ist geeignet für große, weite Wunden ohne zu Retention neigende Taschen oder Fistelgänge, alsd für Verbrennungen, durch Excision vorbereitete Zertrümmerungen, offene Gelenkresektionen, Amputationen, Erfrierungen, Darm- und Harnfisteln und bei Tetanus. Kontraindikationen sind: Schwere Kreislaufstörungen, offene Empyeme, schwere Bronchitiden, Pneumonien, vielleicht auch Nierenkrankheiten. Breitkopf (Breslau).

Scherber, G. Zur Wirkung fermentativ gewonnener Spaltungsprodukte auf Carcinome. Wien. klin. Wochenschr. 1920. Nr. 30.

Die von Joannovics aus Carcinomen gewonnenen fermentativen Spaltungsprodukte bei Carcinomkranken injiziert, rufen spezifische Reaktionen an der Injektionsstelle und im Tumor hervor. Nach den vorliegenden Beobachtungen kommt den Präparaten eine heilende Wirkung bei einzelnen oberflächlichen Hautcarcinomen zu. Für die Anwendung dieser Therapie kommen vor allem nur sicher inoperable Fälle in Betracht.

Viktor Bandler (Prag).

Fuhs, H. Über die therapeutische Wirksamkeit eines durch Verdauung von Trichophytonkulturen gewonnenen Präparates (Joannovics). Wien. klin. Wochenschr. 1920. Nr. 30.

Fuhs benützte bei 26 Fällen von Trichophytie ein aus verdauten Trichophytonkulturen hergestelltes Trichophytin (Joannovics). Das Präparat erwies sich nahezu in gleicher Weise bei subcutaner und intracutaner Anwendung in Dosen bis zu 0,5 ccm bei den tiefen Formen der Bartflechte als verwendbar. Es kürzt den Heilungsprozeß ab.

Viktor Bandler (Prag).

Tranter, V. Zur Behandlung von Hauterkrankungen mit Choleval. Wien. klin. Wochenschr. 1920. Nr. 39.

Tranter empfiehlt den Versuch mit Cholevalpräparaten (5% Cholevalzinkpaste, 10% Cholevallösung usw.) in erster Linie bei jenen Hauterkrankungen, bei welchen man eine epithelisierende Wirkung erzielen will.

Viktor Bandler (Prag).

Fuhs, H. Über die Wirksamkeit des Zuntzschen Haarwuchsmittels „Humagsolan“. Wien. klin. Wochenschr. 1920. Nr. 32.

Nach den Beobachtungen auf der Klinik Riehl konnte Fuhs den Schluß ziehen, daß das Humagsolan als Haarwuchsmittel den

gehegten Erwartungen nicht entsprochen hat. Die Erfahrungen haben bestätigt, daß dieses Präparat auch nach längerer Verabreichung ein für den Organismus unschädliches Mittel ist, ein wesentlich haarwuchsfördernder Einfluß konnte nicht konstatiert werden, ebenso wenig ein Schnellerwachsen der Nägel. Viktor Bandler (Prag).

Oppenheim, M. Das erste Jahr des Bestandes der Anstalt für Krätzeschnellkuren im Wilhelminen-Spital. Wien. klin. Wochenschr. 1920. Nr. 3.

Oppenheim hat mit der Schnellkur in 3 Stunden, welche nach folgender Vorschrift vorgenommen wird, glänzende Erfolge erzielt.

1. Abreibung des nackten Körpers mit Schmierseife (eine Viertelstunde).

2. Halbstündiges warmes Bad mit Schmierseifenabbürstung.

3. Nach Abtrocknung Einsmieren des Körpers mit Hardyscher Salbe: Sulf. praecip. 25,00, Kalii carbon. 10, w. Vaseline fl. 125. In dieser Salbe bleibt der Patient 2 Stunden in ein Leintuch gewickelt, mit Kotzen bedeckt.

Nach 2 Stunden warmes Bad, Seifenreinigung und Zinkpastenbestreichung. Inzwischen kann die Wäsche und Kleidung desinfiziert werden.

Viktor Bandler (Prag).

Ullmann, K. Cignolin, ein synthetisches Chrysarobin-Ersatzmittel in der Hauttherapie. Wien. med. Wochenschr. 1920. Nr. 15.

Ullmann verwendete Cignolin bei oberflächlicher Trichophytie, bei chronischen Ekzemen, Psoriasis vulgar. usw. Das Mittel wurde in $\frac{1}{2}$ —1proz. Lösungen in Benzol oder Zinköl, weiter als Trockenpinselung gegeben. Besonders Trichophytien zeigten nach Cignolinbehandlung nach einigen Tagen Stillstand des Prozesses und glatte Abheilung. Bei Psoriasis wirkte das Cignolin als Öreusche Salbe ebenfalls günstig.

Viktor Bandler (Prag).

Piowaty, R. Über die Behandlung der Dermatomykosen mit Cignolin. Wien. med. Wochenschr. 1920. Nr. 48.

Der Autor verwendete das Cignolin in $\frac{1}{3}$ —1proz. Lösung in Benzol oder Chloroform bei Herpes tonsurans superfic. und beobachtete, daß die oberflächliche Pilzwirkung nicht in die Tiefe drang, was auf die stark reduzierende Wirkung des Mittels zurückzuführen ist. Neben Psoriasis wirkt das Cignolin auch bei Alopecia areata sehr günstig.

Viktor Bandler (Prag).

Ludwig, H. Zur Anwendung des Cignolins in der dermatologischen Praxis. Wien. med. Wochenschr. 1920. Nr. 49.

Ludwig erzielte günstige therapeutische Erfolge bei Psoriasis und den verschiedenen Trichophytien. Er verwendete Cignolin in 1—2proz. Lösung in Form von Trockenpinselung oder als Salbe Acidi salicyl. 10,0, Cignol 1—2,00, Olei rusci 2, w. Vaseline 100. Das Mittel ist als Ersatz des Chrysarobins zu empfehlen.

Viktor Bandler (Prag).

Reines, Sigfr. Eine Modifikation in der Holländerschen Behandlungsmethode des *Lupus erythematodes*. Wien. med. Wochenschr. 1920. Nr. 30/31.

Reines applizierte das Chinin nicht per os, sondern intravenös (Chin. bihydrochlor.), und zwar zweimal täglich in Serien von 6 bis 8 Tagen, hierauf eine Pause von 1—3 Tagen. Nach der Behandlung zeigte sich eine deutliche Besserung des *Lupus eryth.*, indem die Herde sich abflachten, ältere Herde eine stetig narbig atrophische Involution zeigten.

Viktor Bandler (Prag).

Polland, R. Der Chrysarobin ersatz „Cignolin“. Wien. med. Wochenschr. 1919. Nr. 37.

Polland lobt das Cignolin als wirksames Mittel bei Psoriasis in Form der veränderten Dreuwischen Salbe *Acidi salicyl.* 10, Cignolini 3, *Olei rusci* 20, *Saponis viridis*, *Vaselini aa* 35. Das Cignolin reizt weniger als das Chrysarobin, macht keine Conjunctivitis und macht selbst bei ausgedehnter Anwendung keine Vergiftungserscheinungen.

Viktor Bandler (Prag).

Kretschmer, W. Über Cignolin. Wien. med. Wochenschr. 1919. Nr. 37.

An der Klinik Finger wurde das Cignolin bei superficiellen Trichophytien und bei Psoriasis mit bestem Erfolge verwendet.

Viktor Bandler (Prag).

Luithlen, Fr. Aderlaß, ein Teil der Kolloidtherapie. Wien. med. Wochenschr. 1919. Nr. 21 u. 22.

Die klinischen und experimentellen Beobachtungen des Autors erweisen, daß der Aderlaß, besonders die wiederholte Blutentnahme eine brauchbare Therapie darstellt. Die Behandlung kann nicht nur zur direkten Einwirkung auf Krankheitsveränderungen der Haut und anderer Gewebe, zur Umstimmung des Organismus, zur Beseitigung tiefliegender Störungen des Stoffwechsels verwendet werden, sondern es gelingt auch, durch richtige Anwendung des Aderlasses andere Behandlungen in ihrer günstigen Wirkung zu verstärken oder in ihren unangenehmen Nebenwirkungen abzuschwächen.

Viktor Bandler (Prag).

Geschlechtskrankheiten.

Syphilis.

I. Allgemeines, Experimentelles, Diagnostik.

Hochsinger, K. Krieg und Erbsyphilis. Wien. klin. Wochenschrift 1919. Nr. 49.

Hochsinger machte die Beobachtung, daß seit dem Jahre 1915 in seinem Ambulatorium die Erbsyphilis sowohl in den absoluten als auch relativen Zahlen in beträchtlicher Abnahme begriffen ist.